


2005 - يىلى مەملىكەتلىك ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتۇش ماتېرىياللىرىنى
تەكشۈرۈپ بېكىتىش كومىتېتىنىڭ دەسلەپكى تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن

ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ دەرس ئۆلچىمى تەجرىبە دەرسلىكى

ماتېماتىكا

تالىما دەرسلىك 3-2

理科



شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتى



مۇندەرجە

- 1 - باب. ساناش پرىنسىپى 1
- 1 - 1. تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ۋە باسقۇچ 2
2. بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى 2
- ئىزدىنىش ۋە بايقاش قىسمى توپلامنىڭ سانى قانچە؟ 13
- 2 - 1. ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە گۇرۇپپىلاش 16
- ئىزدىنىش ۋە بايقاش گۇرۇپپىلاش سانىنىڭ ئىككى خۇسۇسىيىتى 31
- 2 - 1 - 3. ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى 35
- ئىزدىنىش ۋە بايقاش «ياڭ خۇي ئۇچپۇلۇڭ» دىكى بەزى سىرلار 42
- خۇلاسە 46
- تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى 49

2 - باب. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ۋە ئۇنىڭ

- تەقسىماتى 53
- 2 - 1. دىسكرىت (تارقاق) تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ۋە ئۇنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى 54
- 3 - 2 - 2. ئىككى ئەزالىق تەقسىماتى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى ... 62



ئىزدىنىش ۋە بايقاش ئىككى ئەزالىق تەقسىماتقا بويىسۇنىدىغان تا -

سادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار قانداق قىممەت ئالغاندا ئېھ -

تىماللىق ئەڭ چوڭ بولىدۇ؟ 70

2. 3 - 2. دىسكرىت (تارقاق) تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار -

نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ۋە كۋادراتلىق ئايرىمىسى ... 73

2 - 4. نورمال تەقسىمات 84

ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ قوللىنىلىشى

تەقسىماتقا تەسىرى 89

خۇلاسە 91

تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى 93

3 - باب. ستاتىستىكىغا دائىر ئۆرنەك مىساللار 95

3 - 1. رېگرېسسىيە تەھلىلىنىڭ ئاساسىي ئىدىيىسى ۋە

ئۇنىڭ دەسلەپكى قوللىنىلىشى 96

3 - 2. مۇستەقىللىق تەكشۈرۈشنىڭ ئاساسىي ئىدىيىسى

ۋە ئۇنىڭ دەسلەپكى قوللىنىلىشى 109

پىراكتىكا تاپشۇرۇقى 118

خۇلاسە 119

تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى 120

15



1 - باب

ساناش پرىنسىپى

تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ۋە باسقۇچ 1-1

ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە گۇرۇپپىلاش 2-1

ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى 3-1



ئاپتوموبىل نومۇرى ئادەتتە 26 ئىنگىلىزچە ھەرپ ۋە 10 ئەرەب رەقىمى ئىچىدىكى بىرقانچىسىنى مۇۋاپىق تەرتىپ بويىچە تىزىش ئارقىلىق ھاسىل قىلىنىدۇ. ئائىلە ئاپتوموبىللىرىنىڭ سانى كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ تېز ئېشىپ بېرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، ئاپتوموبىل نومۇرىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن ئەتىكى زۆرۈر ئىش بولۇپ قالدى. بۇنىڭدىن باشقا، نۇرغۇن ئاپتوموبىل ئىگىلىرى نومۇرىنى «خاسلاشتۇرۇش» نى ئارزۇ قىلىدۇ. ئۇنداق بولسا، قاتناش باشقۇرۇش تارماقلىرى ئاپتوموبىل نومۇرلىرىنى ھاسىل قىلىش ئۇسۇلىنى قانداق بېكىتسە، ئاندىن ئاممىنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ؟ بۇنىڭ ئۈچۈن، مەلۇم خىل ئاپتوموبىل نومۇرى ھاسىل قىلىش لايىھىسىدىكى مۇمكىن بولغان بارلىق نومۇرلارنىڭ سانىنى «ساناپ چىقىش» قاتارىغا كېلىدۇ، مانا بۇ ساناش. كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىشتا بۇ نىڭغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان ساناش مەسىلىلىرى كۆپلەپ مەۋجۇت. مەسىلەن، كىچىك بالىلار ئويۇنچۇقلىرىنىڭ سانىنى بىر - بىرلەپ ساناش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلايدۇ؛ مەكتەپ سىنىپلار ئارا ۋاسكىتبول مۇسابىقىسى ئۆتكۈزمەكچى بولغاندا، مۇساپقە تۈزۈمى بېكىتىلگەندىن كېيىن، تەنتەربىيە گۇرۇپپىسىدىكى ئوقۇتقۇچىلار جەمئىي قانچە مەيدان مۇسابىقە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ھېسابلاپ باقىدۇ؛ قىزىل، سېرىق، يېشىل رەڭلىك ئۈچ بايراقىدىن دېڭىز قاتنىشى سىگنالى ھاسىل قىلىشتا، بۇ ئۈچ خىل رەڭدىكى بايراقلارنى ھەر خىل تىزىش ئارقىلىق ئوخشاش بولمىغان سىگناللار ئىپادىلەنسە، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە خىل سىگنال ھاسىل قىلىشقا بولىدۇ؟ ... دېگەندەك مەسىلىلەر.

بارلىق مۇمكىنچىلىكلەرنى بىر - بىرلەپ كۆرسىتىش ئۇسۇلى، يەنى بىر - بىرلەپ ساناش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېرەكلىك بولغان ساننى تاپقىلى بولىسىمۇ، ئەمما بۇ سان بەك چوڭ بولغاندا، بىر - بىرلەپ كۆرسىتىش ئۇسۇلىنى ئەمەلىي بېجىرىش توغرىسىدا ئىسپات بولىدۇ. بۇ ساننى قانداق قىلىپ بىر - بىرلەپ سانىماي تۇرۇپ ئېنىقلاش دەل بىز مۇشۇ بابتا كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىلىدۇر.

بىز باشلانغۇچ مەكتەپتە قوشۇش ۋە كۆپەيتىش ئەمەللىرىنى ئۆگەنگەندىن، بۇ، بىرقانچە «كىچىك» ساننى «چوڭراق» سانغا بىرلەشتۈرۈشتىكى ئەڭ ئاساسىي ماھارەت بولۇپ، بۇ خىل ماھارەتنى كېڭەيتىش ئارقىلىق مۇشۇ بابتا ئۆگىنىدىغان تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ۋە باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىش ساناش پرىنسىپى بارلىققا كەلتۈرگىلى بولىدۇ، بۇ ئىككى پرىنسىپ ساناش مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ ئاساسىي، ئەڭ مۇھىم ئىككى ئۇسۇلى ھېسابلىنىدۇ. بىز بۇ ئىككى ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ئىككى تۈرلۈك ئالاھىدە ساناش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ ساناش فورمۇلىسى، يەنى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسى ۋە گۇرۇپپىلاش سانى فورمۇلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز ھەمدە بۇ ئىككى فورمۇلىدىن پايدىلىنىپ بەزى ساناش مەسىلىلىرىنى ئاسان ھەل قىلالايمىز. ساناش پرىنسىپى ۋە ساناش فورمۇلىسىنىڭ قوللىنىلىشى سۈپىتىدە، بىز بۇ بابتا ماتېماتىكىدا كەڭ قوللىنىلىدىغان ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسىنىمۇ ئۆگىنىمىز.

1



رېبونۇكلېئىك كىسلاتا (RNA) مولېكۇلىسى ئىشقار رادىكالىرىنىڭ بەلگىلىك تەرتىپ بويىچە تىزىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئىشقار رادىكالىدىن 4 خىلى بار بولۇپ، يۈزلىگەن، مىڭلىغان ئىشقار رادىكالىرىدىن ھاسىل بولغان RNA مولېكۇلىسىنىڭ خىل سانى ئىنتايىن كۆپ ئىكەن، بۇ خىل ساننىڭ قانداق ھېسابلاپ چىقىلغانلىقىنى بىلەمسىز؟

كومپيۇتېردا ھەرپ - بەلگىلەر ئىككىلىك سىستېمىسى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئىنگىلىزچە ھەرپ بىلەن خەنزۇچە خەت ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بايت سانلىرى ئوخشاش بولمايدۇ، بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟

得到的号码 第 2 位 第 3 位 第 100 位

A_1				
A_2				
A_3	4 种	4 种	4 种	4 种
A_4				
A_5				
A_6				
A_7				

تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ۋە
باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى

مۇلاھىزە؟

سېنىپتىكى ئۇرۇنلارغا بىر ئىنگىلىزچە چوڭ ھەرپ ياكى بىر ئەرەب رەقىمى بىلەن نومۇر قويىساق، ئوخشاش بولمىغان نومۇردىن جەمئىي قانچىنى قويغىلى بولىدۇ؟

جەمئىي 26 ئىنگىلىزچە ھەرپ، 0 دىن 9 غىچە جەمئىي 10 ئەرەب رەقىمى بار، شۇڭا ئوخشاش بولمىغان نومۇردىن جەمئىي

$$26 + 10 = 36$$

نى قويغىلى بولىدۇ.

ئىزدىنىش

بۇ مەسىلىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

سىز تۇرمۇشتىن مۇشۇنىڭغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان مىساللارنى كەلتۈرەلەمسىز؟

① ئوخشاش بولمىغان ئىككى تۈرلۈك لايىھىدىكى ئۇسۇللار ئوخشاش ئەمەس.

يۇقىرىقى مەسىلىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى «ياكى» سۆزدە. نىڭ كۆرۈلگەنلىكىدە ئىپادىلىنىدۇ، يەنى ھەر بىر ئورۇنغا بىر ئىنگىلىزچە ھەرپ بىلەن ياكى بىر ئەرەب رەقىمى بىلەن نومۇر قوشۇشقا بولىدۇ. ئىنگىلىزچە ھەرپلەر بىلەن ئەرەب رەقىملىرى ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئىنگىلىزچە ھەرپتىن پايدىلىنىپ قوشۇلغان نومۇرلار بىلەن ئەرەب رەقىمىدىن پايدىلىنىپ قويۇلغان نومۇرلارمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.

ئومۇمەن، تۆۋەندىكىدەك پرىنسىپ مەۋجۇت:

تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى بىر ئىشنى تاماملاشتا ئوخشاش بولمىغان ئىككى تۈرلۈك لايىھە ② بار بولۇپ، 1 نىچى تۈرلۈك لايىھىدە ئوخشاش m خىل ئۇسۇل، 2 نىچى تۈرلۈك لايىھىدە ئوخشاش بولمىغان n خىل ئۇسۇل بار بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىشنى تاماملاشتا ئوخشاش بولمىغان

$$N = m + n$$

خىل ئۇسۇل بار بولىدۇ.

1 - مىسال. تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتكۈزگەن بىر ئوقۇغۇچى ئالىي مەكتەپكە ئىمتىھان بېرىش ئارزۇ ئانكىتىنى تولدۇرغاندا، A، B ئىككى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ھەربىرىدە ئۆزى قىزىقىدىغان كۈچلۈك تۈر كەسپلىرىنىڭ بارلىقىنى ئىگىلىگەن، كونكرېت ئەھۋال تۆۋەندىكىدەك:

A ئۇنىۋېرسىتېت	B ئۇنىۋېرسىتېت
بىئولوگىيە	ماتېماتىكا
خىمىيە	بوغالتىرلىق ئىلمى
تېببىي ئىلمى	ئۇچۇر تېخنىكىسى
فىزىكا	قانۇن ئىلمى
بىناكارلىق	

بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ بىرلا كەسپىنى تاللىشىغا يول قويۇلسا، ئۇنىڭ قانچە خىل تاللىشى بار؟
تەھلىل: بۇ ئوقۇغۇچى A، B ئىككى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ بىرىنىلا ھەمدە كەسپىنىمۇ پەقەت بىر - بىر تاللىيالايدىغانلىقى، شۇنداقلا ئىككى ئۇنىۋېرسىتېتتا ئورتاق كۈچلۈك تۈر كەسپى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ مەسىلە تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىنىڭ شەرتىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ.
 يېشىش: بۇ ئوقۇغۇچى A، B ئىككى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ بىرىنى تاللىسا بولىدۇ. A ئۇنىۋېرسىتېتتا 5 خىل كەسپ تاللاش ئۇسۇلى، B ئۇنىۋېرسىتېتتا 4 خىل كەسپ تاللاش ئۇسۇلى بار بولۇپ، ئىككى ئۇنىۋېرسىتېتتا بىرەر ئورتاق كۈچلۈك تۈر كەسپى بولمىغانلىقتىن، تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ مۇمكىن بولغان كەسپ تاللىشى جەمئىي:

$$5+4=9 \text{ (خىل).}$$

ئىزدىنىش



بىر ئىشنى ئورۇنداشتا ئوخشاش بولمىغان ئۈچ تۈرلۈك لايىھە بار بولۇپ، 1 - لايىھىدە ئوخشاش بولمىغان m_1 خىل ئۇسۇل، 2 - لايىھىدە ئوخشاش بولمىغان m_2 خىل ئۇسۇل، 3 - لايىھىدە ئوخشاش بولمىغان m_3 خىل ئۇسۇل بار بولسا، بۇ ئىشنى ئورۇنداشتا ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئۇسۇل بار؟
 بىر ئىشنى ئورۇنداشتا ئوخشاش بولمىغان n تۈرلۈك لايىھە بار بولۇپ، ھەربىر لايىھىدە ئوخشاش بولمىغان بىرقانچە خىل ئۇسۇل بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىشنى ئورۇنداشتىكى ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇللارنىڭ خىل سانىنى قانداق ساناش كېرەك؟

مۇلاھىزە؟

ئىنگىلىزچە ئالدىنقى 6 چوڭ ھەرپ ۋە 1 دىن 9 غىچە توققۇز ئەرەب رەقىمىدىن پايدىلىنىپ، سىنىپتىكى ئورۇنلارغا $A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots$ دېگەن شەكىل بويىچە نومۇر قويماق، ئوخشاش بولمىغان نومۇردىن جەمئىي قانچىنى قويغىلى بولىدۇ؟


بۇ مەسىلە ئالدىنقى مەسىلىگە ئوخشىمايدۇ. ئالدىنقى مەسىلىدە، 26 ئىنگىلىزچە ھەرپ ئىچىدىكى خا - لىغان بىرى ياكى 10 ئەرەب رەقىمى ئىچىدىكى خالىغان بىرىدىن پايدىلىنىپ بىر ئورۇن نومۇرىنى بەل -

گىلىگىلى بولىدۇ. ھالبۇكى، ھازىرقى بۇ مەسىلىدە نومۇر چوقۇم بىر ئىنگىلىزچە ھەرپ ۋە ئىندىكىس سۈپىتىدىكى بىر ئەرەب رەقىمىدىن تەركىب تېپىش، بىر نومۇرغا ئېرىشىشتە چوقۇم ئاۋۋال بىر ئىنگىلىزچە ھەرپنى بەلگىلىۋېلىش، ئاندىن بىر ئەرەب رەقىمىنى بەلگىلىۋېلىشتىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچ باشتىن ئۆتكۈزۈلۈشى كېرەك. 1.1.1 - رەسىمدىكى ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ مۇمكىن بولغان بارلىق نو-مۇرلارنى تىزىپ چىقىشقا بولىدۇ.

1.1.1 - رەسىمدە

كىسى ساناش مەسىلىسى
رنى ھەل قىلىشتا كۆپ
ئىشلىتىلىدىغان «دەرەخ»
سىمان شەكىل»، سىز
مۇمكىن بولغان بارلىق
نومۇرلارنى دەرەخسىمان
شەكىلدىن پايدىلىنىپ
تىزىپ چىقالامسىز؟

ئېرىشلىگەن نومۇر رەقىم ھەرپ



1.1.1 - رەسىم

يەنە تۆۋەندىكىدەك مۇلاھىزە يۈرگۈزسەكمۇ بولىدۇ:

ئىنگىلىزچە ئالدىنقى 6 چوڭ ھەرپ ئىچىدىكى خالىغان بىرى بىلەن 9 رەقىم ئىچىدىكى خالىغان بىر-رىدىن بىر نومۇر ھاسىل بولىدىغانلىقى ھەمدە ئۇلار ئۆزئارا ئوخشاش بولمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي

$$6 \times 9 = 54$$

نومۇر بولىدۇ.

ئىزدىنىش



بۇ مەسىلىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

يۇقىرىقى مەسىلىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى «ۋە» سۆزىنىڭ كۆرۈلگەنلىكىدە ئىپادىلىنىدۇ، يەنى ھەر بىر نومۇر بىر ئىنگىلىزچە ھەرپ ۋە بىر ئەرەب رەقىمىدىن تەركىب تاپىدۇ، ھەر بىر ئىنگىلىزچە ھەرپ بىلەن ئوخشاش بولمىغان رەقىملەردىن ھاسىل بولغان نومۇرلار ئوخشاش بولمايدۇ.

ئومۇمەن، تۆۋەندىكىدەك پرىنسىپ مەۋجۇت:

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى بىر ئىشنى ئىككى باسقۇچ بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ^①، 1 - باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان m خىل ئۇسۇل، 2 - باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان n خىل ئۇسۇل بار بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىشنى ئورۇنداشتا ئوخشاش بولمىغان جەمئىي

$$N = m \times n$$

خىل ئۇسۇل بار.

① 1 - باسقۇچتا

قايسى خىل ئۇسۇل قول.

لىنىلىشىدىن قەتئىينە.

زەر، 2 - باسقۇچتىكى

ئۇسۇلنىڭ تاللىنىشى.

خا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.

2 - مىسال. مەلۇم سىنىپتا 30 ئوغۇل ئوقۇغۇچى، 24 قىز ئوقۇغۇچى بار. بۇ سىنىپتىن بىر ئوغۇل ئوقۇغۇچى ۋە بىر قىز ئوقۇغۇچىنى تاللاپ سىنىپقا ۋاكالىتەن مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟

تەھلىل: مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان ئىككى ۋەكىلنى تاللاشنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ، 1 - باسقۇچتا ئوغۇل ئوقۇغۇچىنى تاللايمىز، 2 - باسقۇچتا قىز ئوقۇغۇچىنى تاللايمىز. يېشىش: 1 - باسقۇچتا، 30 ئوغۇل ئوقۇغۇچى ئىچىدىن بىرىنى تاللايمىز، بۇنىڭدا ئوخشاش بولمىغان 30 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛ 2 - باسقۇچتا، 24 قىز ئوقۇغۇچى ئىچىدىن بىرىنى تاللايمىز، بۇنىڭدا ئوخشاش بولمىغان 24 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار.

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي

$$30 \times 24 = 720$$

خىل ئۇسۇل بار.

ئىزدىنىش



بىر ئىشنى ئۈچ باسقۇچ بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ. 1 - باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان m_1 خىل ئۇسۇل، 2 - باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان m_2 خىل ئۇسۇل، 3 - باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان m_3 خىل ئۇسۇل بار بولسا، بۇ ئىشنى ئورۇنداشتا ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئۇسۇل بار؟
بىر ئىشنى n باسقۇچ بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ. ئەگەر ھەر بىر باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان بىر قانچە خىل ئۇسۇل بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىشنى ئورۇنداشتىكى ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇللارنىڭ خىل سانىنى قانداق ساناش كېرەك؟

3 - مىسال. كىتاب جازىسىنىڭ 1 - قەۋىتىدە ئوخشاش بولمىغان 4 پارچە كومپيۇتېر كىتابى، 2 - قەۋىتىدە ئوخشاش بولمىغان 3 پارچە ئەدەبىيات - سەنئەت كىتابى، 3 - قەۋىتىدە ئوخشاش بولمىغان 2 پارچە تەنتەربىيە كىتابى بار.

(1) كىتاب جازىسىدىن خالىغان 1 پارچە كىتابنى ئېلىشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئېلىش ئۇسۇلى بار؟

(2) كىتاب جازىسىنىڭ ھەر بىر قەۋىتىدىن 1 پارچە كىتابنى ئېلىشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئېلىش ئۇسۇلى بار؟

يېشىش: (1) كىتاب جازىسىدىن خالىغان 1 پارچە كىتابنى ئېلىشنىڭ 3 تۈرلۈك ئۇسۇلى بار: 1 - تۈرلۈك ئۇسۇلدا، 1 - قەۋەتتىن 1 پارچە كومپيۇتېر كىتابىنى ئالغىمىز، بۇنىڭدا 4 خىل ئۇسۇل بار؛ 2 - تۈرلۈك ئۇسۇلدا، 2 - قەۋەتتىن 1 پارچە ئەدەبىيات - سەنئەت كىتابىنى ئالغىمىز، بۇنىڭدا 3 خىل ئۇسۇل بار؛ 3 - تۈرلۈك ئۇسۇلدا، 3 - قەۋەتتىن 1 پارچە تەنتەربىيە كىتابىنى ئالغىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل ئۇسۇل بار. تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، ئوخشاش بولمىغان ئېلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:

$$N = m_1 + m_2 + m_3 = 4 + 3 + 2 = 9;$$

(2) كىتاب جازىسىنىڭ ھەر بىر قەۋىتىدىن 1 پارچە كىتاب ئېلىشنى 3 باسقۇچ بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ: 1 - باسقۇچتا، 1 - قەۋەتتىن 1 پارچە كومپيۇتېر كىتابىنى ئالغىمىز، بۇنىڭدا 4 خىل ئۇسۇل

بار؛ 2 - باسقۇچتا، 2 - قەۋەتتىن 1 پارچە ئەدەبىيات - سەنئەت كىتابىنى ئالىمىز، بۇنىڭدا 3 خىل ئۇسۇل بار؛ 3 - باسقۇچتا، 3 - قەۋەتتىن 1 پارچە تەنتەربىيە كىتابىنى ئالىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل ئۇسۇل بار. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، ئوخشاش بولمىغان ئېلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:


$$N = m_1 \times m_2 \times m_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24.$$

4 - مىسال. A، B، C دىن ئىبارەت 3 پارچە رەسىم ئىچىدىن 2 پارچىسىنى تاللاپ، ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم تامنىڭ ئوڭ - سول ئىككى تەرىپىدىكى كۆرسىتىلگەن جايغا ئېسىپ قويۇشتا، جەمئىي ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئېسىش ئۇسۇلى بار؟

يېشىش: 3 پارچە رەسىم ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ تامنىڭ ئوڭ - سول ئىككى تەرىپىگە ئېسىشنى 2 باسقۇچ بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ: 1 - باسقۇچتا، 3 پارچە رەسىم ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ تامنىڭ سول تەرىپىگە ئاسىمىز، بۇنىڭدا 3 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛ 2 - باسقۇچتا، قېپقالغان 2 پارچە رەسىم ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ، تامنىڭ ئوڭ تەرىپىگە ئاسىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، ئوخشاش بولمىغان ئېسىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:

$$N = 3 \times 2 = 6.$$

6 خىل ئېسىش ئۇسۇلىنى تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلەشكە بولىدۇ:




تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى بىلەن باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىنىڭ ھەر ئىككىسىدە بىر ئىشنى ئورۇنداشتىكى ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇللارنىڭ خىل سانى مەسىلىسىگە جاۋاب بېرىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پەرقى شۇكى، تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى «تۈرگە ئايرىلىدىغان» مەسىلەلەرگە قارىتىلىدۇ، ئۇنىڭدىكى ھەر خىل ئۇسۇللار ئۆزئارا مۇستەقىل بولۇپ، بۇ ئىشنى مۇشۇ ئۇسۇللارنىڭ خالىغان بىرى بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ؛ باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى «باسقۇچقا بۆلۈنگەن» مەسىلىلەرگە قارىتىلىدۇ، ھەرقايسى باسقۇچلاردىكى ئۇسۇللار ئۆزئارا بېقىنىش مۇناسىۋىتىدە بولۇپ، ھەممە باسقۇچلارنى تاماملاپ بولغاندىلا ئاندىن بۇ ئىش ئورۇندالغان بولىدۇ.

مەشىق


1. بوش ئورۇننى تۆلدۈرۈڭ:

(1) بىر ئىشنى 2 خىل ئۇسۇل بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ، 5 ئادەم پەقەت 1 - ئۇسۇلنىلا بىلىدۇ، يەنە 4 ئادەم پەقەت 2 - ئۇسۇلنىلا بىلىدۇ. بۇ 9 ئادەم ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ بۇ ئىشنى ئورۇنداشتا، ئوخشاش بولمىغان تاللاش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى _____؛

رۇنلاردىكى ئىشقار رادىكالىرى مۇناسىۋەتسىز بولىدۇ. بىر تۈرلۈك RNA مولېكۇلىسى 100 دانە ئىشقار رادىكالىدىن تۈزۈلگەن دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل RNA مولېكۇلىسى بولىدۇ؟



تەھلىل: 100 دانە ئىشقار رادىكالىدىن تۈزۈلگەن ئۇزۇن زەنجىرنى 2.1.1 - رەسىم بىلەن ئىپادىلەيلى، بۇ چاغدا زەنجىردە جەمئىي 100 ئورۇن بار بولۇپ، ھەر بىر ئورۇننى U، G، C، A ئىچىدىكى خالىغان بىرى ئىگىلىيەلەيدۇ.



رەسىم - 2.1.1

$$4^{100} \approx 1.6 \times 10^{60}$$

بۇ بىر ناھايىتى چوڭ سان. ئەگەر قىزىقىدىغان ساۋاقداشلار بولسا، ئۇ زۇڭلار RNA غا مۇنا. سۈنەتلىك ماتېرىياللارنى تەكشۈرۈپ كۆرۈڭلار.

يېشىش: 2.1.1 - رەسىمدىكىدەك، 100 دانە ئىشقار رادىكالىدىن تۈزۈلگەن ئۇزۇن زەنجىردە جەمئىي 100 ئورۇن بار. سولدىن ئوڭغا بولغان تەرەپتىن بويىچە كەلگەن ھەر بىر ئورۇننى U، G، C، A ئىچىدىكى خالىغان بىرىنى تاللاپ تولدۇرساق، ھەر بىر ئورۇننى 4 خىل ئۇسۇل بىلەن تولدۇرۇشقا بولىدۇ. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، بۇ تۈردىكى (يەنى 100 دانە ئىشقار رادىكالىدىن تۈزۈلگەن) مۇمكىنچىلىكى بار ئوخشاش بولمىغان بارلىق RNA مولېكۇلىلىرىنىڭ خىل سانى:

$$\underbrace{4 \times 4 \times \dots \times 4}_{100 \text{ دانە}} = 4^{100}.$$

7 - مىسال. ئېلېكترونلۇق ئېلېمېنتتىن پايدىلىنىپ توك يولىنى ئۆتكۈزۈش ۋە ئۇزۇۋېتىش، ئېلېكتر پوتېنسىئالنى يۇقىرىلىتىش ۋە تۆۋەنلىتىشنى ناھايىتى ئاسان ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ، بۇلار كونترول قىلىش ئەڭ ئاسان بولغان ئىككى خىل ھالەتتۇر. شۇڭا، كومپيۇتېرنىڭ ئىچكى قىسمىدا ھەر بىر خانىسىدا 0 ياكى 1 دىن ئىبارەت ئىككى خىل رەقەملا بولغان سان خاتىرىلەش ئۇسۇلى، يەنى ئىككىلىك سىستېمىسى قوللىنىلىدۇ. كومپيۇتېرنى ھەرپ - بەلگىلەرنى پەرق ئېتەلەيدىغان قىلىش ئۈچۈن، ھەرپ - بەلگىلەرنى كودلاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ، كودلاشتۇرۇشتا، ھەر بىر ھەرپ - بەلگە بىر ياكى بىر قانچە بايت بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، بايت دېگەنمىز كومپيۇتېردا سانلىق مەلۇمات ساقلاشنىڭ ئەڭ كىچىك ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ، ھەر بىر بايت ئىككىلىك سىستېمىدىكى 8 خانىدىن تەركىب تاپىدۇ.


(1) بىر بايت (8 خانە) بىلەن ئەڭ كۆپ بولغاندا ئوخشاش بولمىغان قانچە دانە ھەرپ - بەلگىنى ئىپادىلىگىلى بولىدۇ؟

(2) كومپيۇتېردىكى خەنزۇچە خەت خەلقئارا كودى (GB كودى) 6763 دانە خەنزۇچە خەتنى ئۇزۇن

ئىچىگە ئالغان بولۇپ، بىر خەنزۇچە خەت بىر ھەرپ - بەلگىگە توغرا كېلىدۇ. بۇ خەنزۇچە خەتلەرنى كودلاشتۇرۇشقا توغرا كەلسە، ھەر بىر خەنزۇچە خەتنى كەم دېگەندە قانچە بايت بىلەن ئىپادىلەش كېرەك؟

تەھلىل: ھەر بىر بايت ئىككىلىك سىستېمىدىكى 8 خانىدىن تەركىب تېپىپ، ھەر بىر خانىدىكى قىممەتكە نىسبەتەن 0، 1 دىن ئىبارەت ئىككى خىل تاللاش بار ھەمدە 0، 1 نىڭ ئوخشاش بولمىغان تەر - تىپتە تىزىلىشى ئوخشاش بولمىغان ھەرپ - بەلگىنى ئىپادىلەيدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ مىسالنى باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ يەشكىلى بولىدۇ.

يېشىش: (1) بىر بايتنى 3.1.1 - رەسىم بىلەن ئىپادىلەيلى.



3.1.1 - رەسىم

بىر بايت 8 خانىدىن تەركىب تېپىپ، ھەر بىر خانىغا نىسبەتەن 2 خىل تاللاش بولغانلىقى ئۈچۈن، باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسلانسا، بىر بايت بىلەن ئەڭ كۆپ بولغاندا ئوخشاش بولمىغان

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^8 = 256$$

دانه ھەرپ - بەلگىنى ئىپادىلەشكە بولىدۇ.


(2) (1) دىن بىلەلەيمىزكى، ئوخشاش بولمىغان 6763 دانه ھەرپ - بەلگىنى بىر بايت بىلەن ئىپادە - لىگىلى بولمايدۇ، شۇڭا 2 بايت بىلەن قانچە دانه ھەرپ - بەلگىنى ئىپادىلەشكە بولىدىغانلىقىنى مۇلاھى - زە قىلىشىمىز كېرەك. ئالدىنقى بىر بايتتا ئوخشاش بولمىغان 256 خىل ئىپادىلەش ئۇسۇلى، كېيىنكى بىر بايتتىمۇ ئوخشاش بولمىغان 256 خىل ئىپادىلەش ئۇسۇلى بولغانلىقى ئۈچۈن، باسقۇچ بويىچە كۆ - پەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسلانسا، 2 بايت بىلەن ئوخشاش بولمىغان

$$256 \times 256 = 65536$$

دانه ھەرپ - بەلگىنى ئىپادىلىگىلى بولىدۇ، بۇ سان خەنزۇچە خەت خەلقئارا كودى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەنزۇچە خەت سانى 6763. تىن خېلىلا چوڭ، شۇڭا بۇ خەنزۇچە خەتلەرنى ئىپادىلەشتە، ھەر بىر خەنزۇچە خەتنى كەم دېگەندە 2 دانه بايت بىلەن ئىپادىلەش كېرەك.

8 - مىسال. كومپيۇتېر پروگرامما خادىملىرى پروگرامما تۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى سە - نايدۇ. قانچىلىك سىناش سانلىق مەلۇماتى بىلەن تەمىنلەشنى بىلىش ئۈچۈن، پروگرامما خادىمى ئىجرا قىلىش يولى (پروگراممىنىڭ «باشلاش» تىن «ئاخىرلاشتۇرۇش» قىچە بولغان يولى) دىن قانچىسى بارلە - قىمنى بىلىشى كېرەك. 4.1.1 - رەسىمدىكىدەك، پروگرامما بۆلىكى نۇرغۇن ئىجرا قىلىش يوللىرىغا ئىگە بولۇپ، ئادەتتە ئۇ كۆپلىگەن قىسمى بۆلەكلەردىن تەركىب تاپىدۇ. ئۇنداق بولسا، رەسىمدىكى بۇ پروگرامما بۆلىكىدە قانچە ئىجرا قىلىش يولى بار؟

بۇنىڭدىن باشقا، سىناش ۋاقتىنى تېجەش ئۈچۈن، پروگرامما خادىمى سىناش قېتىم سانىنى ئازا - تىشىنىڭ ئامالىنى قىلىدۇ. پروگرامما خادىمىنىڭ سىناش قېتىم سانىنى ئازايتىشى ئۈچۈن بىر سىناش ئۇسۇلى لايىھىلەپ بېرەلمىسۇن؟



4.1.1 - رەسىم

تەھلىل: پۈتكۈل پروگرامما بۆلىكىدىن خالىغان بىر ئىجرا قىلىش يولىنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ: 1 - باسقۇچتا، «باشلاش» تىن A نۇقتىسىغىچە ئىجرا قىلىمىز؛ 2 - باسقۇچتا، A نۇقتىسىدىن «ئاخىرلاشتۇرۇش» قىچە ئىجرا قىلىمىز. ھالبۇكى، 1 - باسقۇچنى قىسمى بۆلەك 1 ياكى قىسمى بۆلەك 2 ياكى قىسمى بۆلەك 3 بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ؛ 2 - باسقۇچنى قىسمى بۆلەك 4 ياكى قىسمى بۆلەك 5 بىلەن ئورۇنداشقا بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، بىر بۇيرۇقنىڭ پۈتكۈل پروگرامما بۆلىكىدىكى ئىجرا قىلىنىش يولىنى تەھلىل قىلىشتا ئىككى ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىشقا توغرا كېلىدۇ. يېشىش: تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، قىسمى بۆلەك 1 ياكى قىسمى بۆلەك 2 ياكى قىسمى بۆلەك 3 تىكى قىسمى يوللارنىڭ سانى جەمئىي:

$$18+45+28=91;$$

قىسمى بۆلەك 4 ياكى قىسمى بۆلەك 5 تىكى قىسمى يوللارنىڭ سانى جەمئىي:

$$38+43=81.$$

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، پۈتكۈل پروگرامما بۆلىكىنىڭ ئىجرا قىلىش يوللىرىنىڭ سانى جەمئىي:

$$91 \times 81 = 7371.$$

ئەمەلىي سىناش جەريانىدا، پروگرامما خادىمى دائىم بىر قىسمى بۆلەكنى بىر «قارا ساندۇق» دەپ قاراپ، پەقەت قىسمى بۆلەكنىڭ توغرا ئىجرا قىلىنغان - قىلىنمىغانلىقىنى تەكشۈرۈش شەكلى ئارقىلىق پۈتكۈل پروگرامما بۆلىكىنى تەكشۈرىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇ ئالدى بىلەن 5 قىسمى بۆلەكنى ئايرىم - ئايرىم مۇستەقىل سىناپ، ھەر بىر قىسمى بۆلەكنىڭ خىزمىتىنىڭ نورمال بولغان - بولمىغانلىقىنى تەكشۈرىدۇ. ئومۇمىي سىناش قېتىم سانى:

$$18+45+28+38+43=172.$$

ئاندىن ھەرقايسى قىسمى بۆلەكلەر ئارىسىدىكى ئۆچۈر ئالمىشىشنىڭ نورمال بولغان - بولمىغانلىقىنى سىنايدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن، پروگراممىنىڭ 1 - باسقۇچىدىكى قىسمى بۆلەكلەر بىلەن 2 - باسقۇچىدىكى قىسمى بۆلەكلەر ئارىسىدا ئۆچۈر ئالمىشىشنىڭ نورمال بولغان - بولمىغانلىقى سىنالىنىلا بولىدۇ، سىناش قېتىم سانى:

$$3 \times 2 = 6.$$

ئەگەر ھەربىر قىسمى بۆلەكنىڭ خىزمىتىنى نورمال ھەمدە ھەرقايسى قىسمى بۆلەكلەر ئارىسىدىكى ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش نورمال بولسا، ئۇ ھالدا پۈتكۈل پروگرامما بۆلىكىنىڭ خىزمىتىمۇ نورمال بولىدۇ. شۇنداق قىلىپ، پۈتكۈل پروگرامما بۆلىكىنى سىناش قېتىم سانى:

$$172+6=178 \text{ (قېتىم).}$$

روشنەنكى، 178 بىلەن 7371 نىڭ پەرقى ناھايىتى چوڭ.

سىز پروگرامما خادىمىنىڭ سىناش قېتىم سانىنى ئازايتىشنى قانداق قىلىپ ئەمەلگە ئاشۇرغانىدۇر؟

9 - مىسال. مەلۇم شەھەردىكى ئائىلە ئاپتوموبىل سانى كىشىلەر تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ تېز ئېشىپ بارغانلىقى ئۈچۈن، ئاپتوموبىل نومۇرىنى كېڭەيتىشكە توغرا كەلدى. قاتناش باشقۇرۇش تارماقلىرى ئاپتوموبىل نومۇرى ھاسىل قىلىشنىڭ مۇنداق بىر يېڭى ئۇسۇلىنى ئوتتۇرىغا قويدى: ھەربىر ئاپتوموبىل نومۇرىدا چوقۇم تەكرارلانمايدىغان 3 ئىنگىلىزچە ھەرپ ۋە تەكرارلانمايدىغان 3 ئەرەب رەقىمى بولۇشى ھەمدە 3 ئىنگىلىزچە ھەرپ چوقۇم بىر گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن شەكىلدە كۆرۈلۈشى، 3 ئەرەب رەقىمىمۇ چوقۇم بىر گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن شەكىلدە كۆرۈلۈشى كېرەك. بۇ يېڭى ئۇسۇلدىن پايدىلانغاندا جەمئىي قانچە ئاپتوموبىلغا نومۇر قويغىلى بولىدۇ؟

تەھلىل: ئاپتوموبىللارغا مۇشۇ يېڭى ئۇسۇل بويىچە نومۇر قويغاندا، نومۇرلارنى گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن ھەرپلەر سول تەرەپتە بولۇش ۋە ئوڭ تەرەپتە بولۇش دەپ 2 تۈرگە ئايرىشقا بولىدۇ. بىر ئاپتوموبىل نومۇرىدىكى ھەرپ ۋە رەقىملەرنى بەلگىلەشنى 6 باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ.

يېشىش: ئاپتوموبىل نومۇرلىرىنى گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن ھەرپلەر سول تەرەپتە بولىدىغان ۋە ئوڭ تەرەپتە بولىدىغان قىلىپ 2 تۈرگە ئايرىمىز.

گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن ھەرپلەر سول تەرەپتە بولغاندا، بىر ئاپتوموبىل نومۇرىدىكى ھەرپ ۋە رەقىملەرنى بەلگىلەشنى 6 باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇندايىمىز:

1 - باسقۇچتا، 26 ھەرپ ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ باش ئورۇنغا قويىمىز، بۇنىڭدا 26 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛

2 - باسقۇچتا، قېپقالغان 25 ھەرپ ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ 2 نچى ئورۇنغا قويىمىز، بۇنىڭدا 25 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛

3 - باسقۇچتا، قېپقالغان 24 ھەرپ ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ 3 نچى ئورۇنغا قويىمىز، بۇنىڭدا 24 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛

4 - باسقۇچتا، 10 رەقەم ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ 4 نچى ئورۇنغا قويىمىز، بۇنىڭدا 10 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛

5 - باسقۇچتا، قېپقالغان 9 رەقەم ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ 5 نچى ئورۇنغا قويىمىز، بۇنىڭدا 9 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛

6 - باسقۇچتا، قېپقالغان 8 رەقەم ئىچىدىن بىرىنى تاللاپ 6 نچى ئورۇنغا قويىمىز، بۇنىڭدا 8 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار.

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ سىناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن ھەرپلەر سول تەرەپتە بولىدىغان ئاپتوموبىل نومۇرلىرىنىڭ سانى:

$$26 \times 25 \times 24 \times 10 \times 9 \times 8 = 11\,232\,000.$$

ئوخشاش يول بىلەن، گۇرۇپپا بولۇپ تەشكىللەنگەن ھەرپلەر ئوڭ تەرەپتە بولىدىغان ئاپتوموبىل نومۇرلىرىنىڭ سانىمۇ 11 232 000 بولىدۇ.

ئاپتوموبىلغا نومۇر قويغىلى بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ساناش مەسىلىلىرىنى تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ۋە باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىش ئۇسۇلىنى يىغىنچاقلىيالايمىز؟

ساناش مەسىلىلىرىنى ئىككى ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم ئىش شۇكى، ھېسابلاشتىن ئىلگىرى ئالدى بىلەن تۈرگە ئايرىش ياكى باسقۇچقا بۆلۈش مەسىلىسى ئۈستىدە ئىنچىكىلىك بىلەن تەھلىل يۈرگۈزۈش كېرەك.

تۈرگە ئايرىشتا «تەكرارلىماسلىق ۋە چۈشۈرۈپ قويىماسلىق» نى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. تۈرگە ئايرىغاندىن كېيىن، ھەر بىر تۈردىكى ئۇسۇللارنىڭ سانىنى ئايرىم - ئايرىم سانايىمىز، ئاخىرىدا تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ يىغىندىنى تېپىپ، ئومۇمىي سانغا ئېرىشىمىز.

باسقۇچقا بۆلۈشتە «باسقۇچلارنىڭ تولۇق بولۇشى» نى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بارلىق باسقۇچلار تاماملانغاندىن كېيىن، ۋەزىپىمۇ ئورۇندالغان بولىدۇ، بۇنىڭدا باسقۇچ بىلەن باسقۇچنىڭ ئۆزئارا مۇستەقىل بولۇشىغا دىققەت قىلىش كېرەك. باسقۇچقا بۆلگەندىن كېيىن، ھەر بىر باسقۇچتىكى ئۇسۇللارنىڭ سانىنى ھېسابلايمىز، ئاخىرىدا باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، ھەر بىر باسقۇچنى ئورۇنداشتىكى ئۇسۇللار سانىنى كۆپەيتىپ، ئومۇمىي سانغا ئېرىشىمىز.

مۇلاھىزە؟

كۆپەيتىش ئەمىلى ئالاھىدە شەرت ئاستىدىكى قوشۇش ئەمىلىنىڭ ئاددىيلاشتۇرۇلۇشى ھېسابلىنىدۇ، ئۇنداق بولسا، باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى بىلەن تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ئارىسىدىمۇ بۇنىڭغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان مۇناسىۋەت بارمۇ؟

مەشىق

1. كۆپەيتىمە $(a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3)(c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5)$ نى يايغاندىن كېيىن، يېيىلمىدا جەمئىي قانچە ئەزا بار؟
2. مەلۇم تېلېفون ئىدارىسىنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسىدىكى تېلېفون نومۇرلىرى 8 خانىلىق رەقەمدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ئۇنىڭ ئالدىنقى تۆت خانىسىدىكى رەقەملەر ئۆزگەرمەي، كېيىنكى تۆت خانىسىدىكى رەقەملەر 0 بىلەن 9 ئارىلىقىدىكى رەقەملەر بولسا، بۇ تېلېفون ئىدارىسىنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسىدە ئوخشاش بولمىغان تېلېفون نومۇرىدىن ئەڭ كۆپ بولغاندا قانچىسى بار؟
3. 5 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 1 گۇرۇپپا باشلىقى ۋە 1 مۇئاۋىن گۇرۇپپا باشلىقى تاللاشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟
4. مەلۇم سودا سارىيىنىڭ 6 ئىشىكى بار. بىر ئادەم سودا سارىيىنىڭ خالىغان بىر ئىشىكىدىن كىرىپ، باشقا بىر ئىشىكىدىن چىقىپ كەتمەكچى بولسا، ئۇنىڭ سودا سارىيىغا كىرىپ - چىقىشىدا ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئۇسۇل بار؟



قىسمىي توپلامنىڭ سانى قانچە؟

مەسىلە n ئېلېمېنتلىق توپلام $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ نىڭ قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانى قانچە؟ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشتا يولغا قويۇشقا بولىدىغان بىر پىكىر يولى مۇنداق: ئالدى بىلەن بەزى كونكرېت توپلاملار، مەسىلەن، $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ نىڭ قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانىنى تەتقىق قىلىپ، بۇنىڭدىن ئىلھام ئېلىش ئاساسىدا ئومۇمىي ئەھۋال ئۈستىدە مۇھاكىمە ئېلىپ بېرىش.

S تا 3 لا ئېلېمېنت بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ بارلىق قىسمىي توپلاملىرىنى بىر - بىرلەپ كۆرسىتىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ يېزىپ چىقالايمىز:

$$\emptyset, \{a_1\}, \{a_2\}, \{a_3\}, \{a_1, a_2\}, \{a_1, a_3\}, \{a_2, a_3\}, S.$$

شۇڭا، 3 ئېلېمېنتى ئۆز ئىچىگە ئالغان توپلامنىڭ قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانى جەمئىي 8.

مىسال كەلتۈرۈش ئۇسۇلى بىر قەدەر «دۆت» رەك بولۇپ، لېكىن ئۇ ساناش ئۇسۇلىنىڭ ئاساسىي ئۇسۇلىدۇر، 4 ئېلېمېنتلىق، 5 ئېلېمېنتلىق توپلامنىڭ قىسمىي توپلاملىرىنى مىسال كەلتۈرۈپ باقىڭىز بولىدۇ.



بىر توپلامنىڭ ئېلېمېنتلىرىنىڭ سانى ئازراق بولغاندا، ئۇنىڭ قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانىنى بىر - بىرلەپ كۆرسىتىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئېنىقلاشقا بولىدۇ. لېكىن، توپلامنىڭ ئېلېمېنتلىرىنىڭ سانى بىر قەدەر كۆپ بولغاندا، ئۇنىڭ قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانىنى بۇ ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئېنىقلاش قۇلايسىز بولۇپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ قىرغى بىلەن 3 بىلەن 8 ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بايقاشمۇ بىر قەدەر تەس.

قانۇنىيەتنى بايقاش ئۈچۈن باشقا ئۇسۇللارنى قوللىنىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. بۇ يەردە، تەبىئىي ھالدا ئامال قىلىپ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى ساناش پرىنسىپىنى ئىشلىتىش دېگەن پىكىرگە كېلىمىز.

روشنەكى، a_i ($i=1, 2, 3$) ئېلېمېنت بىلەن ھەرقايسى قىسمىي توپلاملار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت a_i قىسمىي توپلامغا تەۋە ياكى a_i قىسمىي توپلامغا تەۋە ئەمەستىن ئىبارەت ئىككى خىللا بولىدۇ. شۇڭا، S تىكى ھەر بىر ئېلېمېنتنىڭ مەلۇم قىسمىي توپلامغا تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ بىر قىسمىي توپلامغا ئېرىشىشنى ئويلاشقا بولىدۇ. S تا 3 ئېلېمېنت بولغانلىقتىن، S توپلامنىڭ بىر قىسمىي توپلىمى S_1 گە ئېرىشىشنى ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ:

1 - باسقۇچتا، a_1 ئېلېمېنتىنىڭ S_1 گە تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار ($a_1 \notin S_1, a_1 \in S_1$)؛

2 - باسقۇچتا، a_2 نىڭ S_1 گە تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار ($a_2 \notin S_1, a_2 \in S_1$)؛

3 - باسقۇچتا، a_3 ئېلېمېنتىنىڭ S_1 گە تەۋە بولۇش - بولما. ماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار $(a_3 \notin S_1, a_3 \in S_1)$.

يۇقىرىقى ئۈچ باسقۇچ تاماملاندىلا، S_1 توپلامىدىكى ئېلېمېنتلار تامامەن ئېنىقلانغان بولىدۇ. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، 3 ئېلېمېنتتىن تەركىب تاپقان توپلامنىڭ ئوخشاش بولمىغان قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانى: $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$.

يۇقىرىقى جەرياندىن 3 بىلەن 8 نىڭ مۇناسىۋىتىنى كۆرۈۋالالايمىز: 3 بولسا 2^3 دىكى كۆر. سەتكۈچ، ئەمما 8 بولسا 2^3 نى ھېسابلىغاندىكى نەتىجە. ئومۇمەن:

n ئېلېمېنتلىق توپلام $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ نىڭ ئوخشاش بولمىغان قىسمىي توپلاملىرىنىڭ سانى 2^n بولىدۇ.

ئىسپات: A توپلامنىڭ بىر قىسمىي توپلىمى S_1 گە ئېرىشىشنى n باسقۇچقا بۆلۈپ ئو. رۇنداشقا بولىدۇ:

1 - باسقۇچتا، a_1 ئېلېمېنتىنىڭ S_1 غا تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار $(a_1 \notin S_1, a_1 \in S_1)$;

2 - باسقۇچتا، a_2 ئېلېمېنتىنىڭ S_1 گە تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇنىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار $(a_2 \notin S_1, a_2 \in S_1)$;

.....

k - نىچى باسقۇچتا، a_k ئېلېمېنتىنىڭ S_1 گە تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇ. نىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار $(a_k \notin S_1, a_k \in S_1)$;

.....

n - نىچى باسقۇچتا، a_n ئېلېمېنتىنىڭ S_1 گە تەۋە بولۇش - بولماسلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇ. نىڭدا 2 خىل مۇمكىنچىلىك بار $(a_n \notin S_1, a_n \in S_1)$.

يۇقىرىدىكى بۇ n باسقۇچ تاماملاندىلا، S_1 توپلامنىڭ ئېلېمېنتلىرى تامامەن ئېنىقلانغان بولىدۇ. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، n ئېلېمېنتتىن تەركىب تاپقان توپلامنىڭ ئېلېمېنتلىرىنىڭ سانى:

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{2 \text{ دانە } n} = 2^n.$$

دەنە ئوخشاش بولمىغان قىسمىي توپلامدىن ئىبارەت.


مۇلاھىزە؟

يۇقىرىدىكى يەكۈننى باشقا ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلىيالايمىز؟


1.1 - كۆنۈكمە



A گۆرۈپيا



(2 - مىسال ئۈچۈن)



(4 - مىسال ئۈچۈن)

1. بىر ماگىزىن مەلۇم تىپلىق تېلېۋىزور ساتماقچى بولدى. بۇنىڭ ئىچىدە، شۇ يەردە ئىشلەپچىقىرىلغان تېلېۋىزور 4 خىلى، باشقا يەردە ئىشلەپچىقىرىلغان تېلېۋىزور 7 خىلى بار بولسا، مۇشۇ تىپلىق 1 تېلېۋىزور سېتىۋېلىشتا ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟

2. A جايدىن B جايغا بارىدىغان 2 يول، B جايدىن D جايغا بارىدىغان 3 يول بار؛ A جايدىن C جايغا بارىدىغان 4 يول، C جايدىن D جايغا بارىدىغان 2 يول بار. A جايدىن D جايغا بېرىشتا ئوخشاش بولمىغان قانچە يول بار؟

3. 1، 5، 9، 13 ئىچىدىكى خالىغان بىرىنى سۈرەت، 4، 8، 12،

16 ئىچىدىكى خالىغان بىرىنى مەخرەج قىلىپ ئوخشاش بولمىغان ئاددىي كەسىردىن قانچىنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ ئوخشاش بولمىغان توغرا كەسىردىن قانچىنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟

4. رەسىمدىكى توك يولىدا، A بىلەن B نى تۇتاشتۇرۇشتا ئوخشاش بولمىغان قانچە لىنىيە بار؟

5. (1) تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردىنات سىستېمىسىدا، ئابىسسا -

سى ۋە ئوردىناتى ئوخشاشلا توپلام $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ئىچىدە قىممەت ئالدىغان ئوخشاش بولمىغان نۇقتىدىن قانچىسى بار؟

(2) تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردىنات سىستېمىسىدا، پانتۇلۇقى توپلام $B = \{1, 3, 5, 7\}$ ئىچىدە، y ئوقتىكى كەسىمە ئارىلىقى توپلام $C = \{2, 4, 6, 8\}$ ئىچىدە قىممەت ئالدىغان ئوخشاش بولمىغان تۈز سىزىقتىن قانچىسى بار؟

B گۆرۈپيا

1. مەلۇم خىل نومۇرلۇق قۇلۇپنىڭ 4 دانە نومۇر تەخسىسى بار بولۇپ، ھەربىر نومۇر تەخسىسىدە 0 دىن 9 غىچە 10 رەقەم بار. ھازىر قۇلۇپنىڭ ئاخىرقى بىر نومۇر تەخسىسىدە كاشىلا چىققانلىقتىن، ئۇنىڭدىن 0 دىن 5 كىچە ئالتە رەقەمنىلا بۇرۇپ چىقارغىلى بولسا، بۇ 4 دانە نومۇر تەخسىسىدىن تۆت خانىلىق رەقەملىك نومۇردىن قانچىنى ھاسىل قىلىشقا بولىدۇ؟

2. (1) 4 ساۋاقداش ئايرىم - ئايرىم مەكتەپنىڭ پۈتۈل كوماندىسى، ۋاسكىتبول كوماندىسى ۋە تىكتاك توپ كوماندىسىغا تىزىملانماقچى بولدى، ئەگەر ھەربىر ساۋاقداشنىڭ بىرلا كوماندىغا تىزىملىتىشقا يول قويۇلسا، ئوخشاش بولمىغان تىزىملىتىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى 4^3 بولامدۇ ياكى 4^4 مۇ؟

(2) 3 سىنىپ ئايرىم - ئايرىم 5 مەنزىرە نۇقتىسىدىن بىرىنى تاللاپ سەيلە قىلماقچى بولدى، بۇنىڭدا ئوخشاش بولمىغان تاللاش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى 3^5 بولامدۇ ياكى 5^3 مۇ؟

ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە گۇرۇپپىلاش

ئورۇنلاشتۇرۇش

1-2-1

ئىزدىنىش



1.1 - پاراگرافتا كەلتۈرۈلگەن 9 - ئۈلگە مىسالدىن كۆرەلەيمىزكى، بۇ مەسىلەنى باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلغاندا، بەزى تەكرار خىزمەتلەر ئىشلەنگەنلىكتىن جەريان چۇۋالچاق بولۇپ قالدۇ. ئۇنداق بولسا، بۇ تۈردىكى ساناش مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشنىڭ ئاددىي ئۇسۇلى بارمۇ؟


ئاددىي ساناش ئۇسۇلىنى تېپىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن بۇ تۈردىكى ئاددىي ئىككى مىسالنى تەھلىل قىلىپ ئۆتىمىز.

مەسىلە 1 A, B, C ئۈچ ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ مەلۇم پائالىيەتكە قاتناشتۇرماقچى، ئۇلارنىڭ بىرىنى چۈشتىن بۇرۇنقى پائالىيەتكە، يەنە بىرىنى چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟

بۇ مەسىلىنى مۇنداق تەھلىل قىلىشقا بولىدۇ: A, B, C ئۈچ ئوقۇغۇچى ئىچىدىن ھەر قېتىمدا ئوقۇغۇچىنى تاللاپ، چۈشتىن بۇرۇنقى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغانلار ئالدىدا، چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغانلار كەينىدە بولۇش تەرتىپى بويىچە ئورۇنلاشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلىدىن جەمئىي قانچە خىل بارلىقىنى تاپايلى.

بۇ مەسىلىنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ھەل قىلىشقا بولىدۇ: 1 - باسقۇچتا چۈشتىن بۇرۇنقى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىنى بەلگىلەيمىز، 3 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن بىرىنى تاللاشتا 3 خىل ئۇسۇل بار؛ 2 - باسقۇچتا چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىنى بەلگىلەيمىز، چۈشتىن بۇرۇنقى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىنى قېپقالغان 2 ئوقۇغۇچى ئىچىدىنلا تاللاش كېرەك، بۇنىڭدا 2 خىل ئۇسۇل بار. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، 3 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ، ئۇلارنى چۈشتىن بۇرۇنقى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغانلىقىنى ئالدىدا، چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغانلىقىنى كەينىدە بولۇش تەرتىپى بويىچە ئورۇنلاشتۇرۇشتا ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇلدىن جەمئىي $3 \times 2 = 6$ خىل بار (1.2.1 - رەسىمىدىكىدەك).

مابى ئورۇنلاش - چۈشتىن - چۈشتىن
تۈرۈش ئۇسۇلى - كىيىن - بۇرۇن



1.2.1 - رەسىم

يۇقىرىقى مەسىلىدە، ئېلىنغان ئويىپىكتار ئېلىپىنت دەپ ئاتىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بۇ مەسىلىنى تۆ-
ۋەندىكىدەك بايان قىلىشقا بولىدۇ:

ئوخشاش بولمىغان a, b, c ئۈچ ئېلىپىنت ئىچىدىن خالىغان 2 سىنى ئېلىپ، ئۇلارنى بەلگىلىك
تەرتىپ بويىچە بىر قاتار قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇ-
سۇلى بار؟

بارلىق ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇشلار

ab, ac, ba, bc, ca, cb

بولۇپ، ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى جەمئىي $3 \times 2 = 6$ خىل بولىدۇ.

مەسىلە 2 1, 2, 3, 4 تىن ئىبارەت 4 رەقەم ئىچىدىن ھەر قېتىمدا 3 نى ئېلىپ بىر ئۈچ خانى-
لىق سان تۈزۈشتە، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە ئۈچ خانىلىق سان تۈزۈشكە بولىدۇ؟

روشنەنكى، 4 رەقەم ئىچىدىن ھەر قېتىمدا 3 نى ئېلىپ، ئۇلارنى «يۈزلەر خانىسى»، «ئونلار خانى-
سى»، «بىرلەر خانىسى» دېگەن تەرتىپ بويىچە بىر قاتار قىلىپ ئورۇنلاشتۇرساق، ئۈچ خانىلىق بىر سان
كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى بولسا، ئوخ-
شاش بولمىغان ئۈچ خانىلىق ساندىن شۇنچىنى تۈزۈشكە بولىدۇ. بۇ مەسىلىنى ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈپ ھەل
قىلالايمىز:

1 - باسقۇچتا، يۈزلەر خانىسىدىكى رەقەمنى بەلگىلەيمىز، 1, 2, 3, 4 تىن ئىبارەت بۇ 4 رەقەم ئى-
چىدىن خالىغان بىرىنى ئېلىشتا 4 خىل ئۇسۇل بار؛


2 - باسقۇچتا، ئونلار خانىسىدىكى رەقەمنى بەلگىلەيمىز، يۈزلەر خانىسىدىكى رەقەم بەلگىلىۋېلىن-
غاندىن كېيىن، ئونلار خانىسىدىكى رەقەمنى قېپقالغان 3 رەقەم ئىچىدىن ئېلىشقا بولىدۇ، بۇنىڭدا 3
خىل ئۇسۇل بار؛

3 - باسقۇچتا، بىرلەر خانىسىدىكى رەقەمنى بەلگىلەيمىز، يۈزلەر، ئونلار خانىسىدىكى رەقەملەر بەل-
گىلىۋېلىنغاندىن كېيىن، بىرلەر خانىسىدىكى رەقەمنى قېپقالغان 2 رەقەم ئىچىدىنلا ئېلىشقا بولىدۇ.
بۇنىڭدا 2 خىل ئۇسۇل بار.

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، 1, 2, 3, 4 تىن ئىبارەت ئوخشاش بولمىغان
بۇ 4 رەقەم ئىچىدىن ھەر قېتىمدا 3 رەقەمنى ئېلىپ، ئۇلارنى «يۈزلەر خانىسى»، «ئونلار خانىسى»، «بىر-
لەر خانىسى» دېگەن تەرتىپ بويىچە بىر قاتار قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي

$$4 \times 3 \times 2 = 24$$

خىل ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى بار. شۇڭا، ئوخشاش بولمىغان ئۈچ خانىلىق ساندىن جەمئىي 24 نى
تۈزۈشكە بولىدۇ (2.2.1 - رەسىمىدىكىدەك).



رەسم 2.2.1 -

يۇقىرىدىكىگە ئاساسەن بۇ ئۈچ خانىلىق سانلارنىڭ ھەممىسىنى يېزىپ چىقىشقا بولىدۇ:

123, 124, 132, 134, 142, 143,

213, 214, 231, 234, 241, 243,

312, 314, 321, 324, 341, 342,

412, 413, 421, 423, 431, 432.

يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش، مەسىلە 2 نى تۆۋەندىكىدەك يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ:

ئوخشاش بولمىغان a, b, c, d تۆت ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان 3 نى ئېلىپ، ئۇلارنى بەلگىلىك تەرتىپ بويىچە بىر قاتار قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇ - سۇلى بار؟

ئوخشاش بولمىغان بارلىق ئورۇنلاشتۇرۇشلار

$abc, abd, acb, acd, adb, adc,$

$bac, bad, bca, bcd, bda, bdc,$

$cab, cad, cba, cbd, cda, cdb,$

$dab, dac, dba, dbc, dca, dcb$

بولۇپ، ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى $4 \times 3 \times 2 = 24$ خىل بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلە 1 بىلەن مەسىلە 2 نىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكى نېمە؟ ئۇلارنى ئۇ - مۇمى ئەھۋالغا كېڭەيتەلەمسىز؟

ئومۇمەن، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m ($m \leq n$) دانە ئېلېمېنتنى ئېلىپ، ئۇلار - نى بەلگىلىك تەرتىپ بويىچە بىر قاتار قىلىپ تىزىش ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بىر ئورۇنلاشتۇرۇش (arrangement) دەپ ئاتىلىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ئالاھىدىلىكىنى يىغىنچاقلىيالايمىز؟

ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن، پەقەت ۋە پەقەت ئىككى ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ئېلىپ - مېنىتلىرى پۈتۈنلەي ئوخشاش ھەمدە ئۇلارنىڭ ئېلېمېنتلىرىنىڭ تىزىلىش تەرتىپىمۇ ئوخشاش بولغاندا، بۇ ئىككى ئورۇنلاشتۇرۇش ئوخشاش بولىدۇ. مەسىلەن، مەسىلە 2 دىكى 123 بىلەن 134 نىڭ ئېلېمېنت -

لىرى پۈتۈنلەي ئوخشىشىپ كەتمىگەنلىكتىن، ئۇلار ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇشلاردۇر؛ 123 بىد - لىن 132 نىڭ ئېلېمېنتلىرى پۈتۈنلەي ئوخشاش بولسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ ئېلېمېنتلىرىنىڭ تىزىلىش تەرتىپى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئۇلارمۇ ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇشلار بولىدۇ.

① A دېگەندە -
مىز ئىنگىلىزچە
arrangement (ئو -
رۇنلاشتۇرۇش) دې -
گەن سۆزنىڭ باش
ھەرىپى.

ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m ($m \leq n$) دانە ئېلېمېنت -
نى ئالغاندىكى بارلىق ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇشلارنىڭ سانى ئوخشاش
بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئو -
رۇنلاشتۇرۇش سانى دەپ ئاتىلىدۇ ۋە A_n^m بەلگە بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.
يۇقىرىدىكى مەسىلە 1 ئوخشاش بولمىغان 3 ئېلېمېنت ئىچىدىن 2 ئېلې -
مېنتنى ئالغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانىنى تېپىش مەسىلىسى بولۇپ، بۇ ئو -
رۇنلاشتۇرۇش سانى A_3^2 قىلىپ يېزىلىدۇ، ئۇنىڭ تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقى -
قىمىنى ھېسابلاپ چىققاندىق:

$$A_3^2 = 3 \times 2 = 6;$$

يۇقىرىقى مەسىلە 2 بولسا، ئوخشاش بولمىغان 4 ئېلېمېنت ئىچىدىن 3 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئو -
رۇنلاشتۇرۇش سانىنى تېپىش مەسىلىسى بولۇپ، بۇ ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_4^3 قىلىپ يېزىلىدۇ. ئۇنىڭ
تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى ھېسابلاپ چىققاندىق:

$$A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24.$$

ئىزدىنىش




ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن 2 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئو -
رۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^2 قانچە بولىدۇ؟ A_n^3 چۇ؟ ($m \leq n$) A_n^m چۇ؟

مەسىلە 1، 2 لەرنى يېشىش تەجرىبىمىزگە ئاساسەن، ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^2 نى تېپىشتا مۇنداق
يېڭى يۈرگۈزۈشكە بولىدۇ:

تەرتىپى بەلگىلەنگەن 2 بوش ئورۇن (3.2.1 - رەسىم) بار دەپ پەرەز قىلالايمىز. ئوخشاش بولمىغان n
دانە ئېلېمېنت $a_1, a_2, \dots, a_n$ ئىچىدىن خالىغان 2 سىنى ئېلىپ، بىر بوش ئورۇنغا بىر ئېلېمېنتنى
تولدۇرساق، ھەر بىر خىل تولدۇرۇش ئۇسۇلىدىن بىر ئورۇنلاشتۇرۇش كېلىپ چىقىدۇ؛ ئەكسىچە، ھەر -
قانداق بىر ئورۇنلاشتۇرۇشقا ھامان مۇشۇنداق بىر خىل تولدۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ.
شۇڭا، ئوخشاش بولمىغان بارلىق تولدۇرۇش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^2
دىن ئىبارەت بولىدۇ.

ئەمدى ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تولدۇرۇش ئۇسۇلى بارلىقىنى ھېسابلاپ كۆرەيلى، بوش ئورۇن -
نى تولدۇرۇشنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ:



3.2.1 - رەسىم

- 1 - باسقۇچتا، ئالدى بىلەن 1 - ئورۇندىكى ئېلېمېنتنى تولدۇردە -
مىز، بۇنىڭدا n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاللاشقا بولىدۇ -
دىغانلىقتىن، n خىل ئۇسۇل بار بولىدۇ؛
- 2 - باسقۇچتا، 2 - ئورۇندىكى ئېلېمېنتنى تولدۇرمىز، بۇنىڭدا
قېپقالغان $(n-1)$ دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاللاشقا بو -

لىدىغانلىقتىن، $(n-1)$ خىل ئۇسۇل بار بولىدۇ.

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، 2 بوش ئورۇننى تولدۇرۇش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:


$$A_n^2 = n(n-1).$$

ئوخشاش يول بىلەن، ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^3 نى تېپىشتا، تەرتىپ بويىچە 3 بوش ئورۇننى تولدۇرۇش ئۇستىدە پىكىر يۈرگۈزۈش ئارقىلىق تۆۋەندىكىگە ئىگە بولىمىز:

$$A_n^3 = n(n-1)(n-2).$$

ئومۇمەن، ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^m نى تېپىشتا، تەرتىپ بويىچە m دانە بوش ئورۇننى تولدۇرۇش ئۇستىدە پىكىر يۈرگۈزۈشكە بولىدۇ:

تەرتىپى بەلگىلەنگەن m دانە بوش ئورۇن $(4.2.1 - رەسىم)$ بار دەپ پەرەز قىلالى. ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت $a_1, a_2, \dots, a_n$ ئىچىدىن خالىغان m دانىسىنى ئېلىپ، بىر بوش ئورۇنغا 1 ئېلېمېنتنى تولدۇرساق، ھەر بىر خىل تولدۇرۇش ئۇسۇلى بىر ئورۇنلاشتۇرۇشقا ماس كېلىدۇ، شۇڭا ئوخشاش بولمىغان بارلىق تولدۇرۇش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^m دىن ئىبارەت بولىدۇ.



4.2.1 - رەسىم

بوش ئورۇن تولدۇرۇشنى m دانە باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ:

- 1 - باسقۇچتا، 1 - ئورۇنغا n خىل تاللاش ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاللاپ تولدۇرۇشقا بولىدىغانلىقتىن، جەمئىي n خىل تاللاش ئۇسۇلى بار بولىدۇ؛
- 2 - باسقۇچتا، 2 - ئورۇنغا قېپقالغان $(n-1)$ دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاللاپ تولدۇرۇشقا بولىدىغانلىقتىن، جەمئىي $(n-1)$ خىل تاللاش ئۇسۇلى بار بولىدۇ؛
- 3 - باسقۇچتا، 3 - ئورۇنغا قېپقالغان $(n-2)$ دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاللاپ تولدۇرۇشقا بولىدىغانلىقتىن، جەمئىي $(n-2)$ خىل تاللاش ئۇسۇلى بار بولىدۇ؛

...

m - ئورۇنغا قېپقالغان $(n-m+1)$ دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاللاپ تولدۇرۇشقا بولىدۇ. خالىغانلىقتىن، جەمئىي $n-m+1$ خىل تاللاش ئۇسۇلى بار بولىدۇ.

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، m دانە

بوش ئورۇننى پۈتۈنلەي تولدۇرۇپ بولۇشتا، جەمئىي

$$n(n-1)(n-2)\cdots[n-(m-1)]$$

خىل تولدۇرۇش ئۇسۇلى بار بولىدۇ.

شۇنىڭ بىلەن تۆۋەندىكى فورمۇلغا ئىگە بولىمىز:

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1).$$

بۇ يەردە $n, m \in \mathbb{N}^*$ ھەمدە $m \leq n$. بۇ فورمۇلا ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسىغا ئاساسەن، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدە -
 دىن $m (m \leq n)$ دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بارلىق ئورۇنلاشتۇرۇشلارنىڭ سانىنى ئاسانلا ھېسابلاپ
 چىقالايمىز. مەسىلەن:

$$A_5^2 = 5 \times 4,$$

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنتنىڭ ھەممىسى ئېلىنغاندىكى بىر ئورۇنلاشتۇرۇش n دانە ئېلې-
 مېنتنىڭ بىر تولۇق ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسىدا
 $m = n$ بولۇپ، تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$A_n^n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1,$$

بۇ، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنتنىڭ ھەممىسى ئېلىنغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى 1 دىن n
 گىچە بولغان مۇسبەت پۈتۈن سانلارنى ئارقىمۇ ئارقا كۆپەيتكەندىكى كۆپەيتىمگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى
 بىلدۈرىدۇ. 1 دىن n گىچە بولغان مۇسبەت پۈتۈن سانلارنى ئارقىمۇ ئارقا كۆپەيتكەندىكى كۆپەيتىمە n نىڭ
 فاكىتورىئالى دەپ ئاتىلىپ، $n!$ بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. شۇڭا، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنتنىڭ تولۇق
 ئورۇنلاشتۇرۇلۇش سانى فورمۇلىسىنى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$A_n^n = n!.$$

بىز يەنە $0! = 1$ دەپ بەلگىلىۋاليمىز.

1 - مىسال. ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلايلى: (1) A_{10}^4 ; (2) A_{18}^5 ; (3) $A_{18}^{18} \div A_{13}^{13}$.

يېشىش: ھېسابلىغۇچتىن پايدىلانماق تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$(1) 10 [\text{SHIFT}] [\text{nPr}] 4 = 5040;$$

$$(2) 18 [\text{SHIFT}] [\text{nPr}] 5 = 1028160;$$

$$(3) 18 [\text{SHIFT}] [\text{nPr}] 18 [\div] 13 [\text{SHIFT}] [\text{nPr}] 13 = 1028160.$$

(2)، (3) دىن كۆرەلەيمىزكى، $A_{18}^5 = A_{18}^{18} \div A_{13}^{13}$. ئۇنداق بولسا، بۇ يەكۈن ئومۇمىي ئەھۋالغا ئۇيغۇن

كېلەمدۇ؟ يەنى تۆۋەندىكى ئىپادە كۈچكە ئىگە بولامدۇ؟

$$A_n^m = \frac{A_n^n}{A_{n-m}^{n-m}} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

گەمەلىيەتتە:

$$\begin{aligned} A_n^m &= n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1) \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-m+1) \cdot (n-m) \cdots 2 \cdot 1}{(n-m) \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \frac{n!}{(n-m)!} = \frac{A_n^n}{A_{n-m}^{n-m}}. \end{aligned}$$

شۇڭا ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسىنى يەنە تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

2 - مىسال. مەلۇم يىلى مەملىكەتلىك A دەرىجىلىكلەر (A گۇرۇپپا) پۈتۈل مۇسابىقىسىگە 14 كوماندا قاتناشقان بولۇپ، ھەربىر كوماندا باشقا كوماندىلار بىلەن ئۆزىنىڭ مەيدانىدا ۋە قارشى تەرەپنىڭ مەيدانىدا ئايرىم - ئايرىم ھالدا بىر مەيدان مۇسابىقىگە ئېلىپ بارسا، جەمئىي قانچە مەيدان مۇسابىقىگە ئېلىپ بېرىلىدۇ؟

يېشىش: خالىغان ئىككى كوماندا ئارىسىدا ئۆزىنىڭ مەيدانىدا بىر قېتىم ۋە قارشى تەرەپنىڭ مەيدانىدا بىر قېتىم مۇسابىقىگە ئېلىپ بېرىش دېگەننىمىز 14 ئېلىمېنت ئىچىدىن خالىغان 2 ئېلىمېنتنى ئالغاندىكى بىر ئورۇنلاشتۇرۇشقا ماس كېلىدۇ، شۇڭا ئېلىپ بېرىلىدىغان مۇسابىقىنىڭ ئومۇمىي مەيدان سانى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$A_{14}^2 = 14 \times 13 = 182.$$

3 - مىسال. (1) ئوخشاش بولمىغان 5 پارچە كىتاب بار. ئۇلارنىڭ ئىچىدىن 3 پارچىنى تاللاپ 3 ئوقۇغۇچىنىڭ ھەربىرىگە 1 دىن تەقسىم قىلىپ بېرىشتە، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە خىل تەقسىملىش ئۇسۇلى بار؟

(2) ئوخشاش بولمىغان 5 خىل كىتاب بار. ئۇلارنىڭ ئىچىدىن 3 پارچىنى سېتىۋېلىپ 3 ئوقۇغۇچىنىڭ ھەربىرىگە 1 دىن تەقسىم قىلىپ بېرىشتە، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە خىل تەقسىملىش ئۇسۇلى بار؟

يېشىش: (1) ئوخشاش بولمىغان 5 پارچە كىتاب ئىچىدىن 3 پارچىنى تاللاپ ئايرىم - ئايرىم 3 ئوقۇغۇچىغا تەقسىم قىلىپ بېرىش دېگەننىمىز ئوخشاش بولمىغان 5 ئېلىمېنت ئىچىدىن خالىغان 3 ئېلىمېنتنى ئالغاندىكى بىر ئورۇنلاشتۇرۇشقا ماس كېلىدۇ، شۇڭا ئوخشاش بولمىغان تەقسىم قىلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60.$$


(2) ئوخشاش بولمىغان 5 خىل كىتاب بار بولۇپ، ھەربىر ئوقۇغۇچىغا 1 پارچە كىتاب تەقسىم قىلىشنىڭ ئوخشاش بولمىغان 5 خىل تاللاپ سېتىۋېلىش ئۇسۇلى بار بولغانلىقتىن، 3 ئوقۇغۇچىنىڭ ھەربىرىگە 1 پارچە كىتاب تەقسىم قىلىشتىكى ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇللارنىڭ خىل سانى:

$$5 \times 5 \times 5 = 125.$$

3 - مىسالدىكى ئىككى تارماق مىسالنىڭ پەرقى تۆۋەندىكىچە: (1) تارماق مىسالدا، ئوخشاش بولمىغان 5 پارچە كىتابتىن 3 پارچىسى تاللىنىپ 3 ئوقۇغۇچىغا تەقسىم قىلىنىدۇ، بۇنىڭدا ھەربىر ئوقۇغۇچىغا تەقسىم قىلىنغان كىتاب ئوخشاش بولمايدىغانلىقتىن، ئۇ ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىگە تەۋە؛ (2) تارماق مىسالدا، ئوخشاش بولمىغان ئوقۇغۇچىلارغا تەقسىم قىلىنىدىغان كىتابلار ئوخشاش بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن، شۇڭا، ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسىنى قوللىنىشقا ماس كەلمىگەن ئەھۋالدا، پەقەت باس-قۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاش كېرەك.

4 - مىسال. 0 دىن 9 غىچە بولغان 10 رەقەمدىن پايدىلىنىپ، تەكرار رەقەمى بولمىغان ئۈچ خانىلىق ساندىن قانچىنى تۈزۈشكە بولىدۇ؟

تەھلىل: بۇ مەسىلىدىكى 0 دىن 9 غىچە بولغان 10 رەقەم ئىچىدە 0 يۈزلەر خانىسىدا تۇرسا بولمايدۇ، قالغان رەقەملەر خالىغان خانىدا تۇرسا بولىۋېرىدۇ. شۇڭا، بۇ رەقەملەر ئىچىدە 0 ئالاھىدە ئېلىمېنت ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتە، بىز ئالاھىدە ئېلىمېنتنىڭ ئورنىدىن قول سېلىپ مەسىلىلەر ئۈستىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزۈمىز.



5.2.1 - رەسىم


1 - خىل يېشىش ئۇسۇلى: تەكرار رەقىمى بولمىغان ئۈچ خانىلىق ساننىڭ يۈزلەر خانىسىدىكى رەقىمى 0 بولسا بولمايدىغان. لىقتىن، ئورۇنلاشتۇرۇشنى تۆۋەندىكى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ئو- رۇنداشقا بولىدۇ: 1 - باسقۇچتا، 1 دىن 9 غىچە بولغان بۇ 9 رەقەم ئىچىدىن خالىغان 1 نى تاللاپ، يۈزلەر خانىسىدىكى رەقەمنى تە- زىمىز، بۇنىڭدا A_1^1 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛ 2 - باسقۇچتا، قېپ- قالغان 9 رەقەم ئىچىدىن خالىغان 2 نى تاللاپ، ئونلار خانىسى بىلەن بىرلەر خانىسىدىكى رەقەملەرنى تەزىمىز، بۇنىڭدا A_2^2 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار (5.2.1 - رەسىم). باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، تاپماقچى بولغان ئۈچ خانىلىق سانلارنىڭ سانى:

$$A_1^1 \cdot A_2^2 = 9 \times 9 \times 8 = 648 \text{ (دانە).}$$

2 - خىل يېشىش ئۇسۇلى: 6.2.1 - رەسىمدىكىدەك، شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئۈچ خانىلىق سانلارنى ئۈچ تۈرگە ئايرىشقا بولىدۇ: ھەربىر خانىسىدىكى رەقىمى 0 بولمىغان ئۈچ خانىلىق ساندىن A_3^3 دانە بار، بىرلەر خانىسىدىكى رەقىمى 0 بولغان ئۈچ خانىلىق ساندىن A_0^2 دانە بار، ئونلار خانىسىدىكى رە- قىمى 0 بولغان ئۈچ خانىلىق ساندىن A_0^2 دانە بار.

تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئۈچ خانىلىق سانلارنىڭ سانى:

$$A_3^3 + A_0^2 + A_0^2 = 648 \text{ (دانە).}$$



6.2.1 - رەسىم

3 - خىل يېشىش ئۇسۇلى: 0 دىن 9 غىچە بولغان 10 رەقەم ئىچىدىن خالىغان 3 رەقەمنى ئالغان- دىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_{10}^3 بولۇپ، بۇنىڭدا 0 يۈزلەر خانىسىدا بولغان ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_0^2 بولىدۇ، شۇڭا ئۇلارنىڭ ئايرىمىسى دەل بۇ 10 رەقەمدىن تۈزۈلگەن تەكرار رەقىمى بولمىغان ئۈچ خانىلىق سانلارنىڭ سانى بولىدۇ، يەنى تاپماقچى بولغان ئۈچ خانىلىق سانلارنىڭ سانى:

$$A_{10}^3 - A_0^2 = 10 \times 9 \times 8 - 9 \times 8 = 648.$$

4 - مىسالدىكىگە ئوخشاش ساناش مەسىلىلىرىگە دۇچ كەلگەندە، مەسىلىنى مۇۋاپىق ئۇسۇلدىن پايدى- لىنىپ بىرقانچە تارماق مەسىلىگە ئاجرىتىۋالغىمىز، ئاندىن پىكىر يۈرگۈزۈش تۇرغۇلىرىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا قاراپ، مەسىلىنى ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ يېشىمىز. يۇقىرىدىكى 1 - خىل يېشىش ئۇسۇلىدا، يۈزلەر خانىسىدىكى رەقەم 0 بولسا بولمايدىغانلىقىغا ئاساسەن، 3 رەقەمنى تاللاپ تەكرار رەقىمى بولمىغان ئۈچ خانىلىق سان تۈزۈشتىن ئىبارەت بۇ ئىشنى باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ سا- ناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ئورۇندىدۇق؛ 2 - خىل يېشىش ئۇسۇلىدا، 0 نىڭ ئوتتۇرىغا چىققان - چىقمىغانلىقى ھەمدە ئوتتۇرىغا چىققاندىكى ئورۇننى ئۆلچەم قىلغان ھالدا، بۇ ئىشنى تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ئورۇندىدۇق؛ 3 - خىل يېشىش ئۇسۇلىدا تەتۈرىچە پىكىر يۈرگۈزۈش ئۇسۇلىدىن پايدىلاندىق، بۇنىڭدا ئالدى بىلەن ئوخشاش بولمىغان 10 رەقەم ئىچىدىن تەكرارلانمايدىغان 3 رەقەمنى تاللاشنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇش سانىنى تېپىپ، ئاندىن مۇشۇ ئورۇنلاشتۇرۇش سانىدىن يۈزلەر خا-

نمىدىكى رەقىمى 0 بولۇشنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇش سانى (يەنى ئۈچ خانىلىق سان بولمايدىغانلىرىنىڭ سانى) نى ئېلىۋېتىش ئارقىلىق تەكرار رەقىمى بولمىغان ئۈچ خانىلىق سانلارنىڭ سانىنى كەلتۈرۈپ چىقاردۇق.

يۇقىرىقى مەسىلىلەرنى يېشىش جەريانىدىن كۆرەلەيمىزكى، ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇقۇمىنى كىرگۈزۈش ھەمدە ئورۇنلاشتۇرۇش سانىنى تېپىش فورمۇلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش نەتىجىسىدە، «ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m ($m \leq n$) دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بارلىق ئورۇنلاشتۇرۇشلارنىڭ سانى» نى تېپىش تۈرىدىكى ئالاھىدە سانلار مەسىلىلىرىنى تېخىمۇ ئاددىي ھەم ئىخچام ھالدا يېشەلەيدىغان بولدۇق.

1.1 - پاراگرافتىكى 9 - مىسال مۇشۇ تۈردىكى سانلار مەسىلىسىمۇ؟ سىز ئورۇنلاشتۇرۇش بىلىملىرىگە ئاساسەن ئۇنى ھەل قىلالامسىز؟

مەشىق

1. تۆۋەندىكىلەرنى يېزىڭ:

(1) ئوخشاش بولمىغان 4 ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان 2 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بارلىق ئورۇنلاشتۇرۇشلار؛

(2) ئوخشاش بولمىغان 5 ئېلېمېنت ئىچىدىن خالىغان 2 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بارلىق ئورۇنلاشتۇرۇشلار.

2. ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلاڭ:

$$(1) A_{15}^4;$$

$$(2) A_7^7;$$

$$(3) A_8^4 - 2A_8^3;$$

$$(4) \frac{A_{12}^8}{A_7^7}.$$

3. تۆۋەندىكى فاكىتورىئاللارنى ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلاپ، جەۋەلگە تولدۇرۇڭ:

n	2	3	4	5	6	7	8
$n!$							

4. ئىسپاتلاڭ:

$$(1) A_m^n = nA_{m-1}^{n-1};$$

$$(2) A_8^8 - 8A_7^7 + 7A_6^6 = A_7^7.$$

5. كوللېكتىپ تىكتاك توپ مۇسابىقىسىگە قاتناشقان 5 تەنھەرىكەتچى ئىچىدىن 3 نى تاللاپ، ئۇلارنى بەلگىلەنگەن تەرتىپ بويىچە مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئۇسۇل بار؟

6. 4 خىل كۆكتات ئۇرۇقىدىن 3 خىلىنى تاللاپ، ئايرىم - ئايرىم ھالدا تۇپراق سۈپىتى ئوخشاش بولمىغان 3 پارچە يەرگە تېرىپ تەجرىبە ئېلىپ بېرىشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تېرىش ئۇسۇلى بار؟

ئىزدىنىش



A, B, C ئۈچ ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ بىر پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇش. تا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟ بۇ مەسىلە بىلەن ئالدىنقى پاراگرافنىڭ بېشىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلە 1 ئارىسىدا قانداق باغلىنىش ۋە ئوخشاشلىق بار؟

3 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاشتا، مۇمكىن بولغان تاللاش ئۇسۇللىرىنى تۆۋەندىكىدەك بىر - بىرلەپ كۆرسىتىشكە بولىدۇ:

$A, B; A, C; B, C.$

ئالدىنقى پاراگرافنىڭ بېشىدىكى مەسىلە 1 مۇنداق ئوتتۇرىغا قويۇلغان: « A, B, C ئۈچ ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ مەلۇم پائالىيەتكە قاتناشتۇرماقچى، ئۇلارنىڭ بىرىنى چۈشتىن بۇرۇنقى پائالىيەتكە، يەنە بىرىنى چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟»، « A چۈشتىن بۇرۇن، B چۈشتىن كېيىن» بىلەن « B چۈشتىن بۇرۇن، A چۈشتىن كېيىن» ئوخشاش بولمىغان ئىككى خىل تاللاش ئۇسۇلى بولغانلىقتىن، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشتا، 3 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ، يەنە ئۇلارنى «چۈشتىن بۇرۇن ئالدىدا، چۈشتىن كېيىن كەينىدە» بولۇش تەرتىپى بويىچە ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. مانا بۇ، ئالدىنقى پاراگرافتا تەتقىق قىلىنغان ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىدۇر.

بۇ پاراگرافتا تەتقىق قىلىدىغىنىمىز 3 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ بىر پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇش مەسىلىسى بولۇپ، بۇ مەسىلىدە ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ تەرتىپىنى ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرىدىن يىتى يوق. كونكرېت ئارقا كۆرۈنۈشنى قايرىپ قويساق، بۇ مەسىلىنى مۇنداق ئومۇملاشتۇرۇشقا بولىدۇ: ئوخشاش بولمىغان 3 ئېلېمېنت ئىچىدىن 2 سىنى ئېلىپ بىر گۇرۇپپا قىلىپ بىرلەشتۈرگەندە، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە گۇرۇپپا بولىدۇ؟

مانا بۇ، بىز مۇشۇ پاراگرافتا تەتقىق قىلىدىغان مەسىلىدۇر.

ئومۇمەن، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m ($m \leq n$) دانە ئېلېمېنتنى ئېلىپ بىر گۇرۇپپا قىلىپ بىرلەشتۈرۈش ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بىر گۇرۇپپىلاش (combination) دەپ ئاتىلىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن گۇرۇپپىلاش ئارىسىدىكى باغلىنىش ۋە ئوخشاشلىقنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن گۇرۇپپىلاشنىڭ ئېنىقلىمىلىرىدىن بىلەلەيمىزكى، ئۇلارنىڭ ھەر ئىككىسىدە ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m ($m \leq n$) دانە ئېلېمېنت ئېلىنىدۇ، بۇ، ئورۇنلاشتۇرۇش

رۇش بىلەن گۇرۇپپىلاشنىڭ ئورتاق نۇقتىسى؛ ئۇلارنىڭ ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، ئورۇنلاشتۇرۇش ئېلېمېنتلارنىڭ تەرتىپى بىلەن مۇناسىۋەتلىك، گۇرۇپپىلاش بولسا ئېلېمېنتلارنىڭ تەرتىپى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولىدۇ. ئېلېمېنتلىرى ئوخشاش ھەمدە ئېلېمېنتلىرىنىڭ تەرتىپىمۇ ئوخشاش بولغاندىلا، ئىككى ئورۇنلاشتۇرۇش ئاندىن ئوخشاش بولىدۇ؛ ھالبۇكى، ئىككى گۇرۇپپىلاشنىڭ ئېلېمېنتلىرى ئوخشاش بولسىلا، بۇ ئېلېمېنتلارنىڭ تەرتىپىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇلار ئوخشاش گۇرۇپپىلاشلار بولۇپرىدۇ. مەسىلەن، ab ، ba لار ئوخشاش بولمىغان ئىككى ئورۇنلاشتۇرۇش، ئەمما ئۇلار ئوخشاش بىر گۇرۇپپىلاشتۇر.

ئەمدى ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىگە سېلىشتۇرغان ھالدا تۆۋەندىكى ئۇقۇمنى ئوتتۇرىغا قويىمىز:

ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m ($m \leq n$) دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى بارلىق ئوخشاش بولمىغان گۇرۇپپىلاشلارنىڭ سانى ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانى دەپ ئاتىلىدۇ ۋە C_n^m بەلگە بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. مەسىلەن، ئوخشاش بولمىغان 8 ئېلېمېنت ئىچىدىن 5 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانى C_8^5 قىلىپ، ئوخشاش بولمىغان 7 ئېلېمېنت ئىچىدىن 6 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانى C_7^6 قىلىپ ئىپادىلىنىدۇ. ئۇنداق بولسا، C_n^m نىڭ قىممىتى نېمىگە تەڭ؟ بۇنىڭ ئۈچۈن، ئالدى بىلەن بىر قانچە كونكرېت مەسىلىگە قاراپ باقايلى.

يۇقىرىقى مەسىلىدە، 3 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 2 سىنى تاللاپ بىر پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇشتا، ئوخشاش بولمىغان 3 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار، يەنى

$$C_3^2 = 3.$$

ئۇنداق بولسا، توپلام $\{a, b, c, d\}$ ئىچىدىن 3 ئېلېمېنتنى ئېلىپ ئۈچ ئېلېمېنتلىق قىسمىي توپلام ھاسىل قىلىشتا، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە قىسمىي توپلام ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ توپلامدىكى ئېلېمېنتلارنىڭ «تەرتىپسىزلىكى» گە ئاساسلانماق، بۇ مەسىلىنىڭ ماھىيىتى ئەمەلىيەتتە مۇنداق بولىدۇ:

a, b, c, d تۆت ئېلېمېنت ئىچىدىن ئوخشاش بولمىغان 3 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانى C_4^3 قانچىگە تەڭ؟ بۇ مەسىلىگە جاۋاب بېرىش ئۈچۈن دەرەخسىمان شەكىلدىن پايدىلانماق بولىدۇ (7.2.1 - رەسىم). بۇ شەكىلگە ئاساسەن بارلىق گۇرۇپپىلاشلارنى يېزىپ چىقالايمىز:

$$abc, abd, acd, bcd,$$

يەنى

$$C_4^3 = 4.$$

ئىزدىنىش

ئالدىدا گۇرۇپپىلاش بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇش ئارىسىدا باغلىنىش بارلىقى تىلغا ئېلىنغانىدى. ئۇنداق بولسا، مۇشۇ باغلىنىشقا ئاساسەن، گۇرۇپپىلاش سانى C_n^m نى

ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_n^m دىن پايدىلىنىپ تاپقىلى بولامدۇ؟



بۇ مەسىلىگە جاۋاب بېرىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن a, b, c, d تۆت ئېلېمېنت ئىچىدىن 3 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن گۇرۇپپىلاشنىڭ مۇناسىۋىتىنى تەھلىل قىلىپ كۆرەيلى. «ئېلېمېنت-لىرى ئوخشاش، ئېلېمېنتلىرىنىڭ تەرتىپى ئوخشاش بولمىغان ئىككى گۇرۇپپىلاشنىڭ ئوخشاش بولمىغانلىقى» ھەمدە «ئېلېمېنتلىرى ئوخشاش، ئېلېمېنتلىرىنىڭ تەرتىپى ئوخشاش بولمىغان ئىككى ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقى» دىن ئىلھام ئېلىپ، «ئېلېمېنتلىرى ئوخشاش بولۇش» نى ئۆلچەم قىلغان ھالدا، ئورۇنلاشتۇرۇشنى تۈرگە ئايرىشقا ھەمدە ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن گۇرۇپپىلاش ئارىسىدا تۆۋەندىكىدەك ماسلىق مۇناسىۋىتىنى تۇرغۇزۇۋېلىشقا بولىدۇ:

ئورۇنلاشتۇرۇش گۇرۇپپىلاش

$a b c$	$a b c \quad b a c \quad c a b$ $a c b \quad b c a \quad c b a$
$a b d$	$a b d \quad b a d \quad d a b$ $a d b \quad b d a \quad d b a$
$a c d$	$a c d \quad c a d \quad d a c$ $a d c \quad c d a \quad d c a$
$b c d$	$b c d \quad c b d \quad d b c$ $b d c \quad c d b \quad d c b$

شۇنىڭ ئۈچۈن، «ئېلېمېنتلىرى ئوخشاش بولۇش» نى ئۆلچەم قىلىپ، يۇقىرىقى بۇ 24 ئورۇنلاشتۇرۇشنى ھەر بىر گۇرۇپپىدا ئوخشاش بولمىغان 6 ئورۇنلاشتۇرۇش بار قىلىپ 4 گۇرۇپپىغا ئايرىشقا بولىدۇ. يۇقىرىقى بۇ نەتىجە نەدىن كەلگەنلىكىنى بىر قاراپلا بىلگىلى بولىدىغان بىر خىل شەكىلدە نامايان قىلىنسا ناھايىتى پايدىلىق بولىدۇ:

$$C_4^3 = 4 = \frac{24}{6} = \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1} = \frac{A_4^3}{A_3^3},$$

شۇنداق قىلىپ تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$A_4^3 = C_4^3 \times A_3^3.$$

بۇ تەڭلىكنىڭ ئەمەلىي مەنىسى نېمە؟ روشەنكى، تەڭلىكنىڭ سول تەرىپى «ئوخشاش بولمىغان 4 ئېلېمېنت ئىچىدىن 3 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى» بولۇپ، ئۇنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئىككى سان ئۆزئارا كۆپەيتىلگەن. بۇنىڭغا ئاساسەن، باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا باغلاپ تەسەۋۋۇر قىلىپ، بۇ تەڭلىكنى تۆۋەندىكىدەك چۈشەندۈرەلەيمىز:

ئوخشاش بولمىغان 4 ئېلېمېنت ئىچىدىن 3 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_4^3 نى تېپىشنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنداشقا بولىدۇ. 1 - باسقۇچتا، ئوخشاش بولمىغان 4 ئېلېمېنت ئىچىدىن 3 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانى C_4^3 نى تاپىمىز (ئېلېمېنتلارنىڭ تەرتىپىنى ئويلاشمايمىز); 2 - باسقۇچتا، ھەر بىر گۇ-

«تەڭلىك» نىڭ ئىككى تەرىپى ئوخشاش بىر مەسىلىنىڭ ئىككى خىل تەڭ كۈچلۈك چۈشەندۈرۈلۈشىدىن ئىبارەت. بۇنداق چۈشەندۈرۈش مەسىلىگە بولغان چۈشەندۈرۈش شەنچىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپلا قالماي، بىزنى يەنە مەسىلە ھەل قىلىش ئۇسۇلىنى تېپىش ئىمكانىيىتىگىمۇ ئىگە قىلىدۇ. «مەسىلىنى باشقا بىر تۈرگۈندىن چۈشەندۈرۈش» ناھايىتى مۇھىم بىر خىل ئىدىيە ئۇسۇلىدۇر.

رۇپىلاشتىكى ئوخشاش بولمىغان 3 ئېلېمېنتتىن تولۇق ئورۇنلاشتۇرۇش ھاسىل قىلساق، ھەربىر گۇ - رۇپىلاشتىكى ئېلېمېنتلاردىن ھاسىل قىلىنغان ئورۇنلاشتۇرۇش سانى A_3^3 بولىدۇ. يۇقىرىقى چۈشەندۈرۈشنى ئومۇمىي ئەھۋالغا كېڭەيتىشكە بولىدۇ.

ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنت ئالغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانىنى تېپىشنى تۆۋەندىكى 2 باسقۇچتىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان دەپ قاراشقا بولىدۇ:

1 - باسقۇچتا، ئوخشاش بولمىغان بۇ n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالسىمىز، بۇ - نىڭدا ئوخشاش بولمىغان جەمئىي C_n^m خىل ئېلىش ئۇسۇلى بار؛

2 - باسقۇچتا، ئېلىنغان بۇ m دانە ئېلېمېنتتىن تولۇق ئورۇنلاشتۇرۇش ھاسىل قىلىمىز، بۇنىڭدا ئوخشاش بولمىغان جەمئىي A_m^m خىل ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى بار. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن،

$$A_n^m = C_n^m \cdot A_m^m,$$

شۇڭا:

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}.$$

بۇ يەردە $n, m \in \mathbb{N}^*$ ھەمدە $m \leq n$. بۇ فورمۇلا گۇرۇپپىلاش سانى فورمۇلىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

بولغانلىقتىن، يۇقىرىدىكى گۇرۇپپىلاش سانى فورمۇلىسىنى يەنە تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

ئۇنىڭدىن باشقا، يەنە $C_n^0 = 1$ دەپ بەلگىلىۋالسىمىز.

1 - مىسال. C_{10}^7 نى ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلايلى.

يېشىش: ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلىساق:

$$10 \overline{\text{Cr}} 7 = 120.$$

2 - مىسال. بىر تىرىپىنىڭ پۈتۈل كوماندىسىدا ئىلگىرى مۇسابىقىگە چۈشۈپ باقمىغان 17 يېڭى ئەزا بار. پۈتۈل مۇسابىقىسىنىڭ قائىدىسى بويىچە، مۇسابىقىدە بىر پۈتۈل كوماندىسىنىڭ مەيدانغا چىقىدىغان ئادەم سانى 11 بولىدۇ.

(1) بۇ تىرىپىر مۇشۇ 17 يېڭى ئەزادىن قانچە خىل مەيدانغا چىقىش لايىھىسى تۈزلەيدۇ؟

(2) مەيدانغا چىقىدىغان 11 ئادەمنى تاللاشتا يەنە بىر ۋارانتارنى بەلگىلىۋېلىشقا توغرا كەلسە، تىرىپىر

بۇ ئىشنى قانچە خىل ئۇسۇلدا ئورۇندىيالايدۇ؟

تەھلىل: (1) دە، مەسىلىنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن، 17 يېڭى ئەزانىڭ رولىدا پەرق يوق، ئۇلارنىڭ

ئورنى تامامەن ئوخشاش، شۇڭا، بۇ مەسىلە ئوخشاش بولمىغان 17 ئېلېمېنت ئىچىدىن 11 ئېلېمېنت ئې-

لىنىدىغان گۇرۇپپىلاش مەسىلىسىدۇر؛ (2) دە، ۋارانتارنىڭ ئورنى ئالاھىدە بولۇپ، مەيدانغا چىقىدىغان

باشقا ئەزالارنىڭ ئورنىدا پەرق يوق، شۇڭا بۇ مەسىلە باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇندىلىدىغان گۇرۇپپىلاش مەسىلىسىدۇر.

يېشىش: (1) مەيدانغا چىقىدىغان يېڭى ئەزالارنىڭ رولىدا پەرق بولمىغانلىقى ئۈچۈن، تۈزۈشكە بولىدىغان مەيدانغا چىقىش لايىھىسىنىڭ خىل سانى:

$$C_{11}^{11} = 12376.$$

(2) تېرىپىر بۇ ئىشنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇندىسا بولىدۇ:

1 - باسقۇچتا، 17 يېڭى ئەزا ئىچىدىن 11 نى تاللاپ مەيدانغا چىقىش گۇرۇپپىسى تەشكىللەيدۇ، بۇنىڭدا C_{17}^{11} خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؛

2 - باسقۇچتا، تاللىۋېلىنغان 11 ئادەم ئىچىدىن 1 ۋارانتار تاللايدۇ، بۇنىڭدا C_{11}^1 خىل تاللاش ئۇسۇلى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن، تېرىپىرنىڭ بۇ ئىشنى ئورۇندىشىدىكى ئۇسۇلنىڭ خىل سانى:

$$C_{17}^{11} \times C_{11}^1 = 136136.$$

ئىزدىنىش



بۇ مىسالدىكى (2) مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ باشقا ئۇسۇللىرىنى ئويلاپ تاپالامسىز؟

3 - مىسال. (1) تەكشىلىكتە 10 نۇقتا بار، ئۇلار ئىچىدىكى ھەر 2 نۇقتىنى ئۈچ قىلغان كېسىك-لەرنىڭ سانى جەمئىي قانچە؟

(2) تەكشىلىكتە 10 نۇقتا بار. ئۇلار ئىچىدىكى ھەر 2 نۇقتىنى ئۈچ قىلغان يۆنىلىشلىك كېسىكلەرنىڭ سانى جەمئىي قانچە؟

يېشىش: (1) بۇ 10 نۇقتا ئىچىدىكى ھەر 2 نۇقتىنى ئۈچ قىلغان كېسىكلەرنىڭ سانى دەل ئوخشاش بولمىغان 10 ئېلېمېنت ئىچىدىن 2 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانىغا تەڭ، يەنى بۇنداق كېسىكلەرنىڭ تال سانى جەمئىي:

$$C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{1 \times 2} = 45.$$

(2) يۆنىلىشلىك كېسىكنىڭ ئىككى ئۈچ نۇقتىسىنىڭ بىرى باش نۇقتا، يەنە بىرى ئاخىرقى نۇقتا بولىدىغانلىقتىن، بۇ 10 نۇقتا ئىچىدىكى ھەر 2 نۇقتىنى ئۈچ قىلغان يۆنىلىشلىك كېسىك-لەرنىڭ سانى دەل ئوخشاش بولمىغان 10 ئېلېمېنت ئىچىدىن 2 ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى ئورۇنلاشتۇرۇش سانىغا تەڭ، يەنى يۆنىلىشلىك كېسىكنىڭ تال سانى جەمئىي

$$A_{10}^2 = 10 \times 9 = 90.$$

3 - مىسالنىڭ (1) تارماق

مىسالدا، كېسىكنىڭ ئىككى ئۈچىنىڭ تەرتىپى ئويلىشىلا-مايدۇ، شۇڭا ئۇ گۇرۇپپىلاش مەسىلىسىدۇر؛ (2) تارماق مەسىلىدا، كېسىكنىڭ ئىككى ئۈچىنىڭ تەرتىپى ئويلىشىلىدۇ، شۇڭا ئۇ ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىدۇر.

4 - مىسال. 100 مەھسۇلاتنىڭ 98 ى لايىقەتلىك مەھسۇلات، 2 سى ناچار مەھسۇلات. بۇ 100 مەھسۇلات ئىچىدىن خالىغان 3 نى ئالغاندا:

(1) ئوخشاش بولمىغان ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل؟

(2) ئېلىنغان 3 مەھسۇلات ئىچىدە، دەل 1 ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل؟

(3) ئېلىنغان 3 مەھسۇلات ئىچىدە كەم دېگەندە 1 ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل؟
يېشىش: (1) ئوخشاش بولمىغان ئېلىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى دەل 100 مەھسۇلات ئىچىدىن 3 دىن ئېلىشنىڭ گۇرۇپپىلاش سانىغا تەڭ بولىدۇ، شۇڭا ئوخشاش بولمىغان ئېلىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى:

$$C_{100}^3 = \frac{100 \times 99 \times 98}{3 \times 2 \times 1} = 161700.$$

(2) 2 ناچار مەھسۇلات ئىچىدىن 1 ناچار مەھسۇلات ئېلىشنىڭ ئۇسۇلى C_2^1 خىل، 98 مەھسۇلات ئىچىدىن 2 لايىقەتلىك مەھسۇلات ئېلىشنىڭ ئۇسۇلى C_{98}^2 خىل بولغانلىقتىن، ئېلىنغان 3 مەھسۇلات ئىچىدە دەل 1 ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:

$$C_2^1 \cdot C_{98}^2 = 9506.$$

(3) 1 - خىل يېشىش ئۇسۇلى: 100 مەھسۇلات ئىچىدىن ئېلىنغان 3 مەھسۇلات ئىچىدە كەم دېگەندە 1 ناچار مەھسۇلات بولۇش دېگەنلىك، 1 ناچار مەھسۇلات بولۇش ۋە 2 سى ناچار مەھسۇلات بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى ئەھۋالنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. (2) تارماق مىسالدا 1 ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى $C_2^1 \cdot C_{98}^2$ خىل بولىدىغانلىقى تېپىلدى، شۇڭا تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، ئېلىنغان 3 مەھسۇلات ئىچىدە كەم دېگەندە 1 ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى:

$$C_2^1 \cdot C_{98}^2 + C_2^2 \cdot C_{98}^1 = 9604.$$

2 - خىل يېشىش ئۇسۇلى: 3 مەھسۇلات ئىچىدە كەم دېگەندە 1 ناچار مەھسۇلات بولۇشتىكى ئېلىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى دېگەنلىك، 100 مەھسۇلات ئىچىدىن 3 نى ئېلىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانىدىن 3 مەھسۇلاتنىڭ ھەممىسى لايىقەتلىك مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانىنى ئېلىۋەتكەنگە باراۋەر كېلىدۇ، يەنى

$$C_{100}^3 - C_{98}^3 = 161700 - 152096 = 9604.$$

مەشىق

1. A, B, C, D تۆت پۇتبول كوماندىسى يەككە ئايالما مۇسابىقىسى ئۆتكۈزدى:

(1) ھەرقايسى مەيدان مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىدىغان ئىككى تەرەپ كوماندىلىرىنى يېزىپ چىقىڭ؛

(2) چېمپىيونلۇق ۋە ئىككىنچىلىكنى ئېلىشنىڭ بارلىق مۇمكىن بولىدىغان ئەھۋاللىرىنى يېزىپ چىقىڭ.

2. تەكشۈرۈلگەن A, B, C, D تۆت نۇقتا ئىچىدىكى ھەرقانداق 3 نۇقتىنىڭ بىر تۈز سىزىق ئۈستىدە ياتمايدىغانلىقى بېرىلگەن، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ھەر 3 نۇقتىنى چوققا قىلغان بارلىق ئۈچبۇلۇڭلارنى يېزىپ چىقىڭ.

3. مەكتەپ 6 نۇرلۇك تاللىما دەرسلىك تەسىس قىلدى. ئەگەر ھەربىر ئوقۇغۇچىنىڭ بۇلاردىن 3 نى تاللىشى تەلپ قىلىنسا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟

4. 3، 5، 7، 11 دىن ئىبارەت تۆت تۈپ سان ئىچىدىكى خالىغان 2 سى كۆپەيتىلسە، ئۆزئارا تەڭ بولمىغان كۆپەيتىمىلەردىن قانچىسى كېلىپ چىقىدۇ؟

5. ھېسابلاڭ ھەمدە نەتىجىڭىزنى ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ تەكشۈرۈڭ:

$$(1) C_8^2; \quad (2) C_8^3; \quad (3) C_7^3 - C_6^2; \quad (4) 3C_8^3 - 2C_8^2.$$

$$6. C_n^m = \frac{m+1}{n+1} C_{n+1}^{m+1} \text{ نى ئىسپاتلاڭ.}$$



گۇرۇپپىلاش ساننىڭ ئىككى خۇسۇسىيىتى

ئۆزىنىش



تۆۋەندە بېرىلگەن ھەربىر گۇرۇپپىدىكى گۇرۇپپىلاش سانلىرىنى ھېسابلىغۇچىنى پايدىلىنىپ ھېسابلاڭ، نېمىنى بايقىدىڭىز؟ بايقىغىنىڭىزنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

$$C_{12}^4, C_{12}^8; C_{18}^3, C_{18}^{15}; C_{10}^7, C_{10}^3, \dots$$

بايقاش تەس ئەمەسكى، ھەرقايسى گۇرۇپپىلاردىكى ئىككى گۇرۇپپىلاش ساننى ئۆزئارا تەڭ ھەمدە ئىككى گۇرۇپپىلاش ساننىڭ يۇقىرى ئىندىكسىلىرىنىڭ يىغىندىسى تۆۋەن ئىندىكسىغا تەڭ بولىدۇ، مەسىلەن،

$$4+8=12, 3+15=18, 7+3=10, \dots$$

بۇ نەتىجىنى قانداق چۈشەندۈرۈش كېرەك؟

«تەڭلىكنىڭ ئىككى تەرىپىدە ئوخشاش بىر مەسىلىنىڭ ئىككى خىل تەڭ كۈچلۈك چۈشەندۈرۈلۈشى بېرىلگەن» دېگەن بۇ بىر جۈملە سۆز بىزنى شۇنداق ئىلھاملاندۇرىدۇكى، ئەگەر C_{12}^4 نى «12 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 4 نى تاللاپ مەلۇم پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇشتىكى تاللاش ئۇسۇلى» لىرىنىڭ خىل سانى دەپ چۈشەندۈرسەك، ئۇ ھالدا C_{12}^8 نى «12 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن پائالىيەتكە قاتناشمايدىغان 8 نى قالدۇرۇپ قويۇشتىكى تاللاش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى» دەپ چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ. 8 ئوقۇغۇچى قالدۇرۇپ قويۇلغاندىن كېيىن، قالغان 4 پائالىيەتكە قاتناشمايدىغان ئوقۇغۇچىلار بولىدۇ، شۇڭا پائالىيەتكە قاتناشمايدىغان ئوقۇغۇچىلارنى تاللاش ئۇسۇلى لىرىنىڭ خىل سانى C_{12}^8 پائالىيەتكە قاتناشمايدىغان ئوقۇغۇچىلارنى تاللاش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى C_{12}^4 كە تەڭ بولىدۇ، يەنى

$$C_{12}^4 = C_{12}^8.$$

ئومۇمەن، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىن كېيىن، چوقۇم $n-m$ دانە ئېلېمېنت ئېشىپ قالىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش بىلەن قېپقالغان $n-m$ دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش بىرگە بىر ماس كېلىدۇ. شۇنداق قىلىپ، ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن m دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانى مۇشۇ ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن $n-m$ دانە ئېلېمېنتنى ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش سانىغا تەڭ بولىدۇ. دېمەك:

$$C_n^m = C_n^{n-m}.$$

1 - خۇسۇسىيەت

$C_n^0=1$ بولغانلىقتىن، يۇقىرىقى تەڭلىك $m=n$ بولغاندىمۇ كۈچكە ئىگە بولۇپرىدۇ.
 1 - خۇسۇسىيەتنى كەلتۈرۈپ چىقارغاندا، گۇرۇپپىلاشقا دائىر تەڭلىكلەرنى ئىسپاتلاشتا كۆپ قوللىنىلىدىغان بىر مۇھىم ئۇسۇلدىن پايدىلاندىق. بۇ ئۇسۇلنى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلىشقا بولىدۇ: تەڭلىكنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى ئوخشاش بولمىغان ئىپادىلەر ئەمەلىيەتتە ئوخشاش بىر گۇرۇپپىلاش مەسىلىسىگە قارىتىلغان ئىككى خىل ساناش لايىھىسى ئىكەنلىكىنى شەرھىلەپ، بۇ ئارقىلىق ئىسپاتلاش مەقسىتىگە يېتىش.

ئىزدىنىش

يۇقىرىدىكى ئىدىيىنى ئۇسۇلغا ئاساسەن، گۇرۇپپىلاش سانىنىڭ تۆۋەندىكى خۇسۇسىيەتىنى تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلىيالايمىز؟

2 - خۇسۇسىيەت

$$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}.$$

2.1 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلاڭ:

$$(1) 5A_5^2 + 4A_4^2; \quad (2) A_4^1 + A_4^2 + A_4^3 + A_4^4.$$

2. ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلاڭ:

$$(1) C_{15}^3; \quad (2) C_{200}^{197};$$

$$(3) C_6^3 \div C_6^4; \quad (4) C_{n+1}^3 \cdot C_n^{n-2}.$$

3. ئىسپاتلاڭ:

$$(1) A_{n+1}^{n+1} - A_n^n = n^2 A_{n-1}^{n-1};$$

$$(2) \frac{(n+1)!}{k!} - \frac{n!}{(k-1)!} = \frac{(n-k+1) \cdot n!}{k!} \quad (k \leq n).$$

4. پويىز ئىستانسىسىنىڭ 8 ئاچا يولىدا ئوخشاش بولمىغان 4 پويىزنى توختىتىشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل توختىتىش ئۇسۇلى بار (بۇ يەردە ھەربىر ئاچا يولىدا پەقەت بىر پويىز توختىتىشقا بولىدۇ دەپ پەرەز قىلىندۇ)؟

5. بىر ھۆججەتلىك فىلىم 4 ئىدارىدە نۆۋەتلەشتۈرۈپ قويۇلماقچى. ھەربىر ئىدارىدە 1 مەيدان قويۇلسا، قانچە خىل نۆۋەتلەشتۈرۈپ قويۇش تەرتىپى بار؟

6. بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئوخشاش بولمىغان 20 كىتابى بار. بۇ كىتابلارنى بىرلا قەۋىتى بار كىتاب جازىسىگە تىزىشتا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تىزىش ئۇسۇلى بار؟

7. مەكتەپ سەنئەت كېچىلىكىدە ئورۇندىلىدىغان 11 نومۇرنىڭ ئورۇندىلىش تەرتىپىنى ئورۇنلاشتۇرماقچى. 1 - نومۇر بىلەن ئاخىرقى 11 نومۇر بېكىتىلىپ بولغاندىن سىرت، 4 مۇزىكا نومۇرىنىڭ 2، 5، 7، 10 - ئورۇندا بولۇشى، 3 ئۇسسۇل نومۇرىنىڭ 3، 6، 9 - ئورۇندا بولۇشى، 2 ئەلەمگە نومۇرىنىڭ 4، 8 - ئورۇندا بولۇشى تەلەپ قىلىنسا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى بار؟

8. $n \times n$ دانە ساندىن ھاسىل قىلىنغان كۋادرات ماترىسسىنىڭ ئەڭ يۇقىرىقى يولىدا ئوخشاش بولمىغان n دانە سان بار. مۇشۇ n دانە ساننى ئوخشاش بولمىغان تەرتىپتە تىزىش ئارقىلىق قالغان ھەممە يوللارنى ھاسىل قىلىپ، خالىغان ئىككى يولنىڭ تەرتىپىنى ئوخشاش ئەمەس قىلغىلى بولامدۇ؟ ئەگەر بىر سانلىق ماترىسسىنىڭ m يولى بار بولۇپ، ھەر بىر يولىدا ئوخشاش بولمىغان n دانە سان بولسا، ئۇنىڭ ھەر بىر يولىدا تەكرارلىنىشنىڭ بولماسلىقى ئۈچۈن، m ئەڭ چوڭ بولغان قانداق قىممەتنى ئېلىشى كېرەك؟

9. چەمبەر ئۈستىدە ياتقان 10 نۇقتا بار:

- (1) ھەر 2 نۇقتا ئارقىلىق بىر خوردا ئۆتكۈزسەك، جەمئىي قانچە خوردا ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ؟
- (2) ھەر 3 نۇقتا ئارقىلىق چەمبەرگە ئىچىتىن تېگىشكەن ئۆچۈلگۈچىدىن بىرنى سىز ساق، بۇنداق ئۆچۈلگۈچىدىن قانچىنى سىزغىلى بولىدۇ؟

10. (1) كۆپۈنگۈ بەش تەرەپلىكنىڭ قانچە دىئاگونالى بار؟
(2) كۆپۈنگۈ n تەرەپلىكنىڭ قانچە دىئاگونالى بار؟

11. بىر يۈەن، ئىككى يۈەن، بەش يۈەن، ئون يۈەنلىك خەلق پۇلىنىڭ ھەرقايسىسىدىن 1 ى بار بولسا، ئۇلار دىن جەمئىي قانچە خىل پۇل قىممىتى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟

12. (1) بوشلۇقتا 8 نۇقتا بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ھەرقانداق 4 نۇقتا تەكشىلىكداش ئەمەس، بۇ 8 نۇقتا تا ئىچىدىكى ھەر 3 نۇقتا ئارقىلىق بىر تەكشىلىك ئۆتكۈزسەك، جەمئىي قانچە تەكشىلىك ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ؟
(2) بوشلۇقتا 10 نۇقتا بار بولۇپ، ئۇلار ئىچىدىكى ھەرقانداق 4 نۇقتا تەكشىلىكداش ئەمەس. بۇ 10 نۇقتا ئىچىدىكى ھەر 4 نۇقتىنى چوققا قىلىپ تۆت ياقلىق ھاسىل قىلساق، جەمئىي قانچە تۆت ياقلىق ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟

13. بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ:

(1) 3 دانە ئېكسكۇرسىيە بېلىتى بار. 5 ئادەم ئىچىدىن 3 ئادەمنى بەلگىلەپ ئېكسكۇرسىيىگە ئەۋەتىشكە توغرا كەلسە، ئوخشاش بولمىغان بەلگىلەش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى _____ بولىدۇ؛

(2) ئوخشاش بولمىغان 5 بۇيۇمدىن 3 نى تاللاپ 3 ئوقۇغۇچىغا بىردىن سوۋغا قىلىشتا ئوخشاش بولمىغان سوۋغا قىلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى _____ بولىدۇ؛

(3) 5 ئىشچى 3 كۈن ئىچىدىن 1 كۈننى ئۆز ئالدىغا تاللاپ دەم ئالسا، ئوخشاش بولمىغان تاللاش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى _____ بولىدۇ؛

(4) A توپلامدا m دانە ئېلېمېنت، B توپلامدا n دانە ئېلېمېنت بار. بۇ ئىككى توپلامنىڭ ھەرقايسىسىدىن 1 دانە ئېلېمېنتنى ئېلىشتا، ئوخشاش بولمىغان ئېلىش ئۇسۇلىنىڭ خىل سانى _____ بولىدۇ.

14. بىر قېتىملىق ئىمتىھاننىڭ تاللاپ ئىشلىنىدىغان سوئال قىسمىدا، بىرىنچى سوئالدىكى 4 تارماق سوئالدىن 3 نى تاللاپ ئىشلەش، ئىككىنچى سوئالدىكى 3 تارماق سوئالدىن 2 نى تاللاپ ئىشلەش، ئۈچىنچى سوئالدىكى 2 تارماق سوئالدىن 1 نى تاللاپ ئىشلەش تەلەپ قىلىنسا، بۇنىڭدا ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟

15. 5 ئوغۇل ئوقۇغۇچى ۋە 4 قىز ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 4 نى تاللاپ مۇنازىرە مۇسابىقىسىگە قاتناشتۇرۇشتا:

(1) ئەگەر ئوغۇل ئوقۇغۇچىلار بىلەن قىز ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن 2 نى تاللاشقا توغرا كەلسە،

قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟


- (2) ئەگەر ئوغۇل ئوقۇغۇچىلار ئىچىدىكى «ئا» ئوقۇغۇچى بىلەن قىز ئوقۇغۇچىلار ئىچىدىكى «ب» ئوقۇغۇچىنىڭ چوقۇم قاتنىشىشى تەلەپ قىلىنسا، قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟
- (3) ئەگەر ئوغۇل ئوقۇغۇچىلار ئىچىدىكى «ئا» ئوقۇغۇچى بىلەن قىز ئوقۇغۇچىلار ئىچىدىكى «ب» ئوقۇغۇچىنىڭ كەم دېگەندە بىرى قاتنىشىشى تەلەپ قىلىنسا، قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟
- (4) ئەگەر 4 ئوقۇغۇچىنىڭ ئىچىدە چوقۇم ھەم ئوغۇل ئوقۇغۇچى، ھەم قىز ئوقۇغۇچىنىڭ بولۇشى تەلەپ قىلىنسا، قانچە خىل تاللاش ئۇسۇلى بار؟
16. 6 ئادەم مەلۇم پائالىيەتكە قاتنىشىشقا بىرلا ۋاقىتتا تەكلىپ قىلىندى. ئەگەر بۇ پائالىيەتكە چوقۇم ئادەم بېرىشى كېرەك بولسا ھەمدە قانچە ئادەم بېرىشنى ئۇلارنىڭ ئۆزلىرى بەلگىلىسە، ئوخشاش بولمىغان جەمئىي قانچە خىل بېرىش ئۇسۇلى بار؟

17. 200 مەھسۇلاتنىڭ ئىچىدە 2 ناچار مەھسۇلات بار. ئۇلارنىڭ ئىچىدىن خالىغان 5 نى ئالغاندا:

- (1) «دەل 2 سى ناچار مەھسۇلات» بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل بولىدۇ؟
- (2) «دەل 1 ى ناچار مەھسۇلات» بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل بولىدۇ؟
- (3) «ناچار مەھسۇلات چىقمايدىغان» بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل بولىدۇ؟
- (4) «كەم دېگەندە 1 ى ناچار مەھسۇلات» بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل بولىدۇ؟

B گۇرۇپپا

1. مەلۇم پاراۋانلىق لاتارىيە لايىھىسىدە، 1 دىن 37 گىچە بولغان 37 رەقەم ئىچىدىن 7 رەقەم تاللىۋېلىنىپ، تاللىۋېلىنغان بۇ 7 رەقەم ئېچىلغان 7 رەقەم بىلەن ئوخشاش بولسا (رەقەملەرنىڭ تىزىلىش تەرتىپى نەزەرگە ئېلىنمايدۇ)، 1 - دەرىجىلىك مۇكاپات چىقىدۇ. ئۇنداق بولسا، لاتارىيە بېلىتىدىن قانچىنى سېتىۋالغاندا 1 - دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكىلى بولىدۇ؟ ئەگەر 1 - دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشىش پۇرسىتى $\frac{1}{6\,000\,000}$ دىن يۇقىرى، ئەمما $\frac{1}{500\,000}$ دىن ئېشىپ كەتمەيدىغان قىلىپ ئاشۇرۇلسا، 37 سان ئىچىدىن قانچە سان تاللىۋېلىنىدىغان قىلىپ بېكىتىلىشى كېرەك؟



(2 - مىسال ئۈچۈن)

2. سولدىكى رەسىمنىڭ تۆت بۆلىكىنى ئوخشاش بولمىغان بەش خىل رەڭ بىلەن بويلاشتۇرۇشقا، ئورتاق تەرەپكە ئىگە ئىككى بۆلىكىنى بىر خىل رەڭ بىلەن بويىماسلىق تەلەپ قىلىنسا، ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل بويلاش ئۇسۇلى بار؟
3. 1، 3، 5، 7، 9 لاردىن خالىغان 3 رەقەمنى، 2، 4، 6، 8 لاردىن خالىغان 2 رەقەمنى ئېلىپ، تەكرار رەقەمى بولمىغان بەش خانىلىق ساندىن جەمئىي قانچىنى تۈزۈشكە بولىدۇ؟
4. «ئا»، «ب»، «س»، «د»، «ئى» دىن ئىبارەت بەش ئوقۇغۇچى ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان مەلۇم ئەمگەك تېخنىكىسى مۇسابىقىسىدە، بىرىنچىدىن بەشىنچىگىچە بولغانلارنىڭ تەرتىپى ئېنىقلانغاندىن كېيىن، «ئا»، «ب»، «ئىككى ئوقۇغۇچى ئۆزىنىڭ نەتىجىسىنى سورىغاندا، جاۋاب بەرگۈچى «ئا» غا «ناھايىتى ئېسىس، سىز بىلەن «ب» ھەر ئىككىڭلار چېمپىيون بولالامدېڭلار»؛ «ب» غا «سىز ئىلۋەتتە ئەڭ ناچىرى ئەمەس» دېگەن. بۇ جاۋابلارنى تەھلىل قىلغاندا، بەش ئادەمنىڭ تەرتىپىنىڭ ئوخشاش بولمىغان قانچە خىل ئەھۋالى بولۇشى مۇمكىن؟
5. $C_n^k \cdot C_{n-k}^k = C_n^k \cdot C_n^k$ نىڭ مەنىسىنى بىر ئەمەلىي ئارقا كۆرۈنۈش بەرپا قىلىش ئارقىلىق چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

CHAPTER 3-1

ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى

ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى

1-3-1

ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىنى تەتقىق قىلىشتا ئىشلىتىلىدۇ. $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسى دېگەنمىز زادى نېمە؟ بىزنىڭ بۇ يېيىلمىنى ساناڭ پرىنسىپى دېگەن بابتا ئۆگىنىد. دىغانلىقىمىز ئۇنىڭ تۈر بويىچە قوشۇپ ساناڭ پرىنسىپى، باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناڭ پرىنسىپى، ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە گۇرۇپپىلاشقا دائىر بىلىملەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىد. دۇ، ئۇنداق بولسا، ئىككى ئەزالىق يېيىلمىسى بىلەن بۇ بىلىملەرنى قانداق باغلاشتۇرۇش كېرەك؟

ئىزدىنىش

$(a+b)^2$ ، $(a+b)^3$ ، $(a+b)^4$ نىڭ يېيىلمىسىنى ئىككى ساناڭ پرىنسىپىدىن پايدىد.

لىنىپ قانداق كەلتۈرۈپ چىقىرىش كېرەك؟ بۇنىڭغا ئاساسەن، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسى

سنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى قىياس قىلالامىز؟

بىز تۆلۈقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە $(a+b)^2$ نىڭ يېيىلمىسىنى كۆپ ئەزالىقلارنى كۆپەيتىش قائىدىسىدىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقارغانىدۇق:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\ &= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b \\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

يۇقىرىقى جەرياندىن $(a+b)^2$ نىڭ 2 دانە $(a+b)$ نىڭ كۆپەيتىلىشى ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. كۆپ ئەزالىقلارنى كۆپەيتىش قائىدىسىگە ئاساسەن، ھەر بىر $(a+b)$ غا كۆپەيتكەن چاغدا a نى تاللاش ياكى b نى تاللاشتىن ئىبارەت ئىككى خىل تاللاش بار بولۇپ، ھەر بىر $(a+b)$ دىكى a ياكى b تاللىۋېلىنغاندىن كېيىن، ئاندىن يېيىلمىنىڭ بىر ئەزاسىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناڭ پرىنسىپىغا ئاساسەن، ئوخشاش ئەزالارنى ئىخچاملاشتىن بۇرۇن، $(a+b)^2$ نىڭ يېيىلمىسىدا جەمئىي $2 \times 2 = 2^2$ ئەزا بار بولىدۇ ھەمدە ھەر بىر ئەزا $a^{2-k} \cdot b^k$ ($k=0, 1, 2$) كۆرۈنۈشتە بولىدۇ.

ئەمدى $a^{2-k} \cdot b^k$ كۆرۈنۈشتىكى ئوخشاش ئەزالارنىڭ سانىنى تەھلىل قىلايلى. $k=0$ بولغاندا، $a^{2-k} \cdot b^k = a^2$ بولۇپ، ئۇ 2 دانە $(a+b)$ نىڭ ھەر ئىككىسىدىن b نىڭ تاللانمىغانلىقىد.

دىن كېلىپ چىقىدۇ ھەمدە $(a+b)$ 2 دانە $(a+b)$ ئىچىدىن 0 دانە b نى ئالغاندىكى (يەنى ئىككىسىدىن a نى ئالغاندىكى) گۈرۈپپىلاش سانى C_2^0 گە باراۋەر كېلىدۇ، شۇڭا a^2 نىڭ سانى پەقەت 1 بولىدۇ؛
 $k=1$ بولغاندا، $a^{2-k} \cdot b^k = ab$ بولۇپ، ئۇ بىر $(a+b)$ دىن a نى، يەنە بىر $(a+b)$ دىن b نى تاللاشتىن كېلىپ چىقىدۇ. b تاللىۋېلىنغاندىن كېيىن، a نى تاللاش ئۇسۇلىمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ بەلگىلىنىدىغان. لىقى ئۈچۈن، ab نىڭ كۆرۈلۈش قېتىم سانى 2 دانە $(a+b)$ ئىچىدىن 1 دانە b نى ئالغاندىكى گۈرۈپپىلاش سانىغا باراۋەر كېلىدۇ، يەنى ab نىڭ سانى C_2^1 بولىدۇ؛
 $k=2$ بولغاندا، $a^{2-k} \cdot b^k = b^2$ بولۇپ، ئۇ 2 دانە $(a+b)$ نىڭ ھەر ئىككىسىدىن b نى تاللاشتىن كېلىپ چىقىدۇ ھەمدە 2 دانە $(a+b)$ ئىچىدىن 2 دانە b نى تاللىغاندىكى گۈرۈپپىلاش سانى C_2^2 گە باراۋەر كېلىدۇ. شۇڭا، b^2 نىڭ سانى پەقەت 1 بولىدۇ.

يۇقىرىقى تەھلىلدىن تۆۋەندىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرايلىمىز:

$$(a+b)^2 = C_2^0 a^2 + C_2^1 ab + C_2^2 b^2.$$



ئىزدىنىش

يۇقىرىدىكى جەريانغا تەقلىد قىلىپ، $(a+b)^3$ ، $(a+b)^4$ نىڭ يېيىلمىسىنى ئۆز-ئارا كەلتۈرۈپ چىقىرايلىمىز؟

يۇقىرىدىكى كونكرېت مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىشتىن ئىلھام ئېلىپ، خالىغان مۇسبەت پۈتۈن سان n غا نىسبەتەن تۆۋەندىكى قىياسنى ئوتتۇرىغا قويالايمىز:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

بۇ قىياسنى قانداق ئىسپاتلاش كېرەك؟

ئىسپات: $(a+b)^n$ دا n دانە $(a+b)$ ئۆزئارا كۆپەيتىلىدىغانلىقى ھەمدە ھەر بىر $(a+b)$ غا كۆپەيتىدەن a نى تاللاش ياكى b نى تاللاشتىن ئىبارەت ئىككى خىل تاللاش بار بولۇپ، ھەر بىر $(a+b)$ دىن a ياكى b تاللىۋېلىنغاندىن كېيىن، ئاندىن يېيىلمىنىڭ بىر ئەزاسىغا ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن بىلەلەيمىزكى، ئوخشاش ئەزالارنى ئىخچاملاشتىن بۇرۇن، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدا جەمئىي 2^n ئەزا بار بولىدۇ ھەمدە ھەر بىر ئەزا $a^{n-k} b^k$ ($k=0, 1, \dots, n$) كۆرۈنۈشتە بولىدۇ.

مەلۇم k ($k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$) گە ماس كېلىدىغان ئەزا $a^{n-k} b^k$ غا $n-k$ دانە $(a+b)$ ئىچىدىن a نى، k دانە $(a+b)$ ئىچىدىن b نى تاللاش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ. b تاللىۋېلىنغاندىن كېيىن، a نى تاللاش ئۇسۇلىمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ بەلگىلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن، $a^{n-k} b^k$ نىڭ كۆرۈلۈش قېتىم سانى n دانە $(a+b)$ ئىچىدىن k دانە b نى ئالغاندىكى گۈرۈپپىلاش سانى C_n^k گە باراۋەر كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدا، $a^{n-k} b^k$ نىڭ سانى جەمئىي C_n^k بولىدۇ، ئۇلاردىكى ئوخشاش ئەزالارنى ئىخچاملاشتۇرۇپ، تۆۋەندىكى ئىككى ئەزالىق يېيىلمىسى كېلىپ چىقىدۇ:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n.$$

بۇ فورمۇلا ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى (binomial theorem) دەپ ئاتىلىدۇ.

كۆرەلەيمىزكى، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدا جەمئىي $n+1$ ئەزا بار، ئۇنىڭدىكى ھەرقايسى ئەزالارنىڭ كوئېففىتسېنتى C_n^k ($k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$) ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتى (binomial coefficient) دەپ ئاتىلىدۇ، يېيىلمىدىكى $C_n^k a^{n-k} b^k$ ئىككى ئەزالىق يېيىلمىسىنىڭ ئومۇمىي ئەزاسى دەپ ئاتىلىپ، T_{k+1} بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، يەنى ئومۇمىي ئەزا يېيىلمىدىكى $k+1$ نىچى ئەزا بولىدۇ:

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k.$$

ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسىدا، $b=x$ ، $a=1$ دەپ پەرەز قىلساق، تۆۋەندىكى فورمۇلا كېلىپ چىقىدۇ:

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^k x^k + \dots + C_n^n x^n.$$

1 - مىسال. $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ نىڭ يېيىلمىسىنى تاپايلى.

تەھلىل: ئاسان بولۇشى ئۈچۈن، ئاۋۋال ئاددىيلاشتۇرۇۋېلىپ، ئاندىن يېيىلمىنى تاپىمىز. يېشىش: ئەسلى ئىپادىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، ئاندىن يايىساق:

$$\begin{aligned} \left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6 &= \left(\frac{2x-1}{\sqrt{x}}\right)^6 = \frac{1}{x^3} (2x-1)^6 \\ &= \frac{1}{x^3} [(2x)^6 - C_6^1 (2x)^5 + C_6^2 (2x)^4 - C_6^3 (2x)^3 + C_6^4 (2x)^2 - C_6^5 (2x) + C_6^6] \\ &= \frac{1}{x^3} (64x^6 - 6 \cdot 32x^5 + 15 \cdot 16x^4 - 20 \cdot 8x^3 + 15 \cdot 4x^2 - 6 \cdot 2x + 1) \\ &= 64x^3 - 192x^2 + 240x - 160 + \frac{60}{x} - \frac{12}{x^2} + \frac{1}{x^3}. \end{aligned}$$

2 - مىسال. $(1+2x)^7$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى 4 نىچى ئەزا.

نىڭ كوئېففىتسېنتىنى تاپايلى:

$$(2) \quad \left(x - \frac{1}{x}\right)^9 \text{ نىڭ يېيىلمىسىدىكى } x^3 \text{ نىڭ كوئېففىتسېنتىنى}$$

تاپايلى.

يېشىش: $(1+2x)^7$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى 4 نىچى ئەزا تۆ.

ۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\begin{aligned} T_{3+1} &= C_7^3 \cdot 1^{7-3} \cdot (2x)^3 \\ &= C_7^3 \cdot 2^3 \cdot x^3 \\ &= 35 \times 8x^3 \\ &= 280x^3. \end{aligned}$$

شۇڭا، يېيىلمىدىكى 4 نىچى ئەزانىڭ كوئېففىتسېنتى 280.

$$(2) \quad \left(x - \frac{1}{x}\right)^9 \text{ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئومۇمىي ئەزاسى:}$$

$$C_9^r x^{9-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r C_9^r x^{9-2r}.$$

مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن:

$$9-2r=3,$$

$$r=3.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، x^3 نىڭ كوئېففىتسېنتى:

$$(-1)^3 C_3^3 = -84.$$

مەشىق

1. $(p+q)^7$ نىڭ يېيىلمىسىنى يېزىڭ.

2. $(2a+3b)^6$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى 3-ئىنچى ئەزانى تېپىڭ.

3. $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى $r+1$ -ئىنچى ئەزانى يېزىڭ.

4. توغرا جاۋابنى تاللاڭ:

$(x-1)^{10}$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى 6-ئىنچى ئەزانىڭ كوئېففىتسېنتى () بولىدۇ.

(A) C_{10}^6

(B) $-C_{10}^6$

(C) C_{10}^5

(D) $-C_{10}^5$

«ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭى» ۋە ئىككى ئەزالىق
كوئېففىتسېنتىنىڭ خۇسۇسىيىتى

2-3-1

ئىزدىنىش

$(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلارنى ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ ھېسابلاڭ ھەم جەدۋەلگە تولدۇرۇڭ.

n	$(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتى
1	
2	
3	
4	
5	
6	

ھېسابلاش ۋە جەدۋەل تولدۇرۇش ئارقىلىق قانداق قانۇنىيەتنى بايقىدىڭىز؟

يۇقىرىقى جەدۋەلدىن ھەر بىر توغرا قۇردىكى كوئېففىتسېنتلار سىممېترىكلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالالايمىز. ئۇنداق بولسا، يەنە قانداق قانۇنىيەتلەر باردۇ؟ كۆزىتىشكە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن، جەدۋەلنى تۆۋەندىكىدەك يېزىۋالسىز:

ئىزدىنىش

يۇقىرىقى ئىپادىلەش شەكلىگە تايىنىپ، بەزى يېڭى قانۇنىيەتلەرنى بايقىيالايمىز؟

بۇ جەدۋەلگە نۇرغۇن قانۇنىيەتلەر يوشۇرۇنغان، مەسىلەن:

ئوخشاش بىر قۇردا، ھەر بىر قۇرنىڭ ئىككى ئۈچى 1 بولۇپ، بۇ ئىككى 1 بىلەن تەڭ يىراقلىقتا ياتقان ئەزالارنىڭ كۇئېففىتسىيىنى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ؛


قوشنا ئىككى قۇردا، 1 دىن باشقا ھەربىر سان ئۆزىنىڭ «يەلكىسىدىكى» ئىككى ساننىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە، جەدۋىلىدىكى 1 دىن باشقا خالىغان بىر ساننى C_{n+1} دەپ پەرەز قىلساق، ئۇنىڭ يەلكىسىدىكى ئىككى سان ئايرىم - ئايرىم C_n^{-1} ۋە C_n بولىدۇ، تۆۋەندىكىنى ئاسانلا ئىسپاتلىيالايمىز:

$$C_{n+1}^r = C_n^{r-1} + C_n^r.$$

كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى، بۇ جەدۋەلنى ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىي سۇڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ئۆتكەن ماتېماتىكا ئالىمى يانگ خۇي 1261 - يىلى يازغان «توققۇز بابلىق ھېسابنامىگە ئىزاھات» دېگەن كىتابىدا ئوتتۇرىغا قويغان. ئوخشىمايدىغان يېرى بۇ يەردىكى جەدۋەل ئەرەب رەقەملىرى بىلەن ئىپادىلەنگەن، يانگ خۇينىڭ كىتابىدا بولسا خەنزۇچە خەتلەر بىلەن خاتىرىلەنگەن (1.3.1 - رەسىم).

بۇ جەدۋەل ياكى خۇي ئۈچبۇلۇڭى دەپ ئاتىلىدۇ. «توققۇز بابلىق ھېسابنامىگە ئىزاھات» دېگەن بۇ كىتابتا جەدۋىلدىكى «—» دىن باشقا ھەر بىر ساننىڭ ئۆزىنىڭ يەلگىسىدىكى ئىككى ساننىڭ يە - ئىچىدىسىغا تەڭ ئىكەنلىكى چۈشەندۈرۈلگەن، ياكى خۇي بۇ ئۇسۇل - نى «شىسو» دېگەن ھېساب كىتابىدىن ئالغانلىقىنى، ئېلىمىزنىڭ شىمالىي سۇڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى ماتېماتىكا ئالىمى جيا شىيەن (تەخمىنەن مىلادىيە 11 - ئەسىر) بۇ ئۇسۇلدىن پايدىلانغانلىقى -

قىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن. بۇلار ئېلىمىزدا بۇ جەدۋەلنىڭ بايقىلىشى 11 - ئەسىردىن كېيىن ئەمەس. لىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ياۋروپالىقلار بۇ جەدۋەلنى فرانسىيىلىك ماتېماتىكا ئالىمى پاسكال (Blaise Pascal، 1623 ~ 1662) تۇنجى بولۇپ بايقىغان، دەپ قارايدۇ ۋە ئۇنى پاسكال ئۈچبۇلۇڭى دەپ ئاتايدۇ. دېمەك، ئېلىمىزدا ياكى خۇي ئۈچبۇلۇڭى ياۋروپالىقلاردىن 500 يىللار ئىلگىرى بايقالغان، بۇنىڭدىن



1.3.1 - رسم

كۆرەلەيمىزكى، ئېلىمىزنىڭ قەدىمكى دەۋرىدىكى ماتېماتىكىغا ئائىت مۇۋەپپەقىيەتلىرى جۇڭخۇا مىللىيەتلىرىنىڭ پەخىرلىنىشىگە ئىگە بولۇپ،

$(a+b)^n$ نىڭ يېڭىلىنىشىدىكى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرى

$$C_n^0, C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n,$$

نى فۇنكسىيە تۇرغۇسىدىنمۇ تەتقىق قىلالايمىز. C_n^r نى ئىككىنچى ئۆزگەرگۈچى مىقدارى r بولغان فۇنكسىيە $f(r)$ دەپ قاراساق، ئۇنىڭ ئېنىقلىنىش ساھەسى

$$\{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

بولۇپ، n نىڭ قىممىتى ئېنىق بولغاندا، بىز يەنە بۇ فۇنكسىيەنىڭ گرافىكىنىمۇ سىزالايمىز. مەسىلەن، $n=6$ بولغاندا، ئۇنىڭ گرافىكى 7 دانە نۇقتا بولۇپ (2.3.1 - رەسىمدىكىدەك).

$n=7, 8, 9$ بولغاندا،

كى فۇنكسىيە گرافىكى


لىرىنى سىزنىڭ ئۇلار.

نىڭ قانداق ئوخشاشىدىغان

ۋە ئوخشىمايدىغان تە.

رەپلىرىنىڭ بارلىقىنى

بايقىيالىدىغىزمۇ؟



2.3.1 - رەسىم

تۆۋەندە «ياڭ خۇي ئۈچۈلۈشى» ۋە 2.3.1 - رەسىمگە بىرلەشتۈرۈپ، ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتىنىڭ بەزىبىر خۇسۇسىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىمىز.

(1) سىممېترىكلىكى. باش ۋە ئاخىرقى ئىككى ئۈچتىن «تەڭ يىراقلىقتا» ياتقان ئىككى دانە ئىككى ئەزالىقنىڭ كوئېففىتسېنتى ئۆزئارا تەڭ. بۇ خۇسۇسىيەتنى فورمۇلا $C_n^m = C_n^{n-m}$ دىن بىۋاسىتە كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ.

تۈز سىزىق $r = \frac{n}{2}$ فۇنكسىيە $f(r)$ نىڭ گرافىكىنى سىممېترىك بولغان ئىككى بۆلەككە ئايرىدۇ، ئۇ

گرافىكىنىڭ سىممېترىك ئوقىدۇر.

(2) ئېشىش - كېمىيىشچانلىقى ۋە ئەڭ چوڭ قىممىتى.

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{(k-1)! k}$$

$$= C_n^{k-1} \frac{(n-k+1)}{k}$$

بولغانلىقتىن، C_n^k نىڭ C_n^{k-1} گە نىسبەتەن ئېشىش - كېمىيىش ئەھۋالى $\frac{(n-k+1)}{k}$ تەرىپىدىن بەل.

گىلىنىدۇ.

$$\frac{(n-k+1)}{k} > 1 \Leftrightarrow k < \frac{n+1}{2}$$

دىن بىلىشكە بولىدۇكى، $k < \frac{n+1}{2}$ بولغاندا، ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتى تەدرىجىي چوڭىيىدۇ.

سىمپتىرىكلىككە ئاساسەن ئۇنىڭ كېيىنكى يېرىم قىسمىنىڭ تەدرىجىي كىچىكلەيدىغانلىقىنى ھەمدە ئوتتۇرىدا ئەڭ چوڭ قىممەت ئالدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ. n جۈپ سان بولغاندا، ئوتتۇرىدىكى بىر ئەزا ئەڭ چوڭ قىممەت ئالىدۇ؛ n تاق سان بولغاندا، ئوتتۇرىدىكى ئىككى ئەزا $C_n^{\frac{n-1}{2}}$ ، $C_n^{\frac{n+1}{2}}$ ئۆزئارا تەڭ ھەمدە بىرلا ۋاقىتتا ئەڭ چوڭ قىممەت ئالىدۇ.

(3) ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى.

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2x^2 + \dots + C_n^rx^r + \dots + C_n^nx^n \quad ①$$

ئىكەنلىكى بېرىلگەن، $x=1$ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا:

$$2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n.$$

بۇ، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى 2^n گە تەڭ ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

بۇ خۇسۇسىيەتلەردىن پايدىلىنىپ نۇرغۇن مەسىلىلەرنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ئالايلۇق، ياكى خۇي ئۈچۈلۈڭىدىكى 1 دىن باشقا ھەربىر سان ئۆزىنىڭ يەلكىسىدىكى ئىككى ساننىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولالىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ خۇسۇسىيەتتىن پايدىلىنىپ، n غا ماس كېلىدىغان ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىغا ئاساسەن $n+1$ غا ماس كېلىدىغان ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنى يېزىپ چىقىشقا بولىدۇ. مەسىلەن، ياكى خۇي ئۈچۈلۈڭىدىكى $n=6$ گە ماس كېلىدىغان ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىغا ئاساسەن، $n=7$ گە ماس كېلىدىغان ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنى تۆۋەندىكىدەك يېزىپ چىقىشقا بولىدۇ:

$$1 \quad 7 \quad 21 \quad 35 \quad 35 \quad 21 \quad 7 \quad 1$$

ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرى جەدۋىلىنى مۇشۇنداق كېڭەيتىپ، بۇ جەدۋەلگە ئاساسەن ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتىنى تېپىشقا بولىدۇ.

3 - مىسال. $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدا، تاق ئەزالارنىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى جۈپ ئەزالارنىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلايلى.

تەھلىل: تاق ئەزالارنىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى:

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots,$$

جۈپ ئەزالارنىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى:

$$C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots,$$

ئىككى ئەزالىق يېيىلمىسى:

$$(a+b)^n = C_n^0a^n + C_n^1a^{n-1}b + C_n^2a^{n-2}b^2 + \dots + C_n^nb^n.$$

دىكى a, b خالىغان ھەقىقىي سان ئالايدىغانلىقى ئۈچۈن، a, b

غا مۇۋاپىق قىممەت بېرىش ئارقىلىق يۇقىرىدىكى ئىككى كوئېففىتسېنتلار يىغىندىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرايلىمىز.

ئىسپات: يېيىلما

$$(a+b)^n = C_n^0a^n + C_n^1a^{n-1}b + C_n^2a^{n-2}b^2 + \dots + C_n^nb^n$$

دا، $b=-1$ ، $a=1$ دەپ ئالسا، ئۇ ھالدا:

① بۇ «گۈرۈپپىلار»

خان تەڭلىك» نى گۈرۈپ

پىلاش مەنىسىدىن چۈ

شەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

① ئەمەلىيەتتە، a, b

لارنىڭ قىممىتى خالىغان

ھەقىقىي سان، خالىغان كۆپ

ئەزالىق ياكى باشقا نەرسە

بولسىمۇ بولىۋېرىدۇ. بىز a

b لارنىڭ قىممىتىنى كونك

رېت مەسىلىنىڭ ئېھتىياجىدا

غا ئاساسەن جانلىق تاللىماق

بولىدۇ.

$$(1-1)^n = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \dots + (-1)^n C_n^n,$$

يەنى

$$0 = (C_n^0 + C_n^2 + \dots) - (C_n^1 + C_n^3 + \dots),$$

شۇڭا:

$$C_n^0 + C_n^2 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + \dots$$

دېمەك، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدا، تاق ئەزالارنىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى.

سى چۆپ ئەزالارنىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ.

ئەمەلىيەتتە

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^k x^k + \dots + C_n^n x^n$$

نى x كە دائىر فۇنكسىيە، يەنى

$$f(x) = (1+x)^n$$

$$= C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^k x^k + \dots + C_n^n x^n$$

دەپ قارىساق، ئۇ ھالدا $f(-1) = 0$ بولىدۇ، بۇنىڭغا ئاساسەن ئىسپاتلىماقچى بولغان نەتىجىنى ئاسانلا كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز.

مەشىق

1. بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ:

(1) $(a+b)^n$ نىڭ ھەرقايسى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ ئەڭ چوڭ قىممىتى _____ بولىدۇ:

$$(2) C_{11}^1 + C_{11}^3 + \dots + C_{11}^{11} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) \frac{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n}{C_{n+1}^0 + C_{n+1}^1 + C_{n+1}^2 + \dots + C_{n+1}^{n+1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots + C_n^n = 2^{n-1}$ (چۆپ سان) نى ئىسپاتلاڭ.

3. n تەرتىپ بويىچە 1 دىن 10 غىچە قىممەتلەرنى ئالغاندىكى ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرى جەدۋىلىنى

يېزىپ چىقىڭ.



«ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭى» دىكى بەزى سىرلار

ئالدىدا ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭىدىن پايدىلىنىپ ئىككى ئەزالىق يېيىلمىسىنىڭ بەزى خۇسۇسىيەتلىرىنى مۇھاكىمە قىلدۇق. ئەمەلىيەتتە، ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭىنىڭ يەنە نۇرغۇن قىزىقارلىق خۇسۇسىيەتلىرى بار. ئەمدى مۇشۇ خۇسۇسىيەتلەر ئۈستىدە ئىزدىنىپ كۆرەيلى.


1									0 نىچى قۇر
	1		1						1 نىچى قۇر
		1		2		1			2 نىچى قۇر
			1		3		3		3 نىچى قۇر
				1					4 نىچى قۇر
					1				5 نىچى قۇر
						1			6 نىچى قۇر
									⋮
1	C_{n-1}^1	C_{n-1}^2	$\dots$	C_{n-1}^{r-1}	C_{n-1}^r	$\dots$	C_{n-1}^{n-2}	1	$n-1$ نىچى قۇر
									n نىچى قۇر
									⋮

1. بۇ شەكىلنى كۆزىتىپ، ھەر بىر قۇردىكى رەقەملەرنىڭ قانۇنىيىتىنى بايقىيالايمىز؟ باي-قىغىنىڭىزنى بوش ئورۇنغا يېزىڭ.

يۇقىرىقى شەكىلنى كۆزىتىپ شۇنى بايقىيالايمىزكى، $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ كوئېففىتسېنتى بولىدۇ، يەنى قۇرى ئىككى ئەزالىق $(a+b)^n$ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ كوئېففىتسېنتى بولىدۇ، يەنى

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^r a^{n-r} b^r + \dots + C_n^n b^n.$$

2. ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭىنى كۆزىتىپ، بۇ ئۈچبۇلۇڭنى تەشكىل قىلغان ھەر ئىككى قوشنا قۇردىكى سانلار ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بارلىقىنى بايقىيالىدىڭىزمۇ؟
بايقاشقا بولىدۇكى، بۇ ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىككى يېنى رەقەم 1 لەردىن تەركىب تاپقان بولۇپ، قالغان سانلار ئۆزىنىڭ يەلگىسىدىكى ئىككى ساننىڭ يىغىندىسىغا تەڭ.



رەسىم - 1

1.3 - رەسىمدىكىدەك، تۇتاشتۇرۇش سىزىقى ئۈستىدىكى سانلارنى كۆزىتىپ قانداق قانۇنىيەتنى بايقىيالىدىڭىز؟ ئۆزىڭىز يەنە بەزى سانلارنى تۇتاشتۇرۇپ سىناپ بېقىڭ.

ئۆزىڭىز بايقىغان قانۇنىيەتكە ئاساسەن، تۆۋەندىكى سانلار ئارقىمۇ ئارقىلىقلىرىنىڭ ئالدىنقى بىر-قانچە ئەزاسى يىغىندىسىنى قىياس قىلىپ بېقىڭ:

$$1+2+3+\dots+C_{n-1}^1 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$1+3+6+\dots+C_{n-1}^2 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$1+4+10+\dots+C_{n-1}^3 = \underline{\hspace{2cm}},$$


$$\dots\dots$$

ئومۇمەن،

$$C_r^r + C_{r+1}^r + C_{r+2}^r + \dots + C_{n-1}^r = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (n > r)$$

ئەمەلىيەتتە، يۇقىرىدىكى تەڭلىكنى ماتېماتىكىلىق ئىندۇكسىيە ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ.

2.4 - رەسىمدىكى يانتۇ قۇرلارغا قاراڭ، ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭىدا ئالدىنقى بىر قانچە يانتۇ قۇردىكى رەقەملەرنىڭ



يىغىندىسى يانتۇ قۇرلارنىڭ ئاخىرىدا بېرىلگەن، ئەمدى «؟» بار ئورۇنلارغا قالغان قۇرلاردىكى رەقەملەرنىڭ يىغىندىسىنى يېزىپ، بۇ يىغىندىلارنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىڭ، نېمىنى بايقىيالىدىڭىز؟

بۇ بىرقانچە قۇردىكى رەقەملەرنىڭ تىزىلىش قانۇنىيىتىدىن سىرت، يەنە باشقا رەقەملەرنىڭ تىزىلىش قانۇنىيىتىنى تاپالامسىز؟ ساۋاقداشلىرىڭىز بىلەن بۇ ھەقتە پىكىر ئالماشتۇرۇڭ.

3.1 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. (1) $0 < p < 1$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن، $(p + (1-p))^n$ نىڭ يېيىلمىسىنى يېزىڭ؛

(2) نىڭ يېيىلمىسىنى يېزىڭ. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^n$

2. ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسىدىن پايدىلىنىپ تۆۋەندىكىلەرنى يېيىڭ:

$$(1) (a + \sqrt[3]{b})^9;$$

$$(2) \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^7.$$

3. ئاددىيلاشتۇرۇڭ:

$$(1) (1 + \sqrt{x})^5 + (1 - \sqrt{x})^5;$$

$$(2) (2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{-\frac{1}{2}})^4 - (2x^{\frac{1}{2}} - 3x^{-\frac{1}{2}})^4.$$

4. (1) $(1 - 2x)^{15}$ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئالدىنقى 4 ئەزاسىنى تېپىڭ؛

(2) $(2a^3 - 3b^2)^{10}$ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئوتتۇرىدىكى 8 نچى ئەزاسىنى تېپىڭ؛

(3) نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئوتتۇرىدىكى بىر ئەزاسىنى تېپىڭ؛ $\left(\frac{\sqrt{x}}{3} - \frac{3}{\sqrt{x}}\right)^{12}$

(4) نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئوتتۇرىدىكى ئىككى ئەزاسىنى تېپىڭ. $(x\sqrt{y} - y\sqrt{x})^{15}$

5. تۆۋەندىكى ئىپادىلەرنىڭ ئىككى ئەزالىق يېيىلمىسىدا، كۆرسىتىلگەن ھەرقايسى ئەزانىڭ كوئېففىتسېنتى.

تىنى تېپىڭ:

(1) $\left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{10}$ نىڭ $\frac{1}{x^5}$ نى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەزاسى؛

(2) $\left(2x^3 - \frac{1}{2x^3}\right)^{10}$ نىڭ ئازاد ئەزاسى.

6. ئىسپاتلاڭ:

(1) $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{2n}$ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئازاد ئەزاسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$(-2)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!};$$

(2) $(1+x)^{2n}$ نىڭ يېيىلمىسىنىڭ ئوتتۇرىدىكى بىر ئەزاسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!} (2x)^n.$$

7. فۇنكسىيە $f(r) = C_r^7$ ($r=0, 1, 2, \dots, 7$) نىڭ گرافىكىنى «ياڭ خۇي ئۈچبۇلۇڭى» دىن پايدىلىنىپ سىزنىڭ.

8. $(1+x)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى 4-ئىنچى ئەزا بىلەن 8-ئىنچى ئەزانىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرى

ئۆزئارا تەڭ ئىكەنلىكى بېرىلگەن، بۇ ئىككى ئەزانىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتىنى تېپىڭ.

B گۇرۇپپا

1. ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلاڭ:


$$(n+1)^n - 1(1) \text{ چوقۇم } n^2 \text{ قا پۈتۈن بۆلۈنىدۇ};$$

$$(2) 99^{10} - 1 \text{ چوقۇم } 1000 \text{ غا پۈتۈن بۆلۈنىدۇ}.$$

2. ئىسپاتلاڭ:

$$2^n - C_n^1 \cdot 2^{n-1} + C_n^2 \cdot 2^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \cdot 2 + (-1)^n = 1.$$

I بۇ بابتىكى بىلىملەرنىڭ قۇرۇلما رامكىسى



II ئەسەلەش ۋە مۇلاھىزە

1. تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى ۋە باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى ساناشقا دائىر ئەڭ ئاساسىي ئىككى پرىنسىپتۇر.

بىر مۇرەككەپ مەسىلىگە دۇچ كەلگەندە، بۇ مەسىلىنى تۈرگە ئايرىش ياكى باسقۇچقا بۆلۈش ئارقىلىق بەزى ئاددىي مەسىلىلەرگە ئاجرىتىۋالغۇدەك، بۇ ئاددىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىۋالغاندىن كېيىن، ئۇلارنى بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق پۈتكۈل مەسىلىنى ھەل قىلىپ، مۇرەككەپ مەسىلىلەرنى ئاددىي مەسىلىلەر بىلەن بىر تەرەپ قىلىش ئۈنۈمىگە ئېرىشىمىز، مانا بۇ، بىر خىل مۇھىم ھەم ئاساسىي ئىدىيە. يەنە بىر تەرەپتىن، توپلام تۇرغۇسىدىن ئويلاشقاندا، تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى تۆۋەندىكىدەك بىر پاكىتنى نامايان قىلىدۇ:

U توپلام ئىككى - ئىككىدىن ئۆزئارا كېسىشمەيدىغان قىسمىي توپلام $S_1, S_2, \dots, S_k$ غا بۆلۈنسە ھەمدە S_i ($i=1, 2, \dots, k$) لارنىڭ ئېلېمېنت سانى ئايرىم - ئايرىم n_i بولسا، ئۇ ھالدا U توپلامنىڭ ئېلېمېنت سانى:

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k.$$

2. سانلارنى قوشۇش ئەمىلى ۋە كۆپەيتىش ئەمىلى بىز ئەڭ پىششىق بىلىدىغان ئىككى خىل ئەمەل. دۇر. ئەمەلىيەتتە، بۇ ئىككى خىل ئەمەل ئىنسانلارنىڭ ساناش پائالىيىتى جەريانىدا تەرەققىي قىلدۇرۇپ شەكىللەندۈرگەن ماھارىتى بولۇپ، ئۇلار ئىچىدىكى كۆپەيتىش ئەمىلى قوشۇشنىڭ ئاددىيلاشتۇرۇلۇشى ھېسابلىنىدۇ. مۇشۇ ئىككى خىل ماھارەتنى كېڭەيتىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش نەتىجىسىدە بىز بۇ بابتا ئۆگەنگەن تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى بىلەن باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى مەيدانغا كەلگەن. بۇ بابىنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، ئىككى ساناش پرىنسىپى بىلەن سانلارنى قوشۇش، كۆپەيتىش ئەمەللىرى ئارىسىدىكى باغلىنىشنى سۆزلەپ بېرەلەمسىز؟

3. تۈر بويىچە قوشۇپ ساناش پرىنسىپى «تۈرگە ئايرىلىدىغان» پائالىيەتكە ماس كېلىدۇ ھەمدە ھەر بىر تۈردىكى ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ ماس ئىشنى ئورۇندىغىلى بولىدۇ. مەسىلەن، بىر قورۇغا كىرىش

ئۈچۈن بىر نامدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ دەيلى، ئەگەر بۇ تامنىڭ سول تەرىپىدە m ئىشىك، ئوڭ تەرىپىدە n ئىشىك بار بولسا، ئۇ ھالدا قورۇغا كىرىش ئۇسۇللىرىنىڭ سانى $m+n$ بولىدۇ. بۇ يەردىكى n, m لار ئايرىم - ئايرىم سول ۋە ئوڭ تەرەپتىن قورۇغا كىرىش ئۇسۇللىرىنىڭ سانىنى ئىپادىلەيدۇ. نۆرگە ئايرىشتا ئەڭ مۇھىمى تەكرارلىماسلىق ھەم چۈشۈرۈپ قويماستىن دىققەت قىلىش كېرەك، بۇ تەلەپنى توپلام تىلى بىلەن بايان قىلالامسىز؟

4. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپى «باسقۇچقا بۆلۈنىدىغان» پائالىيەتكە ماس كېلىدۇ ھەمدە ھەر بىر باسقۇچنى تاماملاپ بولغاندىلا ئاندىن ماس ئىشنى ئورۇندىغىلى بولىدۇ. مەسىلەن، بىر قورۇغا كىرىش ئۈچۈن ئىككى تامدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ دەيلى، ئەگەر بىرىنچى تامدا m ئىشىك، ئىككىنچى تامدا n ئىشىك بار بولسا، ئۇ ھالدا قورۇغا كىرىش ئۇسۇللىرىنىڭ سانى $m \cdot n$ بولىدۇ. بۇ يەردىكى n, m لار ئايرىم - ئايرىم بىرىنچى ۋە ئىككىنچى ئىشىكتىن ئۆتۈش ئۇسۇللىرىنىڭ سانىنى ئىپادىلەيدۇ. باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىنىڭ قوللىنىلىشىنى ئەمەلىي مىساللاردىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

5. ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن گۇرۇپپىلاش ئىككى تۈرلۈك ئالاھىدە ساناش مەسىلىسىدۇر. ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ئالاھىدىلىكى ئۇنىڭدىكى ئېلېمېنتلارنىڭ «پەرقلەندۈرۈلگەنلىكى» ۋە «تەرتىپچانلىقى» دا ئىپادىلىنىدۇ. مەسىلەن، «سىنىپتىكى 50 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 4 نى تاللاپ، ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم سىنىپ باشلىقى، ئۆگەتۈش ھەيئىتى، ئەدەبىيات - سەنئەت ھەيئىتى ۋە تەنتەربىيە ھەيئىتى قىلىپ تەيىنلەش» بىر ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىدۇر. بۇ مەسىلە نېمە ئۈچۈن ئېلېمېنتلارنىڭ «پەرقلىنىشى» ۋە «تەرتىپچانلىقى» دىن ئىبارەت ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

گۇرۇپپىلاشنىڭ ئالاھىدىلىكى ئۇنىڭدىكى ئېلېمېنتلارنىڭ پەقەت «پەرقلەندۈرۈلگەنلىكى» قىلا ئەمەس. بولۇپمۇ، ئېلېمېنتلارنىڭ تەرتىپىنى ئۆيلەشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوقلۇقىدا ئىپادىلىنىدۇ. مەسىلەن، يۇقىرىقى مەسىلە «سىنىپتىكى 50 ئوقۇغۇچى ئىچىدىن 4 ۋەكىل سايلاپ بىر پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇش» دەپ ئۆزگەرتىلسە، ئۇ بىر گۇرۇپپىلاش مەسىلىسىگە ئايلاندى. ماھىيەت جەھەتتىن ئېيتقاندا، «ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنت ئىچىدىن k دانە ئېلېمېنت ئالغاندىكى گۇرۇپپىلاش» مۇشۇ ئوخشاش بولمىغان n دانە ئېلېمېنتتىن تەركىب تاپقان توپلامنىڭ بىر k ئېلېمېنتلىق قىسمى توپلىمى بولىدۇ.

ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسى ۋە گۇرۇپپىلاش سانى فورمۇلىسىنىڭ كەلتۈرۈپ چىقىرىلىشى ئىككى ساناش پرىنسىپىنىڭ بىر قوللىنىلىش جەريانى ھېسابلىنىدۇ. بۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىش جەريانىنى ئەسلىيەلەمسىز؟

6. گۇرۇپپىلاش سانى فورمۇلىسىنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ئىسپاتلىغاندا «گۇرۇپپىلاشنىڭ مەنىسىنى بەرپا قىلىش» ئۇسۇلىنى قوللاندىق، بۇ ئۇسۇلنىڭ ئاساسى ئوخشاش بىر مەسىلىنىڭ ئىككى خىل چۈشەندۈرۈلۈشىنى «يولى ھەر خىل، نەتىجىسى بىر خىل» قىلىشتىن ئىبارەت. بىر مەسىلىگە دۇچ كەلگەن ئىمىزدە، كۆپ ھاللاردا ئەسلىدە بار بىلىملىرىمىزدىن پايدىلىنىپ بۇ مەسىلىنى يېڭىۋاشتىن چۈشەندۈرۈشمىزگە توغرا كېلىدۇ، بۇ جەريان ئەمەلىيەتتە مەسىلىنى چۈشىنىش جەريانى، نامەلۇمنى مەلۇمغا ئايلاندۇرۇش جەريانى بولۇپ، مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا كۆپ ھاللاردا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ.

7. ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتا ئىككى ساناش پرىنسىپىدىن پايدىلاندىق ھەمدە بۇ ئىككى پرىنسىپتىن پايدىلانغاندا كۆپ ئەزالىقلارنى كۆپەيتىش جەريانىدىكى: ھەر بىر ئەزا $a^{n-k} b^k$ ($k=0, 1, \dots, n$) كۆرۈنۈشتە بولىدۇ دېگەن تەجربىمىزگە تاياندۇق، ئاندىن $a^{n-k} b^k$ گە ئېرىشىش باسقۇچلىرىنى ئىككى ساناش پرىنسىپى بىلەن چۈشەندۈرۈپ، باشقا ئوخشاش ئەزالارنىڭ سانى C_n^k بولىدۇ دېگەن يەكۈننى كەلتۈرۈپ چىقاردۇق. بۇ جەريان ئەستايىدىل ئەسلەپ ئۆزلەشتۈرۈۋېلىشىمىزغا ئەرزىيدۇ.

8. ئىككى ساناش پرىنسىپى، ئورۇنلاشتۇرۇش سانى فورمۇلىسى، گۇرۇپپىلاش سانى فورمۇلىسى ۋە ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتا، بىز باشتىن - ئاخىر بەزى ئاددىي، كونكرېت ئىشلارنى چىقىش قىلىپ، ئۇلاردىن ئومۇمىي خاراكتېرلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش تەجربىسىگە ئېرىشىپ، ئومۇمىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىكى پىكىر يولىنى بارلىققا كەلتۈردۇق. بۇمۇ ماتېماتىكا ۋە باشقا پەنلەرنى ئۆگىنىشتە ئەينەك قىلىشقا بولىدىغان دائىمىي ئۇسۇلدۇر.

تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى

A گۇرۇپپا

1. بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ:

(1) كۆپەيتىمە $(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$ نىڭ يېيىلمىسىدا جەمئىي _____ ئەزا بار.

(2) ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆز يىللىقىدا تەسىس قىلىنغان 7 تاللىما دەرس ئىچىدىن خالىغان 3 نى، دەرىستىن سىرتقى

6 خىل پائالىيەت گۇرۇپپىسى ئىچىدىن خالىغان 2 سىنى تاللىشىغا يول قويۇلسا، ئوخشاش بولمىغان تاللاش ئۇسۇللىرى - نىڭ خىل سانى _____ .

(3) 6 ناخشىچىنىڭ ناخشا نومۇرى ئورۇنداش تەرتىپىنى ئورۇنلاشتۇرۇشتا، مەلۇم ناخشىچىنىڭ بىرىنچى بولۇپ مەيدانغا چىقماسلىقى ھەم ئەڭ ئاخىرىدا مەيدانغا چىقماسلىقى تەلەپ قىلىنسا، ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى _____ .

(4) 5 ئادەمگە ئورۇن نومۇرى يوق 4 پۈتۈل بېلىتىنى تارقىتىپ بېرىشتە، ھەربىر ئادەمگە كۆپ بولغاندا 1 بېلەت بېرىش ھەمدە بېلەتلەرنى چوقۇم تارقىتىپ بولۇش تەلەپ قىلىنسا، ئوخشاش بولمىغان تارقىتىش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى _____ .

(5) 5 ئوقۇغۇچى بىرلا ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلىدىغان دەرىستىن سىرتقى 3 بىلىم لېكسىيىسىنى ئاڭلىماقچى بولدى، ھەر - بىر ئوقۇغۇچىنىڭ بۇ 3 لېكسىيىنىڭ خالىغان بىرىنى تاللىشىغا يول قويۇلسا، ئوخشاش بولمىغان تاللاشلارنىڭ خىل سانى _____ .

(6) مۇنتىزىم 12 تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرىنىڭ سانى _____ .

(7) $(1+x)^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) نىڭ يېيىلمىسىدىكى كوئېففىتسېنتى ئەڭ چوڭ بولغان ئەزا _____ نىچى ئەزا بولىدۇ.

2. (1) رەقەم 1، 2، 3، 4، 5، 6 لەردىن پايدىلىنىپ تەكرار رەقەمى بولمىغان مۇسبەت پۈتۈن ساندىن قانچىنى تۈز - گىلى بولىدۇ؟

(2) رەقەم 1، 2، 3، 4، 5، 6 لەردىن پايدىلىنىپ تەكرار رەقەمى بولمىغان ھەمدە 500 000 دىن چوڭ مۇسبەت پۈتۈن ساندىن قانچىنى تۈزگىلى بولىدۇ؟

3. (1) بىر توپلامنىڭ 8 ئېلېمېنتى بار بولسا، ئۇنىڭ تەركىبىدە 3 ئېلېمېنتى بار بولغان قىسمىي توپلىمىدىن قانچىسى بار؟

(2) بىر توپلامنىڭ 5 ئېلېمېنتى بار بولسا، ئۇنىڭ تەركىبىدە 1 ئېلېمېنتى، 2 ئېلېمېنتى، 3 ئېلېمېنتى، 4 ئېلېمېنتى بار بولغان قىسمىي توپلىمىدىن جەمئىي قانچىسى بار؟

4. بىر ئوقۇغۇچى 10 ساۋاقىدىشى ئىچىدىن 6 سىنى مەلۇم پائالىيەتكە قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلماقچى بولدى. بۇلار - نىڭ ئىچىدىكى 2 ساۋاقداشنى يا بىراقلا تەكلىپ قىلىش، يا ھەر ئىككىسىنى تەكلىپ قىلماسلىققا توغرا كەلسە، جەمئىي قانچە خىل تەكلىپ قىلىش ئۇسۇلى بار؟

5. (1) تەكشىلىكتە n تال تۈز سىزىق بار. ئۇلارنىڭ ئىچىدە 2 سى پاراللېل بولىدىغىنىمۇ يوق، شۇنداقلا 3 سى بىر نۇقتىدا كېسىشىدىغىنىمۇ يوق بولسا، جەمئىي قانچە كېسىشىش نۇقتىسى بار؟

(2) بوشلۇقتا n دانە تەكشىلىك بار. ئۇلارنىڭ ئىچىدە 2 سى پاراللېل بولىدىغىنىمۇ يوق، شۇنداقلا 3 سى بىر تۈز سىزىقتا كېسىشىدىغىنىمۇ يوق بولسا، جەمئىي قانچە كېسىشىش سىزىقى بار؟

6. 100 مەھسۇلاتنىڭ 97 سى لايىقەتلىك مەھسۇلات، 3 سى ناچار مەھسۇلات، بۇ 100 مەھسۇلات ئىچىدىن خالىغان 5 نى ئېلىپ تەكشۈرگەندە:

(1) ئېلىنغان 5 مەھسۇلاتنىڭ ھەممىسى لايىقەتلىك مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل؟

- (2) ئېلىنغان 5 مەھسۇلاتنىڭ دەل 2 سى ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل؟
 (3) ئېلىنغان 5 مەھسۇلاتنىڭ كەم دېگەندە 2 سى ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېلىش ئۇسۇلى قانچە خىل؟
 7. ئوخشاش بولمىغان 4 پارچە ماتېماتىكا كىتابى، ئوخشاش بولمىغان 5 پارچە فىزىكا كىتابى ۋە ئوخشاش بولمىغان 3 پارچە خىمىيە كىتابىنى كىتاب جازىسىنىڭ ئوخشاش بىر قەۋىتىگە تىزىشتا، ئوخشاش تۈردىكى كىتابلارنى ئايرىۋەتە-مەسلىك تەلەپ قىلىنسا، جەمئىي قانچە خىل تىزىش ئۇسۇلى بار؟
 8. $(1-2x)^5(1+3x)^4$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى x نىڭ دەرىجىسىنىڭ ئېشىشى بويىچە تىزىلغان 3ىنچى ئەزانى تېپىڭ:

$$(2) \left(9x + \frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18} \text{ نىڭ يېيىلمىسىدىكى ئازاد ئەزانى تېپىڭ:}$$

- (3) $(1+\sqrt{x})^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى 9ىنچى، 10ىنچى، 11ىنچى ئەزانىڭ ئىككى ئەزالىق كوئېففىتسېنتلىرى تەڭ ئايرىملىق سانلار ئارقىمۇئارقىلىقى تۈزىدىغانلىقى بېرىلگەن، n نى تېپىڭ:
 (4) $(1-x)^{10}(1+x+x^2)$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى x^4 نىڭ كوئېففىتسېنتىنى تېپىڭ.
 9. $55^{55} + 9$ نىڭ 8 گە پۈتۈن بۆلۈنىدىغانلىقىنى ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلاڭ (كۆرسەتە-مە: $55^{55} + 9 = (56-1)^{55} + 9$)

B گۇرۇپپا

1. بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ:
 (1) ئەگەر $C_{n+1}^{n+1} = 21$ بولسا، ئۇ ھالدا $n =$ _____
 (2) مەلۇم سىنىپنىڭ تىل - ئەدەبىيات، ماتېماتىكا، سىياسەت، ئىنگىلىز تىلى، تەنتەربىيە، سەنئەت قاتارلىق 6 دەرسنىڭ بىر كۈنلۈك دەرس جەدۋىلىنى ئورۇنلاشتۇرۇشتا، ماتېماتىكا دەرسىنى چۈشتىن بۇرۇن (ئالدىنقى 4 دەرس سا-ئىتى) غا، تەنتەربىيە دەرسىنى چۈشتىن كېيىن (كېيىنكى 2 دەرس سائىتى) گە ئورۇنلاشتۇرۇش تەلەپ قىلىنسا، ئوخ-شاش بولمىغان ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇللىرىنىڭ خىل سانى _____
 (3) $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ ، $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ توپلاملار بېرىلگەن بولسا، A توپلامىدىن B توپلامغا بولغان ئوخشاش بولمى-غان ئەكس ئېتىشتىن _____ نى، B توپلامىدىن A توپلامغا بولغان ئوخشاش بولمىغان ئەكس ئېتىشتىن _____ نى تۇرغۇزغىلى بولىدۇ.
 (4) بىر خىل ئاپتوموبىل نومۇرى 2 ئىنگىلىزچە ھەرپنىڭ كەينىگە 4 رەقەم ئۆلىنىپ كېلىشتىن تەركىب تاپ-قان ھەمدە ئۇنىڭدىكى 2 ئىنگىلىزچە ھەرپ ئوخشاش ئەمەس بولسا، ئوخشاش بولمىغان ئاپتوموبىل نومۇرلىرىنىڭ سانى _____
 (5) كۈبىنىڭ چوققىلىرىنى چوققا قىلغان ئۈچ قىرلىق پىرامىدالارنىڭ سانى _____
 (6) $(1-2x)^n$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى ھەرقايسى ئەزالار كوئېففىتسېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى _____
 2. رەقەم 0، 1، 2، 3، 4، 5 لەردىن پايدىلىنىپ تەكرار رەقىمى بولمىغان سان تۈزۈشتە:
 (1) ئالتە خانىلىق تاق ساندىن قانچىنى تۈزگىلى بولىدۇ؟
 (2) 201345 دىن چوڭ مۇسبەت پۈتۈن ساندىن قانچىنى تۈزگىلى بولىدۇ؟
 3. (1) تەكشىلىكتە ياتقان ئىككى گۇرۇپپا پاراللېل سىزىقنىڭ بىر گۇرۇپپىسىدا m تال، يەنە بىر گۇرۇپپىدە-سىدا n تال تۈز سىزىق بار. بۇ ئىككى گۇرۇپپا پاراللېل سىزىق ئۆزئارا كېسىشسە، قانچە پاراللېل تۆت تەرەپلىك ھا-سىل بولىدۇ؟
 (2) بوشلۇقتىكى ئۈچ گۇرۇپپا پاراللېل تەكشىلىكنىڭ بىرىنچى گۇرۇپپىسىدا m دانە، ئىككىنچى گۇرۇپپىسىدا n

دانه، ئۈچىنچى گۇرۇپپىسىدا 1 دانه تەكشىلىك بار. ئوخشاش بولمىغان گۇرۇپپىلاردىكى تەكشىلىكلەرنىڭ ھەممىسى كې-
سىشە ھەمدە كېسىش سىزىقلىرىنىڭ ھەممىسى پاراللېل بولمىسا، قانچە پاراللېل ئالتە ياقلىق ھاسىل بولىدۇ؟
4. مەلۇم خىل مەھسۇلاتنى 5 ئىش تەرتىپى بىلەن پىششىقلاپ ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ.
(1) ئەگەر بۇلار ئىچىدىكى مەلۇم بىر ئىش تەرتىپىنى ئەڭ ئاخىرىغا ئورۇنلاشتۇرۇشقا يول قويۇلمىسا، پىششىقلاپ
ئىشلەش تەرتىپىنى ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ قانچە خىل ئۇسۇلى بار؟
(2) ئەگەر بۇلار ئىچىدىكى ئىككى ئىش تەرتىپىنى ھەم ئەڭ ئالدىغا، ھەم ئەڭ ئاخىرىغا ئورۇنلاشتۇرۇشقا يول قويۇل-
مىسا، پىششىقلاپ ئىشلەش تەرتىپىنى ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ قانچە خىل ئۇسۇلى بار؟
5. $(1+x)^3 + (1+x)^4 + \dots + (1+x)^{n+2}$ نىڭ يېيىلمىسىدىكى x^2 نى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەزانىڭ كوئېففىتسېنتىنى
تېپىڭ.

2 - باب


تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ۋە ئۇنىڭ تەقسىماتى

1-2 دىسكرىت (تارقاق) تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ۋە ئۇنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

2-2 ئىككى ئەزالىق تەقسىماتى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى

3-2 دىسكرىت (تارقاق) تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ۋە كۋادراتلىق ئايرىمىسى

4-2 نورمال تەقسىمات





قارىغا ئېتىش ماھىرىنىڭ

ھەر قېتىمقى قارىغا ئېتىش نەتىجىسى تاسادىپىيلىققا ئىگە بولىدۇ. ئۇنىڭ قارىغا ئېتىش ئالاھىدىلىكىنى قانداق سۈرەتلەش كېرەك؟ قارىغا ئېتىش سەۋىيىسىنى قانداق باھالاش كېرەك؟


بىز ئېھتىماللىقنىڭ تاسادىپىي ۋەقەلەرنىڭ يۈز بېرىش مۇمكىنچىلىكىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى تەسۋىرلەشتىكى ئۆلچەم ئىكەنلىكىنى ھەمدە بەزى ئاددىي ئېھتىماللىق مودېللىرىنىمۇ بىلىۋالغاندۇق. مەسىلەن، سۈپىتى تەكشى بىر مېتال پۇلنى تاشلاشقا دائىر كلاسسىك ئېھتىماللىق مودېلىدىكى ۋەقە «ئوڭ چۈشۈش» نىڭ ئېھتىماللىقى؛ سۈپىتى تەكشى بىر شىشخالىنى تاشلاشقا دائىر كلاسسىك ئېھتىماللىق مودېلىدىكى ۋەقە «1 چېكىت چۈشۈش» نىڭ ئېھتىماللىقى؛ يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ جىنسىنى تەسۋىرلەشكە دائىر ئېھتىماللىق مودېلىدىكى ۋەقە «قىز بولۇش» نىڭ ئېھتىماللىقى ... دېگەندەك. بۇ ئوخشاش بولمىغان ئېھتىماللىق مودېللىرىدا تىلغا ئېلىنغان ۋەقەلەرنىڭ قانداق ئورتاق ئالاھىدىلىكى بار؟ بۇ تاسادىپىي ۋەقەلەرنى بىرلىككە كەلگەن بىر ئېھتىماللىق مودېلى تۈرگۈزۈپ سۈرەتلىگىلى بولامدۇ؟ بۇنىڭ ئۈچۈن، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ۋە ئۇنىڭ تەقسىماتىغا دائىر بەزى بىلىملەرنى ئۆگىنىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.

تاسادىپىي تەجرىبىنىڭ نەتىجىسىنى مىقدارلاشتۇرۇپ، ئۇنى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بىلەن ئىپادىلەش بىزنىڭ قىزىقۇۋاتقان تاسادىپىي ھادىسىلەرنى ماتېماتىكىلىق قورال بىلەن تەتقىق قىلىشىمىزغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىدۇ. بۇ بابتا، زۆرۈر دەرسلىكلەردە ئۆگەنگەن ئېھتىماللىق بىلىملىرى ئاساسىدا، بەزى دىسكرىت (تارقاق) تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارلارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى ۋە ئۇنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى، كۋادراتلىق ئايرىمىسى قاتارلىق بىلىملەرنى ئۆگىنىمىز، بەزى تاسادىپىي ھادىسىلەرنى دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ئىندىكىسىنى قوللىنىپ تەسۋىرلەيمىز ۋە تەھلىل قىلىمىز، بەزى ئاددىي ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، ئېھتىماللىق مودېلىنىڭ رولى ۋە ئېھتىماللىق ئىندىكىسىنى قوللىنىپ مەسىلىلەر ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈش ۋە ئۇنى ھەل قىلىشنىڭ ئالاھىدىلىكىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ھېس قىلىمىز.

2



تەبئىي ھادىسىلەر، ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇش ئەمەلىيىتىدە، نۇرغۇن تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارلار نورمال تەقسىماتقا بويسۇنىدۇ ياكى تەقريبىي بويسۇنىدۇ.



دېسكرېت (تارقاق) تېپلىق تاسادىپىي ئۆز- گەرگۈچى مىقدار ۋە ئۇنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

دېسكرېت تېپلىق ئۆزگەرگۈچى مىقدار


1-1-2

مۇلاھىزە؟

بىر شىشخالىنى تاشلىغاندا كۆرۈلىدىغان چېكىت سانىنى رەقەم 1، 2، 3، 4، 5، 6 بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. ئۇنداق بولسا، بىر مېتال پۇلنى تاشلىغاندىكى نەتىجىنىمۇ رەقەم بىلەن ئىپادىلەشكە بولامدۇ؟

بىر مېتال پۇلنى تاشلىغاندا ئوڭ چۈشۈش ۋە تەتۈر چۈشۈشتىن ئىبارەت ئىككى خىل نەتىجە كۆرۈ-
لۈشى مۇمكىن، بۇ تاسادىپىي تەجرىبىنىڭ نەتىجىسى سان بولمىسىمۇ، بىز ئوڭ چۈشۈش ۋە تەتۈر چۈ-
شۈشنى يەنىلا ئايرىم - ئايرىم رەقەم 1 ۋە 0 بىلەن ئىپادىلەيلىمىز (1.1.2 - رەسىم).

بۇ ئىككى تەجرىبە
نەتىجىسىنى باشقا
سانلار بىلەن ئىپادە-
لەشكە بولامدۇ؟



1.1.2 - رەسىم

① ξ ، η لار گرېك-
چە ھەرپ بولۇپ، خەلق-
ئارا ترانسكرىپسىيىسى
ئايرىم - ئايرىم $[ksɪ]$ ،
[eɪtə].

شىشخال تاشلاش ۋە مېتال پۇل تاشلاشتىن ئىبارەت تاسادىپىي تەجرىبە-
لەردە، بىز بىر ماسلىق مۇناسىۋىتى تۇرغۇزۇۋېلىپ، ھەر بىر تەجرىبە نەتى-
جىسىنى بىر ئېنىق رەقەم بىلەن ئىپادىلىدۇق. مۇشۇنداق ماسلىق مۇناسىۋى-
تى ئاستىدا، رەقەم تەجرىبە نەتىجىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئۆزگى-
رىدۇ. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، تەجرىبە نەتىجىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ
ئۆزگىرىدىغان ئۆزگەرگۈچى مىقدار تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار

(random variable) دەپ ئاتىلىدۇ ۋە ئادەتتە X ، Y ، ξ ، η ... ھەرپلىرى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

مۇلاھىزە؟

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بىلەن فۇنكسىيىنىڭ ئوخشىشىپ كېتىدىغان تەرەپلىرى بارمۇ؟

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بىلەن فۇنكسىيىنىڭ ھەر ئىككىسى بىر خىل ئەكس ئېتىش بولۇپ، تاسادىپىي مىقدار تاسادىپىي تەجرىبىنىڭ نەتىجىسىنى ھەقىقىي سانغا ئەكس ئەتتۈرىدۇ، فۇنكسىيە بولسا ھەقىقىي ساننى ھەقىقىي سانغا ئەكس ئەتتۈرىدۇ. بۇ ئىككى خىل ئەكس ئېتىش ئارىسىدا، تەجرىبە نەتىجىسىنىڭ دائىرىسى فۇنكسىيىنىڭ ئېنىقلىنىش ساھەسىگە، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسى فۇنكسىيىنىڭ قىممەت ساھەسىگە باراۋەر كېلىدۇ. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسى ئۇنىڭ قىممەت ساھەسى دېيىلىدۇ.

مەسىلەن، تەركىبىدە 10 ناچار مەھسۇلات بار بولغان 100 مەھسۇلات ئىچىدىن 4 نى خالىغانچە ئالغاندا، ئۇلار ئۆز ئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن بولغان ناچار مەھسۇلاتنىڭ سانى X ئېلىش نەتىجىسىدە نىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىدۇ، ئۇ بىر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ، قىممەت ساھەسى $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ بولىدۇ.

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقداردىن پايدىلىنىپ بەزى ۋەقەلەرنى ئىپادىلىگىلى بولىدۇ. مەسىلەن، $\{X=0\}$ دېگەنمىز «0 دانە ناچار مەھسۇلات ئېلىش» نى، $\{X=4\}$ بولسا «4 دانە ناچار مەھسۇلات ئېلىش» نى ئىپادىلەيدۇ، ۋە باشقىلار. بۇ يەردە $\{X<3\}$ نىڭ قانداق ۋەقەنى ئىپادىلەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟ «3 تىن ئارتۇق ناچار مەھسۇلات ئېلىش» نى X بىلەن قانداق ئىپادىلەش كېرەك؟ ئالدىنقى بارلىق قىممەتلىرىنى بىر - بىرلەپ كۆرسىتىپ بېرىشكە بولىدۇ. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار دىسكرىت (تارقاق) تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ① (discrete random variable) دەپ ئاتىلىدۇ.

① بۇ بابتا تەتقىق قىلىنىدىغان دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي مىقدارلار پەقەت چەكلىك دانە قىممەتتە ئالىدۇ.

دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا جىق مىسال كەلتۈرگىلى بولىدۇ. مەسىلەن، بىر ئادەمنىڭ بىر قېتىم قارىغا ئېتىشىدا تەڭگۈزۈشى مۇمكىن بولغان ھالقا سانى X دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ، ئۇنىڭ مۇمكىن بولغان بارلىق قىممەتلىرى 0، 1، ...، 10 بولىدۇ؛ مەلۇم تور بېتىنىڭ 24 سائەت ئىچىدە باشقىلار تەرىپىدىن كۆز يۈگۈرتۈلۈش قېتىم سانى Y مۇ دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ، ئۇنىڭ مۇمكىن بولغان بارلىق قىممەتلىرى 0، 1، 2، ... بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

لامپۇچكىنىڭ ئۆمرى X دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارمۇ؟

لامپۇچكىنىڭ ئۆمرى X نىڭ ئېلىشى مۇمكىن بولغان قىممەتنى ھەرقانداق بىر مەنىيى بولمىغان ھەقىقىي سان بولىدۇ، ھالبۇكى، مەنىيى بولمىغان بارلىق ھەقىقىي سانلارنى بىر - بىرلەپ كۆرسىتىپ چىقىش مۇمكىن ئەمەس، شۇڭا X دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولالمايدۇ. تاسادىپىي ھادىسىلەرنى تەتقىق قىلغاندا، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان شۇ

مەسىلىگە ئاساسەن دەل جايىدا ئېنىقلىما بېرىش كېرەك. مەسىلەن، بىز لامپۇچكىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۆمرىنىڭ 1000 سائەتكە تەڭ ياكى ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇش - بولماسلىقىغا كۆڭۈل بۆلسەك، ئۇ ھالدا تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا تۆۋەندىكىدەك ئېنىقلىما بەرسەك بولىدۇ:

$$Y = \begin{cases} 1000 \text{ سائەت} < \text{ئۆمرى}, & 0 \\ 1000 \text{ سائەت} \geq \text{ئۆمرى}, & 1 \end{cases}$$

Y ئوخشاش بولمىغان ئىككى قىممەت 0 ۋە 1 نىلا ئالىدىغانلىقتىن، ئۇنىڭ قۇرۇلمىسى لامپۇچكىنىڭ ئۆمرى X كە قارىغاندا تېخىمۇ ئاددىي بولىدۇ، ئۇ دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ، تەتقىقاتلاردا قوللىنىشقا ناھايىتى قولايلىق.

مەشىق

1. تۆۋەندىكى تاسادىپىي تەجرىبىلەرنىڭ نەتىجىسىنى دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بىلەن ئىپادىلىگىلى بولامدۇ؟ ئەگەر ئىپادىلىگىلى بولسا، ھەرقايسى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارلارنىڭ مۇمكىن بولغان قىممەتلىرىنى يېزىڭ ھەمدە بۇ قىممەتلەر ئىپادىلىگەن تاسادىپىي تەجرىبە نەتىجىسىنى چۈشەندۈرۈڭ.
 - (1) ئىككى شىشخالىنى تاشلىغاندىكى چېكىت سانلىرىنىڭ يىغىندىسى؛
 - (2) بىر پۇتبول كوماندىسىنىڭ جازا توپ نۇقتىسىدىن ۋاراناغا 5 قېتىم توپ تېپىپ كىرگۈزگەن توپ سانى؛
 - (3) بوتۇلكىسىغا 2500 ml دەپ يېزىلغان مەلۇم خىل ئىچىملىكتىن 1 بوتۇلكىنى خالىغانچە ئالغاندىكى ئەمەلىي مىقدار بىلەن بەلگىلەنگەن مىقدارنىڭ پەرقى.
2. دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا دائىر ئىككى مىسال كەلتۈرۈڭ.

دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

2-1-2

سۈپىتى تەكشى بىر شىشخال تاشلىنىدىغان تاسادىپىي تەجرىبىدە، بىز تەجرىبە نەتىجىسىنى ئالدىن بىلەلمەيدىغانلىقىمىز ئۈچۈن، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ قىممەت ئېلىشىنىمۇ ئەلۋەتتە ئالدىن بىلەلمەيمىز. بىراق، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئۆزگىرىش قانۇنىيىتىنى چېكىت سانلىرىنىڭ كۆرۈلۈش ئېھتىماللىقىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلالايمىز.

شىشخالنىڭ يۇقىرىغا قاراپ چۈشكەن يېقىدىكى چېكىت سانىنى X بىلەن ئىپادىلەيلى. شىشخالنى تاشلاشتىن بۇرۇن X نىڭ قانداق قىممەت ئالىدىغانلىقىنى ئېنىقلىيالمىساقمۇ، لېكىن كلاسسىك ئېھتىماللىق مودىلىغا دائىر بىلىملىرىمىزگە ئاساسەن بىلەلەيمىزكى، X نىڭ ئوخشاش بولمىغان ھەرقايسى قىممەتلەرنى ئېلىش ئېھتىماللىقى ئوخشاشلا $\frac{1}{6}$ بولىدۇ. 1.2 - جەدۋەلدە تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ مۇمكىن بولغان قىممەتلىرى ۋە ئۇنىڭ بۇ قىممەتلەرنى ئېلىش ئېھتىماللىقلىرى بېرىلدى.

1.2 - جەدۋەل

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

بۇ جەدۋەلدىن پايدىلىنىپ X ئىپادىلىگەن ۋەقەلەرنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپقىلى بولىدۇ. مەسىلەن، بۇ تاسادىپىي تەجرىبىدە ۋەقە $\{X < 3\} = \{X=1\} \cup \{X=2\}$ بولۇپ، ئېھتىماللىقنىڭ قوشۇلۇشچانلىقىغا ئاساسەن:

$$P(X < 3) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

ئوخشاشلا، ۋەقە $\{X \text{ جۈپ سان}\}$ نىڭ ئېھتىماللىقى:

$$P(X \text{ جۈپ سان}) = P(X=2) + P(X=4) + P(X=6) = \frac{1}{2}.$$

1.2 - جەدۋەل شىشخال تاشلىنىدىغان بۇ تاسادىپىي تەجرىبىدىكى قانۇنىيەتنى تەسۋىرلەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ.

ئومۇمەن، دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ ئېلىشى مۇمكىن بولغان ئوخشاش بولمىغان قىممەتلىرى

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n,$$

بولسا، X نىڭ ھەر بىر قىممەت x_i ($i=1, 2, \dots, n$) نى ئېلىش ئېھتىماللىقى $P(X=x_i)=p_i$ نى جەدۋەل شەكلىدە تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

2.2 - جەدۋەل

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$	p_n

بۇ جەدۋەل دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ ئېھتىماللىق تەقسىمات جەدۋىلى (probability distribution series)، قىسقىچە X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى (distribution series) دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىدە ئۇ يەنە ئاددىي ھالدا تەڭلىك


$$P(X=x_i)=p_i, \quad i=1, 2, \dots, n$$

بىلەنمۇ ئىپادىلىنىدۇ.

دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى يەنە گرافىك بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. مەسىلەن، شىشخال تاشلاش تەجرىبىسىدە، چۈشكەن چېكىت سانى X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنىڭ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردىنات سىستېمىسىدىكى دىئاگراممىسى 2.1.2 - رەسىمىدەك بولىدۇ.

دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى مۇشۇ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار سۈرەتلىگەن تاسادىپىي ھادىسىنى تولۇق تەسۋىرلەپ بېرىدۇ.

فۇنكسىيەنى ئانالىتىك ئىپادە، جەدۋەل ياكى گرافىك بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ، دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنىمۇ، ئانالىتىك ئىپادە، جەدۋەل ياكى دىئاگرامما بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ.



2.1.2 - رەسىم

2.1.2 - رەسمىدە، ئابىسېسسا تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ قىممىتىگە، ئوردىنات ئېھتىماللىقىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. رەسمىدىن كۆرەلەيمىزكى، X نىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسى $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ بولۇپ، ئۇنىڭ ھەربىر قىممەتنى ئېلىش ئېھتىماللىقى ئوخشاشلا $\frac{1}{6}$ بولىدۇ.

ئېھتىماللىقنىڭ خۇسۇسىيىتىگە ئاساسەن، دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى تۆۋەندىكىدەك خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز:

$$(1) p_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n;$$

$$(2) \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ئىپادىلىگەن ۋەقەنىڭ ئېھتىماللىقىنى تەقسىمات جەدۋىلى ۋە ئېھتىماللىقنىڭ خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاشقا بولىدۇ.

1 - مىسال. بىر باسما مىخ (قالپاقلىق مىخ) تاشلىنىدىغان تاسادىپىي تەجرىبىدە

$$X = \begin{cases} 1, & \text{ئۈچى يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈش} \\ 0, & \text{ئۈچى تۆۋەنگە قاراپ چۈشۈش} \end{cases}$$

دەپ ئېلىنغان. ئۈچى يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈشنىڭ ئېھتىماللىقى p بولسا، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى يازىلى.

يېشىش: تەقسىمات جەدۋىلىنىڭ خۇسۇسىيىتىگە ئاساسەن، ئۈچى تۆۋەنگە قاراپ چۈشۈشنىڭ ئېھتىماللىقى $(1-p)$ بولىدۇ. شۇڭا، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

3.2 - جەدۋەل

X	0	1
P	$1-p$	p

ئەگەر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى 3.2 - جەدۋەلدەك بولسا، ئۇ ھالدا X نى ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات (two-point distribution) قا بويسۇنىدۇ دەپ، $p = P(X=1)$ نى ئۇتۇق ئېھتىماللىقى دەپ ئاتايمىز.

ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات جەدۋىلى ناھايىتى كەڭ قوللىنىلىدۇ. مەسىلەن، ئېلىنغان لاتارىيە بېلىتىدىن مۇكاپات چىقىش - چىقماسلىقى؛ سېتىۋېلىنغان بىر مەھسۇلاتنىڭ سۈپەتلىك مەھسۇلات بولۇش - بولماسلىقى، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ جىنسى، تاشلانغان توپنىڭ گاراغا چۈشۈش - چۈشمەسلىكى دېگەندەك مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات جەدۋىلىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشقا بولىدۇ.

① ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات

سىمات 0-1 تەقسىماتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. مۇمكىن بولغان ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات بار تاسادىپىي تەجرىبە بېرنۇللى (Bernoulli) تەجرىبىسى دېيىلىدىغانلىقى. تەجرىبە بېرنۇللى تەقسىماتى، ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

2 - مىسال. تەركىبىدە 5 ناچار مەھسۇلات بار 100 مەھسۇلات ئىچىدىن 3 نى خالىغانچە ئالغاندا:

(1) ئېلىنغان ناچار مەھسۇلات سانى X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى تاپايلى؛

(2) كەم دېگەندە 1 ناچار مەھسۇلات ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى.

يېشىش: (1) 100 مەھسۇلات ئىچىدىن خالىغان 3 نى ئېلىشنىڭ نەتىجىلىرىنىڭ سانى C_{100}^3 ، مەھسۇلات ئىچىدىن خالىغان 3 نى ئالغاندا ئۇلارنىڭ ئىچىدە دەل k دانە ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ نەتىجىلىرىنىڭ سانى $C_5^k C_{95}^{3-k}$ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، 100 مەھسۇلات ئىچىدىن خالىغان 3 نى ئالغاندا ئۇلارنىڭ ئىچىدە دەل k دانە ناچار مەھسۇلات بولۇشنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$P(X=k) = \frac{C_5^k C_{95}^{3-k}}{C_{100}^3}, \quad k=0, 1, 2, 3.$$

شۇڭا، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى:

4.2 - جەدۋەل

X	0	1	2	3
P	$\frac{C_5^0 C_{95}^3}{C_{100}^3}$	$\frac{C_5^1 C_{95}^2}{C_{100}^3}$	$\frac{C_5^2 C_{95}^1}{C_{100}^3}$	$\frac{C_5^3 C_{95}^0}{C_{100}^3}$

(2) تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىگە ئاساسەن، كەم دېگەندە 1 ناچار مەھسۇلات ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) \\ &\approx 0.13806 + 0.00588 + 0.00006 \\ &= 0.14400. \end{aligned}$$

ئومۇمەن، تەركىبىدە M دانە ناچار مەھسۇلات بار N دانە مەھسۇلات ئىچىدىن n دانىسىنى ئالغاندا، ئۇلار ئىچىدە دەل X دانە ناچار مەھسۇلات بولسا، ئۇ ھالدا:

$$P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k=0, 1, 2, \dots, m.$$

5.2 - جەدۋەل

X	0	1	...	m
P	$\frac{C_M^0 C_{N-M}^{n-0}}{C_N^n}$	$\frac{C_M^1 C_{N-M}^{n-1}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$

بۇنىڭدىكى $m = \min\{M, n\}$ ھەمدە $n, M, N \in \mathbb{N}^*$, $M \leq N$, $n \leq N$.

ئەگەر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى 5.2 - جەدۋەلدىكىدەك بولسا، ئۇ ھالدا تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نى ھىپېر گېئومېترىيىلىك تەقسىماتقا بويسۇنىدۇ (hypergeometric distribution) دەيمىز.

3 - مىسال. مەلۇم يىللىقتىكى ئوقۇغۇچىلار كۆڭۈل ئېچىش يىغىنىدا بىر مۇكاپاتلىق ئويۇن لايىھىلىدى. بۇ ئويۇندا، بىر خالتىغا چوڭ - كىچىكلىكى پۈتۈنلەي ئوخشاش بولغان 10 قىزىل توپ ۋە 20 ئاق توپ سېلىنىپ، ھەر قېتىمدا خالتىدىن 5 توپ ئېلىنىدۇ، كەم دېگەندە 3 قىزىل توپ ئالالغانلار مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ. مۇكاپاتقا ئېرىشىش ئېھتىماللىقىنى تاپايلى.

يېشىش: ئېلىنغان قىزىل توپنىڭ سانىنى X دەپ پەرەز قىلساق، بۇ ھىپېر گېئومېترىيىلىك تەقسىماتقا بويسۇنىدۇ ھەمدە بۇنىڭدا $n=5$, $M=10$, $N=30$ بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، مۇكاپاتقا ئېرىشىش ئېھتىماللىقى:

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) \\ &= \frac{C_{10}^3 C_{20}^{5-3}}{C_{30}^5} + \frac{C_{10}^4 C_{20}^{5-4}}{C_{30}^5} + \frac{C_{10}^5 C_{20}^{5-5}}{C_{30}^5} \approx 0.191. \end{aligned}$$

مۇلاھىزە؟

ئەگەر بۇ ئۇيۇندا مۇكاپاتقا ئېرىشىش ئېھتىماللىقىنى 55% ئەتراپىدا كونترول قىلىشقا توغرا كەلسە، مۇكاپاتقا ئېرىشىش قائىدىسىنى قانداق لايىھىلەش كېرەك؟

مەشىق

1. ۋاسكېتبول مۇسابىقىسىدە، ھەر قېتىم جازا توپ تاشلىغاندا گارغا چۈشسە 1 نومۇر، چۈشمەسە 0 نومۇر بېرىلىدۇ. مەلۇم تەنھەرىكەتچىنىڭ جازا توپ تاشلىغاندىكى گارغا چۈشۈرۈش ئېھتىماللىقى 0.7 بولسا، ئۇنىڭ بىر قېتىم جازا توپ تاشلاپ نومۇرغا ئېرىشىشىنىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى تېپىڭ.
2. سۈپىتى تەكشى بىر مېتال پۇلى 2 قېتىم تاشلىغاندىكى ئوڭ چۈشۈش قېتىم سانى X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى تېپىڭ.
3. چوڭ - كىچىك شاھلىرى يوق 52 قارتا ئىچىدىن خالىغان 5 نى ئالغاندا كەم دېگەندە 3 كارول ئېلىشىنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.
4. ئىككى نۇقتىلىق تەقسىمات ۋە ھىپېر گېئومېتىرىيىلىك تەقسىماتقا بويىسۇنىدىغان تاسادىپىي ئۆزگەر - گۈچى مىقدارنىڭ ھەرقايسىسىدىن بىر مىسال كەلتۈرۈڭ.

1.2 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. تۆۋەندىكى ئىككى تاسادىپىي تەجرىبىنىڭ نەتىجىسىنى دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بىلەن ئىپادىلىگىلى بولامدۇ؟ ئەگەر ئىپادىلىگىلى بولسا، ھەرقايسى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارلارنىڭ ئېلىشى مۇمكىن بولغان قىممەتلىرىنى يېزىڭ ھەمدە بۇ قىممەتلەر ئىپادىلىگەن تاسادىپىي ۋەقە نەتىجىسىنى چۈشەندۈرۈڭ:
 - (1) مەكتەپتىن ئۆيگە قايتىشتا قىزىل - يېشىل چىراغلىق 5 كوچا ئېغىزىدىن ئۆتۈشكە توغرا كەلسە، قىزىل چىراغقا دۇچ كېلىشىنىڭ مۇمكىن بولغان قېتىم سانى؛
 - (2) مەلۇم ئوقۇغۇچىنىڭ ئەلا، ياخشى، ئوتتۇرا ھال، ئۆتۈش، ئۆتەلمەسلىك دەپ 5 دەرىجىگە ئايرىلغان بىر قېتىملىق سىناققا ئېرىشىشى مۇمكىن بولغان نەتىجىسى.
2. بىر تۈرلۈك بەدەن ئىقتىدارى سىنىقىدا، 1 km ئارىلىقنى 4 min ئىچىدە يۈگۈرۈپ بولۇش ئەلا نەتىجە دەپ بېكىتىلدى. بىر ئوقۇغۇچىنىڭ 1 km غا يۈگۈرۈش ئۈچۈن سەرپ قىلغان ۋاقتى X دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولامدۇ؟ ئەگەر بىز بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ ئەلا نەتىجىگە ئېرىشىش - ئېرىشەلمەسلىكىگىلا كۆ - ئۆل بۆلسەك، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنى قانداق ئېنىقلاش كېرەك؟
3. بىر تاسادىپىي تەجرىبىدە ئېنىقلانغان ھەرقانداق بىر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار مۇشۇ تاسادىپىي تەجرىبىدە كۆرۈلۈش مۇمكىن بولغان بارلىق تاسادىپىي ۋەقەلەرنى تەسۋىرلەپ بېرەلەمدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

4. مەلۇم ئوقۇغۇچى بىر دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ تۆۋەندىكى تەقسىمات جەدۋىلىنى تېپىپ چىققان:

X	0	1	2	3
P	0.2	0.3	0.15	0.45

ئۇنىڭ ھېسابلاش نەتىجىسىنىڭ توغرا بولغان - بولمىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ.
5. بىر مەزگەلنىڭ قارىغا ئېتىپ ئېرىشكەن ھالقا سانى X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى تۆۋەندە بېرىلدى:

X	4	5	6	7	8	9	10
P	0.02	0.04	0.06	0.09	0.28	0.29	0.22

ئەگەر 8 ~ 10 ھالقىلارغا تەگكۈزۈش ئەلا نەتىجە ھېسابلىنسا، ئۇنىڭ بىر قېتىم قارىغا ئېتىپ ئەلا نەتىجىگە ئېرىشىش ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟

6. مەكتەپ 30 نامزات ئىچىدىن 10 نى تاللاپ ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسى تەشكىللىمەكچى، بۇلارنىڭ ئىچىدە مەلۇم سىنىپتىن 4 نامزات بار. ئەگەر ھەر بىر نامزاتنىڭ سايلىنىش پۇرسىتى ئوخشاش بولسا، بۇ سىنىپتىن 2 نامزات سايلىنىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.

B گۇرۇپپا

1. ئوقۇتقۇچى 10 پارچە دەرس تېكىستىدىن 3 نى تاسادىپىي تاللاپ يادلاشقۇزۇش سىنىقى ئېلىپ بارماقچى، بەلگىلىمە بويىچە، 3 تېكىست ئىچىدىن 2 سىنى يادلىغانلار سىناقىتىن ئۆتكەن بولىدۇ. بىر ئوقۇغۇچى بۇ 10 پارچە تېكىستنىڭ 6 سىنى يادلىيالىسا:

(1) ئۇ يادلىيالايدىغان تېكىستلىرىنىڭ تاللىنىش سانىنىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى تېپىڭ:

(2) ئۇنىڭ سىناقىتىن ئۆتۈش ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.

2. مەلۇم خىل لاتارىيە بېلىتىنىڭ مۇكاپات نومۇرى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000، 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007، 1008، 1009، 1010، 1011، 1012، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1020، 1021، 1022، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 1029، 1030، 1031، 1032، 1033، 1034، 1035، 1036، 1037، 1038، 1039، 1040، 1041، 1042، 1043، 1044، 1045، 1046، 1047، 1048، 1049، 1050، 1051، 1052، 1053، 1054، 1055، 1056، 1057، 1058، 1059، 1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068، 1069، 1070، 1071، 1072، 1073، 1074، 1075، 1076، 1077، 1078، 1079، 1080، 1081، 1082، 1083، 1084، 1085، 1086، 1087، 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096، 1097، 1098، 1099، 1100، 1101، 1102، 1103، 1104، 1105، 1106، 1107، 1108، 1109، 1110، 1111، 1112، 1113، 1114، 1115، 1116، 1117، 1118، 1119، 1120، 1121، 1122، 1123، 1124، 1125، 1126، 1127، 1128، 1129، 1130، 1131، 1132، 1133، 1134، 1135، 1136، 1137، 1138، 1139، 1140، 1141، 1142، 1143، 1144، 1145، 1146، 1147، 1148، 1149، 1150، 1151، 1152، 1153، 1154، 1155، 1156، 1157، 1158، 1159، 1160، 1161، 1162، 1163، 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1169، 1170، 1171، 1172، 1173، 1174، 1175، 1176، 1177، 1178، 1179، 1180، 1181، 1182، 1183، 1184، 1185، 1186، 1187، 1188، 1189، 1190، 1191، 1192، 1193، 1194، 1195، 1196، 1197، 1198، 1199، 1200، 1201، 1202، 1203، 1204، 1205، 1206، 1207، 1208، 1209، 1210، 1211، 1212، 1213، 1214، 1215، 1216، 1217، 1218، 1219، 1220، 1221، 1222، 1223، 1224، 1225، 1226، 1227، 1228، 1229، 1230، 1231، 1232، 1233، 1234، 1235، 1236، 1237، 1238، 1239، 1240، 1241، 1242، 1243، 1244، 1245، 1246، 1247، 1248، 1249، 1250، 1251، 1252، 1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263، 1264، 1265، 1266، 1267، 1268، 1269، 1270، 1271، 1272، 1273، 1274، 1275، 1276، 1277، 1278، 1279، 1280، 1281، 1282، 1283، 1284، 1285، 1286، 1287، 1288، 1289، 1290، 1291، 1292، 1293، 1294، 1295، 1296، 1297، 1298، 1299، 1300، 1301، 1302، 1303، 1304، 1305، 1306، 1307، 1308، 1309، 1310، 1311، 1312، 1313، 1314، 1315، 1316، 1317، 1318، 1319، 1320، 1321، 1322، 1323، 1324، 1325، 1326، 1327، 1328، 1329، 1330، 1331، 1332، 1333، 1334، 1335، 1336، 1337، 1338، 1339، 1340، 1341، 1342، 1343، 1344، 1345، 1346، 1347، 1348، 1349، 1350، 1351، 1352، 1353، 1354، 1355، 1356، 1357، 1358، 1359، 1360، 1361، 1362، 1363، 1364، 1365، 1366، 1367، 1368، 1369، 1370، 1371، 1372، 1373، 1374، 1375، 1376، 1377، 1378، 1379، 1380، 1381، 1382، 1383، 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389، 1390، 1391، 1392، 1393، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398، 1399، 1400، 1401، 1402، 1403، 1404، 1405، 1406، 1407، 1408، 1409، 1410، 1411، 1412، 1413، 1414، 1415، 1416، 1417، 1418، 1419، 1420، 1421، 1422، 1423، 1424، 1425، 1426، 1427، 1428، 1429، 1430، 1431، 1432، 1433، 1434، 1435، 1436، 1437، 1438، 1439، 1440، 1441، 1442، 1443، 1444، 1445، 1446، 1447، 1448، 1449، 1450، 1451، 1452، 1453، 1454، 1455، 1456، 1457، 1458، 1459، 1460، 1461، 1462، 1463، 1464، 1465، 1466، 1467، 1468، 1469، 1470، 1471، 1472، 1473، 1474، 1475، 1476، 1477، 1478، 1479، 1480، 1481، 1482، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1488، 1489، 1490، 1491، 1492، 1493، 1494، 1495، 1496، 1497، 1498، 1499، 1500، 1501، 1502، 1503، 1504، 1505، 1506، 1507، 1508، 1509، 1510، 1511، 1512، 1513، 1514، 1515، 1516، 1517، 1518، 1519، 1520، 1521، 1522، 1523، 1524، 1525، 1526، 1527، 1528، 1529، 1530، 1531، 1532، 1533، 1534، 1535، 1536، 1537، 1538، 1539، 1540، 1541، 1542، 1543، 1544، 1545، 1546، 1547، 1548، 1549، 1550، 1551، 1552، 1553، 1554، 1555، 1556، 1557، 1558، 1559، 1560، 1561، 1562، 1563، 1564، 1565، 1566، 1567، 1568، 1569، 1570، 1571، 1572، 1573، 1574، 1575، 1576، 1577، 1578، 1579، 1580، 1581، 1582، 1583، 1584، 1585، 1586، 1587، 1588، 1589، 1590، 1591، 1592، 1593، 1594، 1595، 1596، 1597، 1598، 1599، 1600، 1601، 1602، 1603، 1604، 1605، 1606، 1607، 1608، 1609، 1610، 1611، 1612، 1613، 1614، 1615، 1616، 1617، 1618، 1619، 1620، 1621، 1622، 1623، 1624، 1625، 1626، 1627، 1628، 1629، 1630، 1631، 1632، 1633، 1634، 1635، 1636، 1637، 1638، 1639، 1640، 1641، 1642، 1643، 1644، 1645، 1646، 1647، 1648، 1649، 1650، 1651، 1652، 1653، 1654، 1655، 1656، 1657، 1658، 1659، 1660، 1661، 1662، 1663، 1664، 1665، 1666، 1667، 1668، 1669، 1670، 1671، 1672، 1673، 1674، 1675، 1676، 1677، 1678، 1679، 1680، 1681، 1682، 1683، 1684، 1685، 1686، 1687، 1688، 1689، 1690، 1691، 1692، 1693، 1694، 1695، 1696، 1697، 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 1706، 1707، 1708، 1709، 1710، 1711، 1712، 1713، 1714، 1715، 1716، 1717، 1718، 1719، 1720، 1721، 1722، 1723، 1724، 1725، 1726، 1727، 1728، 1729، 1730، 1731، 1732، 1733، 1734، 1735، 1736، 1737، 1738، 1739، 1740، 1741، 1742، 1743، 1744، 1745، 1746، 1747، 1748، 1749، 1750، 1751، 1752، 1753، 1754، 1755، 1756، 1757، 1758، 1759، 1760، 1761، 1762، 1763، 1764، 1765، 1766، 1767، 1768، 1769، 1770، 1771، 1772، 1773، 1774، 1775، 1776، 1777، 1778، 1779، 1780، 1781، 1782، 1783، 1784، 1785، 1786، 1787، 1788، 1789، 1790، 1791، 1792، 1793، 1794، 1795، 1796، 1797، 1798، 1799، 1800، 1801، 1802، 1803، 1804، 1805، 1806، 1807، 1808، 1809، 1810، 1811، 1812، 1813، 1814، 1815، 1816، 1817، 1818، 1819، 1820، 1821، 1822، 1823، 1824، 1825، 1826، 1827، 1828، 1829، 1830، 1831، 1832، 1833، 1834، 1835، 1836، 1837، 1838، 1839، 1840، 1841، 1842، 1843، 1844، 1845، 1846، 1847، 1848، 1849، 1850، 1851، 1852، 1853، 1854، 1855، 1856، 1857، 1858، 1859، 1860، 1861، 1862، 1863، 1864، 1865، 1866، 1867، 1868، 1869، 1870، 1871، 1872، 1873، 1874، 1875، 1876، 1877، 1878، 1879، 1880، 1881، 1882، 1883، 1884، 1885، 1886، 1887، 1888، 1889، 1890، 1891، 1892، 1893، 1894، 1895، 1896، 1897، 1898، 1899، 1900، 1901، 1902، 1903، 1904، 1905، 1906، 1907، 1908، 1909، 1910، 1911، 1912، 1913، 1914، 1915، 1916، 1917، 1918، 1919، 1920، 1921، 1922، 1923، 1924، 1925، 1926، 1927، 1928، 1929، 1930، 1931، 1932، 1933، 1934، 1935، 1936، 1937، 1938، 1939، 1940، 1941، 1942، 1943، 1944، 1945، 1946، 1947، 1948، 1949، 1950، 1951، 1952، 1953، 1954، 1955، 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1966، 1967، 1968، 1969، 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 1981، 1982، 1983، 1984، 1985، 1986، 1987، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992، 1993، 1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018



CHAPTER 2

2-2

ئىككى ئەزالىق تەقسىماتى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى

شەرتلىك ئېھتىماللىق

1-2-2

ئىزدىنىش



ئۈچ لاتارىيە بېلىتى ئىچىدە مۇكاپات چىقىدىغان بىرلا بېلەت بار. ئەگەر ئۈچ ئۈچ قۇغۇچى بۇ بېلەتلەرنى ئايرىم - ئايرىم قايتۇرماي ئالسا، ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئېلىش ئېھتىماللىقى ئالدىدىكى ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭكىدىن كىچىكمۇ؟

ئۈچ لاتارىيە بېلىتىنى ئايرىم - ئايرىم X_1, X_2, Y ئارقىلىق ئىپادىلەيمىز، بۇنىڭ ئىچىدە Y بىلەن مۇكاپات چىقىدىغان ئاشۇ بېلەتنى ئېلىشنى ئىپادىلەسەك، ئۈچ ئوقۇغۇچىنىڭ بېلەت ئېلىش نەتىجىسىدە جەمئىي ئالتە خىل مۇمكىنچىلىك بار: $YX_1X_2, X_2YX_1, X_2X_1Y, X_1YX_2, X_1X_2Y$ ۋە YX_2X_1 . «ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەت ئېلىشى» دېگەن ۋەقەنى B بىلەن ئىپادىلەسەك، ئۇ ھالدا B ئىككى ئاساسىي ۋەقە X_2X_1Y, X_1X_2Y نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئېھتىماللىقنى كلاسسىك ئېھتىماللىق مودېلىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاش فورمۇلىسىغا ئاساسەن بىلەلەيمىزكى، ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئېلىش ئېھتىماللىقى:

$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

مۇلاھىزە؟

ئەگەر بىرىنچى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئالالمىغانلىقى مەلۇم بولسا، ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئېلىش ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟

بىرىنچى ئوقۇغۇچى مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئالالمىغانلىقى ئۈچۈن، كۆرۈلۈشى مۇمكىن بولغان ئاساسىي ۋەقەلەردىن $X_1YX_2, X_2X_1Y, X_1YX_2, X_1X_2Y$ ۋە X_1YX_1 لار قاليدۇ ھەمدە «ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەت ئېلىشى» ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاساسىي ۋەقە يەنىلا X_1X_2Y ۋە X_2X_1Y بولىدۇ.

ئېھتىماللىقنى كلاسسىك ئېھتىماللىق مودېلىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاش فورمۇلىسىغا ئاساسەن، ئاخىرقى بىر ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئېلىش ئېھتىماللىقى $\frac{2}{4}$ يەنى $\frac{1}{2}$ بولىدىغانلىقىنى بىلە. لەيىمىز. ئەگەر A «بىرىنچى ئوقۇغۇچى مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئالالمىدى» دېگەن ۋەقەنى ئىپادىلەسە، ئۇ ھالدا «بىرىنچى ئوقۇغۇچى مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئالالمىدى» دېگەن بېرىلگەن شەرت ئاستىدا، «ئاخىرقى بىر ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئېلىشى» نىڭ ئېھتىماللىقى $P(B|A)$ بولىدۇ. بىرىنچى ئوقۇغۇچىنىڭ بېلەت ئېلىش نەتىجىسىنىڭ مەلۇم بولغانلىقى نېمە ئۈچۈن ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئېلىش ئېھتىماللىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ بۇ مەسىلىدە، بىرىنچى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بېلەتنى ئالالمىغانلىقىنى بىلىۋالغانلىق Λ ۋەقەنىڭ چوقۇم يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلىۋالغانلىق بىلەن تەڭ كۈچلۈك بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن، كۆرۈ-لۈشى مۇمكىن بولغان ئاساسىي ۋەقە مۇقەررەر ۋەقە A غا ئايلىنىپ قالىدۇ، بۇ، B ۋەقەنىڭ يۈز بېرىش ئېھتىماللىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ - دە، نەتىجىدە $P(B|A) \neq P(B)$ بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

$P(B|A)$ بىلەن يۇقىرىدىكى A ۋەقە، B ۋەقەلەرنىڭ ئېھتىماللىقى ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

ئۈچ ئوقۇغۇچىنىڭ مۇمكىن بولغان ئېلىش نەتىجىلىرىنىڭ بارلىقىنى Ω بىلەن ئىپادىلەسەك، ئۇ ھالدا $\Omega = \{X_1X_2Y, X_1YX_2, X_2X_1Y, X_2YX_1, YX_1X_2, YX_2X_1\}$ ئالتە ئاساسىي ۋەقەدىن تەركىب تاپقان بولىدۇ، يەنى $\Omega = \{X_1X_2Y, X_1YX_2, X_2X_1Y, X_2YX_1, YX_1X_2, YX_2X_1\}$. A ۋەقەنىڭ مۇقەررەر ھالدا يۈز بېرىدىغانلىقى مەلۇم بولغانلىقتىن، بىز مەسىلىنى پەقەت $A = \{X_1X_2Y, X_1YX_2, X_2X_1Y, X_2YX_1\}$ نىڭ دائىرىسى ئىچىدە ئويلاشساقلا بولىدۇ، يەنى بۇ يەردە پەقەت تۆتلا ئاساسىي ۋەقە $X_1X_2Y, X_1YX_2, X_2X_1Y, X_2YX_1$ بار. A ۋەقە يۈز بەرگەن ئەھۋال ئاستىدا، B ۋەقە نىڭ يۈز بېرىشى A ۋەقە، B ۋەقەلەرنىڭ تەڭلا يۈز بېرىشى بىلەن، يەنى AB نىڭ يۈز بېرىشى بىلەن تەڭ كۈچلۈك بولىدۇ. ھالبۇكى، AB ۋەقە ئىككى ئاساسىي ۋەقە X_2X_1Y, X_1X_2Y نى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى-تىن، تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$P(B|A) = \frac{2}{4} = \frac{n(AB)}{n(A)},$$

بۇنىڭدىكى $n(A)$ بىلەن $n(AB)$ ئايرىم - ئايرىم A ۋەقە بىلەن AB ۋەقە ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاساسىي ۋەقەلەرنىڭ سانىنى ئىپادىلەيدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن، ئېھتىماللىقنى كلاسسىك ئېھتىماللىق مودېلىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاش فورمۇلىسىغا ئاساسلانسا:

$$P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)}, \quad P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)},$$

بۇنىڭدىكى $n(\Omega)$ دېگەنمىز Ω ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاساسىي ۋەقەلەرنىڭ سانىنى ئىپادىلەيدۇ. شۇڭا:

$$P(B|A) = \frac{n(AB)}{n(A)} = \frac{\frac{n(AB)}{n(\Omega)}}{\frac{n(A)}{n(\Omega)}} = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن $P(B|A)$ نى A ۋەقە بىلەن AB ۋەقەنىڭ ئېھتىماللىقلىرى ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ. ئومۇمەن، A, B نى ئىككى ۋەقە ھەمدە $P(A) > 0$ دەپ پەرەز قىلىپ،

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

نى A ۋەقە يۈز بەرگەن شەرت ئاستىدىكى B ۋەقەنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ شەرتلىك ئېھتىماللىقى (conditional probability) دەپ ئاتايمىز، بۇ يەردىكى $P(B|A)$ نى A يۈز بەرگەن شەرت ئاستىدا B نىڭ يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى دەپ ئوقۇيمىز.

شەرتلىك ئېھتىماللىقمۇ ئېھتىماللىقنىڭ خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولۇپ، ھەر قانداق ۋەقەنىڭ شەرتلىك ئېھتىماللىقى 0 بىلەن 1 نىڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ، يەنى

$$0 \leq P(B|A) \leq 1.$$

B بىلەن C سىغىشالمايدىغان ۋەقەلەر بولسا، ئۇ ھالدا:

$$P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A).$$

1 - مىسال. 5 ئىمتىھان سوئالى ئىچىدە 3 تەبىئىي پەن سوئالى، 2 ئىجتىمائىي پەن سوئالى بار. بۇلار ئىچىدىن 2 سوئالنى تەرتىپ بويىچە قايتۇرماي ئالغاندا:

(1) 1 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى؛
(2) 1 - قېتىم بىلەن 2 - قېتىمنىڭ ھەر ئىككىسىدە تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى.

(3) 1 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىنغان شەرت ئاستىدا، 2 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى.

يېشىش: 1 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىشنى A ۋەقە، 2 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىشنى B ۋەقە دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا 1 - ۋە 2 - قېتىمنىڭ ھەر ئىككىسىدە تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىش AB ۋەقە بولىدۇ.

(1) 5 سوئال ئىچىدىن 2 سوئالنى تەرتىپ بويىچە قايتۇرماي ئېلىش ئۆز ئىچىگە ئالغان ۋەقە سانى:

$$n(\Omega) = A_5^2 = 20.$$

باسقۇچ بويىچە كۆپەيتىپ ساناش پرىنسىپىغا ئاساسەن، $n(A) = A_3^1 \times A_4^1 = 12$ بولىدۇ، شۇڭا:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}.$$

(2) چۈنكى $n(AB) = A_3^2 = 6$ ، شۇڭا:

$$P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

(3) 1 - خىل يېشىش ئۇسۇلى (1)، (2) لەردىن بىلەلەيمىزكى، 1 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى

ئېلىنغان شەرت ئاستىدا، 2 - قېتىمدا تەبىئىي پەن سوئالى ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{2}.$$

2 - خىل يېشىش ئۇسۇلى چۈنكى $n(A) = 12$ ، $n(AB) = 6$

شۇڭا:

$$P(B|A) = \frac{n(AB)}{n(A)} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

ئەمەلىي قوللىنىشلاردا،

2 - خىل يېشىش ئۇسۇلى

شەرتلىك ئېھتىماللىقنى

تېپىشتىكى بىر خىل مۇ-

ھىم ئۇسۇل ھېسابلىنىدۇ.



2 - مىسال. بىر ئامانەت كارتىسىنىڭ شىفرى 6 رەقەمدىن تەركىب تاپىدۇ ھەمدە ھەر بىر خانىدىكى رەقەم 0 ~ 9 غىچە رەقەملەر ئىچىدە. دىن خالىغانچە تاللىۋېلىنىدۇ. بىر ئادەم بانكىنىڭ ئاپتوماتىك پۇل ئېلىش ماشىنىسىدىن پۇل ئالغان چېغىدا شىفرىنىڭ ئاخىرقى خانىسىدىكى بىر رەقەمنى ئېسىگە ئالالمىغان.

(1) ئاخىرقى خانىدىكى رەقەمنى خالىغانچە باسقاندا، 2 قېتىمدىن ئاشۇرمايلا توغرا بېسىپ چىقىرىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى؛

(2) بۇ ئادەم ئاخىرقى خانىدىكى رەقەمنىڭ جۈپ سان ئىكەنلىكىنى ئېسىگە ئالغان ئەھۋالدا، 2 - قېتىمدىن ئاشۇرمايلا توغرا بېسىپ چىقىرىشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى.

يېشىش: ئاخىرقى خانىدىكى رەقەمنىڭ i - نىچى قېتىمدا بېسىپ چىقىرىلىشىنى A_i ۋەقە ($i=1, 2$) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $A = A_1 \cup (\bar{A}_1 A_2)$ دېگەنمىز 2 قېتىمدىن ئاشۇرمايلا توغرا بېسىپ چىقىرىشنى ئىپادىلەيدۇ.

(1) A_1 بىلەن $\bar{A}_1 A_2$ سىغىشالمايدىغان ۋەقەلەر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئېھتىماللىقنىڭ قوشۇش فورمۇلىسىغا ئاساسەن:

$$P(A) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) = \frac{1}{10} + \frac{9 \times 1}{10 \times 9} = \frac{1}{5}.$$

(2) ئاخىرقى خانىسىدا جۈپ سان بېسىشنى B ۋەقە دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا:

$$P(A|B) = P(A_1|B) + P(\bar{A}_1 A_2|B) = \frac{1}{5} + \frac{4 \times 1}{5 \times 4} = \frac{2}{5}.$$

مەشىق

1. چوڭ - كىچىك شاھلىرى يوق 52 قارتا ئىچىدىن ھەر قېتىمدا 1 دىن قارتا ئېلىپ قايتۇرماي 2 قېتىم ئېلىشتا، 1 - قېتىمدا كارول ئېلىنغانلىقى مەلۇم بولسا، 2 - قېتىمدا كارول ئېلىنغانلىقى ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.

2. 100 مەھسۇلات ئىچىدە 5 ناچار مەھسۇلات بار. بۇ 100 مەھسۇلات ئىچىدىن ھەر قېتىمدا 1 نى ئېلىپ قاي-تۇرماي 2 قېتىم ئېلىشتا، 1 - قېتىمدا ناچار مەھسۇلات ئېلىنغانلىقى مەلۇم بولسا، 2 - قېتىمدا سۈپەتلىك مەھسۇلات ئېلىنغانلىقى ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.

3. شەرتلىك ئېھتىماللىققا دائىر ئىككى ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈڭ.

2-2-2 ۋەقەلەرنىڭ ئۆزئارا مۇستەقىللىقى

مۇلاھىزە؟

ئۈچ لاتارىيە بېلىتى ئىچىدە مۇكاپات چىقىدىغان بىرلا بېلەت بار بولۇپ، ئۈچ ئوقۇغۇچى بۇ بېلەتلەر-
نى ئايرىم - ئايرىم 1 دىن ئالدى ھەم ئېلىپ بولۇپلا يەنە ئۆز جايىغا قايتۇرىدۇ. «1 - ئوقۇغۇچىنىڭ
مۇكاپات چىقىدىغان بېلەت ئالغانلىقى» نى A ۋەقە، «ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇكاپات چىقىدىغان بې-
لەت ئالغانلىقى» نى B ۋەقە دەپ ئالسا، A ۋەقەنىڭ يۈز بەرگەنلىكى B ۋەقەنىڭ يۈز بېرىشى ئېھتىماللى-
قىغا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ؟

روشنەنكى، لاتارىيە بېلەتلىرى ئېلىنغاندىن كېيىن يەنە ئورنىغا قايتۇرۇلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئاخىرقى
بىر ئوقۇغۇچىمۇ ئاشۇ ئۈچ بېلەت ئىچىدىن بىرىنى ئالىدۇ، شۇڭا 1 - ئوقۇغۇچىنىڭ ئېلىش نەتىجىسى
ئاخىرقى ئوقۇغۇچىنىڭ ئېلىش نەتىجىسىگە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ، يەنى A ۋەقەنىڭ يۈز بەرگەنلىكى B ۋەقە-
نىڭ يۈز بېرىشى ئېھتىماللىقىغا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. شۇڭا:

$$P(B|A) = P(B),$$

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B).$$

ئىككى ۋەقەنى A ، B دەپ پەرەز قىلايلى. ئەگەر

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

بولسا، ئۇ ھالدا A ۋەقە بىلەن B ۋەقەنى ئۆزئارا مۇستەقىل (mutually independent) دەپ ئاتايمىز.
ئىسپاتلاشقا بولىدۇكى، ئەگەر A بىلەن B ئۆزئارا مۇستەقىل بولسا، ئۇ ھالدا A بىلەن $\bar{B}$ ، $\bar{A}$ بىلەن
 B ، $\bar{A}$ بىلەن $\bar{B}$ مۇ ئۆزئارا مۇستەقىل بولىدۇ.

3 - مىسال. مەلۇم سودا سارىيى ئىككى قېتىم تەلەي سىناش پائالىيىتىنى يولغا قويدى. بۇنىڭدا،
بەلگىلىك قىممەتتىكى تاۋارنى سېتىۋالغاندىن كېيىن بىر لاتارىيە بېلىتىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ، بېلەت-
تە بىر نەقلەشتۈرۈش نومۇرى بار، بۇ نومۇر بىلەن بېلەت تارتىش شەكلى ئوخشاش بولغان ئىككى قې-
تىملىق نەقلەشتۈرۈش پائالىيىتىگە ئايرىم - ئايرىم قاتناشقىلى بولىدۇ. ئەگەر ئىككى قېتىملىق نەق-
لەشتۈرۈش پائالىيىتىدىكى مۇكاپات چىقىش ئېھتىماللىقى ئوخشاشلا 0.05 بولسا، ئىككى قېتىملىق
بېلەت تارتىشتا تۆۋەندىكى ۋەقەلەرنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى:

(1) ھەر ئىككى قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش؛

(2) دەل بىر قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش؛

(3) كەم دېگەندە بىر قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش.

يېشىش: (1) «1 - قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش» نى A ۋەقە، «2 -

قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش» نى B ۋەقە دەپ ئالسا، ئۇ ھالدا «ھەر

ئىككى قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش» دېگەنلىك AB ۋەقە بولىدۇ. ئىك-
كى قېتىملىق بېلەت تارتىش نەتىجىلىرى بىر - بىرىگە تەسىر كۆرسەتمەيدىغانلىقى ئۈچۈن، A بىلەن B

ئۆزئارا مۇستەقىل بولىدۇ، ئۆزئارا مۇستەقىل ۋەقەلەرنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن، ھەر ئىككى قېتىمدا مەلۇم كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىشنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.05 \times 0.05 = 0.0025.$$

(2) «دەل بىر قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش» نى $(AB) \cup (\bar{A}B)$ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. AB ، $\bar{A}B$ ۋەقەلەر سىغىشالمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئېھتىماللىقنىڭ قوشۇش فورمۇلىسى ۋە ئۆزئارا مۇستەقىل ۋەقەلەرنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن، تاپماقچى بولغان ئېھتىماللىق:

$$\begin{aligned} P(AB) + P(\bar{A}B) &= P(A)P(B) + P(\bar{A})P(B) \\ &= 0.05 \times (1 - 0.05) + (1 - 0.05) \times 0.05 \\ &= 0.095. \end{aligned}$$

(3) «كەم دېگەندە بىر قېتىمدا مەلۇم بىر كۆرسىتىلگەن نومۇرنى تارتىپ چىقىرىش» نى $(AB) \cup (\bar{A}B) \cup (A\bar{B})$ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. AB ، $\bar{A}B$ ، $A\bar{B}$ ۋەقەلەر ئىككى - ئىككىدىن سىغىشالمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئېھتىماللىقنىڭ قوشۇش فورمۇلىسى ۋە ئۆزئارا مۇستەقىل ۋەقەلەرنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن، تاپماقچى بولغان ئېھتىماللىق:

$$P(AB) + P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = 0.0025 + 0.095 = 0.0975.$$

مۇلاھىزە؟

ئىككى قېتىملىق تەلەي سىناشتا كەم دېگەندە بىر قېتىم مۇكاپاتقا ئېرىشىشنىڭ ئېھتىماللىقى بىر قېتىملىق تەلەي سىناشتا مۇكاپاتقا ئېرىشىش ئېھتىماللىقىنىڭ 2 ھەسسىسىگە تەڭ بولامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

مەشىق

1. سۈپىتى تەكشى ئىككى مېتال پۇلنى ئايرىم - ئايرىم تاشلىغاندا، «1 نىچىسى ئوڭ چۈشۈش» نى A ۋەقە، «2 نىچىسى ئوڭ چۈشۈش» نى B ۋەقە، «2 سىنىڭ چۈشۈش نەتىجىسى ئوخشاش» نى C ۋەقە دەپ ئالساق، A ، B ، C لارنىڭ قايسى ئىككىسى ئۆزئارا مۇستەقىل؟
2. خالتا ئىچىدە 2 ئاق توپ ۋە 2 قارا توپ بار.

(1) ئاۋۋال 1 ئاق توپ ئېلىنىپ خالتىغا قايتۇرۇلمىغان بولسا، يەنە بىر ئاق توپ ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقى قانچە؟

(2) ئاۋۋال بىر ئاق توپ ئېلىنىپ خالتىغا قايتۇرۇلغان بولسا، يەنە بىر ئاق توپ ئېلىشنىڭ ئېھتىماللىقى قانچە؟

3. ھاۋا رايىدىن ئالدىن بېرىلگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، يېڭى يىل بايرىمى مەزگىلىدە A جايدا يامغۇر يېغىش ئېھتىماللىقى 0.2، B جايدا يامغۇر يېغىش ئېھتىماللىقى 0.3 ئىكەن. بۇ مەزگىلدە A ، B ئىككى جايدا يامغۇر يېغىش - ياغماسلىقى ئۆزئارا تەسىر كۆرسەتمەسە:

(1) A ، B نىڭ ھەر ئىككىسىدە يامغۇر يېغىش ئېھتىماللىقىنى ھېسابلاڭ؛

(2) A ، B نىڭ ھەر ئىككىسىدە يامغۇر ياغماسلىق ئېھتىماللىقىنى ھېسابلاڭ؛

(3) كەم دېگەندە A ، B ئىككى جاينىڭ بىرىدە يامغۇر يېغىش ئېھتىماللىقىنى ھېسابلاڭ.

4. A بىلەن B ئۆزئارا مۇستەقىل ۋەقەلەر بولسا، A بىلەن $\bar{A}$ بىلەن B بىلەن $\bar{B}$ نىڭمۇ ئۆزئارا مۇستەقىل ۋەقەلەر بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

5. ئۆزئارا مۇستەقىل ۋەقەلەرگە دائىر 2 ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈڭ.

3-2-2

مۇستەقىل تەكرار تەجرىبە ۋە ئىككى ئەزالىق تەقسىماتى

تاسادىپىي ھادىسىلەرنى تەتقىق قىلغاندا، كۆپ ھاللاردا ئوخشاش شەرت ئاستىدا نۇرغۇن تەجرىبىلەرنى تەكرار ئىشلەپ قانۇنىيەتنى بايقاشقا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، مېتال پۇل تاشلاش نەتىجىسىنىڭ قانۇنىيەتنى تەتقىق قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن مېتال پۇل تاشلاش تەجرىبىلىرىنى ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ. روشەنكى، مېتال پۇلنى n قېتىم تەكرار تاشلاش جەريانىدا، ھەر قېتىمقى مېتال پۇل تاشلاش تەجرىبىسىنىڭ نەتىجىسى قالغان مېتال پۇل تاشلاش تەجرىبىلىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدۇ. يەنى

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n). \quad (1)$$

بۇنىڭدىكى A_i ($i=1, 2, \dots, n$) بولسا i نىچى قېتىمقى تەجرىبىنىڭ نەتىجىسى.

ئومۇمەن، ئوخشاش شەرت ئاستىدا n قېتىم تەكرار ئىشلەنگەن تەجرىبە n قېتىملىق مۇستەقىل تەكرار تەجرىبە (independent and repeated trials) دەپ ئاتىلىدۇ.

n قېتىملىق مۇستەقىل تەجرىبىدە، «ئوخشاش شەرت ئاستىدا» دېگەنلىك ھەرقايسى قېتىملىق تەجرىبە نەتىجىلىرىنىڭ باشقا تەجرىبىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدىغانلىقى بىلەن، يەنى (1) ئىپادىنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇشى بىلەن تەڭ كۈچلۈك بولىدۇ.

ئىزدىنىش



بىر باسما مىخنى تاشلاشتا، مىخ ئۇچىنىڭ يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈش ئېھتىماللىقى

نى p دېسەك، مىخ ئۇچىنىڭ تۆۋەنگە قاراپ چۈشۈش ئېھتىماللىقى $q=1-p$ بولىدۇ.

دۇ. بىر باسما مىخنى ئۇدا 3 قېتىم تاشلىغاندا، مىخ ئۇچىنىڭ پەقەت 1 قېتىملا يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈشىنىڭ ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟

بىر باسما مىخنى ئۇدا 3 قېتىم تاشلاش دېگەنلىك 3 قېتىم مۇستەقىل تەكرار تەجرىبە ئىشلەش دېگەنلىكتۇر. i نىچى قېتىم تاشلىغاندا مىخ ئۇچى يۇقىرىغا قاراپ چۈشىدۇ» دېگەن ۋەقەنى A_i ($i=1, 2, 3$) بىلەن، «مىخ ئۇچى پەقەت 1 قېتىملا يۇقىرىغا قاراپ چۈشىدۇ» دېگەن ۋەقەنى B_1 بىلەن ئىپادىلىسەك، ئۇ ھالدا:

$$B_1 = (A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \cup (\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) \cup (\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3).$$

ۋەقەلەر ئۆز ئارا سىغىشالمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئېھتىماللىقنىڭ قوشۇش فورمۇلىسىغا ئاساسەن:

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= q^2 p + q^2 p + q^2 p = 3q^2 p. \end{aligned}$$

شۇڭا، باسما مىخنى ئۇدا 3 قېتىم تاشلىغاندا، مىخ ئۇچىنىڭ پەقەت 1 قېتىملا يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈش ئېھتىماللىقى $3q^2 p$.

مۇلاھىزە؟

يۇقىرىدا بىز باسما مىخنى 1 قېتىم تاشلىغاندا، مىخ ئۇچىنىڭ يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈش ئېھتىماللىقىنى p دەپ پەرەز قىلىۋېلىپ، باسما مىخنى ئۇدا 3 قېتىم تاشلىغاندا، مىخ ئۇچىنىڭ پەقەت 1 لا قېتىم يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىپ چىقتۇق. ئۇنداق بولسا، باسما مىخنى ئۇدا 3 قېتىم تاشلىغاندا، مىخ ئۇچىنىڭ k ($0 \leq k \leq 3$) قېتىم يۇقىرىغا قاراپ چۈشۈشنىڭ ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟ بۇنىڭدىكى قانۇننى يەنى بايقىيالىدۇڭىزمۇ؟

ھەرقانداق $0 \leq k \leq 3$ كە نىسبەتەن، «بىر باسما مىخنى ئۇدا 3 قېتىم تاشلىغاندا، مىخ ئۇچى k قېتىم يۇقىرىغا قاراپ چۈشىدۇ» دېگەن ۋەقەنى B_k بىلەن ئىپادىلىسەك، يۇقىرىقى مۇھاكىمىلەرگە تەقلىد قىلغان ھالدا تۆۋەندىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز:

$$P(B_0) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = q^3,$$

$$P(B_1) = P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = 3q^2 p,$$

$$P(B_2) = P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) = 3q p^2,$$

$$P(B_3) = P(A_1 A_2 A_3) = p^3.$$

يۇقىرىقى تەڭلىكلەرنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ شۇنى بايقىيالايمىزكى:

$$P(B_k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k=0, 1, 2, 3.$$

ئومۇمەن، n قېتىملىق مۇستەقىل تەكرار تەجرىبىدە، A ۋەقەنىڭ يۈز بېرىش قېتىم سانىنى X بىلەن

ئىپادىلەيمىز، A ۋەقەنىڭ ھەر قېتىمقى تەجرىبىدە يۈز بېرىش

ئېھتىماللىقىنى p دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k=0, 1, 2, \dots, n. \textcircled{1}$$

بۇ چاغدا، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نى ئىككى ئەزالىق

تەقسىمات (binomial distribution) قا بويسۇنىدۇ دەيمىز ۋە ئۇنى

$X \sim B(n, p)$ قىلىپ يازىمىز ھەمدە p نى ئۇتۇق ئېھتىماللىقى

دەپ ئاتايمىز.

① بۇ فورمۇلا بىلەن

ئىككى ئەزالىق تېئورېمىسى

نىڭ فورمۇلىسىنى سېلىش


تۈرۈپ، ئىككىسىنىڭ باغلى

نىشىنى بايقىيالىدۇڭىزمۇ؟



مۇلاھىزە؟

ئىككى ئەزالىق تەقسىمات بىلەن ئىككى نۇقتىلىق تەقسىماتنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟



4 - مىسال. بىر مەرگەننىڭ ھەر قېتىم قارىغا ئاتقاندىكى نى

شانغا تەگكۈزۈش ئېھتىماللىقى 0.8 بولسا، بۇ مەرگەن 10 قېتىم قارىغا ئاتقاندا:

(1) دەل 8 قېتىم نىشانغا تەگكۈزۈشنىڭ ئېھتىماللىقىنى تاپايلى؛

(2) كەم دېگەندە 8 قېتىم نىشانغا تەگكۈزۈشنىڭ ئېھتىماللىقى

نى تاپايلى (نەتىجىسىنى ئىككى ئىناۋەتلىك رەقەمگىچە ئېنىقلىقتا ئالايلى).

يېشىش: نىشانغا تەگكۈزۈش قېتىم ساننى X دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $X \sim B(10, 0.8)$ بولىدۇ.
(1) 10 قېتىم قارىغا ئاتقاندا دەل 8 قېتىم نىشانغا تەگكۈزۈشنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$P(X=8) = C_{10}^8 \times 0.8^8 \times (1-0.8)^{10-8} \approx 0.30.$$

(2) 10 قېتىم قارىغا ئاتقاندا كەم دېگەندە 8 قېتىم نىشانغا تەگكۈزۈشنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= P(X=8) + P(X=9) + P(X=10) \\ &= C_{10}^8 \times 0.8^8 \times (1-0.8)^{10-8} + C_{10}^9 \times 0.8^9 \times (1-0.8)^{10-9} + \\ &\quad C_{10}^{10} \times 0.8^{10} \times (1-0.8)^{10-10} \\ &\approx 0.68. \end{aligned}$$

مەشىق

1. بىر خىل مەھسۇلات 5 ئىش تەرتىپى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلىدۇ ھەمدە 1 — 5 — گىچە بولغان ئىش تەرتىپى-لىرىدىكى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ لايىقەتلىك نىسبىتى ئايرىم — ئايرىم 96%، 97%، 98%، 99%، 96% ئەگەر پۈتۈن كەن مەھسۇلاتتىن خالىغان 1 ئىشلىنىسا، لايىقەتلىك مەھسۇلاتنىڭ ئېلىنىش ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟
2. بىر مېتال پۇلنى ئۇدا 5 قېتىم ئاتقاندىكى ئوڭ چۈشۈش قېتىم سانى X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى تېپىڭ.
3. بىر مەرگەننىڭ ھەر قېتىم قارىغا ئاتقاندىكى نىشانغا تەگكۈزۈش ئېھتىماللىقى 0.9 بولۇپ، ھەر قېتىمقى قارىغا ئېتىش نەتىجىلىرى ئۆزئارا مۇستەقىل بولسا، بۇ مەرگەننىڭ ئۇدا 4 قېتىم قارىغا ئېتىپ، 1 — قېتىم نىشانغا تەگكۈزەلمەي، كېيىنكى 3 قېتىمىنىڭ ھەممىسىدە نىشانغا تەگكۈزەلىشىنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.
4. ئىككى ئەزالىق تەقسىماتقا بويسۇنىدىغان تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا دائىر ئىككى ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈڭ.



ئىككى ئەزالىق تەقسىماتقا بويسۇنىدىغان تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار قانداق قىممەت ئالغاندا ئېھتىماللىق ئەڭ چوڭ بولىدۇ؟

ئىككى ئەزالىق تەقسىمات ئەڭ كۆپ قوللىنىلىدىغان دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ئېھتىماللىق مودېلى بولۇپ، ئۇنىڭغا ئالاقىدار بەزى مەسىلىلەر ئۈستىدە ئىزدە-نىشمۇ ناھايىتى مەنىلىك بولىدۇ. مەسىلەن، يۇقىرىدا كەلتۈرۈلگەن 4 — ئۈلگە مىسالدا، بىز يەنە مۇنداق مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويالايمىز:

ئەگەر بىر مەرگەننىڭ ھەر قېتىم قارىغا ئاتقاندىكى نىشانغا تەگكۈزۈش ئېھتىماللىقى 0.8 بولۇپ، ھەر قېتىمقى قارىغا ئېتىش نەتىجىلىرى ئۆزئارا مۇستەقىل بولسا، ئۇ ھالدا ئۇ 10 قې-تىم قارىغا ئاتقاندا، نىشانغا قانچە قېتىم تەگكۈزەلىشىنىڭ مۇمكىنچىلىكى ئەڭ چوڭ؟
ئۇنىڭ 10 قېتىم قارىغا ئاتقاندىكى نىشانغا تەگكۈزۈش قېتىم سانى X دەپ پەرەز قىلالى. ھەر قېتىمقى قارىغا ئېتىش نەتىجىلىرى ئۆزئارا مۇستەقىل بولغانلىقى ئۈچۈن، $X \sim B(10, 0.8)$ بولىدۇ. شۇڭا، ئۇنىڭ دەل k قېتىم نىشانغا تەگكۈزەلىشىنىڭ ئېھتىماللىقى:

$$P(X=k) = C_{10}^k \times 0.8^k \times 0.2^{10-k}, \quad 0 \leq k \leq 10.$$

شۇنىڭ بىلەن:

$$\begin{aligned} \frac{P(X=k)}{P(X=k-1)} &= \frac{(10-k+1) \times 0.8}{k \times 0.2} \\ &= 1 + \frac{11 \times 0.8 - k}{k \times 0.2}, \quad 0 \leq k \leq 10. \end{aligned}$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، $k < 8.8$ بولغاندا، $P(X=k-1) < P(X=k)$ ؛ $k > 8.8$ بولغاندا، $P(X=k-1) > P(X=k)$ بولىدۇ.

يۇقىرىقى تەھلىللەردىن بىلەلەيمىزكى، بۇ مەرگەن 10 قېتىم قارىغا ئاتقاندا، 8 قېتىم نىشانغا تەگكۈزەلشنىڭ مۇمكىنچىلىكى ئەڭ چوڭ بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئەگەر $X \sim B(n, p)$ بولۇپ، بۇنىڭدىكى $0 < p < 1$ بولسا، ئۇ ھالدا k نىڭ قىممىتى 0 دىن n غىچە چوڭايغاندا، $P(X=k)$ قانداق ئۆزگىرىدۇ؟ k قانداق قىممەتنى ئالغاندا $P(X=k)$ ئەڭ چوڭ بولىدۇ؟

2.2 - كۆنۈكمە


A گۇرۇپپا

1. بىر ئاسما چىراغدا يانداش ئۇلانغان 3 لامپۇچكا بار. ئەگەر مەلۇم بۆلەك ۋاقىت ئىچىدە ھەر بىر لامپۇچكىدىن بىر ئورمال يورۇتۇش ئېھتىماللىقى ئوخشاشلا 0.7 بولسا، مۇشۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدە بۇ ئاسما چىراغنىڭ يورۇ-تالىشىنىڭ ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟
2. بىر ساندۇقتا $2n$ دانە ئاق توپ ۋە $(2n-1)$ دانە قارا توپ بار.
 - (1) خالىتىدىن بىر قېتىمدا n دانە توپ ئالغاندا، ھەممىسىنىڭ ئاق توپ بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ؛
 - (2) خالىتىدىن بىر قېتىمدا n دانە توپ ئالغاندا، ئېلىنغان توپلارنىڭ رەڭگى ئوخشاش ئىكەنلىكى مەلۇم بولسا، ئۇلارنىڭ ئاق توپ بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.
3. ئەگەر ئوغۇل تۇغۇش بىلەن قىز تۇغۇشنىڭ ئېھتىماللىقى ئوخشاش بولسا، 3 بالا بىر ئائىلىدە كەم دېگەندە 2 قىز بالا بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقىنى تېپىڭ.
4. A, B, C ۋەقەلەر $P(A) > 0$ ھەمدە B بىلەن C سىغىشالمايدۇ دېگەن شەرتنى قانائەتلەندۈرسە، تۆۋەندىكىنى ئىسپاتلاڭ:

$$P(B \cup C | A) = P(B | A) + P(C | A).$$

B گۇرۇپپا

1. A, B ئىككى ماھىر مۇسابىقىلەشمەكچى. ئەگەر A نىڭ ھەر بىر مەيدان مۇسابىقىدە ئۇتۇش ئېھتىماللىقى 0.6 ، B نىڭ ئۇتۇش ئېھتىماللىقى 0.4 بولسا، ئۇ ھالدا 3 مەيداندا 2 مەيدان ئۇتۇش تۈزۈمى بىلەن 5 مەيداندا 3 مەيدان ئۇتۇش تۈزۈمىنىڭ قايسىسى قوللىنىلسا A غا تېخىمۇ پايدىلىق بولىدۇ؟ مەيدان تۈزۈمىنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا قىلىپ تەسىس قىلىنىشىغا قانداق قارايسىز؟
2. مەكتەپنىڭ باغچە سەيلىسى پائالىيىتىدە مۇنداق بىر ئويۇن تەسىس قىلىندى: A ساندۇقتا 3 ئاق توپ، 2 قارا توپ، B ساندۇقتا 2 ئاق توپ، 2 قارا توپ بار، بۇ ئىككى ساندۇقتىن ئايرىم - ئايرىم 1 دىن توپ ئالغاندا، ئېلىنغان ھەر ئىككى توپ ئاق توپ بولسا، توپ ئالغۇچىغا مۇكاپات بېرىلىدۇ. بەزىلەر: ئىككى ساندۇقتىكى ئاق توپلارنىڭ سانى قارا توپتىن كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن، مۇكاپاتقا ئېرىشىش ئېھتىماللىقى 0.5 تىن چوڭ بولىدۇ، دەپ قارايدۇ. سىز قانداق قارايسىز؟
3. بىر تۈركۈم مەھسۇلات بار بولۇپ، ئۇنىڭ ھەر n دانىسىنىڭ ناچار مەھسۇلات نىسبىتى 2% . بۇ بىر تۈركۈم مەھسۇلات ئىچىدىن تەرتىپ بويىچە ھەر قېتىمدا خالىغان 3 نى ئېلىپ تەكشۈرگەندە:
 - (1) $n=500, 5000, 50000$ بولغاندا، قايتۇرۇلىدىغان ۋە قايتۇرۇلمايدىغان ئىككى شەكىل بويىچە ئالغاندا دەل 1 ناچار مەھسۇلات چىقىشنىڭ ئېھتىماللىقى ئايرىم - ئايرىم قانچە؟
 - (2) (1) گە ئاساسەن، ھېچبىر گېئومېترىيىلىك تەقسىمات بىلەن ئىككى ئەزالىق تەقسىماتنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدە قانداق تونۇشقا كەلدىڭىز؟



CHAPTER 2

3-2

دېسكرېت (تارقاق) تېپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ۋە كۋادراتلىق ئايرىمىسى

دېسكرېت تېپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئېھتىماللىق تەقسىمات جەدۋىلىگە ئاساسەن شۇ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا ئالاقىدار ۋەقەلەرنىڭ ئېھتىماللىقىنى ئېنىقلىغىلى بولىدۇ. بىراق، ئەمەلىي مەسىلىلەردە، بىز بەزىدە تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ بىر قىسىم سانلىق ئالاھىدىلىكلىرىگە تېخىمۇ قىزىقىمىز. مەسىلەن، مەلۇم سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىر قېتىملىق ماتېماتىكا سىنىقىدا نامايان قىلغان ئومۇمىي سەۋىيىسىنى ئىگىلەشتە، ئوتتۇرىچە نومۇرغا قاراش ناھايىتى مۇھىم ئىش ھېسابلىنىدۇ؛ مەلۇم سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ماتېماتىكا نەتىجىسىدە «ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كېتىش» ئەھۋالىنىڭ بار - يوقلۇقىنى ئىگىلەشتە، بۇ سىنىپنىڭ ماتېماتىكا نەتىجىسىدىكى كۋادراتلىق ئايرىمىسىغا قاراشقا توغرا كېلىدۇ، ۋە باشقىلار.

دېسكرېت تېپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى 1-3-2

مۇلاھىزە؟

مەلۇم سودا سارىيى باھاسى ئايرىم - ئايرىم $18/\text{kg}$ يۈەن، $24/\text{kg}$ يۈەن ۋە $36/\text{kg}$ يۈەن بولغان 3 خىل كەمپۇتنى نىسبەت $1:2:3$ بويىچە ئارىلاشتۇرۇپ ساتماقچى بولدى، ئۇلار ئارىلاشما كەمپۇتنىڭ باھاسىنى قانداق بېكىتسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟

① ۋەزىنى تارازا تېشىغا ئوخشاش. ساق، ئۇ ھالدا ۋەزىن سانى ئېغىر - يېنىكىلىكىنى ئۆلچەش رولىنى ئوينايدىغان سانلىق قىممەت بولىدۇ. ۋەزىنلىك ئوتتۇرىچە قىممەت دېگەنىمىز بىرقانچە مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە سانىنى ھېسابلىغاندا، ھەر بىر مىقدارنىڭ ئومۇمىي مىقداردىكى مۇھىملىقىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا قاراپ، ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم ئوخشاش بولمىغان ۋەزىن سانىغا ئىگە قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.

3 خىل كەمپۇتنىڭ ھەر 1kg ئارىلاشما كەمپۇتنىكى ماسسىسى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ئايرىم - ئايرىم $\frac{1}{2}\text{kg}$ ، $\frac{1}{3}\text{kg}$ ، $\frac{1}{6}\text{kg}$ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئارىلاشما كەمپۇتنىڭ مۇۋاپىق باھاسى:

$$18 \times \frac{1}{2} + 24 \times \frac{1}{3} + 36 \times \frac{1}{6} = 23 (\text{yuan/kg}).$$

بۇ سان 3 خىل كەمپۇت باھاسىنىڭ بىر خىل ۋەزىنلىك ئوتتۇرىچە قىممىتى ① بولۇپ، بۇ يەردە ۋەزىن سانى ئايرىم - ئايرىم $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ۋە $\frac{1}{6}$ بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئەگەر ئارىلاشما كەمپۇتتىكى ھەربىر تال كەمپۇتنىڭ ماسسىسى ئۆزئارا تەڭ بولسا، ۋەزىن ساننىڭ ئەمەلىي مەنىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرەلەمسىز؟

كلاسسىك ئېھتىماللىق مودېلىغا ئاساسەن، ئارىلاشما كەمپۇتتىن خالىغان بىر كەمپۇتنى ئالساق، بۇ كەمپۇتنىڭ 1 - خىل كەمپۇت بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقى $\frac{1}{2}$ ، 2 - خىل كەمپۇت بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقى $\frac{1}{3}$ ، 3 - خىل كەمپۇت بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقى $\frac{1}{6}$ بولىدۇ، يەنى ئېلىنغان بۇ كەمپۇتنىڭ باھا - سى 18/kg، 24/kg، 36/kg يۈەن، ۋە $\frac{1}{3}$ ۋە $\frac{1}{6}$ بولىدۇ. بۇ بىر تال كەمپۇتنىڭ باھاسىنى X بىلەن ئىپادىلەسەك، ئۇ ھالدا X دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ، ئۇنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى:

6.2 - جەدۋەل

X	18	24	36
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

كۆرۈشكە بولىدۇكى، ۋەزىن سانى دەل تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى بولىدۇ. شۇنداق قىلىپ، ھەربىر كىلوگرام ئارىلاشما كەمپۇتنىڭ مۇۋاپىق باھاسىنى تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

$$18 \times P(X=18) + 24 \times P(X=24) + 36 \times P(X=36).$$

ئومۇمەن، ئەگەر دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى:

7.2 - جەدۋەل

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$	p_n

بولسا، ئۇ ھالدا

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_i p_i + \dots + x_n p_n$$

نى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى (mean) ياكى ماتېماتىكىلىق كۈتۈلۈمىسى (mathematical expectation) دەپ ئاتايمىز. ئۇ دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار - نىڭ قىممەت ئېلىشىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيىسىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ.

ئەگەر $Y = aX + b$ بولۇپ، a ، b لار تۇراقلىق سان بولسا، ئۇ ھالدا Y مۇ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولىدۇ.

$$P(Y = ax_i + b) = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

بولغانلىقتىن، Y نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى:

8.2 - جەدۋەل

Y	$ax_1 + b$	$ax_2 + b$	$\dots$	$ax_i + b$	$\dots$	$ax_n + b$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$	p_n

شۇڭا:

$$\begin{aligned} E(Y) &= (ax_1 + b)p_1 + (ax_2 + b)p_2 + \cdots + (ax_i + b)p_i + \cdots + (ax_n + b)p_n \\ &= a(x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_ip_i + \cdots + x_np_n) + b(p_1 + p_2 + \cdots + p_i + \cdots + p_n) \\ &= aE(X) + b. \end{aligned}$$

يەنى

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

1 - مىسال. ۋاسكېتبول مۇسابىقىسىدە، گارغا جازا توپ ئاتقاندا 1 قېتىم چۈشۈرگىنىگە 1 نومۇر، چۈشۈرەلمىگىنىگە 0 نومۇر بېرىلىدۇ. بىر تەنھەرىكەتچىنىڭ جازا توپ ئېتىپ گارغا چۈشۈرۈش ئېھتىماللىقى 0.7 بولسا، ئۇنىڭ 1 قېتىم جازا توپ ئېتىپ نومۇرغا ئېرىشىشى X نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى قانچە بولىدۇ؟

يېشىش: چۈنكى $P(X=0)=0.3$ ، $P(X=1)=0.7$ ، شۇڭا:

$$E(X) = 1 \times P(X=1) + 0 \times P(X=0) = 1 \times 0.7 + 0 \times 0.3 = 0.7.$$

ئومۇمەن، ئەگەر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X ئىككى نۇقتىلىق تەقسىماتقا بويىسۇنسا، ئۇ ھالدا:

$$E(X) = 1 \times p + 0 \times (1-p) = p.$$

شۇڭا:

ئەگەر X ئىككى نۇقتىلىق تەقسىماتقا بويىسۇنسا، ئۇ ھالدا $E(X) = p$.

ئىككى نۇقتىلىق تەقسىماتنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى فورمۇلىسىغا ئاساسلانغاندا، ئەگەر جازا توپ ئاتقاندىكى گارغا چۈشۈرۈش ئېھتىماللىقى 0.8 بولسا، بىر قېتىم جازا توپ ئېتىپ 1 نومۇرغا ئېرىشەلەيلى شىشنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى قانچە بولىدۇ؟

ئەگەر $X \sim B(n, p)$ بولسا، ئۇ ھالدا $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$ غا ئاساسەن:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n kC_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n npC_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-1-(k-1)} \\ &= np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-1-(k-1)} = np. \end{aligned}$$

شۇڭا:

ئەگەر $X \sim B(n, p)$ بولسا، ئۇ ھالدا $E(X) = np$.

مۇلاھىزە؟

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى بىلەن ئەۋرىشكىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ئارىسىدا قانداق باغلىنىش ۋە پەرق بار؟

بايقاشقا بولىدۇكى، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى تۇراقلىق سان بولىدۇ، ھالبۇكى، ئەۋرىشكىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ئەۋرىشكىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدۇ. دىئانالىق ئۈچۈن، ئۇ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولىدۇ. ئاددىي تاسادىپىي ئەۋرىشكىلەردە، ئەۋرىشكە سىغىمىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ئەۋرىشكىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ئومۇمىي گەۋدىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىگە بارغانسېرى يېقىنلىشىدۇ، شۇڭا بىز ئومۇمىي گەۋدىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىنى كۆپ ھاللاردا ئەۋرىشكىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىدىن پايدىلىنىپ مۆلچەرلەيمىز.

2 - مىسال. بىر قېتىملىق بۆلەكلەر بويىچە ئېلىنغان سىناقتا توغرا جاۋابنى تاللاش سوئالىدىن 20 سى چىقىرىلدى، ھەر بىر سوئالنىڭ 4 جاۋابى بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ پەقەت بىرىلا توغرا. ھەر بىر سوئالنىڭ توغرا جاۋابى تاللانسا 5 نومۇر بېرىلىدۇ، تاللانمىسا ياكى خاتا تاللانسا نومۇر بېرىلمەيدۇ، تولۇق نومۇر 100 نومۇر. A ئوقۇغۇچىنىڭ خالىغان بىر سوئالنىڭ جاۋابىنى توغرا تاللاش ئېھتىماللىقى 0.9 بولۇپ، B ئوقۇغۇچى سىناقتا ھەر بىر سوئالنىڭ 4 جاۋابى ئىچىدىن خالىغان بىرىنى تاسادىپىي تاللىماقچى بولدى. A، B ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇشۇ قېتىمقى سىناقتىكى نەتىجىسىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممەتلىرىنى ئايرىم - ئايرىم تاپايلى.

يېشىش: A، B ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇشۇ قېتىمقى بۆلەكلەر بويىچە ئېلىنغان سىناقتا جاۋابىنى توغرا تاللىيالىغان سوئاللىرىنىڭ سانىنى ئايرىم - ئايرىم X_1 ۋە X_2 دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $X_1 \sim B(20, 0.9)$ ، $X_2 \sim B(20, 0.25)$ بولىدۇ، شۇڭا:

$$E(X_1) = 20 \times 0.9 = 18,$$

$$E(X_2) = 20 \times 0.25 = 5.$$

ھەر بىر سوئالنىڭ جاۋابى توغرا تاللانسا 5 نومۇر بېرىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، A، B ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ مۇشۇ قېتىمقى سىناقتىكى نەتىجىسى ئايرىم - ئايرىم $5X_1$ ، $5X_2$ بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇلارنىڭ سىناقتىكى نەتىجىلىرىنىڭ كۈتۈلمىسى ئايرىم - ئايرىم تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$E(5X_1) = 5E(X_1) = 5 \times 18 = 90,$$

$$E(5X_2) = 5E(X_2) = 5 \times 5 = 25.$$

مۇلاھىزە؟

A ئوقۇغۇچى بۇ قېتىمقى سىناقتا چوقۇم 90 نومۇر ئالامدۇ؟ ئۇنىڭ نەتىجىسىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى (كۈتۈلمىسى) 90 نومۇر بولىدۇ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟

3 - مىسال. ھاۋا رايىدىن ئالدىن بېرىلگەن مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا، مەلۇم رايوندا يېقىنقى مەزگىلدە كىچىك كەلكۈن كېلىش ئېھتىماللىقى 0.25، چوڭ كەلكۈن كېلىش ئېھتىماللىقى 0.01 ئىكەن. بۇ رايوندىكى مەلۇم ئىش ئورنىدا چوڭ تىپلىق بىر ئۈسكۈنە بار بولۇپ، چوڭ كەلكۈن كەلسە بۇ ئۈسكۈنە نىڭگە 60 000 يۈەنلىك، كىچىك كەلكۈن كەلسە 10 000 يۈەنلىك زىيان سالىدۇ. ئۈسكۈنىنى قوغداپ قېلىشتا تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل لايىھە بار:

1 - لايىھە: ئۈسكۈنىنى يۆتكەپ كېتىش، يۆتكەش ھەققى 3800 يۈەن؛

2 - لايىھە: قوغداش تېمى قوپۇرۇش، قۇرۇلۇش ھەققى 2000 يۈەن، ئەمما تام پەقەت كىچىك كەلكۈن گىلا بەرداشلىق بېرەلەيدۇ.

3 - لايىھە: كەلكۈن كەلمىسە ئىدى دەپ ئۈمىد قىلىپ، ھېچقانداق تەدبىر قوللانماسلىق.

قايسى لايىھە ياخشىراق؟

يېشىش: ئۈچ خىل لايىھىدىكى زىياننى ئايرىم - ئايرىم X_1 ، X_2 ۋە X_3 بىلەن ئىپادىلىۋالىمىز.

1 - لايىھىنى قوللانغاندا، مەيلى كەلكۈن كەلسۇن - كەلمىسۇن، 3800 يۈەن زىيان بولىدۇ، يەنى

$$X_1 = 3800.$$

2 - لايىھىنى قوللانغاندا، چوڭ كەلكۈن كەلسە $2000 + 60\,000 = 62\,000$ يۈەن زىيان بولىدۇ؛ چوڭ

كەلكۈن كەلمىسە 2000 يۈەن زىيان بولىدۇ، يەنى

$$X_2 = \begin{cases} 62000, & \text{چوڭ كەلكۈن كەلسە;} \\ 2000, & \text{چوڭ كەلكۈن كەلمەسە.} \end{cases}$$

ئوخشاشلا، 3 - لايىھىنى قوللانغاندا مۇنداق بولىدۇ:

$$X_3 = \begin{cases} 60000, & \text{چوڭ كەلكۈن كەلسە;} \\ 10000, & \text{كىچىك كەلكۈن كەلسە;} \\ 0, & \text{كەلكۈن كەلمەسە.} \end{cases}$$

شۇڭا:

$$E(X_1) = 3800,$$

$$E(X_2) = 62000 \times P(X_2 = 62000) + 2000 \times P(X_2 = 2000) \\ = 62000 \times 0.01 + 2000 \times (1 - 0.01) = 2600,$$

$$E(X_3) = 60000 \times P(X_3 = 60000) + 10000 \times P(X_3 = 10000) + 0 \times P(X_3 = 0) \\ = 60000 \times 0.01 + 10000 \times 0.25 = 3100.$$

دېمەك، 2 - لايىھىنى قوللانغاندا زىيان ئەڭ ئاز بولىدىكەن، شۇڭا مۇشۇ لايىھىنى قوللىنىش كېرەك. شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، يۇقىرىدىكى يەكۈن «ئوتتۇرىچە زىيان» نى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان. «ئوتتۇرىچە زىيان» نى ئادەتتە مۇنداق چۈشەنسەك بولىدۇ: مەسىلىدىكى ھاۋا رايى ئەھۋالى ئىلگىرى كۆپ قېتىم يۈز بەرگەن دەپ پەرەز قىلىنغاندا، 2 - لايىھە قوللىنىلسا زىياننى ئەڭ ئاز قىلغىلى بولىدۇ. لېكىن، كەلكۈننىڭ يۈز بېرىش - بەرمەسلىكى ۋە ئۇنىڭ چوڭ ياكى كىچىكلىكى تاسادىپىي بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئايرىم بىر قېتىملىق تەدبىرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، 2 - لايىھىنى قوللىنىشنىڭ ئەڭ ياخشى بولۇشىمۇ ناتايىن.

مەشىق

1. دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ كۈتۈلمىسى چوقۇم ئۇنىڭ تەجرىبىدە كۆرۈلۈش ئېھتىماللىقىنىڭ ئەڭ چوڭ قىممىتى بولامدۇ؟ كونكرېت ئەمەلىي مىسالغا ئاساسلىنىپ چۈشەندۈرۈڭ.
2. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

X	0	1	2	3	4	5
P	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1

بولسا، $E(X)$ نى تېپىڭ.

3. بىر مېتال پۇلنى تاشلىغاندا، ئوڭ چۈشكىنىگە 1 نومۇر، تەتۈر چۈشكىنىگە 1 - نومۇر بېرىلىدۇ دەپ بەلگىلەنگەن بولسا، ئېرىشلىدىغان نومۇر X نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىنى تېپىڭ.
4. مەھسۇلات مىقدارى ئوخشاش بولغان 2 ئىستانوكتا ئوخشاش بىر خىل دېتال ئىشلەپچىقىرىلدى. بۇ 2 ئىستانوكتا 1 سائەت ئىچىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ناچار مەھسۇلاتنىڭ سانى X_1 ، X_2 لەرنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

X_1	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1

X_2	0	1	2
P	0.3	0.5	0.2

بولسا، قايسى ئىستانوكتا تېخىمۇ ياخشى؟ يەكۈنىڭىزنىڭ ئەمەلىي مەنىسىنى چۈشەندۈرۈڭ.

5. سۈپىتى تەكشى بولغان 5 مېتال پۇلنى تەڭلا تاشلىغاندا، ئوڭ چۈشىدىغان مېتال پۇل سانى X نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىنى تېپىڭ.

2-3-2

دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ كۋادراتلىق ئايرىمىسى

ئىزدىنىش



ئىككى ئوقۇغۇچىدىن بىرىنى تاللاپ سىنىپقا ۋاكالىتەن قارىغا ئېتىش مۇسابىقىسىگە قاتناشتۇرۇشتا، ئۇلارنىڭ ئىلگىرىكى نەتىجىلىرىنىڭ خاتىرىسىگە ئاساسلانغاندا، 1 - ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئاتقاندىكى ھالقا سانى X_1 نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى تۆۋەندىكىدەك بولغان:

9.2 - جەدۋەل

X_1	5	6	7	8	9	10
P	0.03	0.09	0.20	0.31	0.27	0.10

2 - ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئاتقاندىكى ھالقا سانى X_2 نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى تۆۋەندىكىدەك بولغان:

10.2 - جەدۋەل

X_2	5	6	7	8	9
P	0.01	0.05	0.20	0.41	0.33

ئۇلارنىڭ قايسىسىنى مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇش كېرەك؟

ئىلگىرى ئۆگەنگەن بىلىملىرىمىزگە ئاساسەن، قارىغا ئاتقاندىكى ئوتتۇرىچە ھالقا سانىدىن پايدىلىنىپ ئۇلارنىڭ قارىغا ئېتىش سەۋىيىسىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكىنى سېلىشتۇرۇشقا، يەنى X_1 ، X_2 لارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش سەۋىيىسىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكىنى ئېنىقلاشقا بولىدۇ. ھېسابلىساق،



$$E(X_1) = 8, E(X_2) = 8$$

بولۇپ، ئىككى ئوتتۇرىچە قىممەت ئۆزئارا تەڭ بولۇپ قالدى، بۇنىڭدىن بايقىيالايمىزكى، بۇ ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش سەۋىيىسىنى پەقەت ئوتتۇرىچە قىممەتكىلا ئاساسلىنىپ پەرق ئەتكىلى بولمايدىكەن.

مۇلاھىزە؟

قارىغا ئاتقاندىكى ئوتتۇرىچە ھالقا سانىدىن سىرت، ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆزىگە خاس قارىغا ئېتىش ئالاھىدىلىكىنى سۈرەتلەپ بېرەلەيدىغان باشقا كۆرسەتكۈچ بارمۇ؟

1.3.2 - رەسىم (1) ۋە (2) ئايرىم - ئايرىم X_1 بىلەن X_2 نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى ئىپادىلەيدۇ (1) ۋە (2) نى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق، 2 - ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىسى 8 - ھالقىغا بەكرەك مەركەزلەشكەنلىكىنى، يەنى مۇشۇ ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىسى تېخىمۇ مۇقىم ئىكەنلىكىنى بايقىيالايمىز.



رەسىم 1.3.2 -

مۇلاھىزە؟

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ مۇقىملىقىنى مىقدار جەھەتتىن قانداق سۈرەتلەش كېرەك؟

بىزگە مەلۇمكى، ئەۋرىشكىنىڭ كۋادراتلىق ئايرىمىسى بارلىق ئەۋرىشكە سانلىق مەلۇماتلىرى بىلەن ئەۋرىشكە ئوتتۇرىچە قىممىتىنىڭ ئېغىش دەرىجىسىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئەۋرىشكە سانلىق مەلۇماتلىرىنىڭ مۇقىملىقىنى سۈرەتلەشكە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، تەبىئىي ھالدا بىر ئويغا كېلىمىزكى، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ مۇقىملىقىنى ئەۋرىشكىنىڭ كۋادراتلىق ئايرىمىسىغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان بىر مىقداردىن پايدىلىنىپ سۈرەتلەشكە بولامدۇ يوق؟ دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى

جەدۋەل 11.2 -

X	x_1	x_2	...	x_i	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_i	...	p_n

دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $(x_i - E(X))^2$ نىڭ قىممىتى x_i ($i=1, 2, \dots, n$) نىڭ ئوتتۇرىچە قىممەت $E(X)$ كە نىسبەتەن ئېغىش دەرىجىسىنى تەسۋىرلەپ بېرىدۇ. ھالبۇكى،

$$D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i$$

بولسا مۇشۇ ئېغىش دەرىجىلىرىنىڭ ۋەزىنلىك ئوتتۇرىچە قىممىتى بولۇپ، ئۇ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ ئۆزىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى $E(X)$ كە نىسبەتەن ئوتتۇرىچە ئېغىش دەرىجىسىنى سۈرەت-لەپ بېرىدۇ. بىز $D(X)$ نى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ كۋادراتلىق ئايرىمىسى (variance) دەپ ئاتايمىز، ئۇنىڭ ئارىفمېتىكىلىق كۋادرات يىلتىزى $\sqrt{D(X)}$ نى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ ئۆلچەملىك ئايرىمىسى (standard deviation) دەيمىز.

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ كۋادراتلىق ئايرىمىسى بىلەن ئۆلچەملىك ئايرىمىسىنىڭ ھەر

ئىككىسى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارلارنىڭ قىممىتىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممەتكە نىسبەتەن ئوتتۇرىچە ئېغىش دەرىجىسىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. كۆادراتلىق ئايرىما ياكى ئۆلچەملىك ئايرىما قانچىكى كىچىك بولسا، تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممەتكە نىسبەتەن ئوتتۇرىچە ئېغىش دەرىجىسى مۇ شۇنچە كىچىك بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ كۆادراتلىق ئايرىمىسى بىلەن ئەۋرىشكىنىڭ كۆادراتلىق ئايرىمىسى ئارىسىدا قانداق باغلىنىش ۋە پەرق بار؟

تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ كۆادراتلىق ئايرىمىسى تۇراقلىق سان بولىدۇ. ھالبۇكى، ئەۋرىشكىنىڭ كۆادراتلىق ئايرىمىسى ئەۋرىشكىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولىدۇ. ئاددىي تاسادىپىي ئەۋرىشكىلەردە، ئەۋرىشكە كۆادراتلىق ئايرىمىسى ئەۋرىشكە سىغىمىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ ئومۇمىي گەۋدە كۆادراتلىق ئايرىمىسىغا بارغانسېرى يېقىنلىشىدىغانلىقى ئۈچۈن، بىز كۆپ ھاللاردا ئومۇمىي گەۋدە كۆادراتلىق ئايرىمىسىنى ئەۋرىشكە كۆادراتلىق ئايرىمىسىدىن پايدىلىنىپ مۆلچەرلەيمىز. ئەمدى، ماھىر تاللاشنى ئاساس بىلەن تەمىن ئېتىش ئۈچۈن، يۇقىرىدىكى ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆزىگە خاس قارىغا ئېتىش ئالاھىدىلىكلىرىنى ئۇلارنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىلىرىنىڭ كۆادراتلىق ئايرىمىسىدىن پايدىلىنىپ سۈرەتلەيمىز. ئالدىدىكى ھېسابلاش نەتىجىلىرى ۋە كۆادراتلىق ئايرىمىنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن:

$$D(X_1) = \sum_{i=5}^{10} (i-8)^2 P(X_1 = i) = 1.50,$$

$$D(X_2) = \sum_{i=5}^9 (i-8)^2 P(X_2 = i) = 0.82.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، 1 - ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىسىنىڭ مۇقىملىقى ناچارراق، 2 - ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىسىنىڭ مۇقىملىقى ياخشىراق بولۇپ، 2 - ئوقۇغۇچىنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىسى 8 - ھالقا ئەتراپىغا مۇقىملاشقان.

مۇلاھىزە؟

ئەگەر باشقا سىنىپتىكى ماھىرلارنىڭ قارىغا ئېتىش نەتىجىسى 9 - ھالقا ئەتراپىدا بولسا، بۇ سىنىپتىن قايسى ماھىرنى مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇش كېرەك؟ ئەگەر باشقا سىنىپتىكى ماھىرلارنىڭ نەتىجىسى 7 - ھالقا ئەتراپىدا بولسا، بۇ سىنىپتىن قايسى ماھىرنى مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇش كېرەك؟

تۆۋەندىكى يەكۈنلەرنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇ:

ئەگەر X ئىككى نۇقتىلىق تەقسىماتقا بويسۇنسا، ئۇ ھالدا $D(X) = p(1-p)$.

ئەگەر $X \sim B(n, p)$ بولسا، ئۇ ھالدا $D(X) = np(1-p)$.



تۆۋەندىكى يەكۈننى ئىسپاتلىيالايمىز؟

$$D(aX+b)=a^2D(X).$$

4 - مىسال. سۈپىتى تەكشى بولغان بىر شىشخالنى تاسادىپىي تاشلىغاندىكى يۇقىرىغا قاراپ چۈشكەن چېكىت سانى X نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى، كۋادراتلىق ئايرىمىسى ۋە ئۆلچەملىك ئايرىمىسىنى تاپايلى.

يېشىش: شىشخال تاشلىغاندا كېلىپ چىقىدىغان چېكىت سانى X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى:

12.2 - جەدۋەل

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

شۇڭا:

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5;$$

$$D(X) = (1-3.5)^2 \times \frac{1}{6} + (2-3.5)^2 \times \frac{1}{6} + (3-3.5)^2 \times \frac{1}{6} +$$

$$(4-3.5)^2 \times \frac{1}{6} + (5-3.5)^2 \times \frac{1}{6} + (6-3.5)^2 \times \frac{1}{6}$$

$$\approx 2.92;$$

$$\sqrt{D(X)} \approx 1.71.$$

5 - مىسال. A ، B ئىدارىلەرنىڭ ھەر ئىككىسى سىزنى خىزمەتكە تەكلىپ قىلىشنى خالايدۇ، سىز تۆۋەندىكىدەك ئۇچۇرلارغا ئىگە بولىڭىز:

13.2 - جەدۋەل

A ئىدارىدىكى ئوخشاش بولمىغان ئىش ئورۇنلىرى - نىڭ ئايلىق مائاشى X_1 (يۈەن)	1200	1400	1600	1800
ماس ئىش ئورنىغا ئېرىشىشنىڭ ئېھتىماللىقى P_1	0.4	0.3	0.2	0.1

14.2 - جەدۋەل

B ئىدارىدىكى ئوخشاش بولمىغان ئىش ئورۇنلىرى - نىڭ ئايلىق مائاشى X_2 (يۈەن)	1000	1400	1800	2200
ماس ئىش ئورنىغا ئېرىشىشنىڭ ئېھتىماللىقى P_2	0.4	0.3	0.2	0.1

مائاش تەمىناتىنىڭ پەرقلەنىش ئەھۋالىغا ئاساسەن، قايسى ئىدارىنى تاللاشنى خالايسىز؟
يېشىش: ئايلىق مائاشنىڭ تەقسىمات جەدۋىلىگە ئاساسەن، ھېسابلىغۇچ بىلەن ھېسابلىساق:

$$E(X_1) = 1200 \times 0.4 + 1400 \times 0.3 + 1600 \times 0.2 + 1800 \times 0.1$$

$$= 1400,$$

$$D(X_1) = (1200 - 1400)^2 \times 0.4 + (1400 - 1400)^2 \times 0.3 +$$

$$(1600 - 1400)^2 \times 0.2 + (1800 - 1400)^2 \times 0.1$$

$$= 40000;$$

$$E(X_2) = 1000 \times 0.4 + 1400 \times 0.3 + 1800 \times 0.2 + 2200 \times 0.1$$

$$= 1400,$$

$$D(X_2) = (1000 - 1400)^2 \times 0.4 + (1400 - 1400)^2 \times 0.3 +$$

$$(1800 - 1400)^2 \times 0.2 + (2200 - 1400)^2 \times 0.1$$

$$= 160000.$$

$D(X_1) < D(X_2)$ ، $E(X_1) = E(X_2)$ بولغانلىقتىن، ئىككى ئىدارىنىڭ مائاشىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى

ئۆزئارا تەڭ، ئەمما A ئىدارىنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئىش ئورۇنلىرىنىڭ مائاشى نىسبەتەن مەركەزلەش-

كەن، B ئىدارىنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئىش ئورۇنلىرىنىڭ مائاشى نىسبەتەن تارقاق. يۇقىرىدىكىلەرگە

ئاساسلانغاندا، ئەگەر ئوخشاش بولمىغان ئىش ئورۇنلىرىنىڭ مائاش پەرقى كىچىكرەك بولۇشنى خالىسى-

ڭىز A ئىدارىنى تاللاڭ؛ ئوخشاش بولمىغان ئىش ئورۇنلىرىنىڭ مائاش پەرقى چوڭراق بولۇشنى خالى-

سىڭىز B ئىدارىنى تاللاڭ.

مەشىق

1. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

X	0	1	2	3	4
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

بولسا، $D(X)$ بىلەن $\sqrt{D(X)}$ نى تېپىڭ.

2. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ $P(X=c)=1$ (تۇراقلىق سان) نى قانائەتلەندۈرىدىغانلىقى بې-

رىلگەن بولسا، $D(X)$ نى تېپىڭ.

3. كۆادراتلىق ئايرىمىنىڭ ئەمەلىيەتتىكى قوللىنىلىشى نېمە؟ كونكرېت ئەمەلىي مىساللار بىلەن چۈشەندۈرۈڭ.

3.2 - كۆنۈكمە

A گۈرۈپپا

1. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

X	-2	1	3
P	0.16	0.44	0.40

بولسا، $E(X)$ ، $E(2X+5)$ ، $D(X)$ ، $\sqrt{D(X)}$ لەرنى تېپىڭ.

2. بىر مەرگەننىڭ قارا مەركىزىگە تەگكۈزۈش ئېھتىماللىقى 0.9. ئەگەر بۇ مەرگەن ئوخشاش شەرت ئاستىدا قارىغا ئۇدا 10 قېتىم ئاتقان بولسا، ئۇنىڭ قارا مەركىزىگە تەگكۈزۈش قېتىم سانىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىنى تېپىڭ.

3. 10 000 دانە لاتارىيە بېلىتى تارقىتىلدى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە، مۇكاپات سوممىسى 2 يۈەن بولغىنىدىن 1000 دانە بېلەت، 10 يۈەنلىكتىن 300 دانە بېلەت، 50 يۈەنلىكتىن 100 دانە بېلەت، 100 يۈەنلىكتىن 50 دانە بېلەت، 1000 يۈەنلىكتىن 5 دانە بېلەت بار بولسا، 1 دانە لاتارىيە بېلىتى سېتىۋالغاندا چىقىشى مۇمكىن بولغان مۇكاپات سوممىسىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى قانچە يۈەن؟

4. A ، B ئىككى مەرگەننىڭ ئوخشاش شەرت ئاستىدا قارىغا ئاتقاندىكى ھالقا سانى X_1 ، X_2 لەرنىڭ تەقسىمات جەدۋىلى ئايرىم - ئايرىم

X_1	6	7	8	9	10
P	0.16	0.14	0.42	0.1	0.18


X_2	6	7	8	9	10
P	0.19	0.24	0.12	0.28	0.17

بولسا، ھالقا سانىنىڭ كۈتۈلمىسى ۋە كۋادراتلىق ئايرىمىسىغا ئاساسەن، بۇ ئىككى مەرگەننىڭ قارىغا ئېتىش سەۋىيىسىنى سېلىشتۇرۇڭ.

B گۈرۈپپا

1. ئىككى شىشخالىنى تاشلاش تەجرىبىسى ئىشلىگەندە، كەم دېگەندە شىشخالىنىڭ بىرىدە 5 چېكىت ياكى بىرىدە 6 چېكىت كۆرۈلسە تەجرىبە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى دەپ قارىلىدۇ، مۇشۇنداق 30 قېتىملىق تەجرىبىدە كى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش قېتىم سانى X نىڭ كۈتۈلمىسىنى تېپىڭ.


2. بىر ماشىنىدا بىر كۈن ئىچىدە كاشىلا يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى 0.1. بىر ھەپتىدىكى 5 ئىش كۈنى ئىچىدە، بۇ ماشىنىدا كاشىلا يۈز بەرمىسە 50 مىڭ يۈەن، 1 قېتىم كاشىلا يۈز بەرسە 25 مىڭ يۈەن، 2 قېتىم كاشىلا يۈز بەرسە 0 يۈەن پايدا ئالغىلى بولۇپ، 3 قېتىم ياكى 3 قېتىمدىن ئارتۇق كاشىلا يۈز بەرسە 10 مىڭ يۈەن زىيان بولىدۇ. بۇ ماشىنىدىن بىر ھەپتە ئىچىدە ئېلىش مۇمكىن بولغان پايدىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىنى تېپىڭ.



نورمال تەقسىمات


سىز گالتون تاختىسىنى كۆرۈپ باققانمۇ؟ 1.4.2 - رەسىمدە بېرىلگەننى گالتون تاختىسىنىڭ سىخېمىسى. بۇنىڭدا، بىر ياغاچ تاختىغا بىر قانچە قاتار سىلىندىر شەكىللىك ياغاچ پارچىسى ئۆزئارا پاراللېل ھەم بىر - بىرىگە تاقىشىپ قالمايدىغان قىلىپ مېخلىنىپ، ياغاچ پارچىلىرى ئارىسىغا ئۆتۈش يولى ئورنىدا مۇۋاپىق يوقۇق قالدۇرۇلىدۇ، ئالدى تەرەپتە بىر ئەينەك توسۇق بار. بىر شارچە گالتون تاختىسىنىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى ئۆتۈش ئېغىزىدىن تۆۋەنگە چۈشۈرۈلگەندە، شارچە چۈشۈش جەريانىدا قەۋەتمۇقەۋەت ياغاچ پارچىلىرى بىلەن سوقۇلۇپ، ئاخىر گالتون تاختىسىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى مەلۇم بىر شار ئېرىقچىسى ئىچىگە چۈشىدۇ.

شار ئېرىقچىلىرىغا نومۇر قويۇۋالساق، شارچىنىڭ زادى قانچىنچى نومۇرلۇق ئېرىقچىغا چۈشكەنلىكىنى تەكشۈرۈش ئاسان بولىدۇ. گالتون تاختىسى تەجرىبىسىنى تەكرار ئىشلىگەندە، ھەرقايسى ئېرىقچىلارغا چۈشىدىغان شارچىلارنىڭ سانى تەجرىبە قېتىم سانىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ بارغانسېرى كۆپىيىپ، ئۇلارنىڭ دۆۋىلىنىش ئېگىزلىكىمۇ بارغانسېرى يۇقىرىلايدۇ. ھەرقايسى ئېرىقچىلاردىكى دۆۋىلىنىش ئېگىزلىكى شارچىلارنىڭ ھەرقايسى ئېرىقچىلارغا چۈشكەن سانىنىڭ ئاز - كۆپلۈكىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ.




1.4.2 - رەسىم

ھەرقايسى ئېرىقچىلاردىكى شارچىلارنىڭ تەجرىبە قېتىم سانىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ تەقسىملەنىش ئەھۋالىنى تېخىمۇ ياخشى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، بىز شارچىلارنىڭ تەقسىملىنىش قانۇنىيىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تەكرارلىق تۇرغۇسىدىن تەتقىق قىلىمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن، ئېرىقچىلارنىڭ نو - مۇرىنى ئابىسېسسا، شارچىلارنىڭ ھەرقايسى ئېرىقچىلارغا چۈشۈشنىڭ تەكرارلىق قىممىتىنى ئوردىنات قىلىپ ئېلىپ، تەكرارلىقنىڭ تەقسىمات گىستوگراممىسىنى سىزىپ چىقىمىز (2.4.2 - رەسىم).



رەسىم - 2.4.2

تەكرارلاش قېتىم سانىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، بۇ تەكرارلىق گىستوگراممىسىنىڭ شەكلى بىر قوغۇراقسىمان ئەگرى سىزىققا بارغانسېرى يېقىنلىشىدۇ (3.4.2 - رەسىم).



رەسىم - 3.4.2

بۇ ئەگرى سىزىق دەل (ياكى تەقريبىي ھالدا) تۆۋەندىكى فۇنكسىيەنىڭ گرافىكى بولىدۇ:

$$\varphi_{\mu, \sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, +\infty),$$

① μ ، σ لار


گرېكچە ھەرپ بو-
لۇپ، ئايرىم - ئايرىم
[ˈsigma]، [ˈmjʊ:
ئوقۇلىدۇ.

بۇنىڭدىكى ھەقىقىي سان μ ۋە σ (① $\sigma > 0$) پارامېتىر. بىز $\varphi_{\mu, \sigma}(x)$ نىڭ گرافىكىنى نورمال تەقسىماتنىڭ زىچلىق ئەگرى سىزىقى، قىسقىچە نورمال ئەگرى سىزىق دەپ ئاتايمىز.

ئەگەر گالتون تاختىسى تەجرىبىسىدە ئەڭ تۆۋەن تەرەپتىكى ئېرىقچىلارنى چىقىرىۋېتىپ، ئۇنىڭ تۆۋەن تەرىپىنى بويلاپ بىر گوروزونتال ئوردىنات ئوقى ھاسىل قىلساق ھەمدە ئېرىقچىنىڭ كەڭلىكىنى شىكالا بىرلىكى قىلىپ ئېلىپ، چۈشكەن شارچىنىڭ گالتون تاختىسىنىڭ تۆۋەن قىسمى بىلەن 1 - قېتىم تېگىشكەن چاغدىكى كوئوردىناتنى X بىلەن ئىپادىلىسەك، ئۇ ھالدا X بىر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىنتېرۋال $[a, b]$ غا چۈشۈش ئېھتىماللىقى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$P(a < X \leq b) \approx \int_a^b \varphi_{\mu, \sigma}(x) dx.$$

بۇ ئىپادە بىزگە شۇنى بىلدۈرىدۇكى، نورمال ئەگرى سىزىق، $(a, 0)$ ، $(b, 0)$ ئىككى نۇقتىدىن ئۆتكەن ھەمدە x ئوققا تىك بولغان ئىككى تۈز سىزىق ۋە x ئوق بىلەن قورشالغان تەكشىلىك شەكلىنىڭ يۈزى (4.4.2 - رەسىمدىكى تۈتۈك قىسمىنىڭ يۈزى) دەل X نىڭ ئىنتېرۋال $[a, b]$ غا چۈشۈش ئېھتىماللىقىنىڭ تەقريبىي قىممىتى بولىدۇ.



رەسىم - 4.4.2

ئومۇمەن، ئەگەر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X ھەرقانداق ھەقىقىي سان $a < b$ غا نىسبەتەن

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b \varphi_{\mu, \sigma}(x) dx,$$

نى قانائەتلەندۈرسە، ئۇ ھالدا X نىڭ تەقسىماتى نورمال تەقسىمات (normal distribution) دەپ ئاتىلىدۇ. نورمال تەقسىماتنى پارامېتىر μ ۋە σ ئارقىلىق تامامەن ئېنىقلاشقا بولىدۇ، شۇڭا ئۇ ئادەتتە $N(\mu, \sigma^2)$ قىلىپ يېزىلىدۇ. ئەگەر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نورمال تەقسىماتقا بويسۇنسا، ئۇ ھالدا ئۇ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ قىلىپ يېزىلىدۇ.

تەجرىبىلەر ئىسپاتلىدىكى، ئەگەر بىر تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار كۆپلىگەن، ئۆزئارا ئالاقىسى بولمىغان، مۇھىم، مۇھىم ئەمەس دەپ ئايرىلمىغان تاسادىپىي ئامىللار تەسىرىنىڭ نەتىجىلىرىنىڭ يىغىندىسى بولسا، ئۇ ھالدا ئۇ نورمال تەقسىماتقا بويسۇنىدۇ ياكى تەقريبىي بويسۇنىدۇ. مەسىلەن، گالتون تاختىسى تەجرىبىسىدە، شارچە چۈشۈش جەريانىدا كۆپلىگەن ياغاچ پارچىلىرىغا سوقۇلىدۇ، ھەر قېتىملىق سوقۇلۇش نەتىجىسىدە تاسادىپىي ھالدا سولدىن ياكى ئوڭدىن تۆۋەنگە چۈشىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، شارچىنىڭ گالتون تاختىسىنىڭ تۆۋەن قىسمى بىلەن 1 - قېتىم تېز.

① پارامېتىر μ تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار قىممىتىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيىسىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان خاراكتېرلىك گۈچى سان بولۇپ، ئۇنى ئەۋرىشىشنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىدىن پايدىلىنىپ مۆلچەرلىگىلى بولىدۇ؛ σ بولسا تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئومۇمىي جەھەتتىن تەۋرىنىشىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى ئۆلچەيدىغان خاراكتېرلىك گۈچى سان بولۇپ، ئۇنى ئەۋرىشىشنىڭ ئۆلچەملىك ئايرىمىسىدىن پايدىلىنىپ مۆلچەرلىگىلى بولىدۇ.

فرانسىيىلىك ماتېماتىكا ئالىمى دې موۋر 1733 - يىلى $n!$ نىڭ تەقريبىي فورمۇلىسىدىن پايدىلىنىپ نورمال تەقسىماتنى كەلتۈرۈپ چىقارغانىدى. كېيىن، گېرمانىيىلىك ماتېماتىكا ئالىمى گاۋس خاتالىق پەرقىنى ئۆلچەشنى تەتقىق قىلغاندا نورمال تەقسىماتنى باشقا بىر تۈرۈمدىن كەلتۈرۈپ چىقاردى ھەمدە ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتىنى تەتقىق قىلدى. شۇڭا، كىشىلەر نورمال تەقسىماتنى گاۋس تەقسىماتى دەپمۇ ئاتايدۇ.

گشكەن چاغدىكى كۆرۈنۈشنى X كۆپلىگەن تاسادىپىي سوقۇلۇشلارنىڭ نەتىجىسى بولۇپ، ئۇ نورمال تەقسىماتقا تەقربىي بويىنىدۇ.

رېئال تۇرمۇشتىكى نۇرغۇن تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارلار نورمال تەقسىماتقا بويىنىدۇ ياكى تەقربىي بويىنىدۇ. مەسىلەن، ئۇزۇنلۇق ئۆلچەشتىكى خاتالىق پەرقى؛ مەلۇم رايوندىكى تەڭ ياشلىق ئا. دەملەر توپىنىڭ بوي ئېگىزلىكى، بەدەن ئېغىرلىقى، ئۆپكەسىنىڭ نەپەس ئېلىش سىغىمچانلىقى قاتار. لىقلار؛ مۇئەييەن شارائىتتا ئۆسكەن بۇغداينىڭ تۈپ ئېگىزلىكى، باشقا ئۇزۇنلۇقى، بىرلىك مەھسۇلات مىقدارى قاتارلىقلار؛ نورمال ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىدىكى ھەر خىل مەھسۇلاتلارنىڭ سۈپەت كۆرسەت. كۈچى (مەسىلەن، دېتالنىڭ ئۆلچىمى، تالانىڭ ئىنچىكىلىكى، كوندېنساتورنىڭ ئېلېكتر سىغىمچانلىقى، ئېلېكترون لامپىسىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۆمرى قاتارلىقلار)؛ مەلۇم جاينىڭ ھەر يىلى 7 - ئايدىكى ئوتتۇرىچە تېمپېراتۇرىسى، ئوتتۇرىچە نەملىكى، ھۆل - يېغىن مىقدارى قاتارلىقلار. شۇنىڭ ئۈچۈن، نورمال تەقسىمات تەبىئىي ھادىسە، ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇش ئەمەلىيىتىدە كەڭ مەۋجۇت بولۇپ، ئېھتىماللىق ۋە ستاتىستىكىدا مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەيدۇ.

مۇلاھىزە؟

4.4.2 - رەسىمنى كۆزىتىڭ، ئاندىن $\varphi_{\mu, \sigma}(x)$ نىڭ ئانالىتىك ئىپادىسى ۋە ئېھتىماللىقنىڭ خۇسۇسىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، نورمال ئەگرى سىزىقنىڭ ئالاھىدىلىكىنى سۆزلەپ بېرىڭ.

بايقاشقا بولىدۇكى، نورمال ئەگرى سىزىق تۆۋەندىكىدەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە:


- (1) ئەگرى سىزىق x نۇقتىنىڭ يۇقىرى تەرىپىدە ياتىدۇ ھەمدە x ئوق بىلەن كېسىشمەيدۇ؛
- (2) ئەگرى سىزىق يەككە چوققىلىق بولۇپ، تۈز سىزىق $x = \mu$ غا نىسبەتەن سىممېترىك؛
- (3) ئەگرى سىزىق $x = \mu$ ئورۇندا چوققا قىممەت $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ گە ئېرىشىدۇ؛
- (4) ئەگرى سىزىق بىلەن x ئوق ئارىسىدىكى يۈزنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى 1 گە تەڭ.

ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ قوللىنىلىشى




نورمال ئەگرى سىزىقنىڭ μ ۋە σ نىڭ ئۆزگەرىشىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىش ئالاھىدىلىكىنى كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىش

نورمال تەقسىماتنى μ ۋە σ ئارقىلىق تامامەن ئېنىقلاشقا بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، نورمال ئەگرى سىزىقنىڭ ئالاھىدىلىكىنى μ ۋە σ نىڭ ئۆزگىرىشىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق تونۇيالايمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن، ئاۋۋال σ نىڭ قىممىتىنى مۇقىم قىلىپ، μ ئوخشاش بولمىغان قىممەتلەرنى ئالغاندىكى گرافىكىنى سىزىمىز (5.4.2 - رەسىم (1))؛ ئاندىن μ نىڭ قىممىتىنى مۇقىم قىلىپ، σ ئوخشاش بولمىغان قىممەتلەرنى ئالغاندىكى گرافىكىنى سىزىمىز (5.4.2 - رەسىم (2)).



(1)



(2)

رەسىم 5.4.2 -

يۇقىرىقى جەرياندىن يەنە نورمال ئەگرى سىزىقنىڭ تۆۋەندىكى ئالاھىدىلىكلىرىنى بايقىيالايمىز:


(5) σ مۇقىم بولغاندا، ئەگرى سىزىق μ نىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگەشكەن ھالدا x ئوقىنى بويلاپ پاراللېل يۆتكىلىدۇ؛

(6) μ مۇقىم بولغاندا، ئەگرى سىزىقنىڭ شەكلى σ تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. σ قانچىكى كىچىك بولسا، ئەگرى سىزىق شۇنچە «ئورۇق ھەم ئېگىز» بولىدۇ، بۇ، ئومۇمىي گەۋدىنىڭ تەقسىماتى شۇنچە مەركەزلىشىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ؛ σ قانچىكى چوڭ بولسا، ئەگرى سىزىق شۇنچە «پاكار ھەم سېمىز» بولىدۇ، بۇ، ئومۇمىي گەۋدىنىڭ تەقسىماتى شۇنچە تارقاق بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

ئەمدى مۇھاكىمىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرىمىز. ئەگەر $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ بولسا، ئۇ ھالدا ھەرقانداق ھەقىقىي سان $a > 0$ گە نىسبەتەن، ئېھتىماللىق

$$P(\mu - a < X \leq \mu + a) = \int_{\mu-a}^{\mu+a} \varphi_{\mu, \sigma}(x) dx$$


6.4.2 - رەسىمدىكى تۇتۇق قىسمىنىڭ يۈزىدىن ئىبارەت بولۇپ، μ بىلەن a مۇقىم بولغاندا، بۇ يۈز σ نىڭ كىچىكلىشىگە ئەگىشىپ چوڭىيىپ بارىدۇ. بۇ، σ قانچىكى كىچىك بولسا، X نىڭ ئىنتېرۋال $[\mu - a, \mu + a]$ غا چۈشۈش ئېھتىماللىقى شۇنچە چوڭ بولىدىغانلىقى، يەنى X نىڭ μ ئەتراپىغا مەركەزلىشىش ئېھتىماللىقى شۇنچە چوڭ بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.



رەسىم 6.4.2 -

ئالاھىدە ئەھۋالدا:

$$\begin{aligned} P(\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma) &= 0.6826, \\ P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) &= 0.9544, \\ P(\mu - 3\sigma < X \leq \mu + 3\sigma) &= 0.9974. \end{aligned}$$




رەسىم 7.4.2

كۆرەلەيمىزكى، نورمال ئومۇمىي گەۋدىنىڭ قىممەت ئېلىشى ھامان ئىنتېرۋال $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ ئىچىدە دېگۈدەكلا بولىدۇ. ئۇنىڭ بۇ ئىنتېرۋالنىڭ سىرتىدا قىممەت ئېلىش ئېھتىماللىقى 0.0026 بولۇپ، ئادەتتە بۇ خىل ئەھۋالنىڭ بىر قېتىملىق تەجرىبىدە يۈز بېرىشى مۇمكىن ئەمەس دېيەر-لىكلا بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ.

ئەمەلىي قوللىنىشلاردا، ئادەتتە نورمال تەقسىمات $N(\mu, \sigma^2)$ غا بويسۇنىدىغان تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X پەقەت $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ ئارىلىقىدىكى قىممەتلەرنىلا ئالىدۇ دەپ قا-رىلىدۇ ھەمدە بۇ قاراش 3σ پرىنسىپى دەپ ئاتىلىدۇ.

مەشىق



(1 - مىسال ئۈچۈن)

1. مەلۇم رايوندىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ماتېماتىكا ئىمتىھان نەتىجىسى X نورمال تەقسىماتقا بويسۇنىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ زىچلىق فۇنكسىيە ئەگرى سىزىقى رەسىمىدىكىدەك بولسا، X نىڭ ئىند-تېرۋال $[52, 68]$ دا بولۇش ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟
2. نورمال تەقسىماتقا بويسۇنىدىغان تاسادىپىي ھادىسىگە دائىر ئەمەلىي مىسالدىن ئىككىنى كەلتۈرۈڭ.
3. ئەگەر $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ بولسا، X نىڭ ساھە $[\mu, \mu + \sigma]$ دا بولۇش ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟

ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ

قوللىنىلىشى




μ ۋە σ نىڭ نورمال تەقسىماتقا تەسىرى

پارامېتىر μ ۋە σ نىڭ نورمال ئەگرى سىزىققا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى «گېئومېتىرىيىلىك سىزىش تاختىسى» دىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلالايمىز. مەشغۇلات باسقۇچلىرى تۆۋەندىكىچە:

(1) ئوققا تىك قىلىپ بىر تۈز سىزىق ئۆتكۈزۈمىز ھەمدە بۇ تۈز سىزىق ئۈستىدىن خالىغان بىر A نۇقتىنى ئېلىپ، پارامېتىر μ نىڭ ئۆزگىرىشىنى A نۇقتىنىڭ ئوردىناتى بىلەن كونترول قىلىمىز؛

(2) ئوق x ئۈستىدىكى بىر نۇقتا ئارقىلىق x ئوققا تىك قىلىپ بىر نۇر ئۆتكۈزۈمىز ھەمدە بۇ نۇر ئۈستىدىن خالىغان بىر B نۇقتىنى ئېلىپ، پارامېتىر σ نىڭ ئۆزگىرىشىنى B نۇقتىنىڭ ئوردىناتى بىلەن كونترول قىلىمىز؛



(3) فۇنكسىيەنىڭ ئانالىتىك ئىپادىسى $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ نى كىرگۈزۈپ، $f(x)$ فۇنكسىيەسى.

يېنىڭ گرافىكىنى سىزىمىز؛

(4) A, B نۇقتىلارنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، نورمال ئەگرى سىزىقىنىڭ پارامېتىر μ, σ لار ئالغان قىممەتلەرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىش ئەھۋالىنى كۆزەتكىلى بولىدۇ.

4.2 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. تۆۋەندە ئۆلچەملىك نورمال تەقسىمات زىچلىق فۇنكسىيەسى بېرىلدى:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1) $f(x)$ نىڭ جۈپ فۇنكسىيە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاڭ؛

(2) $f(x)$ نىڭ ئەڭ چوڭ قىممىتىنى تېپىڭ؛

(3) $f(x)$ نىڭ ئېشىش - كېمىيىشچانلىقىنى كۆرسەتكۈچلۈك فۇنكسىيەنىڭ خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرۈڭ.

2. سودا سارىيىدىكى مەلۇم خىل خالتىلىق گۇرۇپپىنىڭ ماسسىسى نورمال تەقسىمات $N(10, 0.1^2)$ غا بويسۇندۇ.

دۇ (بىرلىكى: kg). مۇشۇ خىل گۇرۇپپىنىڭ خالىغان بىر خالتىسىنى تاللىغاندا، ئۇنىڭ ماسسىسى $9.8 \sim 10.2$ kg ئارىلىقىدا بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقى قانچە بولىدۇ؟


B گۇرۇپپا

1. ئەگەر $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ بولۇپ، a ھەقىقىي سان بولسا، $P(X=a)=0$ نى ئىسپاتلاڭ.

2. ئەگەر $X \sim N(5, 1)$ بولسا، $P(6 < X < 7)$ نى تېپىڭ.

خۇلاسە

I بۇ بابتىكى بىلىملەرنىڭ قۇرۇلما رامكىسى



II ئەسلىش ۋە مۇلاھىزە

1. تاسادىپىي ھادىسىنىڭ نەتىجىسىنى مىقدارلاشتۇرۇش، يەنى تاسادىپىي ھادىسىنىڭ نەتىجىسىنى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار بىلەن ئىپادىلەش بىزنىڭ تاسادىپىي ھادىسىنىڭ نەتىجىسىنى ماتېماتىك كىلىق قورال (مەسىلەن، فۇنكسىيە، ئىنتېگرال قاتارلىقلار) دىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشىمىزغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىدۇ. بىر تاسادىپىي ھادىسىنى تەتقىق قىلىشتا، شۇ تاسادىپىي ھادىسىنىڭ كۆرۈلۈشى مۇمكىن بولغان بارلىق نەتىجىلىرىنى ۋە ھەر بىر نەتىجىنىڭ كۆرۈلۈش ئېھتىماللىقىنى بىلىۋېلىش مەقسەت قىلىنىدۇ. تەقسىمات جەدۋىلى دېسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار ئىپادىلىگەن تاسادىپىي ھادىسىنىڭ ئېھتىماللىق قانۇنىيىتىنى سۈرەتلەپ بېرەلەيدۇ. سىز دېسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا دائىر بەزى ئەمەلىي مىساللارنى كەلتۈرەلەمسىز؟ ئۇلارنىڭ تەقسىمات جەدۋىلىنى تۈزلەمسىز؟

2. ھېپېرگېئومېتىرىيلىك تەقسىمات ۋە ئىككى ئەزالىق تەقسىمات ئىنتايىن مۇھىم ھەم قوللىنىلىشى ناھايىتى كەڭ ئىككى ئېھتىماللىق مودېلى بولۇپ، ئەمەلىي تۇرمۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيىتىدىكى نۇرغۇن مەسىلىلەرنى مۇشۇ ئىككى ئېھتىماللىق مودېلىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلغىلى بولىدۇ.

(1) ھېپېرگېئومېتىرىيلىك تەقسىمات ۋە ئۇنىڭ كەلتۈرۈپ چىقىرىلىش جەريانىنى ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈپ چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

(2) تۆۋەندىكى باياننىڭ توغرا ئەمەلىيلىكىنى ئىككى ئەزالىق تەقسىماتتىن ئىبارەت ئېھتىماللىق مودېلىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرەلەمسىز؟

«سۈپىتى تەكشى بولغان بىر مېتال پۇلىنى تاسادىپىي تاشلىغاندىكى ئوڭ چۈشۈش ئېھتىماللىقى 0.5 بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، مۇشۇنداق بىر مېتال پۇلىنى 100 قېتىم تاشلىغاندا، 50 قېتىم ئوڭ چۈشۈشنىڭ مۇمكىنچىلىكىمۇ 0.5 بولۇشى كېرەك.»

3. دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە (ياكى مەركىزىي) ئورنىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۇنىڭ ئەۋرىشكە ئوتتۇرىچە سانى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان يېرى بار؛ دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ كۋادراتلىق ئايرىمىسى تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممەتتە مۇقىملىشىش (ياكى ئۇ-نىڭغا مەركەزلىشىش) دەرىجىسىنى سۈرەتلەپ بېرىدۇ، ئۇنىڭ ئەۋرىشكە كۋادراتلىق ئايرىمىسى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان يېرى بار. دەرسلىكتە كەلتۈرۈلگەن ئۈلگە مىسالغا تەقلىد قىلغان ھالدا، دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى ۋە كۋادراتلىق ئايرىمىسىنىڭ رې-ئال تۈرمۈشتىكى رولىنى مىسال كەلتۈرۈپ چۈشەندۈرەلەمسىز؟

4. ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيىتى ۋە ئەمەلىي تۈرمۈشتا، نۇرغۇن تاسادىپىي ھادىسىلەر نورمال تەقسىم-ماتقا بويىسۇنىدۇ ياكى تەقربىي بويىسۇنىدۇ، شۇڭا نورمال تەقسىماتنىڭ قوللىنىلىشى ناھايىتى كەڭ. (1) نورمال ئەگرى سىزىقنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، بىر نورمال ئەگرى سىزىقنىڭ دەسلەپكى شەكلىنى سىزىپ چىقالامسىز؟

(2) تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچىڭىزدىن سوراڭ، ئۆز يىللىقىڭىزدىكى ساۋاقداشلىرىڭىزنىڭ بوي ئېگىزلىك-كىگە دائىر سانلىق مەلۇمات ماتېرىياللىرىنى توپلاڭ، ئاندىن دەرسلىكتىكى ئۇسۇلغا تەقلىد قىلغان ھالدا، يىللىقىڭىزدىكى ساۋاقداشلىرىڭىزنىڭ بوي ئېگىزلىكى نورمال تەقسىماتقا تەقربىي بويىسۇنىدىغان-بويىسۇنمايدىغانلىقىنى تەتقىق قىلىڭ. ئەگەر بويىسۇنسا، پارامېتىر μ نىڭ قىممىتىنى مۆلچەرلەڭ.

تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى

A گۇرۇپپا

1. دىسكرىت تىپلىق تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ تەقسىمات جەدۋىلى

X	0	1	2
P	0.5	$1-2p$	q^2

بولسا، ئۇ ھالدا تۇراقلىق سان $q =$ _____.

2. تاسادىپىي ئۆزگەرگۈچى مىقدار X نىڭ مۇمكىن بولغان بارلىق قىممەت 1، 2، ...، n لارنى ئېلىش مۇمكىنچىلىكى ئۆزئارا تەڭ ھەمدە X نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى 50.5 بولسا، n نىڭ قىممىتىنى تېپىڭ.
3. ھەربىر زەمبىرەك بىلەن بىر قېتىم ئوق ئاتقاندىكى نىشانغا تەڭگۈزۈش ئېھتىماللىقى 0.3 ئىكەنلىكى بېرىلگەن، مەلۇم بىر نىشانغا ئوق تەڭگۈزۈش ئېھتىماللىقىنى 95% تىن ئاشۇرۇش ئۈچۈن، مۇشۇنداق قانچە زەمبىرەك بىلەن نىشانغا قارىتىپ تەڭلا بىر قېتىمدىن ئوق ئېتىش كېرەك؟ نىشانغا تەڭگۈزۈش ئېھتىماللىقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ھەققىدىكى قاراشلىرىڭىزنى سۆزلەپ بېقىڭ.

4. مەلۇم سودا سارىيى ئۆكتەبىر بايرىمىدا سېتىشنى تېزلىتىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلمەكچى بولۇپ، پائالىيەتنىڭ ساراي ئىچكى ياكى سىرتىدا ئۇيۇشتۇرۇلۇشىنى ھاۋا رايىدىن ئالدىن بېرىلگەن مەلۇماتقا ئاساسەن بېكىتمەكچى بولدى. ستاتىستىكا ماتېرىياللىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ھەريىلى ئۆكتەبىر بايرىمىدا سېتىشنى تېزلىتىش پائالىيىتى ساراي ئىچىدە ئۆتكۈزۈلسە پايدىسى 20 مىڭ يۈەن بولىدىكەن؛ ساراي سىرتىدا ئۆتكۈزۈلگەندە، شۇ كۈنى يامغۇر ياغمىسا پايدىسى 100 مىڭ يۈەن، يامغۇر يېغىپ قالسا زىيىنى 40 مىڭ يۈەن بولىدىكەن. 9 - ئاينىڭ 30 - كۈنى ھاۋا رايى ئىستانسىسى بايرام كۈنى شۇ جايدا يامغۇر يېغىش ئېھتىماللىقى 40% دەپ ئالدىن مەلۇمات بەرگەن بولسا، سودا سارىيى قايسى خىل سېتىشنى تېزلىتىش شەكلىنى قوللىنىشى كېرەك؟

B گۇرۇپپا

1. مەلۇم خىل تاسادىپىي زەخمىلەندۈرۈش سۇغۇرتا پۇلىنىڭ بىر كىشىلىكى 20 يۈەن بولۇپ، ئۇنىڭ سۇغۇرتا تۆلەم سوممىسى 450 مىڭ يۈەن. مەلۇم شەھەردىكى بىر سۇغۇرتا شىركىتى بىر يىلدا مۇشۇ خىل سۇغۇرتا ھۆججىتىدىن 100 مىڭ كىشىلىك ساتىدۇ، بۇنىڭ پۇل تۆلەش ئېھتىماللىقى 10^{-6} . نۆۋەندىكىلەرنى مۇۋاپىق ئۇسۇل تاللاپ ھەم كومپيۇتېر ياكى ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ تېپىڭ:

- (1) بۇ سۇغۇرتا شىركىتىنىڭ زىيان تارتىش ئېھتىماللىقى؛
- (2) بۇ سۇغۇرتا شىركىتىنىڭ بىر يىل ئىچىدىكى پايدىسىنىڭ 110 000 0 يۈەندىن ئاز بولماسلىق ئېھتىماللىقى (ئون مىڭى بىرلىك قىلىپ ھېسابلىشىڭىز ئاسانراق بولىدۇ).
2. $X \sim N(1, 1)$ دەپ پەرەز قىلىپ $P(3 < X \leq 4)$ نى تېپىڭ.
3. $X \sim N(\mu, 1)$ دەپ پەرەز قىلىپ، $P(\mu - 3 < X \leq \mu - 2)$ نى تېپىڭ.