


2005 - يىلى مەملىكەتلىك ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتۇش ماتېرىياللىرىنى
تەكشۈرۈپ بېكىتىش كومىتېتىنىڭ دەسلەپكى تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن

ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ دەرس ئۆلچىمى تەجرىبە دەرسلىكى

ماتېماتىكا

تاللىما دەرسلىك 1 - 2



شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتى



者: 米吉提·卡地儿	مىجىت قادىر	تەرجىمانى:
热米拉·阿布都热西提	رەمىلە ئابدۇرېشىت	
审: 热夏提·帕尔萨	رىشات پەرسا	مۇھەررىرى:
编: 吾尔卡西·阿布都热依木	ئۆركەش ئابدۇرېھىم	مەسئۇل مۇھەررىرى:
对: 热依拉·阿布莱提	راھىلە ئابلەت	مەسئۇل كوررېكتورى:

普通高中课程标准实验教科书

数 学

选修 2-1

A 版

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

中学数学课程教材研究开发中心

(维吾尔文)

*

شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتى تەرجىمە ۋە نەشر قىلدى

<http://www.xjjycbs.com>

شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى تارقاتتى

شىنجاڭ بىڭتۇەن باسما زاۋۇتى باستى

شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتى كومپيۇتېر مەركىزى تىزدى

*

فورماتى: 890 × 1240, 1/16؛ باسما تاۋىقى: 9

2009 - يىل 6 - ئاي 1 - نەشرى

2010 - يىل 6 - ئاي 2 - بېسىلىشى

تراژى: 1 — 11 400

ISBN 978 — 7 — 5370 — 7295 — 3

باھاسى: 8.22 يۈەن

نەشر ھوقۇقى بىزدە، باشقىلارنىڭ كۆپەيتىپ بېسىشىغا بولمايدۇ.

بېسىش - تۈزلەش سۈپىتىدە مەسىلە كۆرۈلسە ئالماشتۇرۇپ بېرىلىدۇ.

ئادرېس: ئۈرۈمچى شەھىرى غالىبىيەت يولى 187 - نومۇر

پوچتا نومۇرى: 830049؛ تېلېفون نومۇرى: 2863761, 2870654 (0991)

مۇندەرىجە

1 - باب. كۆپ قوللىنىلىدىغان لوگىكىلىق ئاتالغۇلار 1...

- 1 - 1. ھۆكۈملۈك ۋە ھۆكۈملۈكلەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت 2...
 11 - 2. يېتەرلىك شەرت ۋە زۆرۈر شەرت
 16 - 1. ئاددىي لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار
 ئوقۇش ۋە مۇلاھىزە «ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس» ۋە «كېسە -
 22 شىش» «بىرىكىش»، «تولدۇرۇش»
 1 - 4. ئۈنۈپرسال مىقدار سۆز ۋە مەۋجۇتلۇق مىقدار
 24 سۆز
 31 خۇلاسە
 32 تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى

2 - باب. كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى ۋە ئۇلارنىڭ

- 35 تەڭلىمىسى
 36 1 - 2. ئەگرى سىزىق ۋە ئۇنىڭ تەڭلىمىسى
 42 2 - 2. ئېللىپس
 ئىزدىنىش ۋە بايقاش كېسىش ئەگرى سىزىقى نېمە ئۈچۈن
 47 ئېللىپس بولىدۇ؟
 ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ قوللىنىلىشى «گېئومېترىيىلىك
 سىزىش تاختىسى (几何画板)» دىن پايدىلىنىپ نۇقتىنىڭ
 57 تراپىكتورىيىسى - ئېللىپس ئۈستىدە ئىزدىنىش
 59 2 - 3. ھېپېربولا

ئىزدىنىش ۋە بايقاش نېمە ئۈچۈن $y = \pm \frac{b}{a}x$ ھىپېربولا $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

71 نىڭ تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقى بولىدۇ؟

72 2 - 4. پارابولا

ئىزدىنىش ۋە بايقاش ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە

$y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى نېمە ئۈچۈن پارا-

83 بولا بولىدۇ؟

ئوقۇش ۋە مۇلاھىزە I كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ ئوپتىد-

84 كىلىق خۇسۇسىيىتى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى

II كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ مەركەزدىن قېچىش

86 دەرىجىسى ۋە بىرلىككە كەلگەن تەڭلىمىسى

88 خۇلاسە

91 تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى

3 - باب. بوشلۇقتىكى ۋېكتور ۋە ستېرېئومېتىرىيە ... 95

3 - 1. بوشلۇقتىكى ۋېكتور ۋە ۋېكتور ئەمەللىرى

ئوقۇش ۋە مۇلاھىزە ۋېكتور ئۇقۇمىنىڭ كېڭەيتىلىشى ۋە قول-

114 لىنىلىشى

3 - 2. ستېرېئومېتىرىيىدىكى ۋېكتور ئۇسۇلى

131 خۇلاسە

133 تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى



1 - باب

كۆپ قوللىنىلىدىغان لوگىكىلىق ئاتالغۇلار

1-1 ھۆكۈملۈك ۋە ھۆكۈملۈكلەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت

2-1 يېتەرلىك شەرت ۋە زۆرۈر شەرت

3-1 ئاددىي لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار

4-1 ئۈنۋېرسال مىقدار سۆز ۋە مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز

بىزنىڭ كۈندىلىك ئالاقىمىز، ئۆگىنىش ۋە خىزمىتىمىزدە لوگىكىلىق ئاتالغۇلار كەم بولسا بولمايدىغان قورال دۇر. لوگىكىلىق ئاتالغۇلارنى توغرا قوللىنىش ھازىرقى جەمئىيەت پۇقرالىرى ھازىرلاشقا تېگىشلىك ئاساسىي ساپادۇر.

ماتېماتىكا لوگىكىلىقى كۈچلۈك پەن بولۇپ، ماتېماتىكىلىق ئۇقۇم ۋە يەكۈنلەرنى بايان قىلىش، خۇلاسە چىقىرىش ۋە ئىسپاتلاشلاردا لوگىكىلىق ئاتالغۇلار قوللىنىلىدۇ. كۆپ قوللىنىلىدىغان بەزىبىر لوگىكىلىق ئاتالغۇلارنى ئۆگىنىۋالساق، ماتېماتىكىلىق ئۇقۇملارنى توغرا چۈشىنىشىمىز، ماتېماتىكىلىق يەكۈنلەرنى ئىسپات قىلگە مۇۋاپىق ئىسپاتلىشىمىز ۋە ماتېماتىكىلىق مەزمۇنلارنى توغرا بايان قىلىشىمىزغا ياردەمى تېگىدۇ.

بۇ بابتا، ھۆكۈملۈك ۋە تۆت خىل ھۆكۈملۈك ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت، يېتەرلىك شەرت ۋە زۆرۈر شەرت، ئاددىي لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار، ئۈنۋېرسال مىقدار سۆز ۋە مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز قاتارلىق ئاساسىي بىلىملەرنى ئۆگىنىمىز. كۆپ قوللىنىلىدىغان لوگىكىلىق ئاتالغۇلارنى ئۆگىنىش ۋە ئىشلىتىش، كۆپ قوللىنىلىدىغان لوگىكىلىق ئاتالغۇلارنى ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى ئىگىلەش ۋە لوگىكىلىق خاتالىقلارنى تۈزىتىش ئارقىلىق، ماتېماتىكىلىق مەزمۇنلارنى كۆپ قوللىنىلىدىغان لوگىكىلىق ئاتالغۇلاردىن پايدىلىنىپ بايان قىلىشنىڭ توغرىلىقىنى ھەم ئىخچاملىقىنى ھېس قىلالايمىز.



1

لوگىكا تەپەككۇر شەكلى ۋە
ئۇنىڭ قانۇنىيىتىنى تەتقىق قىلىدۇ.
غان پەن؛ «ماتېماتىكا تەپەككۇرنى
ئاساس قىلىدىغان پەن». لوگىكا بىلەن
ماتېماتىكىنىڭ باغلىنىشى تەبىئىي
باغلىنىشتۇر.

ھۆكۈملۈك ۋە ھۆكۈملۈكلەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت

1-1

ھۆكۈملۈك 1-1-1

مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى جۈملىلەرنىڭ بايان قىلىنىش شەكلى قانداق ئالاھىدىلىككە ئىگە؟ ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلالامسىز؟

(1) ئەگەر تۈز سىزىق $a \parallel b$ بولسا، ئۇ ھالدا a تۈز سىزىق بىلەن b تۈز سىزىقنىڭ ئورتاق نۇقتىسى يوق بولىدۇ؛

(2) $2+4=7$;

(3) ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ئىككى تەكشىلىك پاراللېل بولىدۇ؛

(4) ئەگەر $x^2=1$ بولسا، ئۇ ھالدا $x=1$ بولىدۇ؛

(5) ئۆزئارا تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭنىڭ يۈزلىرى تەڭ بولىدۇ؛

(6) 3 بولسا 2 گە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ.

بۇلاردىن كۆرەلەيمىزكى، بۇ جۈملىلەرنىڭ ھەممىسى بايان جۈملىلىرى بولۇپ، ئۇلارنىڭ توغرا - نا - توغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى (1)، (3)، (5) جۈملىلىرى توغرا، (2)، (4)، (6) جۈملىلىرى ناتوغرا.

ئۆزگەرگۈچى مىقدارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈك (مەسىلەن، يۇقىرىقى «مۇلاھىزە» دىكى (4) لەردە، ئەگەر ئۆزگەرگۈچى مىقدارنىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسى R بولسا، ئۇنى يازمىساقمۇ بولىدۇ. كېيىن، ئۆزگەرگۈچى مىقدارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈكنى مەخسۇس مۇھاكىمە قىلىمىز.

ئومۇمەن، ماتېماتىكىدا سۆز، بەلگە ياكى ئىپادە بىلەن ئىپادىلەنگەن، توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدىغان بايان جۈملىلىرى ھۆكۈملۈك (proposition) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدە، توغرا دەپ ھۆكۈم قىلىنغان جۈملىلە توغرا ھۆكۈملۈك (true proposition)، ناتوغرا دەپ ھۆكۈم قىلىنغان جۈملىلە ناتوغرا ھۆكۈملۈك (false proposition) دەپ ئاتىلىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن، يۇقىرىقى جۈملىلىرى ئىچىدىكى (1)، (3)، (5) جۈملىلىرى توغرا ھۆكۈملۈك، (2)، (4)، (6) جۈملىلىرى ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

① 1 دىن چوڭ
ھەمدە 1 بىلەن ئۆزىدە
دىن باشقا مۇسبەت
كۆپەيتكۈچىسى بول-
مىغان پۈتۈن سان.

1 - مىسال. تۆۋەندىكى جۈملىلەرنىڭ قايسىلىرى ھۆكۈملۈك؟ ئۇلار توغرا ھۆكۈملۈكمۇ ياكى ناتوغرا ھۆكۈملۈكمۇ؟

- (1) بوش توپلام ھەرقانداق توپلامنىڭ قىسمى توپلىمى بولىدۇ؛
- (2) ئەگەر پۈتۈن سان a تۈپ سان ① بولسا، ئۇ ھالدا a تاق سان بولىدۇ؛
- (3) كۆرسەتكۈچلۈك فۇنكسىيە ئاشقۇچى فۇنكسىيەمۇ؟
- (4) ئەگەر بوشلۇقتىكى ئىككى تۈز سىزىق ئۆزئارا كېسىشمەسە، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ؛

$$(5) \sqrt{(-2)^2} = 2;$$

$$(6) x > 15.$$

تەھلىل: بىر جۈملىنىڭ ھۆكۈملۈك بولۇش - بولماسلىقىغا ھۆكۈم قىلىشتا، ئۇنىڭ «بايان جۈملە بولۇش» ۋە «توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولۇش» تىن ئىبارەت ئىككى شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدەن - كەلمەيدىغانلىقىغا قاراش كېرەك.

يېشىش: يۇقىرىقى ئالتە جۈملە ئىچىدە، (3) جۈملە بايان جۈملە ئەمەس، شۇڭا ئۇ ھۆكۈملۈك ئەمەس؛ (6) جۈملە بايان جۈملە بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ، شۇڭا ئۇمۇ ھۆكۈملۈك ئەمەس؛ قالغان تۆت جۈملىنىڭ ھەممىسى بايان جۈملە ھەمدە ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ، شۇڭا ئۇلارنىڭ ھەممىسى ھۆكۈملۈك، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى (1) بىلەن (5) توغرا ھۆكۈملۈك، (2) بىلەن (4) ناتوغرا ھۆكۈملۈك.

بۇ خىل شەكىلدىكى ھۆ-
كۈملۈكنى يەنە «پەقەت p
بولسا، q بولىدۇ»، « p بولسا،
ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شە-
كىللەردە يېزىشقىمۇ بولىدۇ.

شۇنى ئاسانلا كۆرۈۋالالايمىزكى، 1 - مىسالدىكى (2) ۋە (4) ھۆكۈملۈك

«ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بېرىلگەن. بۇ بابتا، بىز پەقەت مۇشۇ خىل شە-
كىلدىكى ھۆكۈملۈكلەرنىلا مۇھاكىمە قىلىمىز.

ئادەتتە، بۇ خىل شەكىلدە بېرىلگەن ھۆكۈملۈكلەردىكى p نى ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى، q نى ھۆكۈملۈكنىڭ يەكۈنى دەيمىز.

2 - مىسال. تۆۋەندە بېرىلگەن ھۆكۈملۈكلەردىكى شەرت p بىلەن يەكۈن q نى كۆرسىتىپ بېرىلى:

- (1) ئەگەر پۈتۈن سان a نى 2 گە پۈتۈن بۆلگىلى بولسا، ئۇ ھالدا a جۈپ سان بولىدۇ؛
- (2) ئەگەر بىر تۆت تەرەپلىك رومبا بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك ھەمدە بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ.

يېشىش: (1) دىكى شەرت p : پۈتۈن سان a نى 2 گە پۈتۈن بۆلگىلى بولىدۇ، يەكۈن q : پۈتۈن سان a جۈپ سان بولىدۇ.

(2) دىكى شەرت p : تۆت تەرەپلىك رومبا، يەكۈن q : تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك ھەمدە بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ.

ماتېماتىكىدا «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە كەلمىگەن ھۆكۈملۈكلەرمۇ بار،

مەسىلەن، «ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ئىككى تەكشىلىك پاراللېل بولىدۇ»، بۇنداق ھۆكۈم -
 لۈكنىڭ بايان قىلىنىشىنى مۇۋاپىق ئۆزگەرتىپ، «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە
 يېزىشقا بولىدۇ:

ئەگەر ئىككى تەكشىلىك ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى تەكشىلىك پاراللېل -
 بولىدۇ.
 بۇنداق يازغاندا، ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنى ناھايىتى ئېنىق بولىدۇ.

3 - مىسال. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە
 يازايلى ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ؛

(2) مەنپىي ساننىڭ كۈبى مەنپىي سان بولىدۇ؛

(3) قارىمۇقارشى چوققىلىق بۇلۇڭلار تەڭ بولىدۇ.

يېشىش: (1) ئەگەر ئىككى تۈز سىزىق ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى
 تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ. بۇ ناتوغرا ھۆكۈملۈك.

(2) ئەگەر بىر سان مەنپىي سان بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ساننىڭ كۈبى مەنپىي سان بولىدۇ. بۇ توغرا
 ھۆكۈملۈك.

(3) ئەگەر ئىككى بۇلۇڭ قارىمۇقارشى چوققىلىق بۇلۇڭلار بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى بۇلۇڭ تەڭ بو -
 لىدۇ. بۇ توغرا ھۆكۈملۈك.

مەشىق

1. ھۆكۈملۈككە دائىر مىساللارنى كەلتۈرۈڭ ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ.

2. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) 6 گە پۈتۈن بۆلۈنىدىغان پۈتۈن سان چوقۇم 3 كە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ؛

(2) ئەگەر بىر تۆت تەرەپلىكنىڭ تۆت تەرەپى تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ تۆت تەرەپلىك كۋادرات بولىدۇ؛

(3) ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيىنىڭ گرافىكى بىر پارابولا بولىدۇ؛

(4) ئىككى ئىچكى بۇلۇڭى 45° قا تەڭ بولغان ئۈچبۇلۇڭ تەڭ يانلىق تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ بولىدۇ.

3. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە يېزىڭ ھەم ئۇلارنىڭ

توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) تەڭ يانلىق ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىككى يېنىدىكى مېدىئانلار تەڭ بولىدۇ؛

(2) جۈپ فۇنكسىيىنىڭ گرافىكى y ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ؛

(3) ئوخشاش بىر تەكشىلىككە تىك بولغان ئىككى تەكشىلىك پاراللېل بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

تۆۋەندە بېرىلگەن تۆت ھۆكۈملۈك ئىچىدىكى (1) ھۆكۈملۈك بىلەن (2)، (3)، (4) ھۆكۈملۈكلەرنىڭ شەرتى ۋە يەكۈنى ئارىسىدا ئايرىم - ئايرىم قانداق مۇناسىۋەت بار؟

- (1) ئەگەر $f(x)$ سىنىق فۇنكسىيە بولسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولىدۇ؛
- (2) ئەگەر $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ سىنىق فۇنكسىيە بولىدۇ؛
- (3) ئەگەر $f(x)$ سىنىق فۇنكسىيە بولمىسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولمايدۇ؛
- (4) ئەگەر $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولمىسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ سىنىق فۇنكسىيە بولمايدۇ.

بۇلاردىن شۇنى كۆرۈۋالالايمىزكى، (1) ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى (2) ھۆكۈملۈكنىڭ يەكۈنى ھەمدە (1) ھۆكۈملۈكنىڭ يەكۈنى (2) ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بولىدۇ، يەنى ئۇلارنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنى ئۆز - ئارا ئالماشقان.

ئومۇمەن، ئەگەر ئىككى ھۆكۈملۈك ئىچىدىكى بىر ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى ۋە يەكۈنى ئايرىم - ئايرىم يەنە بىر ھۆكۈملۈكنىڭ يەكۈنى ۋە شەرتى بولسا، ئۇ ھالدا بۇنداق ئىككى ھۆكۈملۈكنى ئۆزئارا تەتۈر ھۆكۈملۈكلەر دەيمىز. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىر ھۆكۈملۈك ئەسلىي ھۆكۈملۈك (original proposition)، يەنە بىر ھۆكۈملۈك ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى (inverse proposition) دەپ ئاتىلىدۇ. باشقىچە ئېيتقاندا، ئەگەر ئەسلىي ھۆكۈملۈك

«ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى

«ئەگەر q بولسا، ئۇ ھالدا p بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بولىدۇ.

شۇنداق قىلىپ، بېرىلگەن بىر ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنىنى ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق بىر يېڭى ھۆكۈملۈككە ئىگە بولالايمىز، ئۇ بېرىلگەن ھۆكۈملۈكنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى بولىدۇ. مەسىلەن، «بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار تەڭ بولسا، ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنىنى ئۆزئارا ئالماشتۇرساق، ئۇنىڭ «ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولسا، بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار تەڭ بولىدۇ» دېگەن تەتۈر ھۆكۈملۈككە ئىگە بولىمىز.

ئىزدىنىش



1. ئۆزئارا تەتۈر ھۆكۈملۈكلەرگە دائىر مىساللارنى كەلتۈرۈڭ ھەم ئەسلىي ھۆكۈملۈك بىلەن تەتۈر ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ.

2. ئەگەر ئەسلىي ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى چوقۇم توغرا ھۆكۈملۈك بولامدۇ؟

ھۆكۈملۈك (1) بىلەن (3) ئىچىدىكى بىر ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنى دەل يەنە بىر ھۆكۈم-
لۈك شەرتىنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ۋە يەكۈنىنىڭ ئىنكار قىلىنىشى بولىدۇ، بىز بۇنداق ئىككى ھۆكۈم-
لۈكنى ئۆزئارا ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر دەيمىز. ئەگەر ئۇلارنىڭ
ئىچىدىكى بىر ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دېسەك، ئۇ
ھالدا يەنە بىرى ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار ھۆكۈملۈكى
(negative proposition) دەپ ئاتىلىدۇ. باشقىچە ئېيتقاندا، ئەگەر
ئەسلىي ھۆكۈملۈك

«ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ ئىنكار ھۆكۈملۈكى

«ئەگەر $\neg p$ بولسا، ئۇ ھالدا $\neg q$ بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بولىدۇ.

مەسىلەن، ئەگەر «بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار تەڭ بولسا، ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ» دې-
گەن ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دېسەك، ئۇ ھالدا «بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار تەڭ بولمىسا،
ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولمايدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈك ئۇنىڭ ئىنكار ھۆكۈملۈكى بولىدۇ.
يەنە مەسىلەن، «ئەگەر پۈتۈن سان a نى 2 گە پۈتۈن بۆلگىلى بولمىسا، ئۇ ھالدا a تاق سان بولىدۇ»
دېگەن ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دېسەك، ئۇ ھالدا «ئەگەر پۈتۈن سان a نى 2 گە پۈتۈن بۆلگىلى
بولسا، ئۇ ھالدا a جۈپ سان بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈك ئۇنىڭ ئىنكار ھۆكۈملۈكى بولىدۇ.

ئىزدىنىش

1. ئۆزئارا ئىنكار ھۆكۈملۈكلەرگە دائىر مىساللارنى كەلتۈرۈڭ ھەم ئەسلىي ھۆ-
كۈملۈك بىلەن ئىنكار ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ.

2. ئەگەر ئەسلىي ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ ئىنكار ھۆكۈملۈكى چوقۇم
توغرا ھۆكۈملۈك بولامدۇ؟

ھۆكۈملۈك (1) بىلەن (4) ئىچىدىكى بىر ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنى دەل يەنە بىر ھۆ-
كۈملۈك يەكۈنىنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ۋە شەرتىنىڭ ئىنكار قىلىنىشى بولىدۇ، بىز بۇنداق ئىككى ھۆ-
كۈملۈكنى ئۆزئارا تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر دەيمىز. ئەگەر ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىر ھۆكۈملۈكنى
ئەسلىي ھۆكۈملۈك دېسەك، ئۇ ھالدا يەنە بىرى ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى
(inverse and negative proposition) دەپ ئاتىلىدۇ. باشقىچە ئېيتقاندا، ئەگەر ئەسلىي ھۆكۈملۈك

«ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى

«ئەگەر $\neg q$ بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ بولىدۇ»

دېگەن شەكىلدە بولىدۇ.

مەسىلەن، «ئەگەر بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار تەڭ بولسا، ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ» دې-
گەن ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دېسەك، ئۇ ھالدا «ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولمىسا، بىر خىل
ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار تەڭ بولمايدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈك ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى بولىدۇ.

يېزىشقا قۇلايلىق بولۇش
ئۈچۈن، ئادەتتە p شەرتىنىڭ
ئىنكار قىلىنىشى بىلەن q يە-
كۈنىنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى
ئايرىم - ئايرىم « $\neg p$ » ۋە « $\neg q$ »
قىلىپ يازىمىز ھەم « p ئەمەس» ۋە
« q ئەمەس» دەپ ئوقۇيمىز.

ئىزدىنىش

1. ئۆزئارا تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكلەرگە دائىر مىساللارنى كەلتۈرۈڭ ھەم ئەسلىي ھۆكۈملۈك بىلەن تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ.
2. ئەگەر ئەسلىي ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى چو-قۇم توغرا ھۆكۈملۈك بولامدۇ؟

ئەمدى يۇقىرىقى تۆت خىل ئەھۋالنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

«ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن (1) ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دەپ پەرەز قىل-
 ساق، ئۇ ھالدا «ئەگەر q بولسا، ئۇ ھالدا p بولىدۇ» دېگەن (2) ھۆكۈملۈك ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ تەتۈر
 ھۆكۈملۈكى بولىدۇ؛
 «ئەگەر $\neg p$ بولسا، ئۇ ھالدا $\neg q$ بولىدۇ» دېگەن (3) ھۆكۈملۈك ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار ھۆ-
 كۈملۈكى بولىدۇ؛
 «ئەگەر $\neg q$ بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ بولىدۇ» دېگەن (4) ھۆكۈملۈك ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ تەتۈر ئىنكار
 ھۆكۈملۈكى بولىدۇ.

مەشىق

تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى، ئىنكار ھۆكۈملۈكى ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈگىنى يېزىڭ
 ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) ئەگەر بىر پۈتۈن ساننىڭ ئاخىرقى خانىسىدىكى رەقەم 0 بولسا، ئۇ ھالدا بۇ پۈتۈن سان 5 كە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ؛
 (2) ئەگەر بىر ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىككى تەرىپى تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىككى بۇلۇڭى تەڭ بولىدۇ؛
 (3) تاق فۇنكسىيىنىڭ گرافىكى كوئوردىنات بېشىغا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ.

3-1-1 تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتى


مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى تۆت ھۆكۈملۈكنى كۆزىتىڭ:

(1) ئەگەر $f(x)$ سىنۇس فۇنكسىيە بولسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولىدۇ؛
 (2) ئەگەر $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ سىنۇس فۇنكسىيە بولىدۇ؛
 (3) ئەگەر $f(x)$ سىنۇس فۇنكسىيە بولمىسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولمايدۇ؛
 (4) ئەگەر $f(x)$ دەۋرىي فۇنكسىيە بولمىسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ سىنۇس فۇنكسىيە بولمايدۇ.

ھۆكۈملۈك (1) بىلەن ھۆكۈملۈك (2)، (3)، (4) ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت بىزگە مەلۇم. ئۇلار ئىچى-
 دىكى خالىغان ئىككى ھۆكۈملۈكنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

شۇنى بايقىيالايمىزكى، ھۆكۈملۈك (2) بىلەن (3) ئۆزئارا تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر، ھۆكۈملۈك (2) بىلەن (4) ئۆزئارا ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر، ھۆكۈملۈك (3) بىلەن (4) ئۆزئارا تەتۈر ھۆكۈملۈكلەردۇر. ئومۇمەن، ئەسلىي ھۆكۈملۈك، تەتۈر ھۆكۈملۈك، ئىنكار ھۆكۈملۈك ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكتىن ئىبارەت بۇ تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتى 1.1.1 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك بولىدۇ.



1.1.1 - رەسىم

يۇقىرىدا تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتىنى تەكشۈرۈپ كۆردۈق. ئۇنداق بولسا، ئۇلار - نىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشىدىمۇ بەلگىلىك مۇناسىۋەت بارمۇ؟ «مۇلاھىزە»دىكى تۆت ھۆكۈملۈكنى مىسال قىلىپ ئېلىپ، (1) ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دەپ پەرەز قىلساق، ئاسانلا ھۆكۈم قىلالايمىزكى، ئەسلىي ھۆكۈملۈك (1) توغرا ھۆكۈملۈك، ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى (2) ناتوغرا ھۆكۈملۈك، ئۇنىڭ ئىنكار ھۆكۈملۈكى (3) مۇ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولۇپ، ئۇ - نىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى (4) بولسا توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

ئىزدىنىش

1. «ئەگەر $x^2 - 3x + 2 = 0$ بولسا، ئۇ ھالدا $x = 2$ بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دەپ ئېلىپ، ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى، ئىنكار ھۆكۈملۈكى ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنى يېزىڭ ھەم بۇ ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ.
2. باشقا ھۆكۈملۈكلەرنى تەھلىل قىلىپ بېقىڭ، قېنى، ئۇنىڭدىن تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشىدا قانداق قانۇنىيەت بارلىقىنى بايقىيالايمىز؟

ئومۇمەن، تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشىدا پەقەت ۋە پەقەت تۆۋەندىكىدەك تۆت خىل ئەھۋال بار:

ئەسلىي ھۆكۈملۈك	تەتۈر ھۆكۈملۈك	ئىنكار ھۆكۈملۈك	تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈك
توغرا	توغرا	توغرا	توغرا
توغرا	ناتوغرا	ناتوغرا	توغرا
ناتوغرا	توغرا	توغرا	ناتوغرا
ناتوغرا	ناتوغرا	ناتوغرا	ناتوغرا

تەتۈر ھۆكۈملۈك بىلەن ئىنكار ھۆكۈملۈك ئۆزئارا تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر بولغانلىقتىن، تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

(1) ئىككى ھۆكۈملۈك ئۆزئارا تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر بولسا، ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشى ئوخشاش بولىدۇ؛

(2) ئىككى ھۆكۈملۈك ئۆزئارا تەتۈر ھۆكۈملۈكلەر ياكى ئۆزئارا ئىنكار ھۆكۈملۈكلەر بولسا، ئۇلار - نىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشى مۇناسىۋەتسىز بولىدۇ.

ئەسلىي ھۆكۈملۈك بىلەن ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنىڭ توغرا - ناتوغرا بولۇشى ئوخشاش بولىدىغانلىقتىن، مەلۇم بىر ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىنى بىۋاسىتە ئىسپاتلاش قىيىن بولغاندا، ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئارقىلىق ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىنى ۋاسىتىلىك ھالدا ئىسپاتلىساق بولىدۇ.

4 - مىسال. ئەگەر $x^2+y^2=0$ بولسا، ئۇ ھالدا $x=y=0$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلايلى.

تەھلىل: «ئەگەر $x^2+y^2=0$ بولسا، ئۇ ھالدا $x=y=0$ بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دەپ قارايمىز. ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشتا، ئۇنىڭ «ئە - گەر x, y لەرنىڭ كەم دېگەندە بىرى 0 بولمىسا، ئۇ ھالدا $x^2+y^2 \neq 0$ بولىدۇ» دېگەن تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئارقىلىق ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش مەقسىتىگە يەتسەك بولىدۇ.

ئىسپات: x, y لەرنىڭ كەم دېگەندە بىرى 0 ئەمەس، مەسىلەن، $x \neq 0$ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $x^2 > 0$ بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن

$$x^2+y^2 > 0,$$

يەنى $x^2+y^2 \neq 0$.

شۇڭا، ئەسلىي ھۆكۈملۈكنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ئەسلىي ھۆكۈملۈك ئۆزئارا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

مەشىق

ئەگەر $a^2-b^2+2a-4b-3 \neq 0$ بولسا، ئۇ ھالدا $a-b \neq 1$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

1.1 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. تۆۋەندىكى جۈملىلەرنىڭ ھۆكۈملۈك بولۇش - بولماسلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) $12 > 5$;

(2) ئەگەر a مۇسبەت ئىرراتسىئونال سان بولسا، ئۇ ھالدا $\sqrt{a}$ مۇ ئىرراتسىئونال سان بولىدۇ؛

(3) $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$;

(4) سىنۇس فۇنكسىيە دەۋرىي فۇنكسىيەمۇ؟

2. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى، ئىنكار ھۆكۈملۈكى ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنى يېز.

زىڭ ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) ئەگەر a, b لار جۈپ سان بولسا، ئۇ ھالدا $a+b$ جۈپ سان بولىدۇ؛

(2) ئەگەر $m > 0$ بولسا، ئۇ ھالدا تەڭلىمە $x^2 + x - m = 0$ ھەقىقىي يىلتىزغا ئىگە بولىدۇ.

3. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە يېزىڭ ھەم ئۇلارنىڭ

تەتۈر ھۆكۈملۈكى، ئىنكار ھۆكۈملۈكى ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنى يېزىپ، ئاندىن ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرا -

رىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) كېسىكنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچىسى ئۈستىدىكى بىر نۇقتىدىن بۇ كېسىكنىڭ ئىككى ئۇچىغىچە بولغان

ئارىلىقلار تەڭ بولىدۇ؛

(2) تىك تۆتبۇلۇڭنىڭ دىئاگوناللىرى تەڭ.

4. ئەگەر بىر ئۇچبۇلۇڭنىڭ ئىككى تەرىپى تەڭ بولمىسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى تەرەپنىڭ قارشىسىدىكى بۇ -

لۇڭلارمۇ تەڭ بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

B گۇرۇپپا

ئىسپاتلاڭ: چەمبەرنىڭ ئۆزئارا كېسىشكەن ئىككى خوردىسى (دىئامېتىر ئەمەس) بىر - بىرىنى تەڭ ئىك -

كىگە بۆلمەيدۇ.

$$p: a > b, q: a + c > b + c$$

$$p \Leftrightarrow q$$

2-1

يېتەرلىك شەرت ۋە زۆرۈر شەرت

يېتەرلىك شەرت ۋە زۆرۈر شەرت

1-2-1

يۇقىرىدا «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدىكى ھۆكۈملۈكلەرنى مۇھاكىمە قىلىپ ئۆتتۇق. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى توغرا ھۆكۈملۈك، بەزىلىرى ناتوغرا ھۆكۈملۈك. مەسىلەن، تۆۋەندە ئىككى ھۆكۈملۈك بېرىلگەن:

(1) ئەگەر $x > a^2 + b^2$ بولسا، ئۇ ھالدا $x > 2ab$ بولىدۇ؛

(2) ئەگەر $ab = 0$ بولسا، ئۇ ھالدا $a = 0$ بولىدۇ.

بۇلارنىڭ ئىچىدىكى (1) ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك، (2) ھۆكۈملۈك بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك. ئومۇمەن، «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا ھۆكۈملۈك بولۇشى، خۇلاسە چىقىرىش ئارقىلىق p دىن q نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ چاغدا p دىن q نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ دەيمىز ۋە

$$p \Rightarrow q$$

قىلىپ يازىمىز ھەم p نى q نىڭ يېتەرلىك شەرتى (sufficient condition)، q نى p نىڭ زۆرۈر شەرتى (necessary condition) دەپ ئاتايمىز.

يۇقىرىقى (1) ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك، يەنى

$$x > a^2 + b^2 \Rightarrow x > 2ab,$$

شۇنىڭ ئۈچۈن « $x > a^2 + b^2$ » بولۇش « $x > 2ab$ » بولۇشنىڭ يېتەرلىك شەرتى، « $x > 2ab$ » بولۇش « $x > a^2 + b^2$ » بولۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى بولىدۇ.

(1) ھۆكۈملۈكنىڭ «ئەگەر $x \leq 2ab$ بولسا، ئۇ ھالدا $x \leq a^2 + b^2$ بولىدۇ» دېگەن تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىمۇ توغرا ھۆكۈملۈك، باشقىچە ئېيتقاندا، « $x > a^2 + b^2$ » كۈچكە ئىگە بولۇشى ئۈچۈن، « $x > 2ab$ » كۈچكە ئىگە بولۇشى كېرەك. شۇنىڭغا، « $x > 2ab$ » بولۇش « $x > a^2 + b^2$ » نىڭ كۈچكە ئىگە بولۇشىنىڭ زۆرۈر شەرتىدۇر.

1 - مىسال. تۆۋەندە بېرىلگەن «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدىكى ھۆكۈملۈكلەردە، قايسى ھۆكۈملۈكتىكى p شەرت q نىڭ يېتەرلىك شەرتى بولىدۇ؟

(1) ئەگەر $x = 1$ بولسا، ئۇ ھالدا $x^2 - 4x + 3 = 0$ بولىدۇ؛

(2) ئەگەر $f(x) = x$ بولسا، ئۇ ھالدا $f(x)$ فۇنكسىيە $(-\infty, +\infty)$ دا ئاشقۇچى فۇنكسىيە بولىدۇ؛

(3) ئەگەر x ئىرراتسىئونال سان بولسا، ئۇ ھالدا x^2 ئىرراتسىئونال سان بولىدۇ.

يېشىش: (1)، (2) ھۆكۈملۈكلەر توغرا ھۆكۈملۈك، (3) ھۆكۈملۈك بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك. شۇ-
نىڭ ئۈچۈن، (1)، (2) ھۆكۈملۈكلەردىكى p شەرت q نىڭ يېتەرلىك شەرتى بولىدۇ.

«ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغان ئەھۋالدا، p دىن
 q نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولمايدۇ، بىز ئۇنى $p \neq q$ (ياكى $q \neq p$) قىلىپ يازىمىز. بۇ چاغدا، p نى q
نىڭ يېتەرلىك شەرتى ئەمەس، q نى p نىڭ زۆرۈر شەرتى ئەمەس دەيمىز.
مەسىلەن، 1 - مىسالدىكى (3) ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن،
 x^2 ئىرراتسىئونال سان $x \neq$ ئىرراتسىئونال سان

شۇنىڭ ئۈچۈن « x ئىرراتسىئونال سان» دېگەن شەرت « x^2 ئىرراتسىئونال سان» بولۇشنىڭ يېتەرلىك
شەرتى ئەمەس، « x^2 ئىرراتسىئونال سان» دېگەن شەرت « x ئىرراتسىئونال سان» بولۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى
ئەمەس.

2 - مىسال. تۆۋەندە بېرىلگەن «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدىكى ھۆكۈملۈك-
لەردە، قايسى ھۆكۈملۈكتىكى q شەرت p نىڭ زۆرۈر شەرتى بولىدۇ؟

(1) ئەگەر $x=y$ بولسا، ئۇ ھالدا $x^2=y^2$ بولىدۇ؛

(2) ئەگەر ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى ئۈچبۇلۇڭنىڭ يۈزلىرى تەڭ بولىدۇ؛

(3) ئەگەر $a>b$ بولسا، ئۇ ھالدا $ac>bc$ بولىدۇ.

يېشىش: (1)، (2) ھۆكۈملۈكلەر توغرا ھۆكۈملۈك، (3) ھۆكۈملۈك بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك. شۇ-
نىڭ ئۈچۈن، (1)، (2) ھۆكۈملۈكلەردىكى q شەرت p نىڭ زۆرۈر شەرتى بولىدۇ.

مەشىق

1. بوش ئورۇنلارغا « $\Rightarrow$ » ياكى « $\neq$ » نى تولدۇرۇڭ:

(1) $x^2=y^2$ _____ $x=y$;

(2) ئىككى ئالماش بۇلۇڭلار تەڭ _____ ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل؛

(3) پۈتۈن سان a بولسا 6 گە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ _____ a نىڭ بىرلەر خانىسىدىكى رەقەم جۈپ سان؛

(4) $ac=bc$ _____ $a=b$.

2. تۆۋەندە بېرىلگەن «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدىكى ھۆكۈملۈكلەردە، قايسى ھۆ-

كۈملۈكتىكى p شەرت q نىڭ يېتەرلىك شەرتى بولىدۇ؟

(1) ئەگەر ئىككى تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلىقلىرى تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ؛

(2) ئەگەر $x>5$ بولسا، ئۇ ھالدا $x>10$ بولىدۇ.

3. تۆۋەندە بېرىلگەن «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدىكى ھۆكۈملۈكلەردە، قايسى ھۆ-

كۈملۈكتىكى p شەرت q نىڭ زۆرۈر شەرتى بولىدۇ؟

(1) ئەگەر $a+5$ ئىرراتسىئونال سان بولسا، ئۇ ھالدا a ئىرراتسىئونال سان بولىدۇ؛

(2) ئەگەر $(x-a)(x-b)=0$ بولسا، ئۇ ھالدا $x=a$ بولىدۇ.

4. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) $x=2$ بولۇش $x^2-4x+4=0$ بولۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى؛

(2) چەمبەر مەركىزىدىن تۈز سىزىققىچە بولغان ئارىلىقنىڭ رادىئۇسقا تەڭ بولۇشى بۇ تۈز سىزىقنىڭ چەم-

بەرنىڭ ئۈرۈنمىسى بولۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى؛

(3) $\sin \alpha = \sin \beta$ بولۇش $\alpha = \beta$ بولۇشنىڭ يېتەرلىك شەرتى؛

(4) $ab \neq 0$ بولۇش $a \neq 0$ بولۇشنىڭ يېتەرلىك شەرتى.

مۇلاھىزە؟

بېرىلگىنى: p : پۈتۈن سان a بولسا 6 نىڭ ھەسسىلىكى؛

q : پۈتۈن سان a بولسا 2 بىلەن 3 نىڭ ھەسسىلىكى.

ئۇنداقتا، p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟ q شەرت p نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟

يۇقىرىقى مەسىلىدە، $p \Rightarrow q$ ، شۇنىڭ ئۈچۈن، p شەرت q نىڭ يېتەرلىك شەرتى، q شەرت p نىڭ زۆرۈر شەرتى بولىدۇ.

يەنە بىر تەرەپتىن، $q \Rightarrow p$ ، شۇنىڭ ئۈچۈن، p يەنە q نىڭ زۆرۈر شەرتى، q يەنە p نىڭ يېتەرلىك شەرتى بولىدۇ.

ئومۇمەن، ئەگەر ھەم $p \Rightarrow q$ ، ھەم $q \Rightarrow p$ بولسا، ئۇنى

$$p \Leftrightarrow q$$

« p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى» دېگەن سۆزنى يەنە « p شەرت q بىلەن تەڭ كۈچلۈك»، «پەقەت ۋە پەقەت p بولغاندا، q بولىدۇ» دەپ ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ.

قىلىپ يېزىپ، p نى q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى (sufficient and necessary condition) دەيمىز. روشەنكى، ئەگەر p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى بولسا، ئۇ ھالدا q مۇ p نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى بولىدۇ.


ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئەگەر $p \Leftrightarrow q$ بولسا، ئۇ ھالدا p بىلەن q ئۆزئارا يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتلەر بولىدۇ.

3 - مىسال. تۆۋەندە بېرىلگەن قايسى مىسالدىكى p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى بولىدۇ؟
(1) $p: b=0$ ، $q: f(x)=ax^2+bx+c$ فۇنكسىيە جۈپ فۇنكسىيە؛

(2) $p: x>0, y>0$ ، $q: xy>0$;

(3) $p: a>b$ ، $q: a+c>b+c$.

يېشىش: (1) بىلەن (3) دە، $p \Leftrightarrow q$ ، شۇنىڭ ئۈچۈن، (1) بىلەن (3) دىكى p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى بولىدۇ. (2) دە، $q \nRightarrow p$ ، شۇنىڭ ئۈچۈن، (2) دىكى p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى ئەمەس.



1.2.1 - رەسىم

4 - مىسال. بېرىلگىنى: $\odot O$ نىڭ رادىئۇسى r ، چەمبەر مەركىزى

O دىن l تۈز سىزىققىچە بولغان ئارىلىق d .

ئىسپات تەلىپى: $d=r$ بولۇشى l تۈز سىزىق بىلەن $\odot O$ نىڭ ئۆز-ئارا ئۇرۇنۇشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى.

تەھلىل: $p: d=r$ ، $q: l$ تۈز سىزىق بىلەن $\odot O$ ئۆزئارا ئۇرۇندىمۇ دەپ پەرەز قىلايلى. p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى بولىدۇ.

دېغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن، پەقەت شەرتنىڭ يېتەرلىكلىكى ($p \Rightarrow q$) بىلەن زۆرۈرلۈكى ($q \Rightarrow p$) نى ئىسپاتلاشقا كۆپايە قىلىدۇ.

ئىسپات: 1.2.1 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، $OP \perp l$ نى ئۆتكۈزسەك (تىك ئاساسى P)، ئۇ ھالدا $OP=d$ بولىدۇ.

(1) يېتەرلىكلىكى ($p \Rightarrow q$): ئەگەر $d=r$ بولسا، ئۇ ھالدا P نۇقتا $\odot O$ نىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ. l تۈز سىزىق ئۈستىدىن خالىغان بىر Q نۇقتا (P نۇقتىدىن باشقا) نى ئېلىپ، O بىلەن Q نى تۇتاشتۇرىمىز. $Rt \triangle OPQ$ دا، $OQ > OP=r$. شۇنىڭ ئۈچۈن، l تۈز سىزىق ئۈستىدىكى P نۇقتىدىن باشقا نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى $\odot O$ نىڭ سىرتىدا ياتىدۇ، يەنى l تۈز سىزىق بىلەن $\odot O$ پەقەت بىرلا ئورتاق نۇقتا P غا ئىگە بولىدۇ. شۇڭا، l تۈز سىزىق بىلەن $\odot O$ ئۆزئارا ئۇرۇنىدۇ.

(2) زۆرۈرلۈكى ($q \Rightarrow p$): ئەگەر l تۈز سىزىق بىلەن $\odot O$ ئۆزئارا ئۇرۇنسا، ئۇرۇنۇش نۇقتىسىنى P دەپ ئالساق، ئۇ ھالدا $OP \perp l$ بولىدۇ. شۇڭا، $d=OP=r$.

مەشىق

1. تۆۋەندىكى «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە بېرىلگەن ھۆكۈملۈكلەر توغرا ھۆكۈم-لۈكمۇ؟ ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى توغرا ھۆكۈملۈكمۇ؟ p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟
(1) ئەگەر α تەكشىلىكنىڭ سىرتىدىكى بىر a تۈز سىزىق α تەكشىلىكتىكى بىر تۈز سىزىق بىلەن پارال-لېل بولسا، ئۇ ھالدا a تۈز سىزىق بىلەن α تەكشىلىك پاراللېل بولىدۇ؛
(2) ئەگەر سانلار ئارقىمۇئارقىلىقى $\{a_n\}$ نىڭ ئومۇمىي ئەزا فورمۇلىسى $a_n = n+c$ (c تۇراقلىق سان) بولسا، ئۇ ھالدا سانلار ئارقىمۇئارقىلىقى $\{a_n\}$ ئومۇمىي ئايرىمىسى 1 گە تەڭ بولغان تەڭ ئايرىملىق سانلار ئارقىمۇ-ئارقىلىقى بولىدۇ؛
(3) ئەگەر a تۈز سىزىق α تەكشىلىكتىكى ئىككى تۈز سىزىققا تىك بولسا، ئۇ ھالدا a تۈز سىزىق α تەكشىلىككە تىك بولىدۇ.

2. تۆۋەندىكى مىساللاردا، p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟

(1) $p: x^2=3x+4$, $q: x=\sqrt{3x+4}$;

(2) $p: x-3=0$, $q: (x-3)(x-4)=0$;

(3) $p: b^2-4ac \geq 0$ ($a \neq 0$), $q: ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) نىڭ ھەقىقىي يىلتىزى بار؛

(4) $p: x=1$ تەڭلىمە $ax^2+bx+c=0$ نىڭ بىر يىلتىزى، $q: a+b+c=0$.

2.1 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. مىسال كەلتۈرۈپ چۈشەندۈرۈڭ:

(1) p شەرت q نىڭ يېتەرلىك شەرتى؛

(2) p شەرت q نىڭ زۆرۈر شەرتى؛

(3) p شەرت q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى.

2. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ئاتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) « $a > b$ » بولۇش « $a^2 > b^2$ » بولۇشنىڭ يېتەرلىك شەرتى؛

(2) « $|a| > |b|$ » بولۇش « $a^2 > b^2$ » بولۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى؛

(3) « $a > b$ » بولۇش « $a + c > b + c$ » بولۇشنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى.

3. تۆۋەندىكى مىساللاردا، p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟

(1) $p: x=1, q: x-1=\sqrt{x-1}$;

(2) $p: |x-2| \leq 3, q: -1 \leq x \leq 5$;

(3) $p: x=2, q: x-3=\sqrt{3-x}$;

(4) p : بىر ئۇچبۇلۇڭ تەڭ تەرەپلىك ئۇچبۇلۇڭ، q : بىر ئۇچبۇلۇڭ تەڭ يانلىق ئۇچبۇلۇڭ.

4. چەمبەر $x^2 + (y-b)^2 = r^2$ نىڭ كوئوردېنات بېشىدىن ئۆتۈشنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتىنى

تېپىڭ.

B گۇرۇپپا

1. تۆۋەندىكىلەر بېرىلگەن:

$A = \{x | x \text{ شەرتى قانائەتلىنىدۇرىدۇ}\}$,

$B = \{x | x \text{ شەرتى قانائەتلىنىدۇرىدۇ}\}$.

(1) ئەگەر $A \subseteq B$ بولسا، ئۇ ھالدا p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟

(2) ئەگەر $B \subseteq A$ بولسا، ئۇ ھالدا p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟


(3) ئەگەر $A=B$ بولسا، ئۇ ھالدا p شەرت q نىڭ قانداق شەرتى بولىدۇ؟

2. ئىسپاتلاڭ: $\triangle ABC$ نىڭ تەڭ تەرەپلىك ئۇچبۇلۇڭ بولۇشنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى:

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc,$$

بۇ يەردىكى a, b, c لار $\triangle ABC$ نىڭ ئۈچ تەرىپى.

$$p \wedge q$$



$$p \vee q$$

ئاددىي لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار

3-1

CHAPTER 1

ماتېماتىكىدا، بەزىدە «ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس (بولمايدۇ، بولمىسا)» دېگەندەك باغلىغۇچىلار قوللىنىلىدۇ. بىز تۇرمۇشتىمۇ بۇ باغلىغۇچىلارنى قوللىنىمىز، لېكىن ئۇلارنىڭ مەنىسى ۋە ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ماتېماتىكىدىكى مەنىسى ۋە ئىشلىتىلىش ئۇسۇلىغا ئوخشىشىپ كەتمەيدۇ. تۆۋەندە ماتېماتىكىدا قوللىنىلىدىغان باغلىغۇچى «ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس» لەرنىڭ ھۆكۈملۈكلەرنى باغلىغان چاغدىكى مەنىسى ۋە ئىشلىتىلىش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

بايان قىلىشقا ئاسان بولۇش ئۈچۈن، بۇنىڭدىن كېيىن ھۆكۈملۈكلەرنى لاتىنچە كىچىك ھەرپ $p, q, r, s, \dots$ لار بىلەن ئىپادىلەيمىز.

ھەمدە (and)

1-3-1


مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى ئۈچ ھۆكۈملۈك ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

(1) 12 بولسا 3 كە پۈتۈن بۆلۈندۇ؛

(2) 12 بولسا 4 كە پۈتۈن بۆلۈندۇ؛

(3) 12 بولسا 3 كە پۈتۈن بۆلۈندۇ ھەمدە 4 كە پۈتۈن بۆلۈندۇ.



«ھەمدە» باغلىغۇچىسىنىڭ مەنىسىنى ئىزاھلاش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئىشلىتىلىش قىلىنىشىنى چۈشىنىش ئاسان. ئەگەر ئۈزچات (ۋىكلىۋچاتېل) p ، q نىڭ ئۆزلىكى ۋە ئۆزۈلۈشى ئايرىم-ئايرىم ھۆكۈملۈك p, q نىڭ توغرا ۋە ناتوغرىلىقىغا ماس كەلسە، ئۇ ھالدا پۈتكۈل ئىپادىلەش زەنجىرىنىڭ ئۆزلىكى ۋە ئۆزۈلۈشى ئايرىم-ئايرىم ھۆكۈملۈك $p \wedge q$ نىڭ توغرا ۋە ناتوغرىلىقىغا ماس كېلىدۇ.

بۇنىڭدىن (3) ھۆكۈملۈكنىڭ (1) ۋە (2) ھۆكۈمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. «ھەمدە» باغلىغۇچىسى بىلەن باغلاشتىن كەلگەندە، تۈرۈپ چىقىرىلغان يېڭى ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز.

ئومۇمەن، p ھۆكۈملۈك ۋە q ھۆكۈملۈكنى باغلىغۇچى «ھەمدە» بىلەن باغلىساق، بىر يېڭى ھۆكۈملۈك كېلىپ چىقىدۇ، ئۇنى

$$p \wedge q$$

قىلىپ يېزىپ، « p ھەمدە q » دەپ ئوقۇيمىز.

ھۆكۈملۈك $p \wedge q$ نىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىنى قانداق ئېنىقلايمىز؟

ئومۇمەن، مۇنداق بەلگىلىۋالسىز:

p, q ئىككى ھۆكۈملۈكنىڭ ھەر ئىككىسى توغرا ھۆكۈملۈك بولغاندا، $p \wedge q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ؛ p, q ئىككى ھۆكۈملۈكنىڭ بىرى ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغاندا، $p \wedge q$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ. يۇقىرىقى «مۇلاھىزە»دىكى (1)، (2) ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ھەر ئىككىسى توغرا ھۆكۈملۈك، شۇنىڭ ئۈچۈن، (3) ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

1 - مىسال. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى «ھەمدە» باغلىغۇچىسى بىلەن باغلاپ يېڭى ھۆكۈملۈك ھاسىل قىلايلى، ئاندىن يېڭى ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) p : پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ، q : پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى تەڭ بولىدۇ؛

(2) p : رومبىنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك، q : رومبىنىڭ دىئاگوناللىرى بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ؛

(3) p : 35 بولسا 15 نىڭ ھەسسىلىكى، q : 35 بولسا 7 نىڭ ھەسسىلىكى.

يېشىش: (1) $p \wedge q$: پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ - دۇ ھەمدە تەڭ بولىدۇ.

p توغرا ھۆكۈملۈك، q ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، $p \wedge q$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(2) $p \wedge q$: رومبىنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك ھەمدە بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ.

p توغرا ھۆكۈملۈك، q مۇ توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، $p \wedge q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(3) $p \wedge q$: 35 بولسا 15 نىڭ ھەسسىلىكى ھەمدە 7 نىڭ ھەسسىلىكى.

p ناتوغرا ھۆكۈملۈك، q توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، $p \wedge q$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

2 - مىسال. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ھەمدە» دىن پايدىلىنىپ ئۆزگەرتىپ يازايلى ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) 1 ھەم تاق سان، ھەم تۈپ سان؛

(2) 2 بىلەن 3 نىڭ ھەر ئىككىسى تۈپ سان.

يېشىش: (1) «1 ھەم تاق سان، ھەم تۈپ سان» دېگەن ھۆكۈملۈكنى «1 تاق سان ھەمدە تۈپ سان» دەپ يېزىشقا بولىدۇ. «1 تۈپ سان» دېگەن ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ھۆكۈم - لۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(2) «2 بىلەن 3 نىڭ ھەر ئىككىسى تۈپ سان» دېگەن ھۆكۈملۈكنى «2 تۈپ سان ھەمدە 3 تۈپ سان» دەپ يېزىشقا بولىدۇ. «2 تۈپ سان» ۋە «3 تۈپ سان» دېگەن ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ھەر ئىككىسى توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

2-3-1 ياكى (or)

مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى ئۈچ ھۆكۈملۈك ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

(1) 27 بولسا 7 نىڭ ھەسسىلىكى؛

(2) 27 بولسا 9 نىڭ ھەسسىلىكى؛

(3) 27 بولسا 7 نىڭ ھەسسىلىكى ياكى 9 نىڭ ھەسسىلىكى.

(3) ھۆكۈملۈك (1) ھۆكۈملۈك ۋە (2) ھۆكۈم.

لۈكنى «ياكى» باغلىغۇچىسى بىلەن باغلاشتىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان يېڭى ھۆكۈملۈك.

ئومۇمەن، p ھۆكۈملۈك ۋە q ھۆكۈملۈكنى باغلىغۇچى «ياكى» بىلەن باغلىساق، بىر يېڭى ھۆكۈملۈك كېلىپ چىقىدۇ، ئۇنى

$$p \vee q$$

قىلىپ يېزىپ، « p ياكى q » دەپ ئوقۇيمىز.

ھۆكۈملۈك $p \vee q$ نىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىنى قانداق ئېنىقلايمىز؟

ئومۇمەن، مۇنداق بەلگىلىۋالىمىز:

p, q ئىككى ھۆكۈملۈكنىڭ بىرى توغرا ھۆكۈم.

لۈك بولغاندا، $p \vee q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ؛ p, q ئىككى ھۆكۈملۈكنىڭ ھەر ئىككىسى ناتوغرا ھۆكۈم بولغاندا، $p \vee q$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

يۇقىرىقى «مۇلاھىزە»دىكى (1) ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك، (2) ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك، شۇنىڭ ئۈچۈن، (3) ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

3 - مىسال. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

$$(1) 2 \leq 2;$$

(2) $A \cap B$ توپلام $A \cup B$ نىڭ قىسمىي توپلىمى ياكى $A \cup B$ نىڭ قىسمىي توپلىمى؛

(3) ئايلانما ئۇزۇنلۇقلىرى تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولىدۇ ياكى يۈزلىرى تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولىدۇ.

يېشىش: (1) ھۆكۈملۈك « $2 \leq 2$ » بولسا ھۆكۈملۈك

$$p: 2=2; q: 2 < 2$$

لارنى «ياكى» باغلىغۇچىسى بىلەن باغلاشتىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان يېڭى ھۆكۈملۈك، يەنى $p \vee q$.

p ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن، ھۆكۈملۈك $p \vee q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(2) « A توپلام $A \cap B$ نىڭ قىسمىي توپلىمى ياكى $A \cup B$ نىڭ قىسمىي توپلىمى» دېگەن ھۆكۈملۈك

$A : p$ ھۆكۈملۈك $A \cap B$ نىڭ قىسمىي توپلىمى؛

$A : q$ ھۆكۈملۈك $A \cup B$ نىڭ قىسمىي توپلىمى

دېگەن ئىككى ھۆكۈملۈكنى «ياكى» باغلىغۇچىسى بىلەن باغلاشتىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان يېڭى ھۆكۈملۈك، يەنى $p \vee q$.

q ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن، ھۆكۈملۈك $p \vee q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(3) «ئايانما ئۆزۈنلۈكلىرى تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولىدۇ ياكى يۈزلىرى تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولىدۇ» دېگەن ھۆكۈملۈك

p : ئايانما ئۆزۈنلۈكلىرى تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولىدۇ؛

q : يۈزلىرى تەڭ بولغان ئىككى ئۈچبۇلۇڭ تەڭ بولىدۇ

دېگەن ئىككى ھۆكۈملۈكنى «ياكى» باغلىغۇچىسى بىلەن باغلاشتىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان يېڭى ھۆكۈملۈك، يەنى $p \vee q$.

p, q ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ھەر ئىككىسى ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن، ھۆكۈملۈك $p \vee q$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئەگەر $p \wedge q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $p \vee q$ چوقۇم توغرا ھۆكۈملۈك بولامدۇ؟ ئەكسىچە، ئەگەر $p \vee q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $p \wedge q$ چوقۇم توغرا ھۆكۈملۈك بولامدۇ؟

3-3-1 ئەمەس (not)

مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى ئىككى ھۆكۈملۈك ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

(1) 35 بولسا 5 كە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ؛

(2) 35 بولسا 5 كە پۈتۈن بۆلۈنمەيدۇ.

بۇنىڭدىن (2) ھۆكۈملۈك (1) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىدۇ.

ئومۇمەن، بىر p ھۆكۈملۈكنى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىش ئارقىلىق، بىر يېڭى ھۆكۈملۈكنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز، ئۇنى

$$\neg p$$

قىلىپ يېزىپ، « p ئەمەس» ياكى « p نىڭ ئىنكار قىلىنىشى» دەپ ئوقۇيمىز.

بۇ يەردىكى ھۆكۈملۈك نىڭ ئىنكار قىلىنىشى بىلەن 2.1.1 - دىكى ئىنكار ھۆكۈملۈكنىڭ پەرقىگە دىققەت قىلىڭ.

يۇقىرىقى «مۇلاھىزە»دىكى (1) ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك، (2) ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولۇپ، $\neg p$ ھۆكۈملۈك p نىڭ ئىنكار قىلىنىشى بولغانلىقتىن، $\neg p$ بىلەن p بىرلا ۋاقىتتا توغرا ھۆكۈملۈك بولمايدۇ، شۇنداقلا بىرلا ۋاقىتتا ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولمايدۇ. باشقىچە ئېيتقاندا: ئەگەر p توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ جەزمەن ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ؛ ئەگەر p ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ جەزمەن توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

4 - مىسال. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يازايلى ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) $p: y = \sin x$ دەۋرىي فۇنكسىيە؛

(2) $p: 3 < 2$;

(3) p : بوش توپلام A توپلامنىڭ قىسمىي توپلىمى بولىدۇ.

يېشىش: (1) $\neg p: y = \sin x$ دەۋرىي فۇنكسىيە ئەمەس.

p ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك، $\neg p$ ھۆكۈملۈك بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك.

(2) $\neg p: 3 \geq 2$.

p ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك، $\neg p$ ھۆكۈملۈك بولسا توغرا ھۆكۈملۈك.

(3) $\neg p$: بوش توپلام A توپلامنىڭ قىسمىي توپلىمى ئەمەس.

p ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈملۈك، $\neg p$ ھۆكۈملۈك بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك.

مەشىق

1. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) 12 بولسا 48 نىڭ ھەمدە 36 نىڭ بۆلگۈچىسى؛

(2) تىك تۆتبۇلۇڭنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك ھەمدە بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ.

2. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) 47 بولسا 7 نىڭ ھەسسىلىكى ياكى 49 بولسا 7 نىڭ ھەسسىلىكى؛

(2) تەڭ يانلىق تراپېتسىيەنىڭ دىئاگوناللىرى بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ ياكى ئۆزئارا تىك بولىدۇ.

3. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىپ، ئاندىن ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) $2+2=5$;

(2) 3 بولسا تەڭلىمە $x^2-9=0$ نىڭ يىلتىزى؛

(3) $\sqrt{(-1)^2} = -1$.

3.1 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى يېزىڭ ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

$$(1) p \vee q, \text{ بۇ يەردە } p: 4 \in \{2, 3\}, q: 2 \in \{2, 3\};$$

$$(2) p \wedge q, \text{ بۇ يەردە } p: 4 \in \{2, 3\}, q: 2 \in \{2, 3\};$$

$$(3) p \vee q, \text{ بۇ يەردە } p: 2 \text{ بولسا جۈپ سان}, q: 3 \text{ بولسا تۈپ سان ئەمەس};$$

$$(4) p \wedge q, \text{ بۇ يەردە } p: 2 \text{ بولسا جۈپ سان}, q: 3 \text{ بولسا تۈپ سان ئەمەس}.$$

2. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

$$(1) 5 > 2 \text{ ھەمدە } 7 > 3;$$

$$(2) 3 > 4 \text{ ياكى } 3 < 4;$$

$$(3) 7 \geq 8.$$

3. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

$$(1) \sqrt{2} \text{ راتسىئونال سان};$$

$$(2) 5 \text{ بولسا } 15 \text{ نىڭ بۆلگۈچىسى ئەمەس};$$

$$(3) 2 < 3;$$

$$(4) 8 + 7 \neq 15;$$

(5) بوش توپلام ھەرقانداق توپلامنىڭ ھەقىقىي قىسمى توپلىمى بولىدۇ.

B گۇرۇپپا

تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ ھەم سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ:

$$(1) p \vee q, \text{ بۇ يەردە } p: \pi \text{ بولسا ئىرراتسىئونال سان}, q: \pi \text{ بولسا ھەقىقىي سان};$$

$$(2) p \wedge q, \text{ بۇ يەردە } p: \pi \text{ بولسا ئىرراتسىئونال سان}, q: \pi \text{ بولسا ھەقىقىي سان};$$

$$(3) p \vee q, \text{ بۇ يەردە } p: 2 > 3, q: 8 + 7 \neq 15;$$

$$(4) p \wedge q, \text{ بۇ يەردە } p: 2 > 3, q: 8 + 7 \neq 15.$$

ئوقۇش ۋە مۇلازىمەت



«ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس» ۋە «كېسىش»
«بىرىكىش»، «تولدۇرۇش»

لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس» بىلەن توپلامنىڭ «كېسىش»، «بىرىكىش»، «تولدۇرۇش» ئەمەللىرى ئارىسىدا مۇناسىۋەت بارمۇ؟
ئالدى بىلەن بىر كونكرېت مىسالنى كۆرۈپ ئۆتەيلى.
بىزگە مەلۇمكى، «2 بولسا جۈپ سان» ۋە «2 بولسا تۈپ سان» دېگەن ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ھەر ئىككىسى توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن، «2 بولسا جۈپ سان ھەمدە تۈپ سان» دېگەن توغرا ھۆكۈملۈككە ئىگە بولالايمىز. يەنە بىر تەرەپتىن، {جۈپ سان} $\cap$ {تۈپ سان} $\in 2$ بولغانلىقتىن، توپلامنىڭ «كېسىش» ئەمىلىگە ئاساسەن {تۈپ سان} $\cap$ {جۈپ سان} $\in 2$ غا ئىگە بولالايمىز. ئەگەر «توغرا»نى « $\in$ » غا، «ھەمدە»نى «كېسىش» كە ماس كەلتۈرسەك، ئۇ ھالدا «2 بولسا جۈپ سان دېگىنىمىز توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ»نى {جۈپ سان} $\in 2$ غا، «2 بولسا تۈپ سان دېگىنىمىز توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ»نى {تۈپ سان} $\in 2$ غا، «2 بولسا جۈپ سان ھەمدە تۈپ سان دېگىنىمىز توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ»نى {تۈپ سان} $\cap$ {جۈپ سان} $\in 2$ غا ماس كەلتۈرۈشكە بولىدۇ.

يۇقىرىقى مىسالدىن ئىلھام ئېلىپ، لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ھەمدە» بىلەن توپلامنىڭ «كېسىش» ئەمىلى ئارىسىدىكى باغلىنىشنى تۇرغۇزالايمىز.
بىزگە مەلۇمكى، لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ھەمدە» ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە بار:
ئەگەر p, q نىڭ ھەر ئىككىسى توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $p \wedge q$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ؛ ئەگەر p, q لارنىڭ ئىچىدە ناتوغرا ھۆكۈملۈك بار بولسا، ئۇ ھالدا $p \wedge q$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

توپلامنىڭ «كېسىش» ئەمىلى ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە بار:
ئەگەر $a \in P, a \in Q$ بولسا، ئۇ ھالدا $a \in P \cap Q$ بولىدۇ؛ ئەگەر $a \notin P$ ياكى $a \notin Q$ بولسا، ئۇ ھالدا $a \notin P \cap Q$ بولىدۇ.

ھۆكۈملۈك p, q نى ئايرىم - ئايرىم توپلام P, Q غا، «توغرا»، «ناتوغرا» ۋە « $\wedge$ » نى ئايرىم - ئايرىم « $\in$ »، « $\notin$ » ۋە « $\cap$ » غا ماس كەلتۈرسەك، ئۇ ھالدا يۇقىرىدا بايان قىلىنغان «ھەمدە» ۋە «كېسىش» ھەققىدىكى بەلگىلىمىلەر شەكىل جەھەتتە بىردەكلىككە ئىگە بولىدۇ. كونكرېت ئېيتقاندا، « p بولسا توغرا ھۆكۈملۈك» دېگىنىمىز « $a \in P$ » غا، « q بولسا توغرا ھۆكۈملۈك» دېگىنىمىز « $a \in Q$ » غا، « $p \wedge q$ بولسا توغرا ھۆكۈملۈك» دېگىنىمىز « $a \in P \cap Q$ » غا، « $p \wedge q$ بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك» دېگىنىمىز « $a \notin P \cap Q$ » غا ماس كېلىدۇ.

ئىزدىنىش

لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ياكى» بىلەن توپلامنىڭ «بىرىكىش» ئەمىلى ھەققىدىكى

بەلگىلىمىلەرنىڭ شەكىل جەھەتتىكى بىردەكلىكىنى بايقىيالايمىز؟

لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ئەمەس» بىلەن توپلامنىڭ «تولدۇرۇش» ئەمىلىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

يەنە بىر كونكرېت مىسالنى كۆرۈپ ئۆتەيلى.

ئەگەر پۈتۈن سانلار توپلىمىنى تولۇق توپلام دەپ ئالساق، ئۇ ھالدا جۈپ سانلار توپلىمى بىلەن تاق سانلار توپلىمى ئۆزئارا تولدۇرغۇچى توپلاملار بولىدۇ. «2 بولسا جۈپ سان» دېگەنلىمىز توغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن، «2 بولسا تاق سان» دېگىنىمىز ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ؛ «3 بولسا جۈپ سان» دېگىنىمىز ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولغانلىقتىن، «3 بولسا تاق سان» دېگىنىمىز توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ. بۇلارنى توپلام شەكلىدىن پايدىلىنىپ مۇنداق بايان قىلىشقا بولىدۇ: {جۈپ سان} $\in$ 2 بولغانلىقتىن، {تاق سان} $\notin$ 2 بولىدۇ؛ {جۈپ سان} $\notin$ 3 بولغانلىقتىن، {تاق سان} $\in$ 3 بولىدۇ. «ئەمەس»، «توغرا» ۋە «ناتوغرا» نى ئايرىم - ئايرىم «تولدۇرۇش»، « $\in$ » ۋە « $\notin$ » كە ماس كەلتۈرسەك، ئۇ ھالدا p ھۆكۈملۈك بىلەن ئۇنىڭ ئىنكار قىلىنىشى $\neg p$ نى P توپلام بىلەن ئۇنىڭ تولدۇرغۇچى توپلىمى $[U]P$ غا، « p بولسا توغرا ھۆكۈملۈك» نى « $a \in P$ » غا، « $\neg p$ بولسا ناتوغرا ھۆكۈملۈك» نى « $a \notin P$ » غا، « $\neg p$ بولسا توغرا ھۆكۈملۈك» نى « $a \in [U]P$ » غا ماس كەلتۈرۈشكە بولىدۇ. ئومۇمەن، لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ئەمەس» ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە بار:

ئەگەر p توغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ؛ ئەگەر p ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

توپلامنىڭ «تولدۇرۇش» ئەمىلى ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە بار:

U تولۇق توپلام، $P \subseteq U$ دەپ پەرەز قىلغاندا، ئەگەر $a \in P$ بولسا، ئۇ ھالدا $a \in [U]P$ بولىدۇ؛ ئەگەر $a \notin P$ بولسا، ئۇ ھالدا $a \in [U]P$ بولىدۇ.

ئىزدىنىش

«ھەمدە» بىلەن «كېسىشىش» نىڭ باغلىنىشىغا تەققاسلاپ (ئوخشىتىش، ئانالوگىيە دەپمۇ ئاتىلىدۇ) ھەم يۇقىرىقى مىسالغا بىرلەشتۈرۈپ، لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ئەمەس» بىلەن توپلامنىڭ «تولدۇرۇش» ئەمىلى ئارىسىدىكى ماسلىق مۇناسىۋىتىنى تۇرغۇزالايمىز؟

يۇقىرىقى مۇھاكىمىلەردىن بايقىيالايمىزكى، ھۆكۈملۈك بىلەن توپلام ئارىسىدا ماسلىق مۇناسىۋىتىنى تۇرغۇزۇشقا بولىدۇ. بۇنداق ماسلىق تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن، لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار بىلەن توپلام ئەمەللىرى بىردەكلىككە ئىگە بولىدۇ، ھۆكۈملۈكتىكى «ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس» ئايرىم - ئايرىم توپلامدىكى «كېسىشىش»، «بىرىكىش»، «تولدۇرۇش» ئەمەللىرىگە ماس كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار ھەققىدىكى بەلگىلىمىلەرنى توپلام تۇرغۇسىدىن يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ بىلىۋالالايمىز.

$$\forall x \in M, p(x)$$

$$\exists x_0 \in M, p(x_0)$$

CHAPTER 1

4-1

ئۇنىۋېرسال مىقدار سۆز ۋە مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز

ئۇنىۋېرسال مىقدار سۆز

1-4-1

مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى جۈملىلەر ھۆكۈملۈكمۇ؟ (1) بىلەن (3)، (2) بىلەن (4) ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

$$(1) x > 3;$$

$$(2) 2x + 1 \text{ بولسا پۈتۈن سان};$$

$$(3) \text{ بارلىق } x \in \mathbf{R} \text{ غا نىسبەتەن، } x > 3 \text{ بولىدۇ};$$

$$(4) \text{ خالىغان بىر } x \in \mathbf{Z} \text{ قا نىسبەتەن، } 2x + 1 \text{ پۈتۈن سان بولىدۇ}.$$

بىزگە مەلۇمكى، ھۆكۈملۈك دېگىنىمىز توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدىغان بايان جۈملىدۇر. (1) جۈملە بىلەن (2) جۈملە ئۆزگەرگۈچى مىقدار x نى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ئۆزگەرگۈچى مىقدار x قانداق سانغا ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقى نامەلۇم بولغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ توغرا - نا - توغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ، شۇڭا ئۇلار ھۆكۈملۈك ئەمەس. (3) جۈملىدە (1) جۈملە ئاساسىدا ئۆزگەرگۈچى مىقدار x كە «بارلىق ... نىسبەتەن» دېگەن سۆز بىرىكمىسى بىلەن، (4) جۈملىدە بولسا (2) جۈملە ئاساسىدا ئۆزگەرگۈچى مىقدار x كە «خالىغان بىر ... نىسبەتەن» دېگەن سۆز بىرىكمىسى بىلەن چەكلىمە قويۇلۇپ، بۇ ئارقىلىق (3)، (4) جۈملىلەر توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدىغان جۈملىگە ئايلاندۇرۇلغان، شۇڭا (3)، (4) جۈملىلەر ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

«بارلىق ... نىسبەتەن»، «خالىغان بىر ... نىسبەتەن»

دېگەن سۆز بىرىكمىلىرى لوگىكىدا ئۇنىۋېرسال مىقدار سۆز (universal quantifier) دەپ ئاتىلىدۇ ۋە « $\forall$ » بەلگە بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئۇنىۋېرسال مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈك ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك دەپ ئاتىلىدۇ.

مەسىلەن،

خالىغان $n \in \mathbf{Z}$ قا نىسبەتەن $2n + 1$ تاق سان بولىدۇ؛

بارلىق كۋادراتلار تىك تۆتبۇلۇك بولىدۇ

كۆپ ئۇچرايدىغان ئۇنىۋېرسال مىقدار سۆزدىن يەنە «ھەر بىر ... نىسبەتەن»، «خالىغانچە (ئىختىيارىي) بىرلىگەن»، «بارلىق ...» دېگەندەك سۆز بىرىكمىلىرىمۇ بار.

دېگەندەك ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

ئادەتتە، ئۆزگەرگۈچى مىقدار x نى ئۆز ئىچىگە ئالغان جۈملە $p(x)$ ، $q(x)$ ، $r(x)$ ، ... لار بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، ئۆزگەرگۈچى مىقدار x نىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسى M بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، « M دىكى خالىغان بىر x كە نىسبەتەن $p(x)$ كۈچكە ئىگە بولىدۇ» دېگەن ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈكنى بەلگە بىلەن قىسقىچە مۇنداق ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

$$\forall x \in M, p(x),$$

ئۇنى « M غا تەۋە خالىغان x كە نىسبەتەن $p(x)$ كۈچكە ئىگە بولىدۇ» دەپ ئوقۇيمىز.

1 - مىسال. تۆۋەندىكى ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) بارلىق تۈپ سانلار تاق سانلاردۇر؛

$$(2) \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 \geq 1;$$

(3) ھەربىر ئىرراتسىئونال سان x كە نىسبەتەن، x^2 مۇ ئىرراتسىئونال سان بولىدۇ.

تەھلىل: ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك « $p(x)$ ، $\forall x \in M$ » نىڭ توغرا ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن، M توپلامدىكى ھەربىر ئېلېمېنت x كە نىسبەتەن، $p(x)$ نىڭ كۈچكە ئىگە بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش كېرەك؛ ئەگەر M توپلامدىن $p(x_0)$ نى كۈچكە ئىگە قىلمايدىغان بىر ئېلېمېنت x_0 نى تاپقىلى بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

يېشىش: (1) 2 بولسا تۈپ سان، لېكىن 2 تاق سان ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن، «بارلىق تۈپ سانلار تاق سانلاردۇر» دېگەن ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(2) $\forall x \in \mathbf{R}$ ، ھامان $x^2 \geq 0$ بولىدۇ، شۇڭا $x^2 + 1 \geq 1$. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك « $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 \geq 1$ » توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(3) $\sqrt{2}$ ئىرراتسىئونال سان، لېكىن $(\sqrt{2})^2 = 2$ راتسىئونال سان. شۇنىڭ ئۈچۈن، «ھەربىر ئىرراتسىئونال سان x كە نىسبەتەن، x^2 مۇ ئىرراتسىئونال سان بولىدۇ» دېگەن ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

2-4-1 مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز

مۇلاھىزە؟

تۆۋەندىكى جۈملىلەر ھۆكۈملۈكمۇ؟ (1) بىلەن (3)، (2) بىلەن (4) ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

$$(1) 2x + 1 = 3;$$

(2) x بولسا 2 بىلەن 3 كە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ؛

(3) $2x_0 + 1 = 3$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان بىر $x_0 \in \mathbf{R}$ مەۋجۇت؛

(4) كەم دېگەندە بىر $x_0 \in \mathbf{Z}$ بار بولۇپ، بۇ x_0 پۈتۈن سان 2 بىلەن 3 كە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ.

(1) بىلەن (2) نىڭ ھۆكۈملۈك ئەمەس ئىكەنلىكىگە ئاسانلا ھۆكۈم قىلالايمىز. (3) جۈملىدە (1) جۈملە ئاساسىدا، ئۆزگەرگۈچى مىقدار x نىڭ قىممەت ئېلىشىغا «بىر ... مەۋجۇت» دېگەن سۆز بىرىك.

مىسى بىلەن؛ (4) جۈملىدە (2) جۈملە ئاساسىدا، ئۆزگەرگۈچى مىقدار x نىڭ قىممەت ئېلىشىغا «كەم دېگەندە بىر ... بار» دېگەن سۆز بىرىكمىسى بىلەن چەكلىمە قويۇلۇپ، بۇ ئارقىلىق (3)، (4) جۈملىلەر توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدىغان جۈملىگە ئايلاندۇرۇلغان، شۇڭا (3)، (4) جۈملىلەر ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

«بىر ... مەۋجۇت»، «كەم دېگەندە بىر ... بار» دېگەن سۆز بىرىكىمىدە - لىرى لوگىكىدا ئادەتتە مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز (existential quantifier) دەپ ئاتىلىدۇ ۋە « $\exists$ » بەلگە بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈك ئالاھىدە ھۆكۈملۈك دەپ ئاتا-تىلىدۇ. مەسىلەن:

كۆپ ئۇچرايدىغان مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز - دىن يەنە «بەزى ...»، «بىر ... بار»، «مەلۇم بىر ... نىسبەتەن» دېگەندەك سۆز بىرىكىملىرى بار.

بەزى پاراللېل تۆت تەرەپلىكلەر رومبا بولىدۇ؛

تاق سان بولمىغان بىر تۈپ سان بار

دېگەندەك ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ھەممىسى ئالاھىدە ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

« M دا $p(x_0)$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان بىر ئېلېمېنت x_0 مەۋجۇت» دېگەن ئالاھىدە ھۆكۈملۈكنى بەلگە بىلەن قىسقىچە مۇنداق ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

$$\exists x_0 \in M, p(x_0),$$

بۇنى « M دا $p(x_0)$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان بىر ئېلېمېنت x_0 مەۋجۇت (ياكى M غا تەۋە x_0 مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە $p(x_0)$ كۈچكە ئىگە بولىدۇ)» دەپ ئوقۇيمىز.

2 - مىسال. تۆۋەندىكى ئالاھىدە ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) $x_0^2 + 2x_0 + 3 = 0$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان بىر ھەقىقىي سان x_0 بار؛

(2) ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ھەم ئۆزئارا كېسىشكەن ئىككى تەكشىلىك مەۋجۇت؛

(3) بەزى پۈتۈن سانلارنىڭ پەقەت ئىككىلا مۇسبەت كۆپەيتكۈچىسى بار.

تەھلىل: ئالاھىدە ھۆكۈملۈك « $p(x_0), \exists x_0 \in M$ » نىڭ توغرا ھۆكۈملۈك ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن، پەقەت M توپلامىدىن $p(x_0)$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان بىر ئېلېمېنت x_0 نى تاپساقلا بولىدۇ؛ ئەگەر M توپلامدا $p(x)$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان x ئېلېمېنت مەۋجۇت بولمىسا، ئۇ ھالدا بۇ ئالاھىدە ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

يېشىش: (1) $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 \geq 2, \forall x \in \mathbf{R}$ بولغانلىقتىن، $x^2 + 2x + 3 = 0$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان ھەقىقىي سان x مەۋجۇت بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، « $x_0^2 + 2x_0 + 3 = 0$ » نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان بىر ھەقىقىي سان x_0 بار» دېگەن ئالاھىدە ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(2) ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ئىككى تەكشىلىك ئۆزئارا پاراللېل بولىدىغانلىقتىن، ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ھەم ئۆزئارا كېسىشكەن ئىككى تەكشىلىك مەۋجۇت بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، «ئوخشاش بىر تۈز سىزىققا تىك بولغان ھەم ئۆزئارا كېسىشكەن ئىككى تەكشىلىك مەۋجۇت» دېگەن ئالاھىدە ھۆكۈملۈك ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

(3) پۈتۈن سان 3 نىڭ 1 ۋە 3 تىن ئىبارەت پەقەت ئىككىلا مۇسبەت كۆپەيتكۈچىسى بار، شۇڭا «بەزى پۈتۈن سانلارنىڭ پەقەت ئىككىلا مۇسبەت كۆپەيتكۈچىسى بار» دېگەن ئالاھىدە ھۆكۈملۈك توغرا ھۆكۈم - لۈك بولىدۇ.

مەشىق

1. تۆۋەندىكى ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) ھەربىر كۆرسەتكۈچلۈك فۇنكسىيە مونوتون فۇنكسىيىدۇر؛

(2) ھەرقانداق ھەقىقىي ساننىڭ ئارىفمېتىكىلىق كۋادرات يىلتىزى بار؛

(3) $\{x | x \text{ ئىرراتسىئونال سان}\}$ ، $\forall x \in \{x | x \text{ ئىرراتسىئونال سان}\}$ بولىدۇ.

2. تۆۋەندىكى ئالاھىدە ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0 \leq 0$;

(2) كەم دېگەندە بىر پۈتۈن سان بار بولۇپ، ئۇ ھەم مۇرەككەپ سان ئەمەس، ھەم تۈپ سان ئەمەس؛

(3) $\{x | x \text{ ئىرراتسىئونال سان}\}$ ، $\exists x_0 \in \{x | x \text{ ئىرراتسىئونال سان}\}$ بولىدۇ.

3-4-1 بىر مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى

ئىزدىنىش

تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يازايلى:

(1) بارلىق تىك تۆتبۇلۇڭلارنىڭ ھەممىسى پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولىدۇ؛

(2) ھەربىر تۈپ سان تاق سان بولىدۇ؛

(3) $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - 2x + 1 \geq 0$.

بۇ ھۆكۈملۈكلەر بىلەن ئۇلارنىڭ ئىنكار قىلىنىشى شەكىل جەھەتتە قانداق ئۆزگەرگەن؟

بۇ يەردە، «بارلىق تىك تۆتبۇلۇڭلارنىڭ ھەممىسى پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولۇپ كەتمەيدۇ» دېگەن سۆز بىلەن «بارلىق تىك تۆتبۇلۇڭلارنىڭ ھەممىسى پاراللېل تۆت تەرەپلىك ئەمەس» دېگەن سۆزنىڭ پەرقىگە دىققەت قىلىش كېرەك، ئالدىنقىسى «پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولمايدىغان بىر تىك تۆتبۇلۇڭ مەۋجۇت» ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇ باشقا تىك تۆتبۇلۇڭلارنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولۇشىنى چەتكە قاقمايدۇ.

يۇقىرىقى ئۈچ ھۆكۈملۈكنىڭ ھەممىسى ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك بولۇپ، « $p(x), \forall x \in M$ » شەكىلدە بېرىلگەن. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى (1) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى: «بارلىق تىك تۆتبۇلۇڭلارنىڭ ھەممىسى پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولۇپ كەتمەيدۇ»، باشقىچە ئېيتقاندا،

پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولمايدىغان بىر تىك تۆتبۇلۇڭ مەۋجۇت؛
(2) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى: «ھەربىر تۈپ ساننىڭ تاق سان بولۇشى ناتايىن»، باشقىچە ئېيتقاندا،

تاق سان بولمايدىغان بىر تۈپ سان مەۋجۇت؛
(3) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى: «بارلىق $x \in \mathbf{R}$ غا نىسبەتەن، ھامان $x^2 - 2x + 1 \geq 0$ بولۇشى ناتايىن»، باشقىچە ئېيتقاندا،

$\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 - 2x_0 + 1 < 0$.

ھۆكۈملۈك شەكلىدىن قارىغاندا، بۇ ئۈچ ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك

كۈملۈك ئىنكار قىلىنغاندىن كېيىن ئالاھىدە ھۆكۈملۈككە ئۆزگەرگەن.

ئومۇمەن، بىر مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ھەقىقەتتە تۆۋەندىكىدەك يەكۈن بار:

ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك p :

$$\forall x \in M, p(x),$$

ئۇنىڭ ئىنكار قىلىنىشى $\neg p$:

$$\exists x \in M, \neg p(x_0).$$

ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ئالاھىدە ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

3 - مىسال. تۆۋەندىكى ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يازايلى:

(1) $p: 3$ كە پۈتۈن بۆلۈنىدىغان بارلىق پۈتۈن سانلارنىڭ ھەممىسى تاق سان;

(2) $p: 3$ ھەر بىر تۆت تەرەپلىكنىڭ تۆت چوققىسى چەمبەرداش بولىدۇ;

(3) $p: x \in \mathbb{Z}$ كە نىسبەتەن، x^2 نىڭ بىرلەر خانىسىدىكى رەقەم 3 كە تەڭ بولمايدۇ.

يېشىش: (1) $\neg p: 3$ كە پۈتۈن بۆلۈنىدىغان ھەم تاق سان بولمايدىغان بىر پۈتۈن سان مەۋجۇت.

(2) $\neg p$: تۆت چوققىسى چەمبەرداش بولمايدىغان بىر تۆت تەرەپلىك مەۋجۇت.

(3) $\neg p: \exists x_0 \in \mathbb{Z}, x_0^2$ نىڭ بىرلەر خانىسىدىكى رەقەم 3 كە تەڭ بولىدۇ.

ئىزدىنىش

تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ:

(1) بەزى ھەقىقىي سانلارنىڭ مۇتلەق قىممىتى مۇسبەت سان بولىدۇ;

(2) بەزى پاراللېل تۆت تەرەپلىكلەر رومبا بولىدۇ;

$$(3) \exists x_0 \in \mathbb{R}, x_0^2 + 1 < 0.$$

بۇ ھۆكۈملۈكلەر بىلەن ئۇلارنىڭ ئىنكار قىلىنىشى شەكىل جەھەتتە قانداق ئۆزگەرگەن؟

بۇ ئۈچ ھۆكۈملۈكنىڭ ھەممىسى ئالاھىدە ھۆكۈملۈك بولۇپ، « $p(x_0), \exists x_0 \in M$ » شەكىلدە بېرىلگەن.

بۇلارنىڭ ئىچىدىكى (1) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى: «مۇتلەق قىممىتى مۇسبەت سان بولمىغان بىر ھەقىقىي سان مەۋجۇت ئەمەس»، باشقىچە ئېيتقاندا،

بارلىق ھەقىقىي سانلارنىڭ مۇتلەق قىممەتلىرىنىڭ ھەممىسى مۇسبەت سان ئەمەس؛

(2) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى: «رومبا بولمىغان بىر پاراللېل تۆت تەرەپلىك يوق»، باشقىچە ئېيتقاندا،

ھەر بىر پاراللېل تۆت تەرەپلىك ئوخشاشلا رومبا ئەمەس؛

(3) ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى: « $x^2 + 1 < 0$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان $x \in \mathbb{R}$ مەۋجۇت ئەمەس»، باشقىچە ئېيتقاندا،

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 0.$$

ھۆكۈملۈك شەكلىدىن قارىغاندا، بۇ ئۈچ ئالاھىدە ھۆكۈملۈك ئىنكار قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈككە ئۆزگەرگەن.

ئومۇمەن، بىر مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالاھىدە ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك يەكۈن بار:

ئالاھىدە ھۆكۈملۈك p :

$$\exists x_0 \in M, p(x_0),$$

ئۇنىڭ ئىنكار قىلىنىشى $\neg p$:

$$\forall x \in M, \neg p(x).$$

ئالاھىدە ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ئۇنىۋېرسال ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

4 - مىسال. تۆۋەندىكى ئالاھىدە ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يازايلى:

$$(1) p: \exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 + 2x_0 + 2 \leq 0;$$

(2) p : بەزى ئۈچبۇلۇڭلار تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭ بولىدۇ;

(3) p : ئۈچ مۇسبەت كۆپەيتكۈچىنى ئۆز ئىچىگە ئالدىغان بىر تۈپ سان بار.

يېشىش:

$$(1) \neg p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 2 > 0.$$

(2) $\neg p$: بارلىق ئۈچبۇلۇڭلارنىڭ ھەممىسى تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭ ئەمەس.

(3) $\neg p$: ھەربىر تۈپ سان ئۈچ مۇسبەت كۆپەيتكۈچىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ.

5 - مىسال. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يازايلى ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - نا - توغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلايلى:

(1) p : خالىغان ئىككى تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭ ئوخشاش بولىدۇ;

$$(2) p: \exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 + 2x_0 + 2 = 0.$$

يېشىش:

(1) $\neg p$: ئوخشاش بولمىغان ئىككى تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭ مەۋجۇت.

$\neg p$ ناتوغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

$$(2) \neg p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 2 \neq 0.$$

$\neg p$ توغرا ھۆكۈملۈك بولىدۇ.

مەشىق

1. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ:

$$(1) \forall n \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{Q};$$

(2) خالىغان تۈپ سان تاق سان بولىدۇ;

(3) ھەربىر كۆرسەتكۈچلۈك فۇنكسىيە مونوتون فۇنكسىيە بولىدۇ.

2. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ:

(1) بەزى ئۈچبۇلۇڭلار تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ بولىدۇ;

(2) بەزى تراپېتسىيىلەر تەڭ يانلىق تراپېتسىيە بولىدۇ;

(3) مۇتلەق قىممىتى مۇسبەت سان بولمايدىغان بىر ھەقىقىي سان مەۋجۇت.

4.1 - كۆنۈكمە

A گۈرۈپپا

1. تۆۋەندىكى ئۇنۋېرسال ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) ئاخىرقى خانىسى 0 بولغان پۈتۈن سان 5 كە پۈتۈن بۆلۈنىدۇ؛

(2) كېسىكنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچىسى ئۈستىدىكى نۇقتىدىن بۇ كېسىكنىڭ ئىككى ئۇچىغىچە بولغان ئارىلىقلار تەڭ؛

(3) مەنىپى ساننىڭ كۋادراتى مۇسبەت سان بولىدۇ؛

(4) تراپېتسىيىنىڭ دىئاگوناللىرى تەڭ.

2. تۆۋەندىكى ئالاھىدە ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) بەزى ھەقىقىي سانلار دەۋرىي بولمىغان چەكسىز ئوڭلۇق كەسىر بولىدۇ؛

(2) بەزى ئۇچبۇلۇڭلار تەڭ يانلىق ئۇچبۇلۇڭ ئەمەس؛

(3) بەزى رومبىلار كۋادرات بولىدۇ.

3. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ:

$$(1) \forall x \in \mathbf{N}, x^3 > x^2;$$

(2) 5 كە پۈتۈن بۆلۈنىدىغان بارلىق پۈتۈن سانلارنىڭ ئاخىرقى خانىسىدىكى رەقەم 0 بولىدۇ؛

$$(3) \exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 - x_0 + 1 \leq 0;$$

(4) بىر تۆت تەرەپلىك مەۋجۇت بولۇپ، ئۇنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك.

B گۈرۈپپا

تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ ھەم بۇ ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ:

(1) ھەربىر تۈز سىزىق y ئوق ئۈستىدە كېسىشىش ئارىلىقى ھاسىل قىلىدۇ؛


(2) ھەربىر ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيىنىڭ گرافىكى x ئوق بىلەن كېسىشىدۇ؛

(3) بىر ئۇچبۇلۇڭ مەۋجۇت بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچكى بۇلۇڭلىرىنىڭ يىغىندىسى 180° تىن كىچىك؛

(4) سىرتتىن تېگىشكەن چەمبىرى بولمىغان بىر تۆت تەرەپلىك مەۋجۇت.

خۇلاسىە

I بۇ بابتىكى بىلىملەرنىڭ قۇرۇلما سىخىمىسى



II ئەسلىش ۋە مۇلاھىزە

1. توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدىغان بايان جۈملە ھۆكۈملۈك دەپ ئاتىلىدۇ. «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدىكى ھۆكۈملۈكنىڭ شەرتى بىلەن يەكۈنىنى ئۆزگەرتىش ئار - قىلىق، ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈملۈكى، ئىنكار ھۆكۈملۈكى ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنى كەلتۈرۈپ چىقىد - رىشقا بولىدۇ:

(1) تەتۈر ھۆكۈملۈكى: ئەگەر q بولسا، ئۇ ھالدا p بولىدۇ؛

(2) ئىنكار ھۆكۈملۈكى: ئەگەر $\neg p$ بولسا، ئۇ ھالدا $\neg q$ بولىدۇ؛

(3) تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكى: ئەگەر $\neg q$ بولسا، ئۇ ھالدا $\neg p$ بولىدۇ.

تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟
تۆت خىل ھۆكۈملۈكنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقى ئارىسىدىكى ئىچكى باغلىنىش بىزنىڭ خۇلاسىە چىقىد - رىپ ئىسپاتلاش ئېلىپ بېرىشىمىزغا قۇلايلىق يارىتىپ بېرىدۇ. مەسىلەن، ئەسلىي ھۆكۈملۈك بىلەن ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقى ئوخشاش بولغانلىقتىن، ئەسلىي ھۆكۈملۈكنى ئىسپاتلاش قىيىن بولغاندا، ئۇنىڭ تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكىنى ئىسپاتلاش ئارقىلىق ئەسلىي ھۆكۈم - لۈكنىڭ ئىسپاتىغا ئىگە بولالايمىز. بۇنىڭغا دائىر مىساللارنى كەلتۈرەلەمسىز؟

2. ئەگەر p دىن q نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا $(p \Rightarrow q)$ بولسا، ئۇ ھالدا p نى q نىڭ يېتەرلىك شەرت - تى، q نى p نىڭ زۆرۈر شەرتى دەيمىز. ئەگەر p دىن q نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا $(p \Rightarrow q)$ بولسا، ھەم q دىنمۇ p نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا $(q \Rightarrow p)$ بولسا، p نى q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى دەيمىز.

3. لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ھەمدە»، «ياكى»، «ئەمەس» ئايرىم - ئايرىم « $\wedge$ »، « $\vee$ »، « $\neg$ » بەلگىلەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

ھۆكۈملۈك $\neg p$ ، $p \vee q$ ، $p \wedge q$ لارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقى بىلەن p ، q لارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقى - قى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى قانداق ئېنىقلايمىز؟

4. ھۆكۈملۈكتىكى «بارلىق ... نىسبەتەن»، «خالىغان بىر ...» دېگەندەك سۆز بىرىكمىلىرى ئۈند - ۋېرسال مىقدار سۆز دەپ ئاتىلىدۇ ۋە « $\forall$ » بەلگە بىلەن ئىپادىلىنىدۇ؛ «مەۋجۇت»، «كەم دېگەندە بىر ... بار» دېگەندەك سۆز بىرىكمىلىرى مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆز دەپ ئاتىلىدۇ ۋە « $\exists$ » بەلگە بىلەن ئىپادىلىد - نىدۇ. ئۈنۈپرسال مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈك ئۈنۈپرسال ھۆكۈملۈك دەپ ئاتىلىدۇ، مەۋجۇتلۇق مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈك ئالاھىدە ھۆكۈملۈك دەپ ئاتىلىدۇ.

ھۆكۈملۈكلەرنىڭ شەكىلدىن قارىغاندا، ئۈنۈپرسال ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ئالاھىدە ھۆ - كۈملۈك بولىدۇ، ئالاھىدە ھۆكۈملۈكنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ئۈنۈپرسال ھۆكۈملۈك بولىدۇ. شۇڭا، بىز «ئەكس مىسال كەلتۈرۈش» ئارقىلىق بىر ئۈنۈپرسال ھۆكۈملۈكنى ئىنكار قىلالايمىز.

بىر مىقدار سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈكنى قانداق ئىنكار قىلىمىز؟

5. مەسىلىگە باغلىنىش نۇقتىئىنەزىرىدىن قارىساق، ماتېماتىكا بىلىملىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈ - شنىۋالالايمىز. بۇ بابتا، لوگىكىلىق باغلىغۇچىلار بىلەن توپلام ئەمەللىرى، ئېلىپكىر زەنجىرىنى ئارقىد - مۇئارقا ئۇلاش ۋە يانداش ئۇلاشنى بىر - بىرىگە باغلاش ئارقىلىق باغلىنىش نۇقتىئىنەزىرى گەۋدىلەند - ۈرۈلگەن. ئۆگىنىشتىن كېيىنكى تەسىراتىڭىزنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى

A گۇرۇپپا

1. «تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئۈچ ئىچكى بۇلۇڭى ئۆزئارا تەڭ» دېگەن ھۆكۈملۈكنى ئەسلىي ھۆكۈملۈك دەپ پە - رەز قىلىپ، ئەسلىي ھۆكۈملۈكنى «ئەگەر p بولسا، ئۇ ھالدا q بولىدۇ» دېگەن شەكىلدە يېزىڭ ھەم ئۇنىڭ تەتۈر ھۆكۈم - لۈكى، ئىنكار ھۆكۈملۈكى ۋە تەتۈر ئىنكار ھۆكۈملۈكنى يېزىڭ، ئاندىن ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىڭ.

2. ئايرىم - ئايرىم مىسال كەلتۈرۈپ چۈشەندۈرۈڭ:

(1) p بولسا q نىڭ يېتەرلىك شەرتى، لېكىن زۆرۈر شەرتى ئەمەس؛

(2) p بولسا q نىڭ زۆرۈر شەرتى، لېكىن يېتەرلىك شەرتى ئەمەس؛

(3) p بولسا q نىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى.

3. a, b, c لار ھەقىقىي سان ئىكەنلىكى بېرىلگەن، تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم

قىلىڭ:

(1) « $a > b$ » بولۇش « $a^2 > b^2$ » بولۇشنىڭ يېتەرلىك شەرتى؛

(2) « $a > b$ » بولۇش « $a^2 > b^2$ » بولۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى؛

(3) « $a > b$ » بولۇش « $ac^2 > bc^2$ » بولۇشنىڭ يېتەرلىك شەرتى؛

(4) « $a > b$ » بولۇش « $|a| > |b|$ » بولۇشنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى.

4. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) 27 بولسا 3 نىڭ ھەسسىلىكى ياكى 27 بولسا 9 نىڭ ھەسسىلىكى؛

(2) 27 بولسا 3 نىڭ ھەسسىلىكى ھەمدە 27 بولسا 9 نىڭ ھەسسىلىكى؛

(3) پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك ھەمدە بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ؛

(4) پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى ئۆزئارا تىك ياكى بىر - بىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ؛

(5) 1 بولسا تەڭلىمە $x-1=0$ نىڭ يىلتىزى ھەمدە تەڭلىمە $x^2-5x+4=0$ نىڭمۇ يىلتىزى.

5. مىقدار سۆزى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى « $\forall$ » ۋە « $\exists$ » بەلگە بىلەن ئىپادىلەڭ:

(1) تەبىئىي سانلارنىڭ كۋادراتى نۆلدىن چوڭ بولىدۇ؛

(2) چەمبەر $x^2+y^2=r^2$ ئۈستىدىكى خالىغان بىر P نۇقتىدىن چەمبەر مەركىزى O غىچە بولغان ئارىلىق r

بولىدۇ؛

(3) بىر جۈپ پۈتۈن سان x, y مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە $2x+4y=3$ بولىدۇ؛

(4) بىر ئىرراتسىئونال سان مەۋجۇت بولۇپ، ئۇنىڭ كۈبى راتسىئونال سان بولىدۇ.

6. تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىنى يېزىڭ ھەم ئۇلارنىڭ توغرا - ناتوغرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ:

(1) $3=2$;

(2) $5>4$;

(3) خالىغان ھەقىقىي سان x كە نىسبەتەن، $x>0$ بولىدۇ؛

(4) ھەربىر كۋادرات پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولىدۇ.

B گۈرۈپپا

1. بىر قېتىملىق قارىغا ئېتىش مەشىقىدە، مەلۇم بىر جەڭچى ئۇدا ئىككى قېتىم قارىغا ئاتقان. ئۇنىڭ «بىرىنچى قېتىم نىشانغا تەڭگۈزگەن» لىكىنى p ھۆكۈملۈك، «ئىككىنچى قېتىم نىشانغا تەڭگۈزگەن» لىكىنى q ھۆكۈملۈك دەپ پەرەز قىلىپ، تۆۋەندىكى ھۆكۈملۈكلەرنى p ، q ۋە لوگىكىلىق باغلىغۇچى «ياكى»، «ھەمدە»، «ئەمەس» (ياكى $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$) لەر بىلەن ئىپادىلەڭ:

(1) ئىككىلا قېتىمدا نىشانغا تەڭگۈزۈشى؛

(2) ئىككىلا قېتىمدا نىشانغا تەڭگۈزەلمەسلىكى.

2. تۆۋەندىكى تېئورېملاردا ئىپادىلەنگەن ھۆكۈملۈكلەرنى مىقدار سۆزىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈملۈك قىلىپ يېزىڭ:

(1) گوگۇ تېئورېمىسى؛

(2) سىنۇس تېئورېمىسى.

2 - باب


كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى ۋە ئۇلارنىڭ تەڭلىمىسى

1-2 ئەگرى سىزىق ۋە ئۇنىڭ تەڭلىمىسى



2-2 ئېللىپس

3-2 ھىپېربولا


4-2 پارابولا



بىزگە مەلۇمكى، كونۇسنى ئۇنىڭ ئوقىغا تىك بولغان بىر تەكشىلىك بىلەن كەسىسەك، كېسىش ئەگرى سىزىقى (كەسمە يۈز بىلەن كونۇس يان سىرتىنىڭ كېسىش سىزىقى) بىر چەمبەر بولىدۇ. ئەگەر تەكشىلىك بىلەن كونۇس ئوقىنىڭ ئارا بۆلۈڭىنى ئۆزگەرتسەك، ئۇ ھالدا قانداق شەكىل كېلىپ چىقىدۇ؟ رەسىمدىكىدەك، كونۇسنى ئۇنىڭ ئوقىغا تىك بولمىغان بىر تەكشىلىك بىلەن كەسىسەك، كەسمە يۈز بىلەن كونۇس ئوقىنىڭ ئارا بۆلۈڭى ئوخشاش بولمىغاندا، ئوخشاش بولمىغان كېسىش ئەگرى سىزىقلىرى كېلىپ چىقىدۇ، ئۇلار ئايرىم - ئايرىم ئېللىپس، پارابولا، ھىپېربولا بولىدۇ. بىز ئادەتتە چەمبەر، ئېللىپس، پارابولا، ھىپېربولا لارنى ئومۇملاشتۇرۇپ كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى (conic sections) دەپ ئاتايمىز. كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ ئىلمىي تەتقىقات، ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئىندىسانلارنىڭ تۇرمۇشى بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بار. 16 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى، 17 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدىلا كېلىپ سەييارىلەرنىڭ قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىش ئوربىتىسىنىڭ ئېللىپس شەكلىدە ئىكەنلىكىنى بايقىغان. پروژېكتورنىڭ نۇر قايە تۇرۇش ئەينىكى پارابولانى ئۇنىڭ سىممېترىك ئوقىنى چۆرىدىتىپ ئايلاندۇرۇشتىن ھاسىل بولغان پارابولونىڭ ئىبارەت؛ ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ مۇزلىتىش مۇنا-رىنىڭ سىرتقى شەكلى ھىپېربولا بولىدۇ، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق زور رولى بار؟ بىز كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكى ۋە خۇسۇسىيىتىگە ئاساسەن بۇنىڭغا جاۋاب تاپالايمىز. كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى قانداق گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىككە ئىگە؟ كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ خۇسۇسىيىتىنى قانداق تەتقىق قىلىش كېرەك؟ ئەمەلىيەتتە، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ بايقىلىشى ۋە تەتقىق قىلىنىشى قەدىمكى گرىتسىيىدە باشلانغان. ئۇ چاغدا كىشىلەر چەمبەر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان بۇ خىل ئەگرى سىزىقلارنى گېئومېترىيە نۇقتىسىدىن چىقىپ تەتقىق قىلىپ، ئۇلارنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى چەمبەرنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى تەبىئىي كېڭەيتىش ئارقىلىق كەلتۈرۈپ چىقارغان. 17 - ئەسىرنىڭ بېشىدا، دېكارت كوئوردېنات سىستېمىسىنى كەشىپ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنى كوئوردېنات سىستېمىسىنى ئاساس قىلغان ھالدا ئالگېبرالىق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشقا باشلىدى. بۇ بابتا بىز زۆرۈر دەرسلىك «ماتېماتىكا 2» دىكى تۈز سىزىق ۋە چەمبەرنى تەتقىق قىلىشتا قوللانغان كوئوردېنات ئۇسۇلىنى داۋاملىق قوللىنىپ، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلەر ئاساسىدا ئۇلارنىڭ تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇۋالىمىز، ئاندىن كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ ئاددىي خۇسۇسىيەتلىرىنى تەڭلىمىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىپ ھەم ئۇلارغا مۇناسىۋەتلىك بەزى ئاددىي گېئومېترىيىلىك مەسىلىلەر ۋە ئەمەلىي مەسىلىلەرنى كوئوردېنات ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىپ، سان بىلەن شەكىلنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئاساسىي ئىدىيە ھەققىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تەسىراتقا ئىگە بولىمىز.



كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى مول ئەمەلىي ئار-
قا كۆرۈنۈشكە ئىگە بولۇپ، ئۇلار رېئال دۇنيانى سۈرەت-
لەشتە ۋە ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا مۇھىم رول
ئوينايدۇ. كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنى كوئوردېنات
ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق، سان
بىلەن شەكىلنى بىرلەشتۈرۈش ئىدىيىسى ھەققىدە يەنى-
مۇ ئىلگىرىلەپ تەسىراتقا ئىگە بولالايمىز.



CHAPTER 2

1-2


ئەگرى سىزىق ۋە ئۇنىڭ تەڭلىمىسى

ئەگرى سىزىق ۋە ئۇنىڭ تەڭلىمىسى


1-1-2

ئالدىدا بىز تۈز سىزىق ۋە چەمبەرنىڭ تەڭلىمىسىنى تەتقىق قىلىپ، بۇ ئەگرى سىزىقلار (تۈز سىزىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) بىلەن ئۇلارنىڭ ماس تەڭلىمىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى مۇھاكىمە قىلدۇق. تۆۋەندە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئادەتتىكى ئەگرى سىزىقلار (تۈز سىزىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) بىلەن ئۇلارنىڭ تەڭلىمىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى تەتقىق قىلىمىز.

بىزگە مەلۇمكى، تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىدا، -1 ، 3 - چارەكلەرنى تەڭ بۆلىدىغان تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى $x-y=0$ بولىدۇ. دېمەك، ئەگەر $M(x_0, y_0)$ نۇقتا بۇ تۈز سىزىقنىڭ ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئىككى كوئوردېنات ئوقىغىچە بولغان ئارىلىقلار ئۆزئارا تەڭ، يەنى $x_0=y_0$ بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ كوئوردېناتى (x_0, y_0) تەڭلىمە $x-y=0$ نىڭ يېشىمى بولىدۇ؛ ئەكسىچە، ئەگەر (x_0, y_0) تەڭلىمە $x-y=0$ نىڭ يېشىمى، يەنى $x_0=y_0$ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ يېشىمنى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىدىن ئىككى كوئوردېنات ئوقىغىچە بولغان ئارىلىقلار ئۆزئارا تەڭ بولۇپ، بۇ نۇقتا چوقۇم مۇشۇ تۈز سىزىقنىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ (1.1.2 - رەسىم).



رەسىم 2.1.2



رەسىم 1.1.2

يەنە ئالايلۇق، (a, b) نى مەركەز، r نى رادىئۇس قىلغان چەمبەرنىڭ تەڭلىمىسى $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ بولىدۇ. دېمەك، ئەگەر $M(x_0, y_0)$ چەمبەر ئۈستىدىكى بىر نۇقتا بولسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭدىن چەمبەر مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىق چوقۇم رادىئۇسقا تەڭ بولىدۇ، يەنى $\sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2} = r$ ، بۇ، ئاشۇ نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى (x_0, y_0) تەڭلىمە $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ نىڭ يېشىمى بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ؛ ئەكسىچە، ئەگەر (x_0, y_0) تەڭلىمە $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ نىڭ

يېشىمى، يەنى $\sqrt{(x_0-a)^2+(y_0-b)^2}=r$ ، $(x_0-a)^2+(y_0-b)^2=r^2$ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ يېشىمنى كوئور-
دىنات قىلغان نۇقتىدىن (a, b) نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىق r بولۇپ، ئۇ چوقۇم (a, b) نى مەركەز، r نى
رادىئۇس قىلغان چەمبەرنىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ (2.1.2 - رەسىم).

ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭ-
لىمىسى $f(x, y)=0$ نى ئەگ-
رى سىزىق $f(x, y)=0$ دەپ
ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ.


ئومۇمەن، تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىدا، ئەگەر
مەلۇم ئەگرى سىزىق C (نۇقتىلار توپلىمى ياكى مەلۇم خىل
شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسى) ئۈستىدە-
كى نۇقتىلار بىلەن ئىككى نامەلۇملۇق تەڭلىمە $f(x, y)=0$ نىڭ
ھەقىقىي يېشىملىرى ئارىسىدا:

(1) ئەگرى سىزىق ئۈستىدىكى نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتى بىر-
دەك بۇ تەڭلىمىنىڭ يېشىمى بولىدۇ؛

(2) بۇ تەڭلىمىنىڭ يېشىمىنى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىلار ئەگرى سىزىقنىڭ ئۈستىدىكى نۇقتىلار
بولىدۇ.

دېگەن مۇناسىۋەت تۇرغۇزۇلسا، ئۇ ھالدا بۇ تەڭلىمە مۇشۇ ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى دەپ ئاتىلىدۇ؛
بۇ ئەگرى سىزىق مۇشۇ تەڭلىمىنىڭ ئەگرى سىزىقى (curve) دەپ ئاتىلىدۇ.

1 - مىسال. ئىككى كوئوردېنات ئوقىغىچە ئارىلىقلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسى تۇراقلىق سان $k(k>0)$ غا
تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسى $xy=\pm k$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلايلى.



رەسىم - 3.1.2

ئىسپات: (1) 3.1.2 - رەسىمدىكىدەك، $M(x_0, y_0)$ نى تراپىكتورىيە
يە ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا دەپ پەرەز قىلىمىز. M نۇقتا بىلەن
 x ئوقىنىڭ ئارىلىقى $|x_0|$ ، ئۇنىڭ بىلەن y ئوقىنىڭ ئارىلىقى $|y_0|$
بولغانلىقتىن،

$$|x_0| \cdot |y_0| = k,$$

يەنى (x_0, y_0) تەڭلىمە $xy=\pm k$ نىڭ يېشىمى بولىدۇ.

(2) M_1 نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى (x_1, y_1) نى تەڭلىمە $xy=\pm k$ نىڭ
يېشىمى دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا:

$$x_1 y_1 = \pm k,$$

يەنى

$$|x_1| \cdot |y_1| = k.$$

ھالبۇكى، $|x_1|$ ، $|y_1|$ دەل M_1 نۇقتىدىن ئوردىنات ئوقى ۋە ئابىسېسسا ئوقىغىچە بولغان ئارىلىقلار
بولغانلىقتىن، M_1 نۇقتىدىن بۇ ئىككى تۈز سىزىققىچە بولغان ئارىلىقلارنىڭ كۆپەيتىمىسى تۇراقلىق سان
 k غا تەڭ بولۇپ، M_1 نۇقتا ئەگرى سىزىقنىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ.

(1)، (2) لەرگە ئاساسەن، $xy=\pm k$ ئىككى كوئوردېنات ئوقىغىچە ئارىلىقلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسى
تۇراقلىق سان $k(k>0)$ غا تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسى بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە
بولىدۇ.


2-1-2 ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىش

2-1-2

بىز ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى ۋە تەڭلىمىنىڭ ئەگرى سىزىقى ھەققىدىكى ئۇقۇملارنى تۇرغۇ-زۇۋالدۇق. بۇ ئىككى مۇھىم ئۇقۇمغا ئىگە بولغاندىن كېيىن، كوئوردېنات سىستېمىسىدا نۇقتىنى كوئوردېنات بىلەن ئىپادىلەپ، ئەگرى سىزىقنى مەلۇم خىل شەرتنى قانائەتلەندۈرىدىغان نۇقتىلارنىڭ توپلىمى ياكى تراپېكتورىيىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ. دە، ئەگرى سىزىق ئۈستىدىكى نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتى (x, y) قانائەتلەندۈرىدىغان تەڭلىمە $f(x, y) = 0$ ئارقىلىق ئەگرى سىزىقنى ئىپادىلەپ، ئەگرى سىزىقنىڭ خۇسۇسىيىتىنى تەڭلىمىنىڭ خۇسۇسىيىتىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ۋاسىتىلىك ھالدا تەتقىق قىلىشقا بولىدۇ. مانا بۇ بىز قايتا - قايتا تىلغا ئېلىۋاتقان كوئوردېنات ئۇسۇلىدۇر. ماتېماتىكا كىدا، گېئومېترىيىلىك شەكىللەرنى كوئوردېنات ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشقا دائىر بىلىملەردىن شەكىللەنگەن پەن ئانالىتىك گېئومېترىيە دەپ ئاتىلىدۇ. ئالدىدا ئۆگەنگەن بىلىملەردىن كۆرەلەيمىزكى، ئانالىتىك گېئومېترىيە تەتقىق قىلىنىدىغان ئاساسىي مەسىلىلەر تۆۋەندىكىچە:

- (1) بېرىلگەن شەرتكە ئاساسەن، ئەگرى سىزىقنى ئىپادىلەيدىغان تەڭلىمىنى تېپىش؛
 - (2) ئەگرى سىزىقنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىش.
- تۆۋەندە بىز ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىمىز.

2 - مىسال. A, B ئىككى نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى ئايرىم - ئايرىم $(-1, -1)$ ، $(3, 7)$ دەپ بەرەز قىلىپ، AB كېسىكنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسىنى تاپايلى.



رەسىم 4.1.2 -

يېشىش: 4.1.2 - رەسىمدىكىدەك، $M(x, y)$ نۇقتىنى AB كېسىكنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچىسى ئۈستىدىكى خالغان بىر نۇقتا، يەنى M نۇقتىنى تۆۋەندىكى توپلامغا تەۋە دەپ پەرەز قىلىمىز:

$$P = \{M \mid |MA| = |MB|\}.$$

ئىككى نۇقتا ئارىسىدىكى ئارىلىق فورمۇلىسىغا ئاساسەن، M نۇقتا ئۇيغۇن كېلىدىغان شەرتنى تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-7)^2}.$$

يۇقىرىقى ئىپادىنىڭ ئىككى تەرىپىنى كۋادراتقا كۆتۈرۈپ، ئاندىن رەتلىسەك، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$x + 2y - 7 = 0. \quad (1)$$

ئەمدى AB كېسىكنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسى تەڭلىمە ① بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلايمىز.

(1) تەڭلىمىنى تېپىش جەريانىدىن بىلەلەيمىزكى، تىك تەڭ بۆلگۈچى ئۈستىدىكى ھەربىر نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى تەڭلىمە ① نىڭ يېشىمى بولىدۇ:

(2) $M_1(x_1, y_1)$ تەڭلىمە ① نىڭ يېشىمى بولىدۇ، يەنى

$$x_1 + 2y_1 - 7 = 0,$$

$$x_1 = 7 - 2y_1$$

بولدۇ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا M_1 نۇقتىسىدىن A ۋە B غىچە بولغان ئارىلىقلار ئايرىم - ئايرىم تۇرۇپ - ۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\begin{aligned} |M_1A| &= \sqrt{(x_1+1)^2 + (y_1+1)^2} = \sqrt{(8-2y_1)^2 + (y_1+1)^2} \\ &= \sqrt{5(y_1^2 - 6y_1 + 13)}; \\ |M_1B| &= \sqrt{(x_1-3)^2 + (y_1-7)^2} = \sqrt{(4-2y_1)^2 + (y_1-7)^2} \\ &= \sqrt{5(y_1^2 - 6y_1 + 13)}. \end{aligned}$$

$$\therefore |M_1A| = |M_1B|,$$

يەنى M نۇقتىسى AB كېسىكىنىڭ تەڭ بۆلگۈچىسى ئۈستىدە ياتىدۇ.

(1) ۋە (2) گە ئاساسەن بىلەلەيمىزكى، AB كېسىكىنىڭ تەڭ بۆلگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسى تەڭلىمە ① بولىدۇ.

يۇقىرىقى مىساللاردىن كۆرەلەيمىزكى، ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىشتا، ئادەتتە تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە باسقۇچ بولىدۇ:

(1) مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇپ، ئەگرى سىزىق ئۈستىدىكى خالىغان بىر M نۇقتىسىنىڭ كوئوردېناتىنى تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) ئارقىلىق ئىپادىلەش;
(2) p شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان M نۇقتىسىنىڭ توپلىمىنى يېزىش:

$$P = \{M | p(M)\};$$

(3) $P(M)$ شەرتىنى كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلەپ، تەڭلىمە $f(x, y) = 0$ نى تۈزۈش;

(4) تەڭلىمە $f(x, y) = 0$ نى ئەڭ ئاددىي كۆرۈنۈشكە كەلتۈرۈش;


(5) ئاددىيلاشتۇرۇلغاندىن كېيىنكى تەڭلىمىنىڭ يېشىمىنى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى ئەگرى سىزىق ئۈستىدە ياتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش.

ئادەتتىكى ئەھۋالدا، تەڭلىمىلەرنىڭ يېشىملىرى توپلىمى ئاددىيلاشتۇرۇلۇشنىڭ ئالدى - كەينىدە ئوخشاش بولىدىغانلىقتىن، (5) باسقۇچنى قالدۇرۇۋېتىشكە بولىدۇ، ئەمما ئالاھىدە ئەھۋاللاردا مۇۋاپىق چۈشەندۈرۈپ قويۇش لازىم. بۇنىڭدىن سىرت، كونكرېت ئەھۋاللارغا ئاساسەن، (2) باسقۇچنىمۇ قالدۇرۇپ، ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى بىۋاسىتە يېزىشقىمۇ بولىدۇ.

3 - مىسال. بىر l تۈز سىزىقنىڭ ئۈستۈنكى تەرىپىدە ياتقان F نۇقتىسىدىن l غىچە بولغان ئارىلىق 2 ئىكەنلىكى بېرىلگەن. يەنە بىر ئەگرى سىزىقمۇ l نىڭ ئۈستۈنكى تەرىپىدە بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ھەر بىر نۇقتىسىدىن F غىچە بولغان ئارىلىقتىن شۇ نۇقتىسىدىن l غىچە بولغان ئارىلىقنى ئالغاندىكى ئايرىما - ئوخشاشلا 2 گە تەڭ بولسا، مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇپ، بۇ ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

تەھلىل: كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۇرغۇزغاندا، ئادەتتە بېرىلگەن شەرتتىكى مۇقىم نۇقتا، مۇقىم تۈز سىزىق قاتارلىقلاردىن تولۇق پايدىلىنىش كېرەك، بۇنداق قىلغاندا مەسىلىدىكى گېئومېترىيەلىك ئالاھىدىلىكنى تېخىمۇ ياخشى نامايان قىلغىلى ھەم بۇ ئارقىلىق ئەگرى سىزىق تەڭلىمىسىنىڭ كۆرۈنۈشىنى ئاددىيلاشتۇرغىلى بولىدۇ.

يېشىش: 5.1.2 - رەسىمدىكىدەك، l تۈز سىزىقنى x ئوق، F نۇقتىسىدىن ئۆتكەن ھەمدە l تۈز سىزىققا تەڭ بولغان تۈز سىزىقنى y ئوق قىلىپ كوئوردېنات سىستېمىسى xOy نى تۇرغۇزىمىز.



رەسىم 5.1.2 -

$M(x, y)$ نۇقتىسى ئەگرى سىزىق ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا دەپ پەرەز قىلىپ، x ئوق $MB \perp$ (تىك ئاساسى B) نى ئۆتكۈزسەك، ئۇ ھالدا M نۇقتا تۆۋەندىكى توپلامغا تەۋە بولىدۇ:

$$P = \{M \mid |MF| - |MB| = 2\}.$$

ئىككى نۇقتا ئارىسىدىكى ئارىلىق فورمۇلىسىغا ئاساسەن، M نۇقتا ئۇيغۇن كېلىدىغان شەرتنى تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

$$\sqrt{x^2 + (y-2)^2} - y = 2, \quad (1)$$

تەڭلىمە ① نىڭ ئەزالىرىنى يۆتكەپ، ئاندىن ئۇنىڭ ئىككى تەرىپىنى كۋادراتقا كۆتۈرسەك، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$x^2 + (y-2)^2 = (y+2)^2,$$


ئاددىيلاشتۇرساق:

$$y = \frac{1}{8}x^2.$$

ئەگرى سىزىق x ئوقنىڭ ئۈستۈنكى تەرىپىدە بولغانلىقتىن، $y > 0$ بولىدۇ. گەرچە كوئوردېنات بېشى O نىڭ كوئوردېناتى $(0, 0)$ بۇ تەڭلىمنىڭ يېشىمى بولسىمۇ، ئەمما ئۇ بېرىلگەن ئەگرى سىزىق ئۈستىدە ياتىمىغانلىقتىن، ئەگرى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى $y = \frac{1}{8}x^2$ ($x \neq 0$) بولۇشى كېرەك.

مەشىق

1. تەڭ يانلىق ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئۈچ چوققىسىنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $C(2, 0)$ ، $B(-2, 0)$ ، $A(0, 3)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، AO (O كوئوردېنات بېشى) مېدىئانا ياتقان تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى $x=0$ بولامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟



(3 - مىسال ئۈچۈن)

2. تەڭلىمە $ax^2 + by^2 = 2$ نىڭ ئەگرى سىزىقى $B(1, 1)$ ، $A(0, \frac{5}{3})$

نۇقتىلاردىن ئۆتىدىغانلىقى بېرىلگەن. a ، b لارنىڭ قىممىتىنى تېپىڭ.

3. رەسىمدىكىدەك، C نۇقتىسىنىڭ كوئوردېناتى $(2, 2)$ بولۇپ، C نۇقتىسىدىن ئۆتكەن CA تۈز سىزىق x ئوق بىلەن A نۇقتىسىدا، C نۇقتىسىدىن ئۆتكەن CB تۈز سىزىق y ئوق بىلەن B نۇقتىسىدا كېسىشىدىغانلىقى بېرىلگەن. M نۇقتىسى AB كېسىكىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى دەپ پەرەز قىلىپ، M نۇقتىسىنىڭ تراپېكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.



1.2 - كۆنۈكمە

A گۈرۈپپا

1. $A(1, -2)$ ، $B(2, -3)$ ، $C(3, 10)$ نۇقتىلار تەڭلىمە

$$x^2 - xy + 2y + 1 = 0$$

ئىپادىلەيدىغان ئەگرى سىزىقنىڭ ئۈستىدە ياتامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

2. بىر نۇقتىدىن $O(0, 0)$ ، $A(c, 0)$ نۇقتىلارغىچە بولغان ئارىلىقلار كۋادراتلىرىنىڭ ئايرىمىسى تۇراقلىق سان c غا تەڭ بولسا، بۇ نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

3. ئىككى مۇقىم نۇقتىنىڭ ئارىلىقى 6 بولۇپ، M نۇقتىدىن بۇ ئىككى مۇقىم نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىقلار كۋادراتلىرىنىڭ يىغىندىسى 26 گە تەڭ بولسا، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

4. كوئوردىنات بېشىدىن ئۆتكەن تۈز سىزىق بىلەن چەمبەر $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ نىڭ A ، B ئىككى نۇقتىدا كېسىشىدىغانلىقى بېرىلگەن. AB خوردىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى M نىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

B گۈرۈپپا


1. $P(3, 4)$ نۇقتىدىن ئۆتكەن ھەرىكەتچان تۈز سىزىق بىلەن ئىككى كوئوردىنات ئوقىنىڭ كېسىشىش نۇقتىسى ئايرىم - ئايرىم A ، B بولۇپ، A ، B لار ئارقىلىق ئايرىم - ئايرىم ئىككى كوئوردىنات ئوقىغا تەڭ قىلىپ ئۆتكۈزۈلگەن تۈز سىزىقلار ئۆزئارا M نۇقتىدا كېسىشىشە، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

2. بىر ھەرىكەتچان چەمبەرنىڭ تۈز سىزىق $3x - y = 0$ ۋە $3x + y = 0$ نى كېسىشىدىن ھاسىل بولغان خور - دىلارنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم 8، 4 بولسا، بۇ ھەرىكەتچان چەمبەر مەركىزىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

ئېللىپس ۋە ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى

1-2-2

ئىزدىنىش



رەسىم 1.2.2

مۇقىم ئۇزۇنلۇقتىكى بىر ئىنچىكە تانىنى ئېلىپ، ئۇنىڭ ئىككى ئۇچىنى رەسىم تاختىسىدىكى ئوخشاش بىر نۇقتىغا مۇقىملاشتۇرىمىز، ئاندىن تانىنى قېرىنداش ئۇچىغا ئېلىپ ھەم ئۇنى چىڭ تارتىپ تۇرۇپ، قېرىنداش ئۇچىنى ھەرىكەتلەندۈرسەك، بۇ چاغدا قېرىنداش ئۇچى (ھەرىكەتچان نۇقتا) سىزىپ چىققان تراپىكتورىيە بىر چەمبەر بولىدۇ. ئەگەر تانىنىڭ ئىككى ئۇچى ئارىسىدا بىر بۆلەك ئارىلىق قالدۇرۇپ، ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم رەسىم تاختىسىدىكى ئىككى نۇقتىغا مۇقىملاشتۇرغاندىن كېيىن (1.2.2 - رەسىمدىكىدەك)، تانىنى قېرىنداش ئۇچىغا ئېلىپ ھەم ئۇنى چىڭ تارتىپ تۇرۇپ، قېرىنداش ئۇچىنى ھەرىكەتلەندۈرسەك، سىزىپ چىقىلغان تراپىكتورىيە قانداق ئەگرى سىزىق بولىدۇ؟ بۇ جەرياندا، ھەرىكەتلەندۈرۈلگەن قېرىنداش ئۇچى (ھەرىكەتچان نۇقتا) قانائەتلەندۈرىدىغان گېئومېترىيىلىك شەرتنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟


تانىنىڭ ئىككى ئۇچى ئارىسىدا بەلگىلىك ئارىلىق قالدۇرۇپ، قېرىنداش ئۇچىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش جەريانىدا، تانىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۆزگەرمەيدۇ، يەنى قېرىنداش ئۇچىدىن ئىككى مۇقىم نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىقلارنىڭ يىغىندىسى بىر تۇراقلىق سانغا تەڭ بولىدۇ. تەكشىلىكتىكى ئىككى مۇقىم نۇقتا F_1 ، F_2 گىچە ئارىلىقلىرىنىڭ يىغىندىسى تۇراقلىق سان ($|F_1F_2|$ دىن چوڭ) غا تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسى ئېللىپس (ellipse) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئىككى مۇقىم نۇقتا ئېللىپسنىڭ فوكۇسى، ئىككى فوكۇسنىڭ ئارىلىقى ئېللىپسنىڭ فوكۇسلار ئارىلىقى دەپ ئاتىلىدۇ.

بىز ئەمدى ئېللىپسنىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تاللاپ، ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزىمىز ھەمدە تەڭلىمىدىن پايدىلىنىپ ئېللىپسنىڭ خۇسۇسىيىتىنى تەتقىق قىلىمىز.

مۇلاھىزە؟

ئېللىپسىنىڭ شەكلىنى كۆزىتىڭ، سىزنىڭچە كوئوردېنات سىستېمىسىنى قانداق تاللىغاندا ئېللىپسىنىڭ تەڭلىمىسىنى ئاددىيلاشتۇرغىلى بولىدۇ؟

چەمبەرنىڭ سىممېتىرىكلىكىگە ئاساسەن ئۇنىڭ تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇش جەريانىغا تەققاسلاپ، ئېلىپسىنىڭ گېئومېتىرىيەلىك ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تاللاش ئارقىلىق ئۇنىڭ تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزىمىز.



رەسىم 2.2.2 -

2.2.2 - رەسىمدىكىدەك، ئېللىپسىنىڭ ئىككى فوكۇسى F_1, F_2 دىن ئۆتكەن تۈز سىزىقنى x ئوق، F_1F_2 كېسىكىنىڭ تەڭ بۆلگۈچىسىنى y ئوق قىلىپ، تەڭ بۆلۈڭلۈك كوئوردېنات سىستېمىسى xOy نى تۈر - غۇزۇۋالىمىز.

$M(x, y)$ نى ئېللىپس ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا، ئېللىپسىنىڭ فوكۇسلار ئارىلىقىنى $2c$ ($c > 0$) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا فوكۇس F_1, F_2 نىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-c, 0)$ ، $(c, 0)$ بولىدۇ. يەنە M بىلەن F_1, F_2 نىڭ ئارىلىقلىرىنىڭ يىغىندىسىنى تۇراقلىق سان $2a$ غا تەڭ دەپ پەرەز قىلايلى. ئېللىپسىنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن، ئۇ تۆۋەندىكى توپلامدىن ئىبارەت بولىدۇ:

$$P = \{M \mid |MF_1| + |MF_2| = 2a\}.$$

$$\therefore |MF_1| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad |MF_2| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

$$\therefore \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a.$$

بۇ تەڭلىمىنى ئاددىيلاشتۇرۇش ئۈچۈن، سول تەرەپتىكى بىر يىلتىزلىق ئىپادىنى ئوڭ تەرەپكە يۆتكەسەك:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

بۇ تەڭلىمىنىڭ ئىككى تەرەپنى كۋادراتقا كۆتۈرسەك:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2,$$

بۇنى رەتلىسەك:

$$a^2 - cx = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

يۇقىرىدىكى ئىپادىنىڭ ئىككى تەرەپنى يەنە كۋادراتقا كۆتۈرسەك:

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2,$$

بۇنى رەتلىسەك:


$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2),$$

ئىككى تەرەپنى بىرلا ۋاقىتتا $a^2(a^2 - c^2)$ قا بۆلسەك:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1. \quad (1)$$

ئېللىپسىنىڭ ئېنىقلىمىسىدىن بىلەلەيمىزكى، $2a > 2c$ ، يەنى $a > c$ ، شۇڭا $a^2 - c^2 > 0$ بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟



رەسىم 3.2.2 -

3.2.2 - رەسىمنى كۆزىتىڭ، ئۇنىڭدىن a ، c ، $\sqrt{a^2 - c^2}$ نى

ئىپادىلەيدىغان كېسىكلەرنى تېپىپ چىقالامسىز؟

3.2.2 - رەسىمدىن بىلەلەيمىزكى، $|PO| = \sqrt{a^2 - c^2}$ ، $|OF_1| = |OF_2| = c$ ، $|PF_1| = |PF_2| = a$

بولىدۇ. $b = |PO| = \sqrt{a^2 - c^2}$ دەپ ئالساڭ، ئۇ ھالدا ① ئىپادە تۆۋەندىكىگە ئۆزگىرىدۇ:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0). \quad ②$$

يۇقىرىدىكى جەرياندىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئېللىپس ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى تەڭلىمە ② نى قانائەتلەندۈرىدۇ، تەڭلىمە ② نىڭ يېشىمى (x, y) نى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىدىن ئېللىپسنىڭ ئىككى فوكۇسى $F_2(c, 0)$ ، $F_1(-c, 0)$ گىچە بولغان ئارىلىقلارنىڭ يىغىندىسى $2a$ بولىدۇ، يەنى تەڭلىمە ② نىڭ يېشىمىنى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى ئېللىپسنىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ. ئەگرى سىزىق بىلەن تەڭلىمىنىڭ مۇناسىۋىتىدىن بىلەلەيمىزكى، تەڭلىمە ② ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسى بولىدۇ، بىز تەڭلىمە ② نى ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى دەپ ئاتايمىز. بۇ ئېللىپسنىڭ فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، ئىككى فوكۇسنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $F_2(c, 0)$ ، $F_1(-c, 0)$ بولۇپ، $c^2 = a^2 - b^2$ بولىدۇ.


مۇلاھىزە؟

4.2.2 - رەسىمدىكىدەك، ئەگەر فوكۇس F_2 ، F_1 لەر y ئوق ئۈستىدە

ياتسا ھەمدە F_2 ، F_1 لەرنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(0, c)$ ، $(0, -c)$

بولۇپ، a ، b لەرنىڭ مەنىسى يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش بولسا، ئۇ ھالدا ئېللىپس

نىڭ تەڭلىمىسى قانداق بولىدۇ؟



رەسىم 4.2.2 -

ئاسانلا بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ چاغدا ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسى

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

بولۇپ، بۇ تەڭلىمىمۇ ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى بولىدۇ.

1 - مىسال. ئېللىپسنىڭ ئىككى فوكۇسنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-2, 0)$ ، $(2, 0)$ بو.

لۇپ، بۇ ئېللىپسىنىڭ $(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2})$ نۇقتىسىدىن ئۆتىدىغانلىقى بېرىلگەن. ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

يېشىش: ئېللىپسىنىڭ فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدىغانلىقتىن، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك پەرەز قىلىمىز:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0).$$

ئېللىپسىنىڭ ئېنىقلىمىسىدىن بىلەلەيمىزكى،

$$2a = \sqrt{\left(\frac{5}{2} + 2\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{5}{2} - 2\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2} = 2\sqrt{10},$$


شۇڭا $a = \sqrt{10}$.

$$b^2 = a^2 - c^2 = 10 - 4 = 6 \text{ شۇڭا } c = 2.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، تاپماقچى بولغان ئېللىپسىنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ.

$$\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1.$$

بۇ ئېللىپسىنىڭ تەڭلىمىسىنى باشقا ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ تاپالامىسىز؟ قايسى خىل ئۇسۇل تېخىمۇ ئاددىي؟ سىز قانداق تەسىراتقا ئىگە بولىدىڭىز؟



رەسىم 5.2.2 -

2 - مىسال. 5.2.2 - رەسىمدىكىدەك، چەمبەر $x^2 + y^2 = 4$ ئۈستىدە. دىكى خالىغان بىر P نۇقتا ئارقىلىق x ئوققا تىك قىلىپ PD كېسىك ئۆتكۈزۈلگەن (تىك ئاساسى D). P نۇقتا چەمبەر ئۈستىدە ھەرىكەت قىلغاندا، PD كېسىكىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى M نىڭ تراپىكتورىيىسى نېمە بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

تەھلىل: P نۇقتىنىڭ چەمبەر $x^2 + y^2 = 4$ ئۈستىدە ھەرىكەت قىلدۇرۇشنى M نۇقتىنىڭ ھەرىكىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىز M نىڭ PD كېسىكىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولىدىغانلىقىغا ئاساسەن، M نۇقتا بىلەن

P نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىلىرى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت ئىپادىسىگە ئىگە بولالايمىز ھەم P نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى چەمبەر تەڭلىمىسىنى قانائەتلەندۈرىدىغانلىقىغا ئاساسەن، M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى قانائەتلەندۈرىدىغان تەڭلىمىنى تېپىپ چىقالايمىز.

يېشىش: M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى (x, y) ، P نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى (x_0, y_0) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$x = x_0, y = \frac{y_0}{2}.$$

$P(x_0, y_0)$ چەمبەر $x^2 + y^2 = 4$ ئۈستىدە ياتىدىغانلىقتىن،

$$x_0^2 + y_0^2 = 4. \quad ①$$

بۇنى $y_0 = 2y$ ، $x_0 = x$ تەڭلىمىسىگە قويىمىز:

$$x^2 + 4y^2 = 4,$$

بۇ مىسالنى يېشىشتە، M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى x, y بىلەن ئارىسىدىكى ئۆزگەرگۈچى مىقدار x_0, y_0 نىڭ مۇناسىۋىتىنى تېپىپ، ئاندىن x_0, y_0 لەرنى يوقىتىش ئارقىلىق M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىگە ئىگە بولىدۇ. مانا بۇ، ئانالىزنىڭ گېئومېترىيە نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىشتا دائىم قوللىنىلىدىغان بىر خىل ئۇسۇلدۇر.

شارائىتى بار مەكتەپلەر ئۈچۈر تېخنىكىسى قورالىدىن پايدىلىنىپ، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسىنىڭ شەكلى ئۈستىدە ئىزدىنىش ئېلىپ بارسا بولىدۇ.




يەنى

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

شۇڭا، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسى ئېللىپس بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

2 - مىسالدىن ئېللىپس بىلەن چەمبەرنىڭ مۇناسىۋىتىنى بايقىيالىدىڭىزمۇ؟



رەسىم 6.2.2 -

3 - مىسال. 6.2.2 - رەسىمدىكىدەك، A ، B نۇقتىلارنىڭ

كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-5, 0)$ ، $(5, 0)$ بولۇپ، BM ، AM تۈز سىزىقلار M نۇقتىدا كېسىشىدىغانلىقى ھەمدە ئۇلارنىڭ يانتۇ -

لۇقلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسى $-\frac{4}{9}$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. M نۇقتىنىڭ

تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

تەھلىل: M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى (x, y) دەپ پەرەز قىلىمىز.

ساق، ئۇ ھالدا BM ، AM تۈز سىزىقلارنىڭ يانتۇلۇقىنى x ، y نى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىپادە ئارقىلىق

ئىپادىلەشكە بولىدۇ. BM ، AM تۈز سىزىقلارنىڭ يانتۇلۇقلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسى $-\frac{4}{9}$ بولغانلىقتىن،

x ، y لەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت ئىپادىسىنى تۇرغۇزۇپ، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ.

يېشىش: M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى (x, y) دەپ پەرەز قىلىمىز، A نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى $(-5, 0)$ بولغانلىقتىن، AM تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$k_{AM} = \frac{y}{x+5} \quad (x \neq -5);$$

ئوخشاش يول بىلەن، BM تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$k_{BM} = \frac{y}{x-5} \quad (x \neq 5),$$

بېرىلگەن شەرتلەرگە ئاساسەن بىللەلەيمىزكى،

$$\frac{y}{x+5} \times \frac{y}{x-5} = -\frac{4}{9} \quad (x \neq \pm 5),$$

بۇنى ئاددىيلاشتۇرساق، M نۇقتىنىڭ تۆۋەندىكى تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىگە ئىگە بولىمىز:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{\frac{100}{9}} = 1 \quad (x \neq \pm 5).$$

شارائىتى بار مەكتەپلەر


ئۇچۇر تېخنىكىسى قورالىدىن پايدىلىنىپ، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسىنىڭ شەكلى ئۈستىدە ئىزدەنسە بولىدۇ.

1. ئەگەر ئېللىپس $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ ئۈستىدىكى بىر P نۇقتىدىن فوكۇس F_1 گىچە بولغان ئارىلىق 6 بولسا، ئۇ ھالدا P نۇقتىدىن يەنە بىر فوكۇس F_2 گىچە بولغان ئارىلىق _____ بولىدۇ.
2. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى يېزىڭ:
 - (1) $a=4, b=1$ ، فوكۇسى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ؛
 - (2) $a=4, c=\sqrt{15}$ ، فوكۇسى y ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ؛
 - (3) $a+b=10, c=2\sqrt{5}$.
3. ئېللىپس $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ نىڭ ئوڭ فوكۇسى F_2 ئارقىلىق x ئوققا تىك قىلىپ ئۆتكۈزۈلگەن AB تۈز سىزىق ئېللىپس بىلەن A, B ئىككى نۇقتىدا كېسىشىدىغانلىقى ھەم ئېللىپسنىڭ سول فوكۇسى F_1 ئىكەنلىكى بېرىلگەن.
 - (1) $\triangle AF_1B$ نىڭ ئايانما ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ؛
 - (2) ئەگەر AB تۈز سىزىق x ئوققا تىك بولمىسا، $\triangle AF_1B$ نىڭ ئايانما ئۇزۇنلۇقىدا ئۆزگىرىش بولامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟
4. A, B نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-1, 0), (1, 0)$ بولۇپ، AM, BM تۈز سىزىقلار M نۇقتىدا كېسىشسە ھەمدە AM تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى بىلەن BM تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقىنىڭ بۆلۈنمىسى 2 بولسا، M نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىسى نېمە بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟



كېسىش ئەگرى سىزىقى نېمە ئۈچۈن ئېللىپس بولىدۇ؟

1 - رەسىمدىكىدەك، كونۇسنى بىر تەكشىلىك بىلەن كەسىسەك، كېسىش ئەگرى سىزىقى ئېللىپس بولىدۇ. ئۇنداق بولسا، كېسىش ئەگرى سىزىقى نېمە ئۈچۈن ئېللىپس بولىدۇ؟



1 - رەسىم

تارىختا، نۇرغۇن كىشىلەر بۇ مەسىلىنى ساپ گېئومېتىرىيە نۇقتىسىدىن چىقىپ تەتقىق قىلغان، بۇلارنىڭ ئىچىدە ماتېماتىك Germinal Dandelin ئوتتۇرىغا قويغان ئۇسۇل ناھايىتى ئەپچىل ئۇسۇلدۇر.

چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان ئىككى شارنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا كونۇسنىڭ يان سىرتى ۋە كەسمە يۈزى بىلەن ئۇرۇنىدىغان قىلىپ كونۇس ئىچىگە سالىمىز ھەم بۇ ئىككى شار بىلەن كونۇس كەسمە يۈزىنىڭ ئۇرۇنۇش نۇقتىسىنى تېپىمىز.

سىنى ئايرىم - ئايرىم E ، F دەپ ئالىمىز، ئاندىن كېسىش ئەگرى سىزىقى ئۈستىدىن خالىغان بىر A نۇقتىنى ئېلىپ، A نۇقتا ئارقىلىق كونۇسنىڭ ياسىغۇچىسىنى ئۆتكۈزسەك، ئۇ ئىككى شار بىلەن ئايرىم - ئايرىم B ، C نۇقتىلاردا ئۇرۇنىدۇ. شار ۋە چەمبەرنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىدىن بىلەلەيمىزكى،

$$AE=AC, AF=AB,$$


شۇڭا

$$AE+AF=AB+AC=BC.$$

B ، C ئۇرۇنۇش نۇقتىلىرىنى ھاسىل قىلىش ئۇسۇلىدىن بىلىشكە بولىدۇكى، ئۇلارنىڭ ئارىلىقى BC مۇقىم قىممەت بولىدۇ. شۇڭا، كېسىش ئەگرى سىزىقى ئۈستىدىكى خالىغان بىر A نۇقتىدىن ئىككى مۇقىم نۇقتا E ، F كىچە بولغان ئارىلىقلارنىڭ يىغىندىسى تۇراقلىق سان بولىدۇ. ئېللىپسنىڭ ئېنىقلىمىسىدىن بىلىشكە بولىدۇكى، كېسىش ئەگرى سىزىقى ئېللىپس بولىدۇ.

Germinal Dandelin نىڭ بۇ ئۇسۇلى ئىنتايىن ئەپچىل بولۇپ، ئىجادىيەلىقلىمۇ ناھايىتى يۇقىرى. سىز ئۇنىڭ خىزمىتىنى كۆرگەندىن كېيىن، قانداق تەسىراتقا ئىگە بولىدىڭىز؟

2 - رەسىمدىكىدەك، سىلىندىرنى ئۇنىڭ ياسىغۇچىسى بىلەن يانتۇ كېسىشىدىغان بىر تەكشىلىك ئارقىلىق كەسىسەك، بىر كېسىش ئەگرى سىزىقى كېلىپ چىقىدۇ. سىز يۇقىرىدىكى ئۇسۇلغا تەقلىد قىلىپ، بۇ كېسىش ئەگرى سىزىقىنىڭ ئېللىپس بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىيالايسىز؟



2 - رەسىم

ئېللىپسنىڭ ئاددىي گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتى

2-2-2

ئەگرى سىزىقنىڭ دائىرىسى، سىمېترىكلىكى ۋە ئالاھىدە نۇقتىلىرىنى مۇھاكىمە قىلىش ئارقىلىق، ئەگرى سىزىقنىڭ شەكلى، چوڭ - كىچىكلىكى ۋە ئورنىنى ئومۇمىي جەھەتتىن ئىگىلىۋېلىشقا بولىدۇ. شۇڭا، بۇ بابتا بىر قانچە خىل كونۇس ئەگرى سىزىقنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى ئۇلارنىڭ دائىرىسى، سىمېترىكلىكى، چوققىسى ۋە باشقا ئالاھىدىلىكلىرى دېگەندەك تارماقلارغا بۆلۈپ تەتقىق قىلىمىز.

يۇقىرىدا ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى ئۇنىڭ ئېنىقلىمىسى (گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكى) دىن چىقىپ تۇرغۇزۇۋالدۇق. تۆۋەندە ئېللىپسنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىمىز، بۇ، ئېللىپسنىڭ شەكلى، چوڭ - كىچىكلىكى، سىمېترىكلىكى ۋە ئورنى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

بىز ئېللىپسنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0) \quad (1)$$

دىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىمىز.



ئېللىپس $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) نىڭ شەكلىنى كۆزىتىش، سىز شەكىلگە قاراپ ئۇنىڭ دائىرىسىنى بىلەلەمسىز؟ ئۇ قانداق سىممېترىكلىككە ئىگە؟ ئېللىپس ئۈستىدىكى قايسى نۇقتىلار ئالاھىدىرەك؟

1. دائىرىسى

7.2.2 - رەسىمنى كۆزىتىپ، شۇنى ئاسانلا كۆرۈۋالالايمىزكى، ئېللىپس ئۈستىدىكى نۇقتىلارنىڭ ئابسىسسسىنىڭ دائىرىسى $-a \leq x \leq a$ ، ئوردىناتىنىڭ دائىرىسى $-b \leq y \leq b$ بولىدۇ. تۆۋەندە ئۇنىڭ دائىرىسىنى تەڭلىمە (ئالگېبرالىق ئۇسۇل) دىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىمىز.

تەڭلىمە ① دىن بىلەلەيمىزكى،

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} \geq 0,$$

شۇڭا ئېللىپس ئۈستىدىكى نۇقتىلارنىڭ ئابسىسسسى تۆۋەندىكى تەڭسىزلىككە ئۇيغۇن كېلىدۇ:

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1,$$

يەنى

$$-a \leq x \leq a.$$


ئوخشاش يول بىلەن،

$$\frac{y^2}{b^2} \leq 1,$$

يەنى

$$-b \leq y \leq b.$$

بۇ، ئېللىپسنىڭ تۈز سىزىق $x = \pm a$ ۋە تۈز سىزىق $y = \pm b$ دىن قورشالغان تىك تۆتبۇلۇڭ شەكىللىك رامكا ئىچىگە جايلاشقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ (7.2.2 - رەسىم).



7.2.2 - رەسىم

2. سىممېترىكلىكى

ئېللىپسنىڭ شەكلىنى كۆزىتىش ئارقىلىق، ئۇنىڭ ھەم ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك شەكىل، ھەم مەركەزگە نىسبەتەن سىممېترىك شەكىل ئىكەنلىكىنى بايقاشقا بولىدۇ.

ئېللىپس $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) دە y نىڭ ئورنىغا $-y$ نى قويىساق، تەڭلىمە ئۆزگەرمەيدۇ، بۇ،

$P(x, y)$ نۇقتا ئېللىپسنىڭ ئۈستىدە ياتقاندا، ئۇنىڭ x ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك نۇقتىسى $P_1(x, -y)$ مۇ ئېللىپس ئۈستىدە ياتىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ، شۇڭا ئېللىپس x ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ؛ ئوخشاشلا، x نىڭ ئورنىغا $-x$ نى قويىساق، تەڭلىمە ئۆزگەرمەيدۇ، شۇڭا ئېللىپس y ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ؛ x نىڭ ئورنىغا $-x$ نى، y نىڭ ئورنىغا $-y$ نى قويىساق، تەڭلىمە يەنىلا ئۆزگەرمەيدۇ، شۇڭا ئېللىپس كوئوردېنات بېشىغا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ.

يۇقىرىقىلارنى ئومۇملاشتۇرساق، ئېللىپس x, y ئوقلارنىڭ ھەر ئىككىسىگە ۋە كوئوردېنات بېشىغا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ. بۇ يەردە، كوئوردېنات ئوقلىرى ئېللىپسنىڭ سىممېترىك ئوقى، كوئوردېنات بېشى ئېللىپسنىڭ سىممېترىك مەركىزى بولىدۇ، ئېللىپسنىڭ سىممېترىك مەركىزى ئېللىپسنىڭ مەركىزى دەپ ئاتىلىدۇ.


3. چوققىسى

ئەگرى سىزىقنىڭ ئورنىنى ئۇنىڭ ئۈستىدىكى بەزى ئالاھىدە نۇقتىلارنىڭ ئورنىنى مۇھاكىمە قىلىش ئارقىلىق بەلگىلەشكە بولىدۇ. ئەگرى سىزىقنىڭ كوئوردېنات سىستېمىسىدىكى ئورنىنى بەلگىلەشتە، كۆپ ھاللاردا ئەگرى سىزىق بىلەن x ئوق، y ئوقنىڭ كېسىشىش نۇقتىلىرىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىشقا توغرا كېلىدۇ.

ئىزدىنىش

ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسى $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) گە ئاساسەن، ئېللىپس بىلەن

x ئوق، y ئوقنىڭ كېسىشىش نۇقتىلىرىنىڭ كوئوردېناتىنى تاپالامسىز؟



رەسىم 8.2.2

ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىدە، $x=0$ دەپ ئالساق، $y=\pm b$ كېلىپ چىقىدۇ. بۇ، $B_2(0, b)$ ، $B_1(0, -b)$ نۇقتىلار ئېللىپس بىلەن y ئوقنىڭ ئىككى كېسىشىش نۇقتىسى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئوخشاشلا، $y=0$ دەپ ئالساق، $x=\pm a$ كېلىپ چىقىدۇ، بۇ، $A_2(a, 0)$ ، $A_1(-a, 0)$ نۇقتىلار ئېللىپس بىلەن x ئوقنىڭ ئىككى كېسىشىش نۇقتىسى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. x ئوق بىلەن y ئوق ئېللىپسنىڭ سىممېترىك


ئوقلىرى بولغانلىقتىن، ئېللىپس ئۆزىنىڭ سىممېترىك ئوقلىرى بىلەن تۆت نۇقتىدا كېسىشىدۇ، بۇ تۆت كېسىشىش نۇقتىسى ئېللىپسنىڭ چوققىلىرى دېيىلىدۇ (8.2.2 - رەسىمدىكىدەك).

كېسەك A_1A_2 بىلەن B_1B_2 ئايرىم - ئايرىم ئېللىپسنىڭ ئۇزۇن ئوقى ۋە قىسقا ئوقى دېيىلىدۇ، ئۇلارنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم $2a$ ۋە $2b$ غا تەڭ بولىدۇ، a بىلەن b ئايرىم - ئايرىم ئېللىپسنىڭ ئۇزۇن يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە قىسقا يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى دېيىلىدۇ.


4. مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى

مۇلاھىزە؟

ئوخشاش بولمىغان ئېللىپسلار (9.2.2 - رەسىم) نى كۆزىتىش ئارقىلىق، ئېللىپسلارنىڭ سوقچاقلىق دەرىجىسىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى بايقايمىز. ئۇنداق بولسا، ئېللىپسنىڭ سوقچاقلىق دەرىجىسىنى قانداق مىقدار بىلەن تەسۋىرلەشكە بولىدۇ؟



رەسىم 9.2.2 -



رەسىم 10.2.2 -

① ئېللىپسنىڭ مەركەزى - دىن قېچىش دەرىجىسىنى ئوبرازلىق ھالدا: ئېللىپسنىڭ ئۇزۇن ئوق ئۇزۇنلۇقى ئۆز - گەرمىگەن شەرت ئاستىدا، ئىككى فوكۇسنىڭ مەركەزدىن يىراقلىشىش دەرىجىسى دەپ چۈشىنىشكە بولىدۇ. بۇنداق بەلگىلەش كېيىن كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ بىر - دەكلىك خۇسۇسىيىتى دېگەن - دەك خۇسۇسىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىشىمىزغا قۇلايلىق يارىتىپ بېرىدۇ.

10.2.2 - رەسىمدىكىدەك، ئېللىپس $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)

نىڭ ئۇزۇن يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى a ، يېرىم فوكۇسلار ئارىلىقى c ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ئېللىپسنىڭ ئۇزۇن يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى a نى ئۆزگەرتىمەي، يېرىم فوكۇسلار ئارىلىقى c نى ئۆز - گەرتسەك، c نىڭ قىممىتى a غا قانچىكى يېقىنلاشسا، ئېللىپس شۇنچە سوقچاق بولىدىغانلىقىنى بايقايمىز. دېمەك، ئېللىپسنىڭ سوقچاقلىق دەرىجىسىنى c ۋە a ئىككى مىقدار ئارقىلىق تەسۋىر - لەشكە بولىدۇ.

بىز ئېللىپسنىڭ فوكۇسلار ئارىلىقى بىلەن ئۇزۇن ئوق ئۇزۇن - لۇقىنىڭ نىسبىتى $\frac{c}{a}$ نى ئېللىپسنىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرى -

جىسى ① دەپ ئاتاىپ، ئۇنى e بىلەن ئىپادىلەيمىز، يەنى $e = \frac{c}{a}$.

چۈنكى $0 < e < 1$ ، شۇڭا $a > c > 0$ ، e نىڭ قىممىتى 1 گە قانچىكى يېقىنلاشسا، c نىڭ قىممىتى a غا شۇنچە يېقىنلىشىپ، بۇنىڭ بىلەن $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ مۇ شۇنچە كىچىكلەيدۇ - دە، بۇ چاغدا ئېللىپس شۇنچە سوقچاق بولىدۇ؛ ئەكسىچە، e نىڭ قىممىتى 0 گە قانچىكى يېقىنلاشسا، c نىڭ قىممىتى 0 گە شۇنچە يېقىنلىشىپ، بۇنىڭ بىلەن b مۇ a غا شۇنچە يېقىنلىشىدۇ - دە، بۇ چاغدا ئېل - لىپس چەمبەرگە شۇنچە يېقىنلىشىدۇ.

پەقەت ۋە پەقەت $a = b$ بولغاندا، $c = 0$ بولۇپ، بۇ چاغدا ئىككى فوكۇس ئۈستىمۇئۈست چۈشىدۇ - دە، ئېللىپس چەمبەرگە ئايلىنىدۇ، ئۇنىڭ تەڭلىمىسى:

$$x^2 + y^2 = a^2.$$



تەسۋىرلەپ بېرەلەمدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

مېترييلىك فۇنكسىيە بىلىملىرىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟ $e = \frac{c}{a}$ قانچە كىچىك بولسا،

ئېللىپس شۇنچە يۇمىلاق بولامدۇ؟

كەزدىن قېچىش دەرىجىسى، فوكۇسلرى ۋە چوققىلىرىنىڭ كوئوردىناتىنى تاپايلى.

يېشىش: بىرلگەن تەڭلىمنى تۆۋەندىكى ئۆلچەملىك تەڭلىمىگە ئايلاندۇرىمىز:

$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1,$$

شۇنىڭ بىلەن، $a=5$ ، $b=4$ ، $c=\sqrt{25-16}=3$ بولىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئېللىپسىنىڭ ئۇزۇن ئوقى ۋە قىسقا ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم $2a=10$ ۋە

مهرکز دښن قېچش دهر بجسی $2b=8$ ، $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$ ، ئمکی فوکوس۔

نىڭ كۆرۈنىشى ئايرىم - ئايرىم $F_1(-3, 0)$ ۋە $F_2(3, 0)$ نۇقتىسىدە تۇرۇپ

چوققىسىنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $A_2(5, 0)$, $A_1(-5, 0)$

$B_1(0, -4)$ ۋە $B_2(0, 4)$ بولىدۇ.

5 - مىسال. 11.2.2 - رەسىمدىكىدەك، بىر خىل كىنو قويۇش

لامپۇچكىسىنىڭ نۇر قايتۇرۇش سىنىئەينىكى ئايلانما ئېللىپسسىد

(ئېللىپسىنى ئۇنىڭ سىممېتىرىك ئوقىنى چۆرىدىتىپ تولۇق بىر قېتىم ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ئېلىپ بارىلىشى مۇمكىن.)

تتم ئايلاندۇرۇشتىن ھاسىل بولغان ئەگرى سىرت) نىڭ بىر قىسمى

ئىكەنلىكى بېرىلگەن. سىمىتىرىك ئوقتىن ئۆتكەن كېسىش ئېغىزى

BAC ئېللىپسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، لامپۇچكا قىلى ئېللىپسىنىڭ

بر فوکوسی F_1 گه، لپنتا ئىشكى يەنە بر فوکوسی F_2 گه جايلاش -


قان. ئېلېپسنىڭ بىر فوكۇسى F_1 دىن چىققان يورۇقلۇق نۇرى

ئايالناما ئېللىپسىس ئىدىتىن قايتىپ يەنە بىر فوكۇس F_2 گە يىغىلىدۇ،

ئەگەر $|F_1F_2|=4.5\text{ cm}$ ، $|F_1B|=2.8\text{ cm}$ ، $BC \perp F_1F_2$ بولسا، مۇۋاپىق كوئوردىنات سىستېمىسى تۈر - غۇزۇپ، كېسىش ئېغىزى BAC پاتقان ئېللىپسىنىڭ تەڭلىمىسىنى تاپايلى (0.1 cm غىچە ئېنىقلىقتا).

يېشىش: 11.2.2 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردىنات سىستېمىسى تۇرغۇ -

زۇپ، تاپماقچى بولغان ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك دەپ پەرەز قىلىمىز:



11.2.2 - رسم

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

، دە $Rt \triangle BF_1F_2$

$$\begin{aligned} |F_2B| &= \sqrt{|F_1B|^2 + |F_1F_2|^2} \\ &= \sqrt{2.8^2 + 4.5^2}. \end{aligned}$$

ئېللىپسنىڭ خۇسۇسىيىتىدىن $|F_1B| + |F_2B| = 2a$ بولىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز، شۇڭا

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2} (|F_1B| + |F_2B|) \\ &= \frac{1}{2} (2.8 + \sqrt{2.8^2 + 4.5^2}) \\ &\approx 4.1; \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} b &= \sqrt{a^2 - c^2} \\ &= \sqrt{4.1^2 - 2.25^2} \\ &\approx 3.4. \end{aligned}$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، تاپماقچى بولغان ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\frac{x^2}{4.1^2} + \frac{y^2}{3.4^2} = 1.$$

6 - مىسال. $M(x, y)$ نۇقتىسىدىن مۇقىم نۇقتا $F(4, 0)$ كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن تۈز سىزىق $l: x = \frac{25}{4}$ كىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى تۇراقلىق سان $\frac{4}{5}$ بولسا، M نۇقتىسىنىڭ تراپېك-تورىيىسىنى تاپايلى.

يېشىش: M نۇقتىسىدىن تۈز سىزىق $l: x = \frac{25}{4}$ كىچە بولغان ئارىلىقنى d دەپ پەرەز قىلساق، مە-سالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن، M نۇقتىسىنىڭ تراپېكتورىيىسى تۆۋەندىكى تويلامدىن ئىبارەت بولىدۇ:



رەسىم 12.2.2 -

$$P = \left\{ M \mid \frac{|MF|}{d} = \frac{4}{5} \right\},$$

بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىگە ئىگە بولىمىز:

$$\frac{\sqrt{(x-4)^2 + y^2}}{\left| \frac{25}{4} - x \right|} = \frac{4}{5}.$$


بۇ ئىپادىنىڭ ئىككى تەرىپىنى كۋادراتقا كۆتۈرۈپ، ئاندىن ئاد-دىلاشتۇرساق، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$9x^2 + 25y^2 = 225,$$

يەنى

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

شۇڭا، M نۇقتىسىنىڭ تراپېكتورىيىسى ئۇزۇن ئوقى ۋە قىسقا ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم 5 ۋە 3 بولغان ئېللىپستىن ئىبارەت بولىدۇ (رەسىمدىكىدەك). 10



رەسىم 13.2.2

7 - مىسال. ئېللىپس $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، تۈز سىزىق $l: 4x - 5y + 40 = 0$

بېرىلگەن. ئېللىپسنىڭ ئۈستىدە ياتىدىغان ھەم l تۈز سىزىققىچە ئا- رىلىقى ئەڭ كىچىك بولىدىغان بىر نۇقتا مەۋجۇتۇ؟ بۇ ئەڭ كىچىك ئارىلىق قانچە؟

تەھلىل: l تۈز سىزىق بىلەن ئېللىپسنى سىزىمىز (13.2.2 - رەسىمدىكىدەك). شەكىلنى كۆزىتىش ئارقىلىق بىلەلەيمىزكى، l تۈز سىزىققا پاراللېل ھەمدە ئېللىپس بىلەن پەقەت بىرلا كېسىشىش

نۇقتىسىغا ئىگە بولغان تۈز سىزىقتىن پايدىلىنىپ، ماس ھالدىكى ئەڭ كىچىك ئارىلىقنى تېپىشقا بولىدۇ. يېشىش: l تۈز سىزىق بىلەن ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسىگە ئاساسەن بىلىشكە بولىدۇكى، l تۈز سىزىق بىلەن ئېللىپس كېسىشمەيدۇ (نېمە ئۈچۈن؟). m تۈز سىزىقنى l تۈز سىزىققا پاراللېل دەپ پەرەز قىل- ساق، ئۇ ھالدا m تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$4x - 5y + k = 0. \quad (1)$$

تەڭلىملەر سىستېمىسى

$$\begin{cases} 4x - 5y + k = 0, \\ \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$$

دىكى y نى يوقاتساق:

$$25x^2 + 8kx + k^2 - 225 = 0. \quad (2)$$

تەڭلىمە (2) نىڭ يىلتىزىنىڭ ئېنىقلىغۇچىسىنى $\Delta = 0$ دەپ ئالساق، تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$64k^2 - 4 \times 25(k^2 - 225) = 0. \quad (3)$$

تەڭلىمە (3) نى يەشسەك:

$$k_1 = 25 \text{ ياكى } k_2 = -25.$$

13.2.2 - رەسىمدىن بىلىشكە بولىدۇكى، $k = 25$ بولغاندا، m تۈز سىزىق بىلەن ئېللىپسنىڭ كې- سىشىش نۇقتىسىدىن l تۈز سىزىققىچە بولغان ئارىلىق ئەڭ يېقىن بولۇپ، بۇ ۋاقىتتا m تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى $4x - 5y + 25 = 0$ بولىدۇ. m تۈز سىزىق بىلەن l تۈز سىزىقنىڭ ئارىلىقى:

$$d = \frac{|40 - 25|}{\sqrt{4^2 + 5^2}} = \frac{15}{41} \sqrt{41}.$$

شۇڭا، ئەڭ كىچىك ئارىلىق $\frac{15}{41} \sqrt{41}$ بولىدۇ.

ئەڭ چوڭ ئارىلىق

قانچە؟



مەشىق

1. رەسىمدىكى ئېللىپسنىڭ فوكۇسلىرىنىڭ ئورنىنى بەلگىلەپ بېرەلەمسىز؟ نېمىگە ئاساسلاندىڭىز؟

2. تۆۋەندىكى ئېللىپسلارنىڭ فوكۇسلىرىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىڭ:

(1 - مىسال ئۈچۈن)

$$(1) \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1;$$

$$(2) 2x^2 + y^2 = 8.$$

3. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، $a=6$ ، $e=\frac{1}{3}$ ؛

(2) فوكۇسلىرى y ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، $c=3$ ، $e=\frac{3}{5}$.

4. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) $P(-3, 0)$ ، $Q(0, -2)$ نۇقتىلاردىن ئۆتىدۇ؛

(2) ئۇزۇن ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 گە تەڭ، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى $\frac{3}{5}$ كە تەڭ.

5. تۆۋەندە بېرىلگەن ھەر بىر گۈرۈپپىدىكى ئىككى ئېللىپسنىڭ شەكلىنى سېلىشتۇرۇڭ، قايسىسى تېخىمۇ يۇمىلاق، قايسىسى تېخىمۇ سوقىچاق؟ نېمە ئۈچۈن؟

(1) $9x^2 + y^2 = 36$ ، $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ ؛

(2) $x^2 + 9y^2 = 36$ ، $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{10} = 1$.

6. تۆۋەندە بېرىلگەن تۈز سىزىق بىلەن ئېللىپسنىڭ كېسىش نۇقتىسىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىڭ:

(1) $3x + 10y - 25 = 0$ ، $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ ؛

(2) $3x - y + 2 = 0$ ، $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

7. ئېللىپس $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ نىڭ سول فوكۇسى F_1 ئارقىلىق يانتۇلۇق بۇلۇڭى 60° بولغان l تۈز سىزىقنى

ئۆتكۈزسەك، l تۈز سىزىق بىلەن ئېللىپس A ، B ئىككى نۇقتىدا كېسىشىدۇ. AB نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.

2.2 - كۆنۈكمە



A گۈرۈپپا

1. ئەگەر $M(x, y)$ نۇقتا ھەرىكەت قىلىش جەريانىدا ھامان مۇناسىۋەت ئىپادىسى

$$\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + \sqrt{x^2 + (y-3)^2} = 10$$

نى قانائەتلەندۈرسە، ئۇ ھالدا M نۇقتىسىنىڭ تراپېكتورىيىسى قانداق ئەگرى سىزىق بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟ ئۇنىڭ تەڭلىمىسىنى يېزىڭ.

2. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى يېزىڭ:

(1) فوكۇسى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، فوكۇسلار ئارىلىقى 4 كە تەڭ ھەم $P(3, -2\sqrt{6})$ نۇقتىسىدىن ئۆتىدۇ؛

(2) فوكۇسلىرىنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(0, 4)$ ، $(0, -4)$ ، $a=5$ ؛

(3) $a+c=10$ ، $a-c=4$.

3. تۆۋەندىكى ئېللىپسلىرىنىڭ دائىرىسىنى مۇھاكىمە قىلىڭ ھەم شەكلىنى سىزىڭ:

(1) $4x^2 + y^2 = 16$;

(2) $5x^2 + 9y^2 = 100$.

4. تۆۋەندىكى ئېللىپسلىرىنىڭ ئۇزۇن ئوقى ۋە قىسقا ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى، فوكۇسلىرى ۋە چوققىلىرىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىڭ:

(1) $x^2 + 4y^2 = 16$;

(2) $9x^2 + y^2 = 81$.

5. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:


(1) $Q(0, \sqrt{5})$, $P(-2\sqrt{2}, 0)$ نۇقتىلاردىن ئۆتىدۇ;

(2) ئۇزۇن ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى قىسقا ئوقى ئۇزۇنلۇقىنىڭ 3 ھەسسىسىگە تەڭ ھەمدە $P(3, 0)$ نۇقتىسىدىن ئۆتىدۇ;

(3) فوكۇسلار ئارىلىقى 8 گە، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى 0.8 گە تەڭ.

6. P نۇقتا ئېللىپس $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ نىڭ ئۈستىدىكى بىر نۇقتا ھەمدە P نۇقتا ۋە فوكۇس F_2 , F_1 لارنى

چوققا قىلغان ئۇچبۇلۇڭنىڭ بۇزى 1 گە تەڭ ئىكەنلىكى بېرىلگەن، P نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىڭ.



7. رەسىمدىكىدەك، O چەمبىرىنىڭ رادىئۇسى مۇقىم ئۇزۇنلۇق r غا تەڭ، A بولسا O چەمبىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر مۇقىم نۇقتا، P بولسا O چەمبىرى ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا، AP كېسىكىنىڭ تەڭ بۆلگۈچىسى l بىلەن OP رادىئۇس Q نۇقتىدا كېسىشىدۇ. P نۇقتا چەمبىرى ئۈستىدە ھەرىكەت قىلغاندا، Q نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىسى نېمە بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

8. ئېللىپس $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ۋە بىر گۈرۈپپا پارالېل سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى $\frac{3}{2}$

(7 - مىسال ئۈچۈن)

ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

(1) بۇ بىر گۈرۈپپا پارالېل تۈز سىزىق قانداق ۋاقىتتا ئېللىپس بىلەن كېسىشىدۇ؟

(2) بۇ پارالېل سىزىقلار ئېللىپس بىلەن كېسىشكەندە، ھاسىل بولىدىغان كېسىكلەرنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بىر تۈز سىزىق ئۈستىدە ياتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.


9. «زىچىشەن 1 - نومۇرلۇق» كومېتا (قۇيرۇقلۇق يۇلتۇز) نى نەنجىن رەسەتخانىسى بايقىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئايلىنىش ئوربىتىسى قۇياشنى بىر فوكۇس قىلغان ئېللىپستىن ئىبارەت. بۇ ئوربىتىنىڭ قۇياشقا يېقىن نۇقتىسى (قۇياش بىلەن ئارىلىقى ئەڭ يېقىن بولغان نۇقتا) دىن قۇياش مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىقى 1.486 ئاسترونومىيە بىرلىكىگە، قۇياشقا يىراق نۇقتىسى (قۇياش بىلەن ئارىلىقى ئەڭ يىراق بولغان نۇقتا) دىن قۇياش مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىقى 5.563 ئاسترونومىيە بىرلىكىگە تەڭ (1 ئاسترونومىيە بىرلىكى دېگىنىمىز قۇياشتىن يەر شارىغىچە بولغان ئوتتۇرىچە ئارىلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ تەخمىنەن $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ غا تەڭ) ئىكەنلىكى ھەمدە قۇياشقا يېقىن نۇقتا، قۇياشقا يىراق نۇقتا ۋە قۇياش مەركىزىنىڭ ئوخشاش بىر تۈز سىزىق ئۈستىدە ياتىدىغانلىقى ئۆلچەپ چىقىلغان بولسا، ئوربىتىنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

10. يەر شارىنىڭ ئايلىنىش ئوربىتىسى ئۇزۇن ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى $a = 1.50 \times 10^8 \text{ km}$ ، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى $e = 0.0192$ بولغان ئېللىپس بولۇپ، قۇياش بۇ ئېللىپسنىڭ بىر فوكۇسى ئۈستىدە ياتىدىغانلىقى بېرىلگەن. يەر شارىدىن قۇياشقىچە بولغان ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ كىچىك ئارىلىقىنى تېپىڭ.


B گۈرۈپپا

1. رەسىمدىكىدەك، x ئوق $DP \perp$ بولۇپ، M نۇقتا DP نىڭ داۋامى ئۈستىدە ياتىدۇ ھەمدە $\frac{|DM|}{|DP|} = \frac{3}{2}$.

P نۇقتا چەمبەر $x^2+y^2=4$ نىڭ ئۈستىدە ھەرىكەت قىلغاندا، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ ھەم تراپىكتورىيىنىڭ شەكلىنى چۈشەندۈرۈڭ. بۇنى 45 - بەتتىكى 2 - مىسالغا سېلىشتۇرۇڭ، نېمىنى بايقىدىڭىز؟
2. بىر ھەرىكەتچان چەمبەرنىڭ چەمبەر $x^2+y^2+6x+5=0$ بىلەن سىرتتىن، چەمبەر $x^2+y^2-6x-91=0$ بىلەن ئىچتىن ئۇرۇنىدىغانلىقى بېرىلگەن بولسا، ھەرىكەتچان چەمبەر مەركىزىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ ھەم ئۇنىڭ قانداق ئەگرى سىزىق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈڭ.



(4 - مىسال ئۈچۈن)



(1 - مىسال ئۈچۈن)

3. M نۇقتىدىن مۇقىم نۇقتا $F(2, 0)$ كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن مۇقىم تۈز سىزىق $x=8$ گە - چە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى 1 : 2 ئىكەنلىكى بېرىلگەن. M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ ھەم تراپىكتورىيىنىڭ قانداق شەكىل بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ.
4. رەسىمدىكىدەك، تىك تۆتبۇلۇڭ $ABCD$ دا، $|AB|=8$ ، $|BC|=6$ بولۇپ، E, F, G, H لار ئايرىم - ئايرىم تىك تۆتبۇلۇڭنىڭ تۆت تەرىپىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى، T, S, R لار OF كېسىكىنى تەڭ تۆتكە بۆلگۈچى نۇقتىلار، T', S', R' لار CF كېسىكىنى تەڭ تۆتكە بۆلگۈچى نۇقتىلار ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۈز سىزىق ER بىلەن ES, GR' بىلەن ET, GS' بىلەن GT' نىڭ كېسىشىش نۇقتىسى L, M, N لارنىڭ ھەممىسى ئېللىپس $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ نىڭ ئۈستىدە ياتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ قوللىنىلىشى


قوللىنىلىشى




«گېئومېترىيىلىك سىزىش تاختىسى (几何画板)» دىن پايدىلىنىپ -
نىپ نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسى - ئېللىپس ئۈستىدە ئىزدىنىش

رەسىمدىكىدەك، F مۇقىم نۇقتا، l بولسا F نۇقتىدىن ئۆتمەيدىغان مۇقىم تۈز سىزىق، ھە - رىكەتچان نۇقتا M دىن مۇقىم نۇقتا F كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن مۇقىم تۈز سىزىق l غىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى e بولۇپ، $0 < e < 1$ دىن كىچىك بولغان تۇراقلىق سان. ھەرد - كەتچان نۇقتا M نىڭ تراپىكتورىيىسىنى يۇمشاق دېتال «گېئومېترىيىلىك سىزىش تاختىسى» دىن پايدىلىنىپ سىزىپ چىقساق، بۇ تراپىكتورىيىنى كۆزىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ بىر ئېلىپس ئىكەنلىكىنى بايقايمىز.

دائىرە $0 < e < 1$ ئىچىدە، e نىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى ياكى F نۇقتا بىلەن تۈز سىزىق l نىڭ نىسبىتى ئورنىنى ئۆزگەرتسەك، ھەرىكەتچان نۇقتا M نىڭ تراپىكتورىيىسى يەنىلا بىر ئېلىپس بولىدىغانلىقىنى بايقايمىز (1 - رەسىم).



رەسىم 2 -



رەسىم 1 -

يۇقىرىقى مەسىلىنى تەكشىلىكتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ تۆۋەندىكىدەك بايان قىلالايمىز:

ئەگەر $M(x, y)$ نۇقتىسىدىن مۇقىم نۇقتا $F(c, 0)$ كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن مۇقىم تۈز سىزىق $l: x = \frac{a^2}{c}$ كىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى تۇراقلىق سان $\frac{c}{a}$ ($a > c > 0$) غا تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا M نۇقتىسىنىڭ تراپېكتورىيىسى بىر ئېللىپس بولىدۇ (رەسىمىدەك).

مۇقىم نۇقتا $F(c, 0)$ ئېللىپسنىڭ بىر فوكۇسى بولىدۇ، تۈز سىزىق $l: x = \frac{a^2}{c}$ ئېللىپسنىڭ فوكۇس F كە ماس بولغان يۆنەلدۈرگۈچىسى دەپ ئاتىلىدۇ. ئېللىپسنىڭ سىممېترىكلىكىگە ئاساسەن، ئېللىپسنىڭ فوكۇس $F'(-c, 0)$ گە ماس بولغان يۆنەلدۈرگۈچىسى $l': x = -\frac{a^2}{c}$ بولىدۇ.

يۇقىرىدىكى ئېللىپسنىڭ تەڭلىمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز؟ بۇ ئېللىپسنىڭ ئۇزۇن ئوقى ۋە قىسقا ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى ئايرىم - ئايرىم قانچە بولىدۇ؟


ھىپېربولا

ھىپېربولا ۋە ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى

1-3-2

مۇلاھىزە؟

بىزگە مەلۇمكى، ئىككى مۇقىم نۇقتىغىچە ئارىلىقلىرىنىڭ يىغىندىسى نۆل بولمىغان تۇراقلىق سان (ئىككى مۇقىم نۇقتا ئارىسىدىكى ئارىلىقتىن چوڭ) غا تەڭ بولغان نۇقتىلارنىڭ تراپىكتورىيىسى ئېللىپس بولىدۇ. ئۇنداق بولسا، ئىككى مۇقىم نۇقتىغىچە ئارىلىقلىرىنىڭ ئايرىمىسى نۆل بولمىغان تۇراقلىق سانغا تەڭ بولغان نۇقتىلارنىڭ تراپىكتورىيىسى نېمە بولىدۇ؟



رەسىم 1.3.2 -

1.3.2 - رەسىمدىكىدەك، بىر سىيرىتمىنىڭ بىر بۆلىكىنى تارتىپ ئېچىپ، ئېچىلغان ئىككى تەرىپىنىڭ ھەربىرىدىن بىر نۇقتىنى تاللايمىز ھەم ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا F_1 ، F_2 نۇقتىلارغا مۇقىملاشتۇرىمىز، قېرىنداش ئۇچىنى M نۇقتىغا قو- يۇپ، سىيرىتمىنى تەدرىجىي ئاچساق ياكى ئەتسەك، قېرىنداش ئۇچى بېسىپ ئۆتكەن نۇقتىلار بىر ئەگرى سىزىقنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئەگرى سىزىق تۆۋەندىكى شەرتنى قانائەتلەندۈرىدىغان نۇقتىلارنىڭ توپلىمىدىن ئىبارەت:

$$P = \{M \mid |MF_1| - |MF_2| = \text{سان}\}.$$

ئەگەر M نۇقتىسىدىن F_2 نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىقتىن ئۇنىڭدىن F_1 نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىقنى ئالغاندىكى ئايرىمىنى ئوخشاش بىر تۇراقلىق سانغا تەڭ قىلساق، ئۇ ھالدا يەنە بىر ئەگرى سىزىق (1.3.2 - رەسىمنىڭ سول تەرىپىدىكى ئەگرى سىزىق) قا ئىگە بولىمىز. بۇ ئەگرى سىزىق تۆۋەندىكى شەرتنى قانائەتلەندۈرىدىغان نۇقتىلارنىڭ توپلىمىدىن ئىبارەت:

$$P = \{M \mid |MF_2| - |MF_1| = \text{سان}\}.$$

بۇ ئىككى ئەگرى سىزىق بىرلەشتۈرۈلۈپ ھىپېربولا دەپ ئاتىلىدۇ، ھەربىر ئەگرى سىزىق ھىپېر- بولانىڭ بىر تارمىقى دېيىلىدۇ.


مۇلاھىزە؟

ئېللىپسنىڭ ئېنىقلىمىسىغا تەقاسلاپ، ھىپېربولانىڭ ئېنىقلىمىسىنى ئوتتۇرىغا قويالايمىز؟

تەكشۈرۈلگەن ئىككى مۇقىم نۇقتا F_1, F_2 گىچە ئارىلىقلارنىڭ ئايرىمىسىنىڭ مۇتلەق قىممىتى تۇراقلىق سان ($|F_1F_2|$ دىن كىچىك) غا تەڭ بولغان نۇقتىلارنىڭ تراپىكتورىيىسى ھىپېربولا (hyperbola) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئىككى مۇقىم نۇقتا ھىپېربولانىڭ فوكۇسى، ئىككى فوكۇسنىڭ ئارىلىقى ھىپېربولانىڭ فوكۇسلار ئارىلىقى دەپ ئاتىلىدۇ.

ئىزدىنىش

ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇش جەريانىغا تەققاسلاپ، كۆرۈڭ-
نات سىستېمىسىنى قانداق تاللاش ۋە ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى قانداق
تۇرغۇزۇش كېرەكلىكىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟



رەسىم 2.3.2 -

بىز ھىپېربولانىڭ گېئومېترىيەلىك ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، مۇۋاپىق كۆرۈنۈش سىستېمىسىنى تاللاپ، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۈزۈمىز.

2.3.2 - رەسىمدىكىدەك، x ئوق F_1, F_2 فوكۇسلاردىن ئۆتىدىغان، y ئوق F_1F_2 كېسىكىنىڭ تەڭ بۆلگۈچىسى بولىدىغان قىلىپ تىك بۆلۈڭ. لۇق كۆرۈنۈش سىستېمىسى xOy نى تۇرغۇزۇمىز.

$M(x, y)$ نى ھىپېربولا ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا، ھىپېربولانىڭ فوكۇسلار ئارىلىقىنى $2c$ ($c > 0$) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا F_1, F_2 فوكۇسلارنىڭ كۆرۈنۈش ئايرىمى - ئايرىم $(-c, 0)$ ، $(c, 0)$ بولىدۇ. ئاندىن M نۇقتىدىن F_1, F_2 نۇقتىلارغىچە بولغان ئارىلىقلار ئايرىمىسىنىڭ مۇتلەق قىممىتىنى تۇراقلىق سان $2a$ غا تەڭ دەپ پەرەز قىلىمىز.

ئېنىقلىمىدىن بىلەلەيمىزكى، ھىپېربولا تۆۋەندىكى توپلامدىن ئىبارەت بولىدۇ:

$$P = \{M \mid |MF_1| - |MF_2| = 2a\}.$$

$$\therefore |MF_1| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, |MF_2| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

$$\therefore \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a. \quad (1)$$

ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇشتىكى ئاددىيلاش.

تۈرۈش جەريانىغا تەققاسلاپ، ① نى ئاددىيلاشتۇرساق، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2),$$

ئىككى تەرىپىنى بىرلا ۋاقىتتا $a^2(c^2 - a^2)$ قا بۆلسەك، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1.$$

ھىپېربولانىڭ ئېنىقلىمىسىدىن بىلىمىزكى، $2c > 2a$ ، يەنى $c > a$ ،

شۇڭا $c^2 - a^2 > 0$ بولىدۇ.

ئېللىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇش جەريانىغا

تەققاسلاپ، $c^2 - a^2 = b^2$ ($b > 0$) دەپ ئالساق ھەم ئۇنى يۇقىرىقى ئىپادىگە قويساق، تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$2a$ دەپ پەرەز قىلىش

مەسىلىنى تەتقىق قىد.

لىشىمىزغا قۇلايلىق يا.

رتىپ بېرىدۇ.

سىز y ئوق ئۈستىدە.

دىن $|OB| = b$ بولىدۇ.


غان قىلىپ بىر B نۇقتا.

تىنى تاپالامسىز؟

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a>0, b>0). \quad (2)$$

يۇقىرىدىكى جەرياندىن كۆرۈۋالالايمىزكى، ھىپېربولانىڭ ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى تەڭلىمە ② نى قانائەتلەندۈرىدۇ، تەڭلىمە ② نىڭ يېشىمى (x, y) نى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىدىن ھىپېربولانىڭ ئىككى فوكۇسى $F_1(-c, 0)$ ، $F_2(c, 0)$ گىچە بولغان ئارىلىقلار ئايرىمىسىنىڭ مۇتلەق قىممىتى $2a$ بولىدۇ، يەنى تەڭلىمە ② نىڭ يېشىمىنى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى ھىپېربولانىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ. ئەگرى سىزىق بىلەن تەڭلىمىنىڭ مۇناسىۋىتىدىن بىلەلەيمىزكى، تەڭلىمە ② ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسى بولىدۇ. بىز تەڭلىمە ② نى ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى دەپ ئاتايمىز. ئۇ فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتقان، فوكۇسلىرى ئايرىم - ئايرىم $F_1(-c, 0)$ ، $F_2(c, 0)$ بولغان ھىپېربولانى ئىپادىلەيدۇ، بۇ يەردە $c^2 = a^2 + b^2$ بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟



رەسىم 3.3.2 -

3.3.2 - رەسىمدىكىدەك، فوكۇسى y ئوق ئۈستىدە ياتقان ئېلىپسنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىگە تەققاسلىساق، ھىپېربولانىڭ فوكۇسلىرى ئايرىم - ئايرىم $F_1(0, -c)$ ، $F_2(0, c)$ بولۇپ، a ، b لارنىڭ مەنىسى يۇقىرىدا دېيىلگەندىكىگە ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى قانداق بولىدۇ؟

بۇ چاغدا ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a>0, b>0),$$

بۇ تەڭلىمىمۇ ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى بولىدۇ.

1 - مىسال. ھىپېربولانىڭ ئىككى فوكۇسى ئايرىم - ئايرىم $F_1(-5, 0)$ ، $F_2(5, 0)$ بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى بىر P نۇقتىدىن F_1 ، F_2 گىچە بولغان ئارىلىقلار ئايرىمىسىنىڭ مۇتلەق قىممىتى 6 گە تەڭ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

يېشىش: ھىپېربولانىڭ فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدىغانلىقتىن، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك پەرەز قىلساق بولىدۇ:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a>0, b>0).$$


$2a=6$ ، $2c=10$ بولغانلىقتىن، $a=3$ ، $c=5$ بولىدۇ، شۇڭا $b^2 = 5^2 - 3^2 = 16$.

شۇنىڭ ئۈچۈن، ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

2 - مىسال. A, B ئىككى جاينىڭ ئارىلىقى 800 m بولۇپ، زەمبىرەك ئوقىنىڭ پارتلاش ئاۋازىنى A جايدىكىلەر B جايدىكىلەردىن 2 s كېيىن ئاڭلايدىغانلىقى ھەمدە ئاۋازنىڭ تېزلىكى 340 m/s ئىكەنلىكى بېرىلگەن. زەمبىرەك ئوقى پارتلاش نۇقتىسىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

تەھلىل: ئالدى بىلەن مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن، تراپىكتورىيەنىڭ شەكلىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇشقا. ئاۋازنىڭ تېزلىكى ۋە A, B ئىككى جايدا تۇرۇپ پارتلاش ئاۋازىنى ئاڭلىغاندىكى ۋاقىت پەرقىگە ئاساسەن، A, B ئىككى جايدىن پارتلاش نۇقتىسىغىچە بولغان ئارىلىقلار ئايرىمىسىنىڭ مۇقىم قىممەت بولىدىغانلىقىنى بىلىمىز. شۇڭا، پارتلاش نۇقتىسى A, B نى فوكۇس قىلغان ھىپېربولانىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ. پارتلاش نۇقتىسىدىن A جايغىچە بولغان ئارىلىق ئۇنىڭدىن B جايغىچە بولغان ئارىلىقتىن چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن، پارتلاش نۇقتىسى ھىپېربولانىڭ B جايغا يېقىن بولغان بىر تارمىقى ئۈستىدە بولۇشى كېرەك.



رەسىم - 4.3.2

يېشىش: 4.3.2 - رەسىمدىكىدەك، A, B ئىككى نۇقتا x ئوقى ئۈستىدە ياتىدىغان ھەمدە كوئوردېنات بېشى O كېسەك AB نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بىلەن ئۈستىمۇئۈست چۈشىدىغان قىلىپ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى xOy نى تۇرغۇزۇۋالىمىز.

پارتلاش نۇقتىسى P نىڭ كوئوردېناتىنى (x, y) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$|PA| - |PB| = 340 \times 2 = 680,$$

يەنى

$$2a = 680, a = 340.$$

$$\therefore |AB| = 800,$$

$$\therefore 2c = 800, c = 400,$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 44\,400.$$

$$\therefore |PA| - |PB| = 340 \times 2 = 680 > 0,$$


$$\therefore x > 0.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، زەمبىرەك ئوقىنىڭ پارتلاش نۇقتىسىنىڭ تراپىكتورىيە (ھىپېربولا) تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\frac{x^2}{115\,600} - \frac{y^2}{44\,400} = 1 \quad (x > 0).$$

ئوخشاش بولمىغان ئىككى كۆزىتىش نۇقتىسى A, B دا تۇرۇپ ئوخشاش بىر P نۇقتىسىدىن چىققان سىگنالنى ئاڭلىغاندىكى ۋاقىت پەرقىنى ئۆلچەش ئارقىلىق، P نۇقتا ياتقان ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسىنى ئېنىقلىغىلى بولىدۇ. ئەگەر يەنە بىر كۆزىتىش نۇقتىسى C قوشۇلسا، ئۇ ھالدا A, B, C (ياكى A, C) ئىككى نۇقتىدا تۇرۇپ P نۇقتىسىدىن چىققان سىگنالنى ئاڭلىغاندىكى ۋاقىت پەرقىنى ئۆلچەش ئارقىلىق، يەنە بىر ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ. بۇ ئىككى تەڭلىمىدىن تۈزۈلگەن تەڭلىمىلەر سىستېمىسىنى يېشىش ئارقىلىق، P نۇقتىسىنىڭ ئېنىق ئورنىنى بەلگىلەشكە بولىدۇ. بۇ، ھىپېربولانىڭ بىر مۇھىم قوللىنىلىشىدۇر.

ئىزدىنىش



رەسىم - 5.3.2

5.3.2 - رەسىمىدىكىدەك، A ، B نۇقتىلار.

نىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-5, 0)$ ،

$(5, 0)$ بولۇپ، تۈز سىزىق AM ، BM لار M نۇقتىدا كېسىشىدۇ

ھەمدە ئۇلارنىڭ يانتۇلۇقلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسى $\frac{4}{9}$ كە تەڭ. M

نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ ھەمدە M نۇقتىنىڭ

تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىگە ئاساسەن تراپىكتورىيىنىڭ شەكلىگە ھۆ-

كۈم قىلىڭ. 2.2 - پاراگرافتىكى 3 - مىسالغا سېلىشتۇرۇپ كۆرۈڭ، نېمىنى بايقىدىڭىز؟

مەشىق

1. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، $a=4$ ، $b=3$ ؛

(2) فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ ھەمدە $(-\sqrt{2}, -\sqrt{3})$ ، $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{15}}{3})$ نۇقتىلاردىن ئۆتىدۇ؛

(3) فوكۇسلىرى $(0, -6)$ ، $(0, 6)$ ھەمدە $(2, -5)$ نۇقتىدىن ئۆتىدۇ.

2. ھىپېربولا $x^2 - 15y^2 = 15$ بىلەن ئېللىپس $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ نىڭ فوكۇسلىرى ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى

ئىسپاتلاڭ.

3. تەڭلىمە $\frac{x^2}{2+m} - \frac{y^2}{m+1} = 1$ نىڭ ھىپېربولانى ئىپادىلەيدىغانلىقى بېرىلگەن، m نىڭ قىممەت ئېلىش

دايرىسىنى تېپىڭ.

2-3-2 ھىپېربولانىڭ ئاددىي گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتى

ئېللىپسنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى تەتقىق قىلىش ئۇسۇلىغا تەقاسلاپ، ھىپېربولا نىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0). \quad ①$$

گە ئاساسەن ئۇنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى تەتقىق قىلىمىز.

مۇلاھىزە؟

ئېللىپسنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى تەتقىق قىلىشقا تەقاسلاپ، ھىپېربولا $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$(a > 0, b > 0)$ نىڭ قايسى خۇسۇسىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىش كېرەك دەپ قارايسىز؟ بۇ خۇسۇسىيەتلىرىنى

قانداق تەتقىق قىلىش كېرەك؟

1. دائىرىسى

ھىپېربولانى كۆزىتىش ئارقىلىق، ئۇنىڭ تەڭسىزلىك $x \leq -a$ بىلەن $x \geq a$ ئىپادىلىگەن دائىرىە ئىچىدە ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. تۆۋەندە ھىپېربولانىڭ دائىرىسىنى ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىدىن پايدىلىنىپ تاپىمىز.

تەڭلىمە ① نى تۆۋەندىكىدەك ئۆزگەرتىمىز:

$$\frac{x^2}{a^2} - 1 = \frac{y^2}{b^2},$$

شۇڭا ھىپېربولا ئۈستىدىكى نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتى (x, y) تەڭسىزلىك $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$ گە ئۇيغۇن كېلىدۇ،

يەنى

$$x^2 \geq a^2,$$

شۇڭا $x \leq -a$ ياكى $x \geq a$ بولىدۇ.

بۇ، ھىپېربولانىڭ تەڭسىزلىك $x \leq -a$ بىلەن $x \geq a$ ئىپادىلىگەن دائىرىە ئىچىدە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.

2. سىممېترىكلىكى

ئېللىپس $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) نىڭ سىممېترىكلىكىنى تەتقىق قىلىش ئۇسۇلىغا تەققاسلاپ،


ھىپېربولانىڭ x ئوق، y ئوق ۋە كوئوردېنات بېشىغا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدىغانلىقىنى ئاسانلا كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز. بۇ چاغدا، كوئوردېنات ئوقلىرى ھىپېربولانىڭ سىممېترىك ئوقى، كوئوردېنات بېشى ھىپېربولانىڭ سىممېترىك مەركىزى بولىدۇ. ھىپېربولانىڭ سىممېترىك مەركىزى ھىپېربولا- نىڭ مەركىزى دەپ ئاتىلىدۇ.

3. چوققىسى

تەڭلىمە ① دە، $y=0$ دەپ ئالساق، $x = \pm a$ كېلىپ چىقىدۇ، شۇڭا ھىپېربولا بىلەن x ئوقنىڭ $A_2(a, 0)$ ، $A_1(-a, 0)$ دىن ئىبارەت ئىككى كېسىشش نۇقتىسى بولىدۇ. x ئوق ھىپېربولانىڭ سىم- مېترىك ئوقى بولغانلىقتىن، ھىپېربولا بىلەن ئۇنىڭ سىممېترىك ئوقنىڭ ئىككى كېسىشش نۇقتىسى بولىدۇ، ئۇلار ھىپېربولانىڭ چوققىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

$x=0$ دەپ ئالساق، $y^2 = -b^2$ كېلىپ چىقىدۇ، ئەمما بۇ تەڭلىمە ھەقىقىي يىلتىزغا ئىگە ئەمەس، بۇ، ھىپېربولا بىلەن y ئوقنىڭ كېسىشش نۇقتىسى يوق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ، شۇنداق بول- سىمۇ، بىز يەنىلا $B_2(0, b)$ ، $B_1(0, -b)$ نى y ئوق ئۈستىگە بەلگىلەپ قو- يىمىز (6.3.2 - رەسىم).

A_1A_2 كېسىك ھىپېربولانىڭ ھەقىقىي ئوقى دەپ ئاتىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۇ- زۇنلۇقى $2a$ غا تەڭ بولىدۇ، a بولسا ھىپېربولانىڭ ھەقىقىي يېرىم ئوقى- نىڭ ئۇزۇنلۇقى دېيىلىدۇ؛ B_1B_2 كېسىك ھىپېربولانىڭ مەۋھۇم ئوقى دەپ ئاتىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى $2b$ غا تەڭ بولىدۇ، b بولسا ھىپېربولانىڭ مەۋھۇم يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى دېيىلىدۇ.




6.3.2 - رەسىم

4. تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقى



7.3.2 - رەسىمدىكىدەك، ئالدى بىلەن ھىپېربولا $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ نى «گېئومېترىيلىك سىزىق

زىش تاختىسى (几何画板) دىن پايدىلىنىپ سىزىمىز، ئاندىن 1 - چارەكتىكى ئەگرى سىزىق ئۈستىگە بىر M نۇقتىنى بەلگىلەپ، M نۇقتىنىڭ ئابىسېسسسى x_M نى ۋە ئۇنىڭدىن تۈز سىزىق $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 0$ گىچە بولغان ئارىلىق d نى ئۆلچەيمىز، ئۇنىڭدىن كېيىن، M نۇقتىنى ئەگرى سىزىقنى بويلاپ ئوڭ يۇقىرى تەرەپكە سۈرۈپ، x_M بىلەن d نىڭ چوڭ - كىچىكلىك مۇناسىۋىتىنى كۆزىتىمىز، سىز نېمىنى بايقىدىڭىز؟



7.3.2 - رەسىم

شۇنى بايقاشقا بولىدۇكى، M نۇقتىنىڭ ئابىسېسسسى x_M قانچە چوڭايسا، d شۇنچە كىچىكلەيدۇ، ئەمما ئۇ مەڭگۈ 0 گە تەڭ بولمايدۇ.

ئەمەلىيەتتە، A_1, A_2 ئارقىلىق y ئوقىنىڭ پاراللېل سىزىقى $x = \pm a$ نى، B_1, B_2 ئارقىلىق x ئوقىنىڭ پاراللېل سىزىقى $y = \pm b$ نى ئۆتكۈزسەك، بۇ تۆت تۈز سىزىق بىر تىك تۆتبۇلۇڭ ھاسىل قىلىدۇ (7.3.2 - رەسىم). بۇ تىك تۆتبۇلۇڭنىڭ ئىككى دىئاگونالى ياتقان تۈز سىزىقلارنىڭ تەڭلىمىسى

$$\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0 \text{ بولىدۇ. ئۇچۇر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ شۇنى كۆرەلەيمىزكى، ھىپېربولا } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

نىڭ ھەر بىر تارمىقى سىرتقا قاراپ سوزۇلغاندا، ئۇلار بۇ ئىككى تۈز سىزىققا تەدرىجىي يېقىنلىشىدۇ، بىز بۇ ئىككى تۈز سىزىقنى ھىپېربولانىڭ تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقى دەپ ئاتايمىز. باشقىچە ئېيتقاندا، ھىپېربولا ئۆزىنىڭ تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقىغا چەكسىز يېقىنلىشىدۇ، لېكىن ئۇلار بىلەن مەڭگۈ كېسىشمەيدۇ.

ئەگەر تەڭلىمە $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ دە، $a=b$ بولسا، ئۇ ھالدا ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسى $x^2 - y^2 = a^2$ بو.

لۇپ، ئۇنىڭ ھەقىقىي ئوقى بىلەن مەۋھۇم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئوخشاشلا $2a$ غا تەڭ بولىدۇ. بۇ چاغدا، تۆت تۈز سىزىق $y = \pm a$ ، $x = \pm a$ كۋادراتنى ھاسىل قىلىدۇ، تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقلارنىڭ تەڭلىمىسى $x = \pm y$ كە ئايلىنىدۇ، بۇ ئىككى تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىق ئۆزئارا تىك بولۇپ، ھىپېربولانىڭ ھەقىقىي ئوقى بىلەن مەۋھۇم ئوقىدىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭلارنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ. ھەقىقىي ئوقى بىلەن مەۋھۇم ئوقى ئۆزئارا تەڭ بولغان ھىپېربولا تەڭ ئوقلۇق ھىپېربولا دەپ ئاتىلىدۇ.

5. مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى

ئېللىپستىكىگە ئوخشاش، ھىپېربولانىڭ فوكۇسلار ئارىلىقى بىلەن ھەقىقىي ئوقى ئۇزۇنلۇقىنىڭ

نسىبىتى $\frac{c}{a}$ ھىپېربولانىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى دەپ ئاتىلىدۇ. $c > a > 0$ بولغانلىقتىن، ھىپېربولانىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى $e = \frac{c}{a} > 1$ بولىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئېللىپسىنىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى ئۇنىڭ سوقچاقلىق دەرىجىسىنى سۈرەتلەپ بېرىدۇ، ئۇنداق بولسا، ھىپېربولانىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى ئۇنىڭ قانداق گېئومېترىيلىك ئالاھىدىلىكىنى سۈرەتلەپ بېرىدۇ؟

3 - مىسال. ھىپېربولا $9y^2 - 16x^2 = 144$ نىڭ ھەقىقىي يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە مەۋھۇم يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى، فوكۇسلارنىڭ كوئوردېناتىنى، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسىنى، تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

يېشىش: ئالدى بىلەن تەڭلىمە $9y^2 - 16x^2 = 144$ نى تۆۋەندىكى ئۆلچەملىك تەڭلىمىگە ئايلاندۇرۇۋاليمىز:

$$\frac{y^2}{4^2} - \frac{x^2}{3^2} = 1.$$

بۇنىڭدىن بىلەلەيمىزكى، ھىپېربولانىڭ ھەقىقىي يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى $a=4$ ، مەۋھۇم يېرىم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى $b=3$ بولىدۇ؛

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5,$$




ئىككى فوكۇسنىڭ كوئوردېناتى $(0, 5)$ ، $(0, -5)$ ؛ مەركەزدىن قېچىش

دەرىجىسى $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$ ؛ تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسى

سى $y = \pm \frac{4}{3}x$ بولىدۇ.

بۇ ھىپېربولانىڭ
تەخمىنىي شەكلىنى
سىزىڭ.

4 - مىسال. ھىپېربولا تىپىدىكى سوۋۇتۇش مۇنارىنىڭ سىرتقى شەكلى ھىپېربولانىڭ بىر بۆلىكىنى ئۇنىڭ مەۋھۇم ئوقىنى چۆرىدىتىپ ئايلاندۇرۇشتىن ھاسىل بولغان ئەگرى سىرتتىن ئىبارەت (8.3.2 - رەسىم (1)) بولۇپ، ئۇنىڭ ئەڭ كىچىك رادىئۇسى 12 m ، ئۈستۈنكى ئاغزىنىڭ رادىئۇسى 13 m ، ئاستىنقى ئاغزىنىڭ رادىئۇسى 25 m ، ئېگىزلىكى 55 m مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تاللاپ، بۇ ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسىنى تاپايلى (1 m غىچە ئېنىقلىقتا).



(1)

(2)

8.3.2 - رەسىم

يېشىش: 8.3.2 - رەسىم (2) دىكىدەك، سوۋۇتۇش مۇنارىنىڭ ئوق كەسمىسى ياتقان تەكشىلىكتە كىچىك چەمبەرنىڭ AA' دىئامېتىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدىغان، چەمبەر مەركىزى كوئوردېنات بېشى بىلەن ئۈستمۇئۈست چۈشىدىغان قىلىپ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى xOy نى تۇرغۇزۇۋال-لىمىز. بۇ چاغدا، مۇنارنىڭ ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئاغزىنىڭ CC' ، BB' دىئامېتىرلىرى x ئوققا پارال-لېل ھەمدە $|CC'| = 13 \times 2$ ، $|BB'| = 25 \times 2$ بولىدۇ.

ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسىنى $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$, $a > 0$) دەپ پەرەز قىلىپ، C نۇقتىنىڭ كوئوردې-

ناتىنى $(13, y)$ دەپ ئالساق، ئۇ ھالدا B نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى $(25, y-55)$ بولىدۇ.

C ، B نۇقتىلار ھىپېربولانىڭ ئۈستىدە ياتىدىغانلىقتىن،

$$\begin{cases} \frac{25^2}{12^2} - \frac{(y-55)^2}{b^2} = 1, \\ \frac{13^2}{12^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{25^2}{12^2} - \frac{(y-55)^2}{b^2} = 1, \\ \frac{13^2}{12^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \end{cases} \quad (2)$$

② تەڭلىمىدىن $y = \frac{5b}{12}$ (مەنپىي قىممەتنى تاشلىۋېتىمىز) كېلىپ چىقىدۇ، بۇنى ① تەڭلىمىگە

قويساق:

$$\frac{25^2}{12^2} - \frac{\left(\frac{5b}{12} - 55\right)^2}{b^2} = 1,$$

ئاددىيلاشتۇرساق، تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$19b^2 + 275b - 18150 = 0. \quad (3)$$

③ تەڭلىمىنى ھېسابلىغۇچتىن پايدىلىنىپ يەشەك، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$b \approx 25.$$

شۇڭا، تاپماقچى بولغان ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسى مۇنداق بولىدۇ:

$$\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{625} = 1.$$

5 - مىسال. $M(x, y)$ نۇقتىدىن مۇقىم نۇقتا $F(5, 0)$ كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن مۇ-

قىم تۈز سىزىق $l: x = \frac{16}{5}$ گىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى تۇراقلىق سان $\frac{5}{4}$ كە تەڭ بولسا، M

نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىسىنى تاپايلى.

يېشىش: d نى M نۇقتىسىدىن l تۈز سىزىققىچە بولغان ئارىلىق دەپ پەرەز قىلساق، مىسالنىڭ مە -
نسىگە ئاساسەن، تاپماقچى بولغان تراپىكتورىيە تۆۋەندىكى توپلامدىن ئىبارەت بولىدۇ:

$$P = \left\{ M \mid \frac{|MF|}{d} = \frac{5}{4} \right\},$$

بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$\frac{\sqrt{(x-5)^2 + y^2}}{\left| \frac{16}{5} - x \right|} = \frac{5}{4}.$$


بۇ ئىپادىنىڭ ئىككى تەرىپىنى كۋادراتقا كۆتۈرۈپ، ئاندىن ئاددىيلاش -
تۇرساق، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$9x^2 - 16y^2 = 144,$$

يەنى

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$


شۇنىڭ ئۈچۈن، M نۇقتىسىنىڭ تراپىكتورىيىسى ھەقىقىي ئوقىنىڭ
ئۇزۇنلۇقى بىلەن مەۋھۇم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم 8، 6 بول -
غان ھېچىر بولادىن ئىبارەت (9.3.2 - رەسىم).



رەسىم 9.3.2 -

مۇلاھىزە؟

5 - مىسال بىلەن 2.2 - پاراگرافتىكى 6 - مىسالنى سېلىشتۇرۇڭ، نېمىنى بايقىدىڭىز؟



رەسىم 10.3.2 -

6 - مىسال. 10.3.2 - رەسىمدىكىدەك، ھېچىر بولسا $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$

نىڭ ئوڭ فوكۇسى F_2 دىن ئۆتكەن، يانتۇلۇق بۇلۇڭى 30° بولغان
تۈز سىزىق ھېچىر بولسا بىلەن A ، B ئىككى نۇقتىدا كېسىشىشە،
 $|AB|$ نى تاپايلى.

يېشىش: ھېچىر بولانىڭ تەڭلىمىسىگە ئاساسەن، ئۇنىڭ ئىككى
فوكۇسى ئايرىم - ئايرىم $F_2(3, 0)$ ، $F_1(-3, 0)$ بولىدىغانلىقىنى بى -
لەلەيمىز.

AB تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى 30° ھەمدە بۇ تۈز سىزىق
ئوڭ فوكۇس F_2 دىن ئۆتىدىغانلىقى ئۈچۈن، AB تۈز سىزىقنىڭ
تەڭلىمىسى

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x-3) \quad (1)$$

بولىدۇ، تەڭلىمىلەر سىستېمىسى

$$\begin{cases} y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x-3), \\ \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1 \end{cases}$$

دىكى y نى يوقاتساق:

$$5x^2 + 6x - 27 = 0.$$

بۇ تەڭلىمىنى يەشسەك:

$$x_1 = -3, x_2 = \frac{9}{5}.$$

x_2, x_1 نىڭ قىممىتىنى تەڭلىمە ① گە قويساق:

$$y_1 = -2\sqrt{3}, y_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

شۇنىڭ بىلەن، A, B ئىككى نۇقتىنىڭ كوئوردىناتى ئايرىم - ئايرىم $(-3, -2\sqrt{3})$ ، $(\frac{9}{5}, -\frac{2\sqrt{3}}{5})$ بولىدۇ.

$$\begin{aligned} \therefore |AB| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{\left(-3 - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(-2\sqrt{3} + \frac{2\sqrt{3}}{5}\right)^2} \\ &= \frac{16}{5}\sqrt{3}. \end{aligned}$$

مۇلاھىزە؟

$\triangle AF_1B$ نىڭ ئايلىنىم ئۇزۇنلۇقىنى تاپالامسىز؟

مەشىق

1. تۆۋەندىكى ھىپېربولالارنىڭ ھەقىقىي ئوقى ۋە مەۋھۇم ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى، چوققىسى ۋە فوكۇسلىرىنىڭ كوئوردىناتىنى، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسىنى تېپىڭ:

$$(1) x^2 - 8y^2 = 32;$$

$$(2) 9x^2 - y^2 = 81;$$

$$(3) x^2 - y^2 = -4;$$

$$(4) \frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = -1.$$

2. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) چوققىلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، ئىككى چوققىسىنىڭ ئارىلىقى 8، $e = \frac{5}{4}$;

(2) فوكۇسلىرى y ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، فوكۇسلار ئارىلىقى 16 گە تەڭ، $e = \frac{4}{3}$.

3. ئېللىپس $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$ نىڭ فوكۇسلىرىنى چوققا، چوققىلىرىنى فوكۇس قىلغان ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

4. سىممېترىك ئوقلىرى كوئوردىنات ئوقلىرىدا ياتقان تەڭ ئوقلۇق ھىپېربولانىڭ بىر فوكۇسى $F_1(-6, 0)$ بولسا، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى بىلەن تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

5. تۆۋەندىكى تۈز سىزىق بىلەن ھىپېربولانىڭ كېسىشىش نۇقتىسىنىڭ كوئوردىناتىنى تېپىڭ:

$$(1) 2x - y - 10 = 0, \frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1;$$

$$(2) 4x - 3y - 16 = 0, \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

3.2 - كۆنۈكمە


A گۈرۈپپا

1. ھېچبولسا $4x^2 - y^2 + 64 = 0$ نىڭ ئۈستىدىكى بىر P نۇقتىدىن ئۇنىڭ بىر فوكۇسغىچە بولغان ئارىلىق 1 گە تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا P نۇقتىدىن ئۇنىڭ يەنە بىر فوكۇسغىچە بولغان ئارىلىق _____ بولىدۇ.
2. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھېچبولالغان ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:
 - (1) فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، $a = 2\sqrt{5}$ ، $A(-5, 2)$ نۇقتىدىن ئۆتىدۇ؛
 - (2) $A(-7, -6\sqrt{2})$ ، $B(2\sqrt{7}, 3)$ ئىككى نۇقتىدىن ئۆتىدۇ.
3. بېرىلگەن ھېچبولالغان تەڭلىمىسىگە ئاساسەن، ئۇنىڭ فوكۇسلىرىنىڭ كوئوردېناتىنى، مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسىنى ۋە تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقىنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) $16x^2 - 9y^2 = 144$;

(2) $16x^2 - 9y^2 = -144$.

4. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھېچبولالغان ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:
 - (1) فوكۇسلىرى x ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، ھەقىقىي ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10، مەۋھۇم ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 8؛
 - (2) فوكۇسلىرى y ئوق ئۈستىدە ياتىدۇ، فوكۇسلار ئارىلىقى 10، مەۋھۇم ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 8؛
 - (3) مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى $e = \sqrt{2}$ ، $M(-5, 3)$ نۇقتىدىن ئۆتىدۇ.
5. رەسىمىدىكىدەك، O چەمبەرنىڭ رادىئۇسى مۇقىم ئۇزۇنلۇق r غا تەڭ بولۇپ، A نۇقتا O چەمبەرنىڭ سىرتىدىكى بىر مۇقىم نۇقتا، P بولسا چەمبەر ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا، AP كېسىكىنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈ-چىسى l بىلەن OP تۈز سىزىق Q نۇقتىدا كېسىشىدۇ. P نۇقتا چەمبەر ئۈستىدە ھەرىكەت قىلغاندا، Q نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىسى نېمە بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟
6. $A(3, -1)$ نۇقتىدىن ئۆتىدىغان ھەمدە سىممېترىك ئوقلىرى كوئوردېنات ئوقىدا ياتىدىغان تەڭ ئوقلۇق ھېچبولالغان تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.




(5 - مىسال ئۈچۈن)

B گۈرۈپپا

1. فوكۇسلىرى ئېللىپس $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ نىڭكى بىلەن ئوخشاش ھەمدە مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى $e = \frac{5}{4}$ بولغان ھېچبولالغان تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.
2. ئارىلىقى 1400m كېلىدىغان A ، B ئىككى قاراۋۇلخانىدا تۇرۇپ زەمبىرەك ئوقىنىڭ پارتلاش ئاۋازىنى ئاڭلىغاندىكى ۋاقىت پەرقى 3s بولۇپ، ئاۋازنىڭ تېزلىكى 340m/s بولسا، پارتلاش نۇقتىسى قانداق ئەگرى سىزىق ئۈستىدە ياتىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟
3. M نۇقتىدىن مۇقىم نۇقتا $F(c, 0)$ ($c > 0$) كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن مۇقىم تۈز سىزىق $l: x = \frac{a^2}{c}$ كىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى $\frac{c}{a}$ ($\frac{c}{a} > 1$) بولسا، M نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىسىنى تېپىڭ.
4. ھېچبولسا $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ بېرىلگەن، $P(1, 1)$ نۇقتا ئارقىلىق بۇ ھېچبولالغان بىلەن A ، B ئىككى نۇقتىدا كېسىشىدىغان ھەم P نۇقتا AB كېسىكىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولىدىغان بىر l تۈز سىزىقىنى سىزىققا بولامدۇ؟



نېمە ئۈچۈن $y = \pm \frac{b}{a}x$ ھىپېربولا $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ نىڭ تەدرىجىي يېقىنلاشقۇچى سىزىقى بولىدۇ؟



رەسمىدىكىدەك، ئالدى بىلەن ھىپېربولا $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ نىڭ 1 - چارەكتىكى بۆلىكىگە نىسبەتەن ئىسپاتلاش ئېلىپ بارىمىز. بۇ بۆلەكنىڭ تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} \quad (x > a).$$

$M(x, y)$ نى ھىپېربولانىڭ مۇشۇ بۆلىكى ئۈستىدىكى نۇقتا،

$N(x, Y)$ نى تۈز سىزىق $y = \frac{b}{a}x$ ئۈستىدىكى ئابسىسسسى M

نىڭكى بىلەن ئوخشاش بولغان نۇقتا دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $Y = \frac{b}{a}x$ بولىدۇ.

$$\therefore y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{b}{a} x \sqrt{1 - \left(\frac{a}{x}\right)^2} < \frac{b}{a} x = Y,$$

$$\therefore |MN| = Y - y = \frac{b}{a} (x - \sqrt{x^2 - a^2})$$

$$= \frac{b}{a} \cdot \frac{(x - \sqrt{x^2 - a^2})(x + \sqrt{x^2 - a^2})}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$= \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}.$$

$|MQ|$ نى M نۇقتىسىدىن $y = \frac{b}{a}x$ تۈز سىزىقىغىچە بولغان ئارىلىق دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ

ھالدا $|MQ| < |MN|$ بولىدۇ.

x تەدرىجىي چوڭايغاندا، $|MN|$ تەدرىجىي كىچىكلەيدۇ، x چەكسىز چوڭايغاندا، $|MN|$ نىڭ قىممىتى 0 گە چەكسىز يېقىنلىشىپ، $|MQ|$ مۇ 0 گە چەكسىز يېقىنلىشىدۇ. دېمەك، ھىپېربولانىڭ 1 - چارەكتىكى بۆلىكى ON نۇرنىڭ ئاستى تەرەپىدىن ON نۇرغا تەدرىجىي يېقىنلىشىدۇ.

قالغان چارەكلەردىمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش ئەھۋالنى ئىسپاتلاپ چىقىشقا بولىدۇ. سىز بۇنى ئىسپاتلىيالايسىز؟

ئۇنىڭدىن باشقا، $|MQ|$ نى بىۋاسىتە ھېسابلاپ، x چەكسىز چوڭايغاندا $|MQ|$ نىڭ 0 گە چەكسىز يېقىنلىشىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاشقىمۇ بولىدۇ.

پارابولا

پارابولا ۋە ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى 1-4-2


بىزگە مەلۇمكى، ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى پارابولا بولىدۇ، بىز بۇ پارابولانىڭ چوققىسىنىڭ كوئوردېناتى، سىممېترىك ئوقى دېگەندەك مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلغان. ئۇنداق بولسا، پارابولانىڭ زادى قانداق گېئومېترىيەلىك ئالاھىدىلىكلىرى بار؟ ئۇ يەنە قانداق گېئومېترىيەلىك خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە؟

ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ

قوللىنىلىشى



1.4.2 - رەسىمدىكىدەك، «گېئومېترىيەلىك سىزىش تاختىسى»دىن پايدىلىنىپ گرافىك سىزىمىز، بۇنىڭدىكى F مۇقىم نۇقتا، l بولسا F نۇقتىدىن ئۆتمەيدىغان مۇقىم تۈز سىزىق، H بولسا l نىڭ ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا، H نۇقتا ئارقىلىق $MH \perp l$ نى ئۆتكۈزسەك، FH كېسىكىنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچىسى m تىك سىزىق MH بىلەن M نۇقتىدا كېسىشىدۇ. H نۇقتىنى سۈرۈپ، M نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىسىنى كۆزىتىمىز. سىز M نۇقتا قانائەتلەندۈرىدىغان گېئومېترىيەلىك شەرتنى بايقىيالايسىز؟




رەسىم 1.4.2 -

شۇنى بايقاشقا بولىدۇكى، M نۇقتا H قا ئەگىشىپ ھەرىكەت قىلىش جەريانىدا، باشتىن - ئاخىر $|MF| = |MH|$ بولىدۇ، يەنى M نۇقتىسىدىن مۇقىم نۇقتا F كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن مۇقىم تۈز سىزىق l غىچە بولغان ئارىلىق ئۆزئارا تەڭ.

تەكشۈرۈشكە ئىچىدە، بىر مۇقىم نۇقتا F بىلەن بىر مۇقىم تۈز سىزىق l (تۈز سىزىق F نۇقتىسىدىن ئۆتمەيدۇ) غىچە بولغان ئارىلىقلىرى ئۆزئارا تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسى پارابولا (Parabola) دەپ ئاتىلىدۇ. F نۇقتا پارابولانىڭ فوكۇسى، l تۈز سىزىق پارابولانىڭ يۆنەلدۈرگۈچىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

مۇلاھىزە؟

ئېللىپس ۋە ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىش جەريانىغا سېلىشتۇرۇڭ، سىز-نىڭچە كوئوردېنات سىستېمىسىنى قانداق تاللىغاندا، كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان پارابولانىڭ تەڭلىمىسى تېخىمۇ ئاددىي بولىدۇ؟



رەسىم 2.4.2

2.4.2 - رەسىمدىكىدەك، پارابولانىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، F نۇقتىسىدىن ئۆتكەن ھەممە l تۈز سىزىققا تىك (تىك ئاساسى K) بولغان تۈز سىزىقنى x ئوق، KF كېسىكىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىنى كوئوردېنات بېشى قىلىپ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى xOy نى تۇرغۇزۇۋالغىمىز.

$|KF| = p$ ($p > 0$) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا فوكۇس F نىڭ كوئوردېناتى $(\frac{p}{2}, 0)$ ، يۆنەلدۈرگۈچى l نىڭ تەڭلىمىسى $x = -\frac{p}{2}$ بولىدۇ. $M(x, y)$ نۇقتىسى پارابولا ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتا، M نۇقتىسىدىن l غىچە بولغان ئارىلىقنى d دەپ پەرەز قىلساق، پارابولانىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن، پارابولا تۆۋەندىكى نۇقتىلار توپلىمىدىن ئىبارەت بولىدۇ:

$$P = \{M \mid |MF| = d\}.$$

$$\therefore |MF| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}, \quad d = \left|x + \frac{p}{2}\right|,$$

$$\therefore \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

يۇقىرىقى ئىپادىنىڭ ئىككى تەرىپىنى كۋادراتقا كۆتۈرۈپ، ئاندىن رەتلىسەك، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$y^2 = 2px \quad (p > 0). \quad ①$$

يۇقىرىدىكى جەرياندىن كۆرۈۋالالايمىزكى، پارابولانىڭ ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى تەڭلىمە ① نى قانائەتلەندۈرىدۇ؛ تەڭلىمە ① نىڭ يېشىمى (x, y) نى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىدىن پارابولانىڭ فوكۇسى $F(\frac{p}{2}, 0)$ كىچە بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن پارابولانىڭ يۆنەلدۈرگۈچىسى $x = -\frac{p}{2}$ غىچە بولغان ئارىلىق ئۆزئارا تەڭ، يەنى تەڭلىمە ① نىڭ يېشىمىنى كوئوردېنات قىلغان نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى پارابولانىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ. بىز تەڭلىمە ① نى پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى دەپ ئاتايمىز. ئۇ ئىپادىلىگەن پارابولانىڭ فوكۇسىنىڭ كوئوردېناتى $(\frac{p}{2}, 0)$ ، يۆنەلدۈرگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسى

$$x = -\frac{p}{2} \text{ بولىدۇ.}$$

ئىزدىنىش



ئېللىپس ۋە ھىپېربولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتا، ئوخشاش بولمىغان كوئوردېنات سىستېمىلىرىنى تاللاش ئارقىلىق ئوخشاش بولمىغان كۆرۈنۈشتىكى ئۆلچەملىك تەڭلىملەرگە ئىگە بولغاندۇق. ئۇنداق بولسا، پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان قانداق كۆرۈنۈشلىرى بار؟ ئىزدەنگەندىن كېيىن تۆۋەندىكى جەدۋەلنى تولدۇرۇڭ.

يۆنەلدۈرگۈچىسى - نىڭ تەڭلىمىسى	فوكۇسىنىڭ كوئوردېناتى	ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى	شەكلى
$x = -\frac{p}{2}$	$(\frac{p}{2}, 0)$	$y^2 = 2px$ ($p > 0$)	

مۇلاھىزە؟


سىز ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى نېمە ئۈچۈن پارابولا بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟ ئۇنىڭ فوكۇسىنىڭ كوئوردېناتى ۋە يۆنەلدۈرگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسىنى كۆرسىتىپ بېرىڭ.

- 1 - مىسال. (1) پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى $y^2 = 6x$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ئۇنىڭ فوكۇسىنىڭ كوئوردېناتىنى ۋە يۆنەلدۈرگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسىنى تاپايلى؛
 - (2) پارابولانىڭ فوكۇسى $F(0, -2)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تاپايلى.
- يېشىش: (1) $p = 3$ بولغانلىقتىن، پارابولانىڭ فوكۇسىنىڭ كوئوردېناتى $(\frac{3}{2}, 0)$ ، يۆنەلدۈرگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسى $x = -\frac{3}{2}$ بولىدۇ.

- (2) بۇ پارابولانىڭ فوكۇسى y ئوقىنىڭ مەنپىي يېرىم ئوقى ئۈستىدە ياتىدىغانلىقى ھەمدە $\frac{p}{2} = 2$ ،

$p=4$ بولغانلىقى ئۈچۈن، تاپماقچى بولغان پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:
 $x^2 = -8y$.

2 - مىسال. 3.4.2 - رەسىم (1) دە بېرىلگىنى سۈنئىي ھەمراھ سىگنالنى قوبۇل قىلىدىغان بىر خىل ئانتېننىنىڭ ئوق كەسىمىدىن ئىبارەت. سۈنئىي ھەمراھنىڭ دولقۇن دەستىسى ئوق كەسىمىدىن پارابولا شەكلىدە بولغان ئانتېننىغا تەخمىنەن پاراللېل ھالەتتە چۈشۈپ، قايتۇرۇلغاندىن كېيىن فوكۇسقا يىغىلىدۇ. ئانتېننىنىڭ ئېچىلىش ئاغزىنىڭ دىئامېتىرى 4.8m ، چوڭقۇرلۇقى 0.5m ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇپ، پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى ۋە فوكۇسنىڭ كوئوردېناتىنى تاپايلى.



3.4.2 - رەسىم

يېشىش: 3.4.2 - رەسىم (2) دىكىدەك، ئانتېننىنىڭ ئوق كەسىمى ياتقان تەكشىلىكتە تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇپ، ئانتېننىنىڭ چوققىسى (يەنى پارابولانىڭ چوققىسى) نى كوئوردېنات بېشى بىلەن ئۈستىمۇئۈست چۈشۈرمىز. پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى $y^2 = 2px$ ($p > 0$) دەپ پەرەز قىلساق، بېرىلگەن شەرتكە ئاساسەن A نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى $(0.5, 2.4)$ بولىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز. ئۇنى تەڭلىمىگە قويماق، تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$2.4^2 = 2p \times 0.5,$$

يەنى $p = 5.76$.

شۇڭا، تاپماقچى بولغان پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى $y^2 = 11.52x$ ، فوكۇسنىڭ كوئوردېناتى $(2.88, 0)$ بولىدۇ.

مەشىق

1. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئاساسەن پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى يېزىڭ:

(1) فوكۇسى $F(3, 0)$ ؛

(2) يۆنىلىش بۆلگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسى $x = -\frac{1}{4}$ ؛

(3) فوكۇسدىن يۆنىلىش بۆلگۈچىسىگىچە بولغان ئارىلىق 2.

2. تۆۋەندىكى پارابولانىڭ فوكۇسنىڭ كوئوردېناتى ۋە يۆنىلىش بۆلگۈچىسىنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) $y^2 = 20x$;

(2) $x^2 = \frac{1}{2}y$;

(3) $2y^2 + 5x = 0$;

(4) $x^2 + 8x = 0$.

3. بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ:

(1) پارابولا $y^2 = 2px$ ($p > 0$) ئۈستىدىكى M نۇقتىدىن فوكۇسقىچە بولغان ئارىلىق a ($a > \frac{p}{2}$) غا تەڭ بولسا،ئۇ ھالدا M نۇقتىدىن يۆنىلىدۈرگۈچىگىچە بولغان ئارىلىق $\frac{a}{2}$ ، M نۇقتىنىڭ ئابىسسەسى $\frac{a}{2}$ بولىدۇ؛(2) پارابولا $y^2 = 12x$ ئۈستىدە، فوكۇس بىلەن بولغان ئارىلىقى 9 غا تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى

_____ بولىدۇ.

پارابولانىڭ ئاددىي گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيىتى

2-4-2

مۇلاھىزە؟

ئېللىپس ۋە ھىپېربولانىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىگە تەققاسلاپ، پارابولانىڭ قايسى گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى مۇھاكىمە قىلىشقا بولىدۇ دەپ قارايسىز؟

پارابولانىڭ نۇرغۇن مۇھىم خۇسۇسىيەتلىرى بار. تۆۋەندە پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى

① $y^2 = 2px \quad (p > 0)$

گە ئاساسەن، ئۇنىڭ بىر قىسمى ئاددىي گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىمىز.

1. دائىرىسى

$p > 0$ بولغانلىقتىن، ① تەڭلىمىدىن بىلەنلەيمىزكى، پارابولا ① ئۈستىدىكى M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى (x, y) تەڭسىزلىك $x \geq 0$ نى قانائەتلەندۈرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ پارابولا y ئوقىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ياتىدۇ، ئۇنىڭ ئېچىلىش يۆنىلىشى x ئوقىنىڭ ئوڭ يۆنىلىشى بىلەن بىردەك بولىدۇ؛ x نىڭ قىممىتى چوڭايغاندا، $|y|$ مۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ چوڭىيىدۇ، بۇ، پارابولانىڭ ئوڭ يۇقىرى تەرەپ ۋە ئوڭ تۆۋەن تەرەپكە قاراپ چەكسىز سوزۇلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

2. سىممېترىكلىكى

y نىڭ ئورنىغا $-y$ نى قويماق، تەڭلىمە ① ئۆزگەرمەيدۇ، شۇڭا بۇ پارابولا x ئوقىغا نىسبەتەن سىممېترىك بولىدۇ، بىز پارابولانىڭ سىممېترىك ئوقىنى پارابولانىڭ ئوقى دەپ ئاتايمىز.

3. چوققىسى

پارابولا بىلەن ئۇنىڭ ئوقىنىڭ كېسىشىش نۇقتىسى پارابولانىڭ چوققىسى دەپ ئاتىلىدۇ. تەڭلىمە ① دە، $y = 0$ بولغاندا، $x = 0$ بولىدۇ، شۇڭا پارابولا ① نىڭ چوققىسى دەل كوئوردېنات بېشىدىن ئىبارەت بولىدۇ.

4. مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى

پارابولا ئۈستىدىكى M نۇقتىدىن فوكۇسقىچە بولغان ئارىلىق بىلەن مۇشۇ M نۇقتىدىن يۆنىلىدۇر - گۈچىگىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى پارابولانىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى دەپ ئاتىلىپ، e بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. پارابولانىڭ ئېنىقلىمىسىدىن مەلۇمكى، $e=1$ بولىدۇ.

3 - مىسال. پارابولا x ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك بولۇپ، ئۇنىڭ چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتىدىغانلىقى ھەم بۇ پارابولا $M(2, -2\sqrt{2})$ نۇقتىدىن ئۆتىدىغانلىقى بېرىلگەن بولسا، ئۇنىڭ ئۆلچەم - لىك تەڭلىمىسىنى تاپايلى.

يېشىش: پارابولا x ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك بولۇپ، ئۇنىڭ چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا يا - تىدىغانلىقى ھەم ئۇ $M(2, -2\sqrt{2})$ نۇقتىدىن ئۆتىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك پەرەز قىلىشقا بولىدۇ:

$$y^2 = 2px \quad (p > 0).$$

M نۇقتا پارابولا ئۈستىدە ياتىدىغانلىقتىن،

$$(-2\sqrt{2})^2 = 2p \cdot 2,$$

يەنى

$$p = 2.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، تاپماقچى بولغان پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$y^2 = 4x.$$

مۇلاھىزە؟

چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتقان، سىممېترىك ئوقى بولغان ھەم $M(2, -2\sqrt{2})$ نۇقتىدىن ئۆتكەن پارابولادىن قانچىسى بار؟ ئۇلارنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

4 - مىسال. يانتۇلۇقى 1 بولغان l تۈز سىزىق پارابولا $y^2 = 4x$ نىڭ فوكۇسى F تىن ئۆتسە ھەمدە

ئۇ پارابولا بىلەن A ، B ئىككى نۇقتىدا كېسىشسە، AB كېسىكىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تاپايلى.

تەھلىل: پارابولانىڭ تەڭلىمىسىدىن ئۇنىڭ فوكۇسىنىڭ كو - ئوردېناتىنى تاپالايمىز، يەنە l تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى 1، شۇڭا l تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنىمۇ تاپالايمىز؛ l تۈز سىزىقنىڭ تەڭلى - مىسىنى پارابولانىڭ تەڭلىمىسى بىلەن بىرلەشتۈرسەك، A ، B ئىك - كى نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىشقا بولىدۇ؛ ئىككى نۇقتا ئارىس - دىكى ئارىلىق فورمۇلىسىدىن پايدىلىنىپ $|AB|$ نى تاپالايمىز. بۇ

مۇشۇ ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ $|AB|$ نى تېپىپ كۆرۈڭ.



خىل ئۇسۇلنىڭ پىكىر يولى ئاددىي بولسىمۇ، لېكىن مۇرەككەپ ئالگېبرالىق ھېسابلاشلارنى ئېلىپ بېرىشقا توغرا كېلىدۇ.

تۆۋەندە يەنە بىر خىل ئۇسۇل - سان بىلەن شەكىلنى بىرلەشتۈرۈش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

4.4.2 - رەسىمىدىكىدەك، $A(x_1, y_1)$ ، $B(x_2, y_2)$ دەپ پەرەز قىلساق،

پارابولانىڭ ئېنىقلىمىسىدىن بىلەلەيمىزكى، $|AF|$ بىلەن A نۇقتىسىدىن يۆ-
نەلدۈرگۈچىگە بولغان ئارىلىق $|AA'|$ ئۇزۇنلۇقىغا تەڭ بولىدۇ. $|AA'| = d_A$.
دەپ پەرەز قىلساق، $d_A = x_1 + 1$ بولغانلىقتىن، $|AF| = d_A = x_1 + 1$ بو-
لىدۇ. ئوخشاش يول بىلەن، $|BF| = |BB'| = d_B = x_2 + 1$ ، شۇنداق قى-
لىپ تۆۋەندىكىگە ئىگە بولىمىز:

$$|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2.$$

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، A ، B ئىككى نۇقتىسىنىڭ ئا-
سېسالىرىنىڭ يىغىندىسى $x_1 + x_2$ نى تېپىپ چىقساقلا، $|AB|$ نى تاپ-
قىلى بولىدۇ.

رەسىم - 4.4.2

يېشىش: مىسالنىڭ مەنىسىدىن بىلەلەيمىزكى، $\frac{p}{2} = 1$ ، $p = 2$ ، فوكۇس F نىڭ كوئوردېناتى $(1, 0)$ ،

يۆنەلدۈرگۈچى l نىڭ تەڭلىمىسى $x = -1$ بولىدۇ. 4.4.2 - رەسىمىدىكىدەك، $A(x_1, y_1)$ ، $B(x_2, y_2)$ دەپ
پەرەز قىلىپ، A ، B لاردىن يۆنەلدۈرگۈچىگە بولغان ئارىلىقلارنى ئايرىم - ئايرىم d_A ، d_B دەپ ئال-
ساق، پارابولانىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىگە ئىگە بولىمىز:

$$|AF| = d_A = x_1 + 1, |BF| = d_B = x_2 + 1,$$

شۇڭا

$$|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2.$$

پارابولانىڭ فوكۇسى $F(1, 0)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن، شۇڭا تۈز سىزىق AB نىڭ تەڭلىمىسى:

$$y = x - 1.$$

①

① نى تەڭلىمە $y^2 = 4x$ كە قويماق:

$$(x-1)^2 = 4x,$$

ئاددىيلاشتۇرساق:

$$x^2 - 6x + 1 = 0.$$


يىلتىزنى تېپىش فورمۇلىسىغا ئاساسەن:

$$x_1 = 3 + 2\sqrt{2}, x_2 = 3 - 2\sqrt{2},$$

شۇڭا

$$|AB| = x_1 + x_2 + 2 = 8.$$

شۇنىڭ ئۈچۈن، AB كېسىكىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 8 بولىدۇ.



رەسىم - 5.4.2

5 - مىسال. پارابولانىڭ فوكۇسى F تىن ئۆتكەن تۈز سىزىق

پارابولا بىلەن A ، B ئىككى نۇقتىدا، A نۇقتا ۋە پارابولانىڭ چوققى-
سىدىن ئۆتكەن تۈز سىزىق پارابولانىڭ يۆنەلدۈرگۈچىسى بىلەن D
نۇقتىدا كېسىشسە، DB تۈز سىزىقنىڭ پارابولانىڭ سىممېترىك ئو-
قىغا پاراللېل بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلايلى.

تەھلىل: كوئوردېنات ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلايمىز، يە-
نى پارابولا بىلەن تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇپ، DB تۈز
سىزىق بىلەن پارابولانىڭ سىممېترىك ئوقى ئارىسىدىكى ئورۇن مۇ-
ناسىۋىتىنى تەڭلىمىدىن پايدىلىنىپ مۇھاكىمە قىلىمىز.

5.4.2 - رەسىمىدىكىدەك تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇۋېلىپ، D نۇقتىسىنىڭ ئوردىناتى بىلەن B نۇقتىسىنىڭ ئوردىناتى تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇ.

ئىسپات: 5.4.2 - رەسىمىدىكىدەك، پارابولانىڭ سىممېترىك ئوقىنى x ئوق، ئۇنىڭ چوققىسىنى كوئوردېنات بېشى قىلىپ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزىمىز. پارابولانىڭ تەڭلىمىسىنى

$$y^2 = 2px, \quad (1)$$

A نۇقتىسىنىڭ كوئوردېناتىنى $(\frac{y_0^2}{2p}, y_0)$ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا OA تۈز سىزىقىنىڭ تەڭلىمىسى:

$$y = \frac{2p}{y_0} x \quad (y_0 \neq 0), \quad (2)$$

پارابولانىڭ يۆنىلىش گۈچىنىڭ تەڭلىمىسى:

$$x = -\frac{p}{2}. \quad (3)$$

بىلەن (3) نى بىرلەشتۈرسەك، D نۇقتىسىنىڭ ئوردىناتىغا ئىگە بولىمىز:

$$y = -\frac{p^2}{y_0}. \quad (4)$$

F نۇقتىسىنىڭ كوئوردېناتى $(\frac{p}{2}, 0)$ بولىدىغانلىقتىن، AF تۈز سىزىقىنىڭ تەڭلىمىسى مۇنداق بولىدۇ:

$$y = \frac{2py_0}{y_0^2 - p^2} \left(x - \frac{p}{2}\right), \quad (5)$$

بۇنىڭدا $y_0^2 \neq p^2$.


بىلەن (5) نى بىرلەشتۈرسەك، B نۇقتىسىنىڭ ئوردىناتىغا ئىگە بولىمىز:

$$y = -\frac{p^2}{y_0}. \quad (6)$$

يەنە باشقا ئىسپاتلاش ئۇسۇلىڭىز بارمۇ؟

(4) ۋە (6) گە ئاساسەن، x ئوق $DB \parallel$ بولىدىغانلىقىنى بىلىمىز. $y_0^2 = p^2$ بولغاندا، روشەنكى، يەكۈن كۈچكە ئىگە بولىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن، DB تۈز سىزىق پارابولانىڭ سىممېترىك ئوقىغا پاراللېل بولىدۇ.



رەسىم 6.4.2

6 - مىسال. پارابولانىڭ تەڭلىمىسى $y^2 = 4x$ بولۇپ، مۇقىم نۇقتا

$P(-2, 1)$ دىن ئۆتىدىغان تۈز سىزىق l نىڭ يانتۇلۇقى k ئىكەنلىكى بېرىلگەن. k قانداق قىممەتنى ئالغاندا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا $y^2 = 4x$ بىرلا ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولىدۇ؟ ئىككى ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولىدۇ؟ ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولمايدۇ؟

تەھلىل: بۇ مەسىلىنى ئانالىتىك ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن l تۈز سىزىقىنىڭ تەڭلىمىسى بىلەن پارابولانىڭ تەڭلىمىسىدىن تۈزۈلگەن تەڭلىمىلەر سىستېمىسىنىڭ يېشىملىرىنىڭ ئەھۋالىنى مۇھاكىمە قىلساقلا، بۇنىڭغا ئاساسەن l تۈز سىزىق بىلەن پارابولانىڭ ئۈچۈن مۇناسىۋىتىگە ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ.

يېشىش: مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن، l تۈز سىزىقىنىڭ تەڭلىمىسىنى تۆۋەندىكىدەك دەپ پەرەز قىلىمىز:

$$y-1=k(x+2).$$

تەڭلىمىلەر سىستېمىسى

$$\begin{cases} y-1=k(x+2), \\ y^2=4x \end{cases} \quad (*)$$

تىن تۆۋەندىكىگە ئىگە بولىمىز:

$$ky^2-4y+4(2k+1)=0. \quad ①$$

(1) $k=0$ بولغاندا، تەڭلىمە ① دىن تۆۋەندىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ:

$$y=1.$$

$y=1$ نى $y^2=4x$ كە قويىساق:

$$x=\frac{1}{4}.$$

بۇ چاغدا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا پەقەت بىرلا ئورتاق نۇقتا $(\frac{1}{4}, 1)$ گە ئىگە بولىدۇ.

(2) $k \neq 0$ بولغاندا، تەڭلىمە ① نىڭ ئېنىقلىغۇچىسى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$\Delta = -16(2k^2+k-1).$$

(i) $\Delta = 0$ بولغاندا،

$$2k^2+k-1=0$$

بولۇپ، بۇنى يەشسەك تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$k=-1 \text{ ياكى } k=\frac{1}{2}.$$

شۇڭا، $k=-1$ ياكى $k=\frac{1}{2}$ بولغاندا، تەڭلىمە ① نىڭ پەقەت بىرلا يېشىمى بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن

تەڭلىمىلەر سىستېمىسى (*) نىڭمۇ پەقەت بىرلا يېشىمى بولىدۇ. بۇ چاغدا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا پەقەت بىرلا ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولىدۇ.

(ii) $\Delta > 0$ بولغاندا،

$$2k^2+k-1 < 0$$

بولۇپ، بۇنى يەشسەك تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$-1 < k < \frac{1}{2}.$$

شۇڭا، $-1 < k < \frac{1}{2}$ ھەمدە $k \neq 0$ بولغاندا، تەڭلىمە ① نىڭ ئىككى يېشىمى بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن

تەڭلىمىلەر سىستېمىسى (*) نىڭمۇ ئىككى يېشىمى بولىدۇ. بۇ چاغدا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا ئىككى ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولىدۇ.

(iii) $\Delta < 0$ بولغاندا،

$$2k^2+k-1 > 0$$

بولۇپ، بۇنى يەشسەك تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$k < -1 \text{ ياكى } k > \frac{1}{2}.$$

شۇڭا، $k < -1$ ياكى $k > \frac{1}{2}$ بولغاندا، تەڭلىمە ① نىڭ ھەقىقىي يېشىمى يوق بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن

تەڭلىمىلەر سىستېمىسى (*) نىڭمۇ يېشىمى يوق بولىدۇ. بۇ چاغدا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولمايدۇ.

يۇقىرىقىلارنى ئومۇملاشتۇرساق:

$k = -1$ ياكى $k = \frac{1}{2}$ ياكى $k = 0$ بولغاندا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا بىرلا ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بو-

لىدۇ؛

$-1 < k < \frac{1}{2}$ ھەمدە $k \neq 0$ بولغاندا، l تۈز سىزىق بىلەن پارا-

بولا ئىككى ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولىدۇ؛

$k < -1$ ياكى $k > \frac{1}{2}$ بولغاندا، l تۈز سىزىق بىلەن پارابولا ئور-

تاق نۇقتىغا ئىگە بولمايدۇ.

بۇ يەكۈنلەرنى
شەكىل سىزىش ئارقى-
لىق دەلىللىيەلمەيسىز؟



ئىزدىنىش



1. يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بىرنەچچە خىل ئورۇن مۇناسىۋىتىنى شەكىل سىزىپ

ئىپادىلەڭ، شەكىلدىن تۈز سىزىق بىلەن پارابولا پەقەت بىرلا ئورتاق نۇقتىغا ئىگە

بولغاندىكى ئەھۋال قانداق بولىدىغانلىقىنى بايقىيالىدۇڭىزمۇ؟

2. تەڭلىمىلەر سىستېمىسىنىڭ يېشىمىنىڭ سانى بىلەن ئورتاق نۇقتىنىڭ سانى قانداق مۇناسىۋەتتە

بولىدۇ؟

مەشىق

1. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

(1) چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتىدۇ، x ئوققا نىسبەتەن سىممېترىك ھەم $M(5, -4)$ نۇقتىدىن

ئۆتىدۇ؛

(2) چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتىدۇ، فوكۇسى $F(0, 5)$ ؛

(3) چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتىدۇ، يۆنىلىدۈرگۈچىسى $x=4$ ؛

(4) فوكۇسى $F(0, -8)$ ، يۆنىلىدۈرگۈچىسى $y=8$.

2. ئوخشاش بىر تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىدا تۆۋەندىكى پارابولالارنى سىزىپ، ئۇلارنىڭ ئې-

چىلىش ئاغزىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى كۆزىتىڭ ھەم پارابولانىڭ ئېچىلىش ئاغزىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى

بىلەن تەڭلىمىدىكى x نىڭ كوئېففىتسېنتى قانداق مۇناسىۋەتتە بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ:

$$(1) y^2 = \frac{1}{2}x; \quad (2) y^2 = x; \quad (3) y^2 = 2x; \quad (4) y^2 = 4x.$$

3. $M(2, 0)$ نۇقتىدىن ئۆتكەن l تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى 1 بولۇپ، ئۇ پارابولا $y^2 = 4x$ بىلەن A, B ئىككى

نۇقتىدا كېسىشسە، $|AB|$ نى تېپىڭ.

4. x ئوققا تىك بولغان تۈز سىزىق پارابولا $y^2 = 4x$ بىلەن A, B ئىككى نۇقتىدا كېسىشسە ھەمدە $|AB| = 4\sqrt{3}$

بولسا، AB تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

4.2 - كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

1. تۆۋەندىكى پارابوللارنىڭ فوكۇسنىڭ كوئوردېناتى ۋە يۆنىلىش گۇچىسىنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ:

- (1) $x^2=2y$; (2) $4x^2+3y=0$;
(3) $2y^2+x=0$; (4) $y^2-6x=0$.


2. بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ.

- (1) يۆنىلىش گۇچىسىنىڭ تەڭلىمىسى $x=2$ بولغان پارابولنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى _____;
(2) پارابولا $y^2=8x$ نىڭ ئۈستىدىكى بىر نۇقتىدىن فوكۇسقىچە بولغان ئارىلىق 6 گە تەڭ بولسا، بۇ نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى _____.


3. پارابولا $y^2=2px$ ($p>0$) نىڭ ئۈستىدىكى M نۇقتىدىن فوكۇس F قىچە بولغان ئارىلىق $|MF|=2p$ بولسا، M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى تېپىڭ.

4. تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئاساسەن، پارابولنىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسىنى تېپىڭ ھەمدە ئۇنىڭ شەكلىنى سىزىڭ:
(1) چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتىدۇ، سىممېترىك ئوقى x ئوق ھەمدە چوققىسى بىلەن فوكۇسنىڭ ئارىلىقى 6 گە تەڭ;

(2) چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا ياتىدۇ، سىممېترىك ئوقى y ئوق ھەمدە ئۇ $P(-6, -3)$ نۇقتىدىن ئۆتىدۇ.
5. رەسمىدىكىدەك، M پارابولا $y^2=4x$ نىڭ ئۈستىدىكى بىر نۇقتا، F پارابولنىڭ فوكۇسى بولۇپ، Fx نى باشلىنىش تەرىپى، FM نى ئاخىرقى تەرىپى قىلغان بۇلۇڭ $\angle xFM=60^\circ$ بولسا، $|FM|$ نى تېپىڭ.




(6 - مىسال ئۈچۈن)




(5 - مىسال ئۈچۈن)

6. رەسمىدىكىدەك، تۈز سىزىق $y=x-2$ بىلەن پارابولا $y^2=2x$ نىڭ ئۆزئارا A, B نۇقتىلاردا كېسىشىشە، $OA \perp OB$ نى ئىسپاتلاڭ.

7. رەسمىدىكىدەك، كراند لىمىنىڭ AOB قىسمى بىر بۆلەك پارابولدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ كەڭلىكى 7m، ئېگىزلىكى 0.7m بولسا، مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسى قۇرۇپ، بۇ پارابولنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.



(8 - مىسال ئۈچۈن)



(7 - مىسال ئۈچۈن)

8. رەسىمىدىكىسى پارابولا شەكلىدىكى كۆۋرۈك ئەگمىسى بولۇپ، سۇ يۈزى l دا بولغاندا، ئەگمە چوققىسى بىلەن سۇ يۈزىنىڭ ئارىلىقى $2m$ ، سۇ يۈزىنىڭ كەڭلىكى $4m$ بولىدۇ. ئۇنداق بولسا، سۇ يۈزى $1m$ تۆۋەنلىگەندە، ئۇنىڭ كەڭلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟

B گۇرۇپپا

1. پارابولا $y^2 = 2px$ ($p > 0$) ئۈستىدىكى ھەرقايسى نۇقتىلار ئارقىلىق x ئوققا تىك كېسىك ئۆتكۈزۈلگەن بولسا، بۇ تىك كېسىكلەرنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىلىرىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ ھەم بۇ تراپىكتورىيە نىڭ قانداق ئەگرى سىزىق بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ.
2. تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭنىڭ بىر چوققىسى كوئوردېنات بېشىدا، قالغان ئىككى چوققىسى پارابولا $y^2 = 2px$ ($p > 0$) نىڭ ئۈستىدە ياتسا، بۇ تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭنىڭ تەرەپ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.
3. A, B نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-1, 0)$ ، $(1, 0)$ بولۇپ، AM ، BM تۈز سىزىقلار M نۇقتىدا كېسىشىدە ھەمدە AM تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى بىلەن BM تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقىنىڭ ئايرىمىسى 2 بولسا، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.



ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى نېمە ئۈچۈن پارابولا بولىدۇ؟

ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى پارابولا بولىدىغانلىقى بىزگە مەلۇم. بۇ پاراگرافتىكى ئۆگىنىشلەردىن بىلەلەيمىزكى، تەكشىلىكتىكى بىر مۇقىم نۇقتا F بىلەن بىر مۇقىم تۈز سىزىق l غىچە ئارىلىقلىرى ئۆزئارا تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيىسى پارابولا بولىدۇ، بۇ پارابولانىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە گرافىكىنىڭ پارابولانىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرەلسەكلا، ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ نىڭ گرافىكى نېمە ئۈچۈن پارابولا بولىدۇ دېگەن مەسىلىنى ھەل قىلغان بولىمىز. يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېيتقاندا، پارابولا بىلەن ئۇنىڭ تەڭلىمىسى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتتىن بىلەلەيمىزكى، ئەگەر $y = ax^2 + bx + c$ نى مۇۋاپىق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى كۆرۈنۈشىگە ئايلاندۇرالساق، ئۇ ھالدا ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى پارابولا بولىدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ. بۇ دېگەنلىك $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) بىلەن پارابولانىڭ ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى مۇھاكىمە قىلىش ئارقىلىق، ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى بىلەن پارابولا ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش دېگەنلىكتۇر.

$y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ ئوڭ تەرەپىنى كۋادراتقا كۆ-

تۈرسەك:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

فۇنكسىيە گرافىكىنى پارابول يۆتكەشنىڭ خۇسۇسىيە-

تىدىن بىلەلەيمىزكى، فۇنكسىيە $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ نىڭ

گرافىكىنى ۋېكتور $m = \left(\frac{b}{2a}, -\frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ نى بويلاپ پارابول

يۆتكەسەك (1 - رەسىم)، فۇنكسىيە گرافىكىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمايدۇ. پارابول يۆتكەنگەندىن كېيىنكى گرافىك ماس كېلىدىغان فۇنكسىيەنىڭ ئانالىتىك ئىپادىسى:

$$y = ax^2$$

بۇ ئىپادىنى

$$x^2 = \frac{1}{a}y$$

كۆرۈنۈش (تەڭلىمە) تە يازساق، بۇ، چوققىسى كۆ-

ئوردىنات بېشىدا ياتقان، فوكۇسى $\left(0, \frac{1}{4a}\right)$ بولغان

پارابولا بولىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنك-

سىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى بىر پارابولادىن ئىبارەت.

ئىككىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيە $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) نىڭ گرافىكى پارابولا بولىدىغان.

لىقىنى باشقا ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟

ئوقۇش ۋە مۇلازىمەت



I كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيىتى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى


ئېللىپس، ھىپېربولا، پارابولا قاتارلىق كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ فوكۇسى بار. فوكۇسنى ئەمەلىيەتتە يورۇقلۇق نۇرىنىڭ يىغىلىش نۇقتىسى دەپ چۈشىنىشكە بولىدۇ. بۇ، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ يورۇقلۇق بىلەن زىچ باغلىنىشى بارلىقىنى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ مول ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

بىزگە مەلۇمكى، بىر دەستە يورۇقلۇق نۇرى سىنئەينەك يۈزىگە چۈشكەندە، يورۇقلۇق نۇرى بەلگىلىك قانۇنىيەت بويىچە قايتۇرۇلىدۇ، يەنى چۈشۈش بۇلۇڭى قايتىش بۇلۇڭىغا تەڭ بولىدۇ (1 - رەسىم). يورۇقلۇق نۇرى ئەگرى سىرتقا چۈشكەندە، بولۇپمۇ كونۇس ئەگرى سىزىقىنى ئۆزىنىڭ سىممېترىك ئوقىنى چۆرىدىتىپ ئايلاندۇرۇشتىن ھاسىل بولغان ئەگرى سىرتقا


چۈشكەندە، قانداق ھادىسە يۈز بېرىدۇ؟

تۇرمۇشتىكى بىر ئەمەلىي مىسالنى كۆرۈپ باقايلى: كىچىك لامپۇچكىدىن چىققان يورۇق-
لۇق ھەممە تەرەپكە چېچىلىدۇ، ئەمما ئۇنى سىلىندىر شەكىللىك قولچىرىغىنىڭ ئىچىگە سې-
لىپ، مۇۋاپىق تەڭشىگەندىن كېيىن قولچىرىغىدىن بىرقەدەر كۈچلۈك ھەم پاراللېل بولغان يو-
رۇقلۇق نۇرى چىقىدۇ، بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟


ئەسلىدە، قولچىرىغىنىڭ كىچىك لامپۇچكىسىنىڭ كەينىگە بىر يورۇقلۇق قايتۇرۇش
سىنىئەينىكى ئورنىتىلغان، سىنىئەينەك يۈزىنىڭ شەكلى پارابولانى ئۆزىنىڭ ئوقىنى چۆرىدىتىپ
ئايلىاندۇرۇشتىن ھاسىل بولغان بىر ئەگرى سىرت (2 - رەسىم) بولۇپ، ئۇ پارابولانىڭ دەپ ئا-
تلىدۇ. كىشىلەر پارابولانىڭ تۆۋەندىكىدەك بىر مۇھىم خۇسۇسىيىتىنى ئىسپاتلاپ چىققان:
فوكۇستىن چىققان يورۇقلۇق نۇرى پارابولا ئۈستىدىكى بىر نۇقتا ئارقىلىق قايتۇرۇلغاندىن
كېيىن، قايتۇرۇلغان يورۇقلۇق نۇرى پارابولانىڭ ئوقىغا پاراللېل بولىدۇ. چارلاش چىرىغى (3 -
رەسىم) مۇ دەل مۇشۇ پرىنسىپقا ئاساسەن لايىھەلەنگەن.




3 - رەسىم



2 - رەسىم



1 - رەسىم




4 - رەسىم


پارابولانىڭ بۇ خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىپ، پارابولانىڭ
ئوقىغا پاراللېل بولغان بىر دەستە يورۇقلۇق نۇرىنى پارابولا-
نىڭ قايتۇرۇشى ئارقىلىق ئۇنىڭ فوكۇسىغا يىغىشقىمۇ
بولىدۇ. كىشىلەر بۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىپ سۇ ۋە يېمەك-
لىكلەرنى ئىسسىقلىقتا ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل قۇياش نۇ-
رى ئوچىقىنى لايىھەلەپ چىققان (4 - رەسىم). بۇ خىل قۇياش
نۇرى ئوچىقىدا ئايالما پارابولانىڭ شەكلىدىكى بىر نۇر قا-
تۇرۇش سىنىئەينىكى بار، ئۇنىڭ ئوقى قۇياش نۇرى بىلەن
پاراللېل بولغاندا، قۇياش نۇرى قايتۇرۇلغاندىن كېيىن فوكۇس-
قا يىغىلىدۇ - دە، بۇ نۇقتىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ناھايىتى يۇ-
قىرى بولىدۇ.

ئېللىپس بىلەن ھىپېربولانىڭ ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيىتى پارابولانىڭكىگە ئوخشىمايدۇ.
ئېللىپسنىڭ بىر فوكۇسىدىن چىققان يورۇقلۇق نۇرلىرى ئېللىپس ئارقىلىق قايتۇرۇلغاندىن
كېيىن، قايتقان يورۇقلۇق نۇرلىرى ئېللىپسنىڭ يەنە بىر فوكۇسىدا كېسىشىدۇ (5 - رەسىم)؛
ھىپېربولانىڭ بىر فوكۇسىدىن چىققان يورۇقلۇق نۇرلىرى ھىپېربولا ئارقىلىق قايتۇرۇلغاندىن
كېيىن، قايتقان يورۇقلۇق نۇرلىرى خۇددى يەنە بىر فوكۇستىن چېچىلىپ چىققانداك ھالەتتە
بولىدۇ (6 - رەسىم). كىشىلەر ئېللىپس، ھىپېربولانىڭ ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيىتىنىمۇ ھەر
خىل لايىھەلەشلەردە كەڭ قوللىنىلىپ كەلمەكتە.


7 - رەسىمىدىكىدەك، كىنو قويۇش ئاپپاراتىنىڭ يورۇقلۇق نۇرى يىغىش چىرىغىدا بىر نۇر قايتۇرۇش ئەينىكى بار بولۇپ، ئۇ ئايانما ئېللىپسىسىدە شەكىلدە بولىدۇ. لېنتا ئىشىكى (كىنو لېنتىسى ئۆتكۈزۈلىدىغان ئورۇن) نى ئەڭ كۈچلۈك يورۇقلۇق نۇرىغا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن، لامپۇچكا قىلى F_2 بىلەن لېنتا ئىشىكى F_1 ئېللىپسىنىڭ ئىككى فوكۇسىغا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. مانا بۇ، ئېللىپسىنىڭ ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىشقا دائىر بىر ئەمەلىي مىسالدۇر.



رەسىم 7 -



رەسىم 6 -



رەسىم 5 -

II كونسىنوس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى ۋە بىرلىككە كەلگەن تەڭلىمىسى

ئۇچۇر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ شەكىل سىزىش: F نۇقتا تەكشىلىكتىكى بىر مۇقىم نۇقتا، l تۈز سىزىق تەكشىلىكتىكى F نۇقتىدىن ئۆتمەيدىغان بىر مۇقىم تۈز سىزىق بولۇپ، M نۇقتىدىن F نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىق بىلەن بۇ نۇقتىدىن l تۈز سىزىقىغىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى بىر تۇراقلىق سان e غا تەڭ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيەسىنى كۆزىتىڭ ھەم تراپىكتورىيەنىڭ شەكىلىگە ھۆكۈم قىلىڭ.

بايقاشقا بولىدۇكى، M نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيەسى كونسىنوس ئەگرى سىزىقى بولىدۇ ھەم $0 < e < 1$ بولغاندا، بۇ تراپىكتورىيە ئېللىپس بولىدۇ؛

$e > 1$ بولغاندا، بۇ تراپىكتورىيە ھىپېربولا بولىدۇ؛

$e = 1$ بولغاندا، بۇ تراپىكتورىيە پارابولا بولىدۇ.


مۇقىم نۇقتا F ئۇنىڭ فوكۇسى، نىسبەت قىممەت e ئۇنىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى بولىدۇ. مۇقىم تۈز سىزىق l نى ئۇنىڭ يۆنەلدۈرگۈچىسى دەيمىز.

شۇنىڭ بىلەن، كونسىنوس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ تۆۋەندىكى بىرلىككە كەلگەن ئېنىقلىمىسىنى ئىشلىتىشقا بولىدۇ:

تەكشىلىكتە، بىر نۇقتىدىن بىر مۇقىم نۇقتا F كىچىك بولغان ئارىلىق بىلەن ئۇنىڭدىن بىر مۇقىم تۈز سىزىق l غىچە بولغان ئارىلىقنىڭ نىسبىتى تۇراقلىق سان e غا تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ نۇقتىنىڭ تراپىكتورىيەسى كونسىنوس ئەگرى سىزىقى دەپ ئاتىلىدۇ، بۇنىڭدىكى F ئۇنىڭ فوكۇسى، l تۈز سىزىق ئۇنىڭ يۆنەلدۈرگۈچىسى، نىسبەت قىممەت e ئۇنىڭ مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى بولىدۇ.

ئۇنداق بولسا، كونسىنوس ئەگرى سىزىقنىڭ بىرلىككە كەلگەن تەڭلىمىسىنى قانداق تېپىش كېرەك؟

1 - رەسىمىدىكىدەك، M نۇقتا ئارقىلىق $l \perp MH$ (تىك ئاساسى H) نى ئۆتكۈزسەك، كونسىنوس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ بىرلىككە كەلگەن ئېنىقلىمىسىدىن تۆۋەندىكىنى بىلىشكە بولىدۇ:



(1 - مىسال ئۈچۈن)

$$M \in \{M \mid |FM| = e|MH|\}.$$

فوكۇس F تىن ئۆتكەن ھەمدە يۆنەلدۈرگۈچى l غا تىك بولغان تۈز سىزىقنى x ئوق، $F(O)$ نۇقتىنى كوئوردېنات بېشى قىلىپ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇۋالسىمىز. M نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى (x, y) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا:

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (1)$$

l تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى $x = -p$ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا:

$$|MH| = |x + p|. \quad (2)$$

① بىلەن ② نى $|OM| = e|MH|$ قا قويىساق:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = e|x + p|.$$


ئىككى تەرىپىنى كۋادراتقا كۆتۈرۈپ، ئاندىن ئاددىيلاشتۇرساق:

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 - 2pe^2x - p^2e^2 = 0.$$

مانا بۇ، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى (ئېللىپس، ھىپېربولا، پارابولا) نىڭ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىدىكى بىرلىككە كەلگەن تەڭلىمىسىدۇر.

خۇلاسە

I بۇ بابتىكى بىلىملەرنىڭ قۇرۇلما سىخېمىسى



II ئەسلىش ۋە مۇلاھىزە

1. بىز ئەگرى سىزىقنى مەلۇم خىل شەرت p نى قانائەتلەندۈرىدىغان M نۇقتىسىنىڭ توپلىمى دەپ قارايمىز، يەنى

$$P = \{M | p(M)\}.$$

كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇۋېلىنغاندىن كېيىن، P توپلامدىكى خالىغان بىر M ئېلېمېنتقا بىردىنبىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) ماس كېلىدۇ، p شەرتنى قانائەتلەندۈرىدىغان (x, y) ئىككى نامەلۇملۇق تەڭلىمە $f(x, y) = 0$ نى ھاسىل قىلىدۇ، باشقىچە ئېيتقاندا، بۇ (x, y) توپلام

$$Q = \{(x, y) | f(x, y) = 0\}$$

دىكى بىر ئېلېمېنت بولىدۇ. ئەكسىچە، Q توپلامدىكى خالىغان بىر ئېلېمېنت (x, y) كە ھامان بىر M نۇقتا ماس كېلىدۇ ھەمدە M نۇقتا P توپلامدىكى بىر ئېلېمېنت بولىدۇ. P بىلەن Q نىڭ بۇ خىل ماس-لىق مۇناسىۋىتى دەل ئەگرى سىزىق بىلەن تەڭلىمىنىڭ مۇناسىۋىتىدۇر.

ئەگرى سىزىق بىلەن تەڭلىمىنىڭ مۇناسىۋىتى بوشلۇق شەكلى بىلەن سانلىق مىقدارلار مۇناسىۋىتى ئارىسىدىكى باغلىنىشنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ.

2. كونۇسنى بىر تەكشىلىك بىلەن كېسىپ، تەكشىلىك بىلەن كونۇس ئوقىنىڭ ئارا بۆلۈڭىنى ئۆز-گەرتسەك، كېلىپ چىققان كېسىش ئەگرى سىزىقى ئايرىم - ئايرىم چەمبەر، ئېللىپس، پارابولا ۋە ھىپېربولا بولىدۇ، بىز ئۇلارنى ئومۇملاشتۇرۇپ كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى دەپ ئاتايمىز. ئەمەلىيەتتە، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى ئاسترونومىيە، فىزىكا قاتارلىق پەنلەردىكى تەتقىقاتلار بىلەن، شۇنداقلا بىزنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىمىز بىلەنمۇ زىچ باغلىنىشلىق. ئالاقىدار ماتېرىياللاردىن پايدىلىنىپ، بۇ جەھەتتىكى بىلىملەرنى ئىگىلەپ كۆرۈڭ.

3. تارىختا، كىشىلەر ساپ گېئومېتىرىيەلىك ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ كۆپلىگەن خۇسۇسىيەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇ خۇسۇسىيەتلەر ئاسترونومىيە تەتقىقاتلىرىدا

قوللىنىلغان. دېكارت ئانالىتىك گېئومېترىيىنى كەشىپ قىلغاندىن كېيىن، كىشىلەر كوئوردېنات سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ سان بىلەن شەكىلنى ئۆزئارا بىرلەشتۈردى. كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تاللاپ، ئۇلارنىڭ تەڭلىمىسىنى تۇرغۇزۇشقا بولىدۇ، ئاندىن تەڭلىمىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ گېئومېترىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ. مانا بۇ كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنى كوئوردېنات ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىش دېگەنلىكتۇر.

كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرىنى كوئوردېنات ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشنىڭ كۈنكەرت جەريانىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

4. تۆۋەندىكى جەدۋەلنى تاماملاڭ.

پارابولا	ھىپېربولا	ئېللىپس
		ئېنىقلىمىسى
		شەكلى
		ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى
		چوققىسىنىڭ كوئوردېناتى
		سىممېترىك ئوقى
		فوكۇسىنىڭ كوئوردېناتى
		مەركەزدىن قېچىش دەرىجىسى

5. ئېللىپس، ھىپېربولا، پارابولادىن ئىبارەت ئۈچ خىل كۈنۈس ئەگرى سىزىقىنى مۇھاكىمە قىلىش ئۇسۇلى بىردەكلىككە ئىگە. مەسىلەن، ئېللىپسنىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكى، ئېنىقلىمىسى، ئۆلچەملىك تەڭلىمىسى، ئاددىي خۇسۇسىيەتلىرى قاتارلىقلارنى تەتقىق قىلغاندىن كېيىن، تەققاسلاش ئارقىلىق ھىپېربولا ۋە پارابولاغا دائىر تەتقىقات تېمىسى ۋە ئاساسىي تەتقىقات ئۇسۇلىغا ئىگە بولالايمىز.


6. كۈنۈس ئەگرى سىزىقلىرى بىردەكلىككە ئىگە:

- (1) ئۇلارنىڭ ھەممىسى كۈنۈسنى تەكشىلىك بىلەن كەسكەندە ھاسىل بولغان كېسىش ئەگرىسى - سىزىقلىرىدۇر؛
- (2) ئۇلارنىڭ ھەممىسى تەكشىلىك ئىچىدىكى بىر مۇقىم نۇقتىغىچە بولغان ئارىلىقى بىلەن بىر مۇقىم تۈز سىزىق (ئاشۇ مۇقىم نۇقتىدىن ئۆتمىگەن) قىچە بولغان ئارىلىقىنىڭ نىسبەت قىممىتى بىر تۇراقلىق سانغا تەڭ بولغان نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيىلىرى بولۇپ، نىسبەت قىممەتنىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى ئوخشاش بولمىغان ئەگرى سىزىقلارنى ھاسىل قىلىدۇ؛
- (3) ئۇلارنىڭ تەڭلىمىلىرىنىڭ ھەممىسى y, x كە دائىر ئىككىنچى دەرىجىلىك تەڭلىمدۇر.

7.1 تۈز سىزىق بىلەن كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنىڭ ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولۇش - بولماسلىقى ئۇلارنىڭ تەڭلىمىسىدىن تۈزۈلگەن تەڭلىمىلەر سىستېمىسىنىڭ ھەقىقىي يېشىمىگە ئىگە بولۇش - بولماسلىقى بىلەن تەڭ كۈچلۈك بولىدۇ. تەڭلىمىلەر سىستېمىسى قانچە گۈرۈپپا ھەقىقىي يېشىمىگە ئىگە بولسا، l تۈز سىزىق بىلەن كونۇس ئەگرى سىزىقى شۇنچە ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولىدۇ؛ تەڭلىمىلەر سىستېمىسى ھەقىقىي يېشىمىگە ئىگە بولمىسا، l تۈز سىزىق بىلەن C ئەگرى سىزىق ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولمايدۇ.

8. كونۇس ئەگرى سىزىقلىرى تەتقىقاتىدا، ئۈچۈر تېخنىكىسى ناھايىتى ياخشى رول ئوينايدۇ. مەسىلەن، ئەگرى سىزىقنىڭ شەكلىنى ئۈچۈر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ناھايىتى ئاسانلا سىزىپ چىققىلى بولىدۇ؛ بەزى مىقدارلار (مەسىلەن، ئېللىپسىنىڭ ئۇزۇن، قىسقا ئوقلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى فوكۇسلار ئارىلىقى قاتارلىقلار) نى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق، ئەگرى سىزىقلارنىڭ گېئومېترىيىلىك ئالاھىدىلىكى ۋە ئاساسىي خۇسۇسىيەتلىرى (ئۆزگىرىش جەريانىدا ئۆزگەرمەيدىغان ئالاھىدىلىكلىرى) نى ئاسانلا بايقاشقا بولىدۇ ۋە باشقىلار. ئومۇمەن، كونۇس ئەگرى سىزىقلىرىنى تەتقىق قىلىشتا، ئۈچۈر تېخنىكىسى مەسىلەنلىرىنى بايقاش، پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنى شەكىللەندۈرۈش، يەكۈنگە ئىگە بولۇش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ.

A گۇرۇپپا



(1 - مىسال ئۈچۈن)

1. رەسمىدىكىدەك، دۆلىتىمىز قويۇپ بەرگەن تۇنجى يەر شارى سۈنئىي ھەمراھنىڭ ئايلىنىش ئوربىتىسى يەر مەركىزى (يەر شارىنىڭ مەركىزى) F_2 نى بىر فوكۇس قىلغان ئېللىپسىدىن ئىبارەت. ئۇنىڭ يەرگە يېقىن نۇقتىسى (يەر يۈزىگە ئەڭ يېقىن نۇقتىسى) A دىن يەر يۈزىگىچە بولغان ئارىلىق 439 km، يەر دىن يىراق نۇقتىسى (يەر يۈزىدىن ئەڭ يىراق نۇقتىسى) B دىن يەر يۈزىگىچە بولغان ئارىلىق 2384 km بولۇپ، A, F_2, B لار ئوخشاش بىر تۈز سىزىق ئۈستىدە ياتىدىغانلىقى ھەمدە يەر شارىنىڭ رادىئوسى تەخمىنەن 6371 km ئىكەنلىكى بېرىلگەن. سۈنئىي ھەمراھنىڭ ئايلىنىش ئوربىتىسىنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ (1 km غىچە ئېنىقلىقتا).

2. يەر شارى سۈنئىي ھەمراھنىڭ ئايلىنىش ئوربىتىسى يەر شارى مەركىزىنى بىر فوكۇس قىلغان ئېللىپسىدىن ئىبارەت. يەر شارىنىڭ رادىئوسىنى R ، سۈنئىي ھەمراھنىڭ يەرگە يېقىن نۇقتىسى ۋە يەرگە يىراق نۇقتىسىدىن يەر يۈزىگىچە بولغان ئارىلىقلارنى ئايرىم - ئايرىم r_1, r_2 دەپ پەرەز قىلىپ، سۈنئىي ھەمراھ ئوربىتىسىنىڭ مەركەزىدىن قېچىش دەرىجىسىنى تېپىڭ.

3. توغرا جاۋابنى تاللاڭ:

(1) ئەگرى سىزىق $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ بىلەن $\frac{x^2}{25-k} + \frac{y^2}{9-k} = 1$ ($k < 9$) نىڭ ()

(A) ئۇزۇن ئوقلىرى ئۆزئارا تەڭ (B) قىسقا ئوقلىرى ئۆزئارا تەڭ

(C) مەركەزدىن قېچىش دەرىجىلىرى ئۆزئارا تەڭ (D) فوكۇسلار ئارىلىقى ئۆزئارا تەڭ

(2) چەمبەر $x^2 + y^2 = 1$ ۋە $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ بىلەن ئوخشاشلا سىرتتىن ئورۇندىغان چەمبەرنىڭ مەركىزى () ئۈستىدە ياتىدۇ.

(A) بىر ئېللىپس (B) ھىپېربولىنىڭ بىر تارمىقى

(C) بىر پارابولا (D) بىر چەمبەر

4. α نىڭ قىممىتى 0° تىن 180° قىچە ئۆزگەرگەندە، تەڭلىمە $x^2 + y^2 \cos \alpha = 1$ ئىپادىلىگەن ئەگرى سىزىقنىڭ شەكلى قانداق ئۆزگىرىدۇ؟

5. تۈز سىزىق $y = kx - 1$ بىلەن ھىپېربولا $x^2 - y^2 = 4$ ئورتاق نۇقتىغا ئىگە بولمىسا، k نىڭ قىممەت ئېلىش دائىرىسىنى تېپىڭ.

6. پارابولىنىڭ چوققىسى O بولۇپ، فوكۇستىن ئۆتۈپ سىممېترىك ئوققا تىك بولغان تۈز سىزىق پارابولا بىلەن B ، C ئىككى نۇقتىدا كېسىشىدۇ، پارابولا ئۈستىدىكى P نۇقتىدىن ئۆتۈپ سىممېترىك ئوققا تىك بولغان تۈز سىزىق بۇ ئوق بىلەن Q نۇقتىدا كېسىشىدۇ. $|BC|$ بىلەن $|OQ|$ نىڭ تاناسىپلىق ئوتتۇرا ئەزاسى $|PQ|$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

7. تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭنىڭ بىر چوققىسى پارابولا $y^2 = 2px$ ($p > 0$) نىڭ فوكۇسى ئۈستىدە، قالغان ئىككى چوققىسى پارابولىنىڭ ئۈستىدە ياتسا، بۇ تەڭ تەرەپلىك ئۈچبۇلۇڭنىڭ تەرەپ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.

8. يانتۇلۇقى 2 بولغان l تۈز سىزىق ھىپېربولا $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ بىلەن A, B نۇقتىلاردا كېسىشىشە ھەمدە $|AB| = 4$ بولسا، l تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

9. $M(2, 1)$ نۇقتا ئارقىلىق ئۆتكۈزۈلگەن l تۈز سىزىق ھىپېربولا $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ بىلەن A, B نۇقتىلاردا كېسىشسە

ھەمدە M نۇقتا AB نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، l تۈز سىزىقنىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

10. $\triangle ABC$ نىڭ A, B ئىككى چوققىسىنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-5, 0)$ ، $(5, 0)$ ھەمدە AC, BC لار ياتى-

قان تۈز سىزىقلارنىڭ يانتۇلۇقلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسى m ($m \neq 0$) غا تەڭ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. C چوققىنىڭ تراپىكتو-

رىمىسىنى تېپىڭ.

11. پارابولا $y^2 = 4x$ نىڭ ئۈستىدىن تۈز سىزىق $y = x + 3$ كىچە ئارىلىقى ئەڭ قىسقا بولغان بىر P نۇقتىنى تېپىڭ.

12. رەسىمدىكىدەك، بىر تونىلىنىڭ كەسمە يۈزى بىر تىك

تۆتبۇلۇڭ ۋە بىر پارابولادىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ئۇنىڭ ئى-

چىگە قوش لىنىيىلىك تاشيول ياتقۇزۇلغان. بىخەتەرلىككە كاپا-

لەتلىك قىلىش ئۈچۈن، بۇ تونىلىدىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىللار-

نىڭ ئۈستى (بۇ يەردە ئۈستى تەكشى دەپ پەرەز قىلىنىدۇ) بىلەن


تونىل چوققىسىنىڭ ۋېرىتىكال يۆنىلىشتىكى ئارىلىقى پەرقىنىڭ

كەم دېگەندە 0.5m بولۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ. ئەگەر تاشيولنىڭ

ئومۇمىي كەڭلىكى $|AB| = 6\text{m}$ بولسا، تونىلىدىن ئۆتىدىغان

ئاپتوموبىللارنىڭ چەكلەنگەن ئېگىزلىكى قانچە مېتىر (0.1m)

غىچە ئېنىقلىقتا؟




(12 - مىسال ئۈچۈن)

B گۇرۇپپا

1. P نۇقتا ئېللىپس $16x^2 + 25y^2 = 1600$ ئۈستىدىكى بىر نۇقتا ھەمدە ئۇ x ئوقىنىڭ ئۈستۈنكى تەرىپىدە ياتىدۇ، F_1 ،

F_2 لەر ئايرىم - ئايرىم ئېللىپسنىڭ سول ۋە ئوڭ فوكۇسلىرى بولۇپ، PF_2 تۈز سىزىقنىڭ يانتۇلۇقى $4\sqrt{3}$ - كە تەڭ

بولسا، $\triangle PF_1F_2$ نىڭ يۈزىنى تېپىڭ.



(2 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمدىكىدەك، ئېللىپس $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) نىڭ ئۈستىدىكى بىر

P نۇقتا ئارقىلىق x ئوقىغا تىك سىزىق ئۆتكۈزۈلگەن (تىك ئاساسى سول فوكۇس

F_1 بىلەن ئۈستۈن ئۈست چۈشىدۇ)، ئېللىپس بىلەن x ئوقىنىڭ مۇسبەت يېرىم

ئوقى A نۇقتىدا، ئېللىپس بىلەن y ئوقىنىڭ مۇسبەت يېرىم ئوقى B نۇقتىدا

كېسىشىدۇ ھەمدە $|F_1A| = \sqrt{10} + \sqrt{5}$ ، $AB \parallel OP$. بۇ ئېللىپسنىڭ تەڭلىمى-

سىنى تېپىڭ.

3. رەسىمدىكىدەك، تۈز سىزىق بىلەن پارابولا $y^2 = 2px$ ($p > 0$) نىڭ A, B

نۇقتىلاردا كېسىشىدىغانلىقى ھەمدە $OD \perp AB$ ، $OA \perp OB$ (تىك ئاساسى D)،

نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى $(2, 1)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. p نىڭ قىممىتىنى تېپىڭ.

4. پارابولا ۋە ھىپېربولانىڭ ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيەتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ

قوللىنىپ، رېفلېكتورلۇق تېلېسكوپنى لايىھىلەپ چىقىلى بولىدۇ. بۇ خىل تې-


لېسكوپ نەيچىسى قىسقا ھەمدە ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتىنى ئېنىق كۆ-

زەتكىلى بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. مەسىلەن، مەلۇم ئاسترونومىيە ئەسۋاب-

لىرى زاۋۇتى لايىھىلەپ ئىشلەپچىقارغان بىر خىل رېفلېكتورلۇق تېلېسكوپنىڭ


نەيچىسىنىڭ دىئامېتىرى 0.6m ، ئۇزۇنلۇقى 2m بولۇپ، ئۇنىڭ ئوپتىكىلىق

سىستېمىسىنىڭ پرىنسىپى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك (مەركىزىي ئوق كەسمى-



(3 - مىسال ئۈچۈن)

سېنىڭ سىخېمىسى). ئۇنىڭدا، بىر نۇر قايتۇرۇش سىنىئەينىكىنىڭ PO_1Q يايى ياتقان ئەگرى سىزىق پارابولا، يەنە بىر نۇر قايتۇرۇش سىنىئەينىكىنىڭ MO_2N يايى ياتقان ئەگرى سىزىق ھىپېربولانىڭ بىر تارمىقىدىن ئىبارەت. ئەگەر F_1, F_2 لەر ھىپېربولانىڭ ئىككى فوكۇسى بولۇپ، F_2 يەنە پارابولانىڭمۇ فوكۇسى بولسا، رەسمىدىكى ئۆلچەملەر (بىرلىكى: mm) گە ئاساسەن، ئايرىم - ئايرىم پارابولا ۋە ھىپېربولانىڭ تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.



(4 - مىسال ئۈچۈن)

5. A, B نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم $(-1, 0)$ ، $(1, 0)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. $BM \cdot AM$ تۈز سىزىقلار M نۇقتىدا كېسىشىشە ھەمدە ئۇلارنىڭ يانتۇلۇقلىرىنىڭ يىغىندىسى 2 گە تەڭ بولسا، M نۇقتىنىڭ تراپېكتورىيە تەڭلىمىسىنى تېپىڭ.

6. m نىڭ ئوخشاش بولمىغان قىممەتلىرىگە نىسبەتەن، تەڭلىمە $(m-1)x^2 + (3-m)y^2 = (m-1)(3-m)$ ئىپادىلەيدىغان دېغان ئەگرى سىزىقلارنىڭ شەكلىنى كۆرسىتىپ بېرىڭ ھەم يەكۈنىڭىزنى ئۈچۈر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ كۆرسەتەيلىك ھالدا دەلىللەڭ.

7. پارابولا $y^2 = 2px$ ($p > 0$) نىڭ فوكۇسى F ئارقىلىق ئۆتكۈزۈلگەن تۈز سىزىق پارابولا بىلەن A, B ئىككى نۇقتىدا كېسىشىدۇ. AB نى دىئامېتىر قىلىپ چەمبەر سىزىق، بۇ چەمبەر بىلەن پارابولانىڭ يۆنىلىش گۈچىسى l ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئۈچۈر تېخنىكىسى قورالىدىن پايدىلىنىپ كۆزىتىڭ. قانداق يەكۈنگە ئىگە بولىدىڭىز؟ ئەگەر دېيىلگەننى ئېلىپ، ھىپېربولا بولسا ئەھۋال قانداق بولىدۇ؟ يەكۈنىڭىزنى ئىسپاتلاڭ.

3 - باب

بوشلۇقتىكى ۋېكتور ۋە ستېرېئومېترىيە

1-3 بوشلۇقتىكى ۋېكتور ۋە ۋېكتور ئەمەللىرى

2-3 ستېرېئومېترىيىدىكى ۋېكتور ئۇسۇلى



ۋېكتور بىر خىل مۇھىم ماتېماتىكىلىق قورال، ئۇ گېئومېترىيىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا كەڭ قوللىنىلىپلا قالماي، فىزىكا، قۇرۇلۇش ئىلمى قاتارلىقلاردىمۇ كەڭ قوللىنىلىدۇ. ۋېكتور يېقىنقى زامان ماتېماتىكىسىدىكى ئاساسىي ئۇقۇملارنىڭ بىرى بولۇپ، ۋېكتورغا دائىر دەسلەپكى بىلىم ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى خېلى بۇرۇنلا يېقىنقى زامان ماتېماتىكىسىنىڭ ئاساسىي قىسمىغا كىرگۈزۈلگەن.

تەكشىلىكتىكى ۋېكتورنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، تەكشىلىكتىكى نۇقتا، تۈز سىزىقلارنى ۋېكتور ۋە ۋېكتور ئەمەللىرىدىن پايدىلىنىپ ئىپادىلەپ، ئۇلار ئارىسىدىكى پاراللېل بولۇش، تىك بولۇش، ئارا بۇلۇڭ، ئارىلىق دېگەندەك مۇناسىۋەتلەرنى ۋېكتور ئەمەللىرىگە تايىنىپ كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا ۋە بۇ ئارقىلىق تەكشىلىكتىكى شەكىللەرگە دائىر مەسىلىلەرنى تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلاردىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى بىلىۋالدۇق. بۇ بابتا، بىز تەكشىلىكتىكى ۋېكتورنى بوشلۇقتىكى ۋېكتورغا كېڭەيتىپ، بوشلۇقتىكى ۋېكتور ئۇقۇمى، ۋېكتور ئەمەلى، ۋېكتورنىڭ كوئوردىنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى ۋە ستېرېئومېترىيىگە دائىر مەسىلىلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتور ئەمەللىرىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشنى ئۆگىنىمىز.


بوشلۇقتىكى ۋېكتور بىلەن تەكشىلىكتىكى ۋېكتورنىڭ ماھىيەتلىك پەرقى يوق، ئۇلارنىڭ ھەر ئىككىسى چوڭ - كىچىكلىككە ۋە يۆنىلىشكە ئىگە مىقدارنى ئىپادىلەيدۇ، ئۇلار ئۈستىدىكى قوشۇش، ئېلىش، ۋېكتورنى سانغا كۆپەيتىش، سكاليار (سانلىق) كۆپەيتىمە دېگەندەك ئەمەللەرمۇ پۈتۈنلەي ئوخشاش. شۇڭا، ستېرېئومېترىيىگە دائىر مەسىلىلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتورلاردىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشتىمۇ، ئالدى بىلەن بوشلۇقتىكى نۇقتا، تۈز سىزىق، تەكشىلىك قاتارلىق ئېلېمېنتلارنى بوشلۇقتىكى ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ ئىپادىلەپ، ستېرېئومېترىيە بىلەن بوشلۇقتىكى ۋېكتور ئارىسىدىكى باغلىنىشنى تۇرغۇزۇۋالسىمىز؛ ئاندىن بوشلۇقتىكى ۋېكتورلار ئۈستىدە ئەمەل بېجىرىمىز؛ ئۇنىڭدىن كېيىن ئەمەل بېجىرىش نەتىجىسىنىڭ گېئومېترىيىلىك چۈشەندۈرۈلۈشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۇ ئارقىلىق گېئومېترىيىلىك يەكۈنگە ئىگە بولىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۆگىنىش جەريانىدا، بوشلۇقتىكى ۋېكتورنى تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا تەقاسلاش (ئانالوگىيە، ئوخشىتىش دەپمۇ ئاتىلىدۇ) قا دىققەت قىلىپ، بوشلۇقتىكى ۋېكتورنىڭ ستېرېئومېترىيىگە دائىر مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىكى رولىنى ھېس قىلىشىمىز كېرەك.

3




هەيۋەتلىك قۇرۇلۇشلار،
ئېڭىز - ئېڭىز كۆۈرۈكلەر، ئەگرى رې-
لىسلار، زور تىپتىكى قۇرۇلۇش ماشىنىلى-
رى نى لايىھەلەشتە، ستېرېئومېتىر-
يىگە دائىر نۇرغۇن مەسىلىلەرگە دۇچ كې-
لىمىز، بۇ مەسىلىلەر بوشلۇقتىكى ۋېك-
تورلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك.

بوشلۇقتىكى ۋېكتور ۋە ۋېكتور ئەمەللىرى




نۇرغۇنلىغان قۇرۇلۇشلار -
نىڭ پولات تىرەكلىرى ۋە
ھەيكەلتىراشلىق ئەسەرلىرىدە -
دىن بوشلۇقتىكى ۋېكتورنىڭ
گىزاسىنى كۆرەلەيمىز .

1.1.3 - رەسىمدىكىدەك، مۇنتىزىم ئۈچبۇلۇڭ شەكىللىك بىر پارچە تەكشى پولات تاختىنىڭ ماسسىسى 500 kg بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈچ چوققىسى ئايرىم - ئايرىم F_1 ، F_2 ، F_3 كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ، ھەر بىر كۈچ بىلەن ئۈچبۇلۇڭنىڭ شۇ كۈچكە قوش - نا ئىككى تەرىپى ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ ئوخشاشلا 60° ھەم سىرىدە قانداق ھەرىكەت قىلىشى مۇمكىن؟ بۇ ئۈچ كۈچ كەم دېگەندە قانچىلىك چوڭلۇقتا بولغاندا، ئاندىن بۇ پولات تاختىنى كۆتۈرەلەيدۇ؟



رەسىم - 2.1.3




رەسىم - 1.1.3

1.1.3 - رەسىمدىكى F_1 ، F_2 ، F_3 ئۈچ كۈچ ھەم چوڭ - كىچىكلىككە، ھەم يۆنىلىشكە ئىگە مىقدار بولسىمۇ، ئەمما ئۇلار ئوخشاش بىر تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلار ئەمەس. شۇڭا، بۇ مەسىلىنى ھەل قىل - ىشتا بوشلۇقتىكى ۋېكتورغا دائىر بىلىملەر لازىم بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە، ئوخشاش بىر تەكشىلىكتە ياتىمىغان ۋېكتورلارنى ھەممىلا يەردە ئۇچراتقىلى بولىدۇ. مەسىلەن، كۈبتىكى ئوخشاش بىر چوققىدىن ئۆتكەن ئۈچ قىر ئىپادىلىگەن $\vec{OA}$ ، $\vec{OB}$ ، $\vec{OC}$ ئۈچ ۋېكتور ئوخشاش بىر تەكشىلىكتە ياتىمىغان ۋېك - تورلاردۇر (2.1.3 - رەسىم).

بوشلۇقتىكى ۋېكتور ۋە ئۇلارنى قوشۇش، ئېلىش ئەمەللىرى

1-1-3

تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا ئوخشاش، بوشلۇقتا چوڭ - كىچىكلىككە ۋە يۆنىلىشكە ئىگە مىقدارنى بوشلۇقتىكى ۋېكتور (space vector)، ۋېكتورنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى ۋېكتورنىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى مودۇلى (modulus) دەپ ئاتايمىز. يۇقىرىقى مەسىلىدىكى ئۈچبۇلۇڭ شەكىللىك پولات تاختا ئۇچرىغان



رەسىم 3.1.3 -

ئۈچ كۈچ F_1, F_2, F_3 ۋە كۈبىنىڭ ئۈچ قىرى ئىپادىلىگەن ئۈچ ۋېكتور $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ لارنىڭ ھەممىسى بوشلۇقتىكى ۋېكتورلاردۇر.


تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا ئوخشاش، بوشلۇقتىكى ۋېكتورنىمۇ يۆنىلىشلىك كېسىك بىلەن ئىپادىلەيمىز. يۆنىلىشلىك كېسىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋېكتورنىڭ مودۇلى دۆلىنى ئىپادىلەيدۇ. 3.1.3 - رەسىمدىكىدەك، ۋېكتور a نىڭ باش نۇقتىسى A ئاخىرقى نۇقتىسى B بولسا، ئۇ ھالدا ۋېكتور a نى $\vec{AB}$ قىلىپ يېزىقىمۇ بولىدۇ، ئۇنىڭ مودۇلى $|a|$ ياكى $|\vec{AB}|$ قىلىپ يېزىلىدۇ.

قۇلاي بولسۇن ئۈچۈن، بىز مۇنداق بەلگىلىۋالىمىز: ئۇزۇنلۇقى 0 بولغان ۋېكتورنى نۆل ۋېكتور (zero vector) دەپ ئاتاپ، 0 قىلىپ يازىمىز. يۆنىلىشلىك كېسىكنىڭ باش نۇقتىسى A بىلەن ئاخىرقى نۇقتىسى B ئۈستىمۇ ئۈست چۈشكەندە، $\vec{AB} = 0$ بولىدۇ. مودۇلى 1


ۋېكتورنىڭ يۆنىلىشىنى قانداق چۈشەنسەك؟

بولغان ۋېكتور بىرلىك ۋېكتور (unit vector) دېيىلىدۇ. ئۇزۇنلۇقى a ۋېكتورنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن تەڭ، يۆنىلىشى a نىڭكى بىلەن قارىمۇقارشى بولغان ۋېكتور $-a$ قىلىپ يېزىلىدۇ.

يۆنىلىشلىرى ئوخشاش ھەمدە مودۇللىرى تەڭ بولغان ۋېكتورلار تەڭ ۋېكتورلار (equal vector) دېيىلىدۇ. شۇڭا، بوشلۇقتا يۆنىلىشلىرى ئوخشاش ھەمدە ئۇزۇنلۇقلىرى تەڭ بولغان يۆنىلىشلىك كېسىكلەر ئوخشاش بىر ۋېكتور ياكى تەڭ ۋېكتورلارنى ئىپادىلەيدۇ. بوشلۇقتىكى خالىغان ئىككى ۋېكتورنى ئوخشاش بىر تەكشىلىككە يۆتكەپ، ئوخشاش بىر تەكشىلىكتىكى ئىككى ۋېكتور قىلىۋېلىشقا بولىدۇ. 4.1.3 - رەسىمدىكىدەك، بوشلۇقتىكى a, b ۋېكتورلار بېرىلسە، بىز ئۇلارنى ئوخشاش بىر α تەكشىلىككە يۆتكەيلىمىز ۋە خالىغان O نۇقتىنى باش نۇقتا قىلىپ، ۋېكتور $\vec{OA} = a, \vec{OB} = b$ نى سىزالايمىز.



رەسىم 5.1.3 -



رەسىم 4.1.3 -

بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارغا دائىر ئورۇن ئالماشتۇرۇش قانۇنى ۋە گۇرۇپپىلاش قانۇنىنى ئىسپاتلىيالايمىز؟ بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارغا دائىر گۇرۇپپىلاش قانۇنىنى ئىسپاتلاش بىلەن تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلارغا دائىر گۇرۇپپىلاش قانۇنىنى ئىسپاتلاشنىڭ قانداق ئوخشىمايدىغان يېرى بار؟

ماتېماتىكىدا بىر خىل مىقدار كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن، ئۇلار ئۈستىدىكى ئەمەلنى تەتقىق قىلىش مەسىلىسى تەبىئىيلا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. تەكشىلىكتىكى ۋېكتوردىكىگە ئوخشاش، بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنى قوشۇش ۋە ئېلىش ئەمىلىگە تۆۋەندىكىدەك ئېنىقلىما بېرىشكە بولىدۇ (5.1.3 - رەسىم):

$$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = a + b,$$

$$\vec{CA} = \vec{OA} - \vec{OC} = a - b.$$

بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنى قوشۇش ئەمىلى ئورۇن ئالماشتۇرۇش قانۇنى ۋە گۇرۇپپىلاش قانۇنىنى قانائەتلەندۈرىدۇ:

$$a + b = b + a,$$

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

ئىزدىنىش

6.1.3 - رەسىمدىكىدەك، پاراللېل

ئالتە ياقلىق (ئاساسى پاراللېل تۆت تە-

رەپلىك بولغان تۆت قىرلىق پىرىزما) $ABCD - A'B'C'D'$

دا، ئايرىم - ئايرىم $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$ ۋە $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD}$


ئىپادىلەيدىغان ۋېكتورلارنى كۆرسىتىڭ. بۇنىڭدىن ۋېك-

تورلارنى قوشۇش ئەمىلىنىڭ ئۇرۇن ئالماشتۇرۇش قانۇنى

ۋە گۇرۇپپىلاش قانۇنىنى ھېس قىلالامسىز؟ ئومۇمەن،

تەكشىلىكداش بولمىغان ئۈچ ۋېكتورنىڭ يىغىندىسى بىلەن

بۇ ئۈچ ۋېكتور قانداق مۇناسىۋەتتە بولىدۇ؟



رەسىم 6.1.3 -

مەشىق

1. بىرقانچە ئەمەلىي مىسالنى كەلتۈرۈپ، ئوخشاش بىر تەكشۈرۈش.


لىكتە ياتمايدىغان ئۈچ ۋېكتورنى ئىپادىلەڭ.

2. رەسىمدىكىدەك، ۋېكتور a, b, c لار ئۆزئارا پاراللېل بولسا،

$a + b + c$ نى سىزنىڭ.

6.1.3 - رەسىمدە، $\vec{AA'}, \vec{AD}, \vec{AB}$ نى $\vec{DB'}$ ۋە $\vec{BD'}$ ، $\vec{A'C'}$

لار ئارقىلىق ئىپادىلەڭ.



(2 - مىسال ئۈچۈن)

بوشلۇقتىكى ۋېكتورنى سانغا كۆپەيتىش ئەمىلى

2-1-3

تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا ئوخشاش، ھەقىقىي سان λ بىلەن بوشلۇقتىكى ۋېكتور a نىڭ كۆپەيتىمىسى

λa يەنىلا بىر ۋېكتور بولۇپ، بۇ ئەمەل ۋېكتورنى سانغا كۆپەيتىش (multiplication of vector by scalar)

ئەمىلى دېيىلىدۇ. 7.1.3 - رەسىمدىكىدەك، $\lambda > 0$ بولغاندا، λa بىلەن ۋېكتور a نىڭ يۆنىلىشى ئوخ-

شاش؛ $\lambda < 0$ بولغاندا، λa بىلەن ۋېكتور a نىڭ يۆنىلىشى قارىمۇقارشى بولىدۇ؛ λa نىڭ ئۇزۇنلۇقى

نىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ $|\lambda|$ ھەسسىسىگە تەڭ.



رەسىم 7.1.3 -

بۇ ئىككى ئەمەل قانۇنى.
نى تەكشىلىكتىكى ۋېكتور.
نى سانغا كۆپەيتىش ئەمەلى.
نىڭ تارقىتىش قانۇنى ۋە
گۈرۈپپىلاش قانۇنىغا سې.
لىشتۇرۇپ ئىسپاتلاڭ.

بوشلۇقتىكى ۋېكتورنى سانغا كۆپەيتىش ئەمەلى تارقىتىش قا.
نۇنى ۋە گۈرۈپپىلاش قانۇنىنى قانائەتلەندۈرىدۇ:
تارقىتىش قانۇنى:

$$\lambda(a+b) = \lambda a + \lambda b,$$

گۈرۈپپىلاش قانۇنى:

$$\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a.$$

ئەگەر بوشلۇقتىكى يۆنىلىشلىك كېسىكلەر ياتقان تۈز سى.
زىقلار پاراللېل بولسا ياكى ئۈستىمۇئۈست چۈشسە، ئۇ ھالدا بۇ يۆ.
نىلىشلىك كېسىكلەر ئىپادىلىگەن ۋېكتورلار سىزىقداش ۋېكتورلار (colliner vectors) ياكى پاراللېل
ۋېكتورلار (parallel vectors) دەپ ئاتىلىدۇ.


ئىزدىنىش

بوشلۇقتىكى خالىغان ئىككى ۋېكتور a ۋە b غا نىسبەتەن، ئەگەر $a = \lambda b$ بولسا، a بى.
لەن b نىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ ئەكسىچە، a بىلەن b نىڭ ئورۇن مۇنا.
سىۋىتى قانداق بولغاندا، $a = \lambda b$ بولىدۇ؟

تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلارنىڭ سىزىقداش بولۇشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتىگە ئوخشاش، بوش.
لۇقتىكى خالىغان ئىككى ۋېكتور a ، b ($b \neq 0$) غا نىسبەتەن، $a // b$ بولۇشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر
شەرتى شۇنداق بىر ھەقىقىي سان λ مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە

$$a = \lambda b$$

بولۇشتىن ئىبارەت.



رەسىم - 8.1.3

8.1.3 - رەسىمدىكىدەك، l تۈز سىزىق بېرىلگەن A نۇقتىدىن ئۆ.
تىدۇ ھەمدە ئۇ نۆل بولمىغان بېرىلگەن ۋېكتور a غا پاراللېل. بوشلۇق.
تىكى خالىغان بىر O نۇقتىغا نىسبەتەن، P نۇقتىسىنىڭ l تۈز سىزىق
ئۈستىدە يېتىشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى شۇنداق بىر ھەقىقىي
سان t مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + ta \quad ①$$

بولۇشتىن ئىبارەت. بۇنىڭدىكى ۋېكتور a تۈز سىزىق l نىڭ
يۆنىلىشلىك ۋېكتورى (direction vectors) دەپ ئاتىلىدۇ.

l تۈز سىزىق ئۈستىدىن $\overrightarrow{AB} = a$ نى ئالساق، ئۇ ھالدا ①
ئىپادىنى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}. \quad ②$$

بۇنىڭدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى، بوشلۇقتىكى خالىغان ئۈچ
نۇقتىنىڭ سىزىقداش بولۇشىغا ۋېكتورلار ئارىسىدىكى مۇنا.
سىۋەتتىن پايدىلىنىپ ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ. بۇ، تەكشىلىك.
تىكى ئۈچ نۇقتىنىڭ سىزىقداش بولۇشىغا تەكشىلىكتىكى
ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ ھۆكۈم قىلغاندىكى بىلەن ئوخشاش.

① ۋە ② نىڭ ھەر ئىككىسى
بوشلۇقتىكى تۈز سىزىقنىڭ ۋېكتور
ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى دېيىلىدۇ.
بۇنىڭدىن بوشلۇقتىكى خالىغان تۈز
سىزىق بوشلۇقتىكى بىر نۇقتا ۋە
تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىشلىك ۋېكتور.
رى تەرىپىدىن بىردىنبىر ئېنىقلىنىدۇ.
دىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ.

سىز بۇ يەكۈننى بوشلۇقتىكى
ۋېكتورلارنىڭ سىزىقداش بولۇش
شەرتىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلى.
يالامسىز؟

ئوخشاش بىر تەكشىلىككە پاراللېل بولغان ۋېكتورلار تەكشىلىكداش ۋېكتورلار (coplanar vectors) دەپ ئاتىلىدۇ. بىزگە مەلۇمكى، بوشلۇقتىكى خالىغان ئىككى ۋېكتور ھامان تەكشىلىكداش بولىدۇ، ئەمما بوشلۇقتىكى خالىغان ئۈچ ۋېكتور تەكشىلىكداش بولۇشىمۇ، تەكشىلىكداش بولماسلىقىمۇ مۇمكىن (مەسىلەن، مۇشۇ پاراگرافنىڭ بېشىدا دېيىلگەن ۋېكتورلار). ئۇنداقتا، قانداق ئەھۋالدا ئۈچ ۋېكتور تەكشىلىكداش بولىدۇ؟

ئىزدىنىش

بوشلۇقتىكى سىزىقداش بولمىغان خالىغان ئىككى ۋېكتور a ، b غا نىسبەتەن، ئەگەر $p = xa + yb$ بولسا، ئۇ ھالدا ۋېكتور p بىلەن ۋېكتور a ، b لارنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ ئەكسىچە، ۋېكتور p بىلەن ۋېكتور a ، b لارنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتى قانداق بولغاندا، $p = xa + yb$ بولىدۇ؟

③ ئىپادە بوشلۇقتىكى ABC تەكشىلىكىنىڭ ۋېكتور ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى دېيىلىدۇ. بۇنىڭدىن بوشلۇقتىكى خالىغان تەكشىلىك بوشلۇقتىكى بىر نۇقتا ۋە سىزىقداش بولمىغان ئىككى ۋېكتور تەرىپىدىن بىردىنبىر ئېنىقلىنىدۇ. غانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ. سىز بۇ يەكۈننى بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ تەكشىلىكداش بولۇشىنىڭ شەرتىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلىيالايمىز؟

ئەگەر a ، b ئىككى ۋېكتور سىزىقداش بولمىسا، ئۇ ھالدا p ۋېكتور بىلەن a ، b ۋېكتورلارنىڭ تەكشىلىكداش بولۇشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى بىردىنبىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە $p = xa + yb$ بولۇشتىن ئىبارەت.


9.1.3 - رەسىمدىكىدەك، بوشلۇقتىكى بىر نۇقتىنىڭ ABC تەكشىلىكتە يېتىشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتى تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە

$$\vec{AP} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$$

بولۇش ياكى بوشلۇقتىكى خالىغان بىر نۇقتىغا نىسبەتەن

$$\vec{OP} = \vec{OA} + x\vec{AB} + y\vec{AC} \quad ③$$

بولۇشتىن ئىبارەت.




9.1.3 - رەسىم

مۇلاھىزە؟

1. ئۈچ نۇقتىنىڭ سىزىقىدا بولۇشىغا ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ ھۆكۈم قىلغاندىكىگە ئوخشاش، تۆت نۇقتىنىڭ تەكشىلىكىدا بولۇشىغا ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ قانداق ھۆكۈم قىلىش كېرەك؟
2. بوشلۇقتىكى خالىغان بىر O نۇقتا ۋە سىزىقىدا بولمىغان A, B, C ئۈچ نۇقتا بېرىلگەن بولسا، مۇناسىۋەت ئىپادىسى

$$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} \quad (x+y+z=1 \text{ بۇنىڭدا})$$

نى قانائەتلەندۈرىدىغان P نۇقتا بىلەن A, B, C نۇقتىلار تەكشىلىكىدا بولامدۇ - يوق؟



رەسىم 10.1.3

- 1 - مىسال. 10.1.3 - رەسىمدىكىدەك، پاراللېل تۆت تەرەپلىك $ABCD$ بېرىلگەن، تەكشىلىكىنىڭ سىرتىدىكى بىر O نۇقتا ئارقىلىق OA, OB, OC, OD نۇرلار يۈرگۈزۈلۈپ، بۇ تۆت نۇر ئۈستىدىن $\frac{OE}{OA} = \frac{OF}{OB} = \frac{OG}{OC} = \frac{OH}{OD} = k$ بولىدىغان قىلىپ ئايرىم - ئايرىم E, F, G, H نۇقتىلار ئېلىنغان. تۆت نۇقتىنىڭ تەكشىلىكىدا بولدىغانلىقىنى ئىسپاتلايلى.
- تەھلىل: E, F, G, H تۆت نۇقتىنىڭ تەكشىلىكىدا بولدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن، پەقەت $\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG}$ لارنىڭ تەكشىلىكىدا بولدىغانلىقىنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇ. بۇنى $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ لارنىڭ تەكشىلىكىدا بولدىغانلىقىنى ئىسپاتلايمىز.

ئىسپات:

$$\begin{aligned} \therefore \frac{OE}{OA} = \frac{OF}{OB} = \frac{OG}{OC} = \frac{OH}{OD} = k, \\ \therefore \overrightarrow{OE} = k\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OF} = k\overrightarrow{OB}, \\ \overrightarrow{OG} = k\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OH} = k\overrightarrow{OD}. \end{aligned}$$

تۆت تەرەپلىك $ABCD$ پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولغانلىقى تىن، $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ بولىدۇ.

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{EG} &= \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OE} \\ &= k\overrightarrow{OC} - k\overrightarrow{OA} \\ &= k\overrightarrow{AC} \\ &= k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \\ &= k(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA}) \\ &= \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OE} \\ &= \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH}. \end{aligned}$$

ۋېكتورلارنىڭ تەكشىلىكىدا بولۇشىنىڭ يېتەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتىگە ئاساسەن، E, F, G, H تۆت نۇقتىنىڭ تەكشىلىكىدا بولدىغانلىقىنى بىلىمىز.


مەسىلىدىكى گېئومېترىيەلىك ئېلىمېنتلارنى مۇۋاپىق ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەش، گېئومېترىيەلىك ئېلىمېنتلارنىڭ مۇناسىۋىتىنى ۋېكتور ئەمەللىرىدىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىن ئىبارەت بۇ خىل ئۇسۇل سىنتېز گېئومېترىيەلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئۇسۇلدۇر.




مەشەق

1. رەسىمىدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $ABCD$ بېرىلگەن بولۇپ، A بىلەن B ، C بىلەن D تۇتاشتۇرۇلغان، E ، F ئايرىم - ئايرىم BC ، CD نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى. تۆۋەندىكى ئىپادىلەرنى ئاددىيلاشتۇرۇڭ ھەم ئاددىيلاشتۇرغاندىن كېيىنكى ۋېكتورنى سىزنىڭ:

(1) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD}$; (2) $\vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{BD} + \vec{BC})$; (3) $\vec{AF} - \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$.




(2 - مىسال ئۈچۈن)



(1 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمىدىكىدەك، كۆب $ABCD - A'B'C'D'$ بېرىلگەن، E ، F نۇقتىلار ئايرىم - ئايرىم ئۈستۈنكى ياق $A'C'$ ۋە يان ياق CD' نىڭ مەركىزى. تۆۋەندە بېرىلگەن ئىپادىلەردىكى x ، y نىڭ قىممىتىنى تېپىڭ:

(1) $\vec{AC'} = x(\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC'})$;
(2) $\vec{AE} = \vec{AA'} + x\vec{AB} + y\vec{AD}$;
(3) $\vec{AF} = \vec{AD} + x\vec{AB} + y\vec{AA'}$.



(1 - مىسال ئۈچۈن)

3. رەسىمىدىكىدەك، A ، B ، C نۇقتىلار سىزىقتا تەكشىلىك ABC نىڭ سىرتىدىكى خالىغان بىر نۇقتا ھەمدە ABC تەكشىلىكتىكى كىچىك كاتەكچىلەر بىرلىك كۋادرات ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۆۋەندىكىلەرنى قانائەتلەندۈرىدىغان P ، Q ، R ، S نۇقتىلارنى تېپىڭ:


(1) $\vec{OP} = \vec{OA} + 2\vec{AB} + 2\vec{AC}$;
(2) $\vec{OQ} = \vec{OA} - 3\vec{AB} - 2\vec{AC}$;
(3) $\vec{OR} = \vec{OA} + 3\vec{AB} - 2\vec{AC}$;
(4) $\vec{OS} = \vec{OA} + 2\vec{AB} - 3\vec{AC}$.

3-1-3 بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسى ئەمىلى

گېئومېترىيىدە، ئارا بۇلۇڭ بىلەن ئۇزۇنلۇق ئەڭ ئاساسىي ئىككى گېئومېترىيىلىك مىقداردۇر. تۆۋەندە، بوشلۇقتىكى ئىككى تۈز سىزىقنىڭ ئارا بۇلۇڭى ۋە بوشلۇقتىكى كېسىكلەرنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار (سانلىق) كۆپەيتىمىسىدىن پايدىلىنىپ قانداق ئىپادىلەشنى مۇھاكىمە قىلىمىز.

11.1.3 - رەسىمىدە، نۆل بولمىغان ئىككى ۋېكتور a, b بېرىلگەن. بوشلۇقتا خالىغان بىر O نۇقتىنى ئېلىپ، $\vec{OA} = a, \vec{OB} = b$ نى سىزىق، ئۇ ھالدا $\angle AOB$ ۋېكتور a بىلەن b نىڭ ئارا بۇلۇڭى دەپ ئاتىلىپ، $\langle a, b \rangle$ قىلىپ يېزىلىدۇ.

ئادەتتە مۇنداق بەلگىلىۋال. لىمىز: $0 \leq \langle a, b \rangle \leq \pi$. بۇنداق بولغاندا، ئىككى ۋېكتورنىڭ ئارا بۇلۇڭى بىردىنبىر ئېنىقلىنىدۇ ھەمدە $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$ بولىدۇ.



رەسىم 11.1.3

ئەگەر $\langle a, b \rangle = \frac{\pi}{2}$ بولسا، ئۇ ھالدا ۋېكتور a بىلەن b تىك

بولۇپ، $a \perp b$ قىلىپ يېزىلىدۇ.

نۆل بولمىغان ئىككى ۋېكتور a, b بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا $|a||b|\cos\langle a, b \rangle$ ۋېكتور a بىلەن b نىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسى (inner product) دەپ ئاتىلىپ، $a \cdot b$ قىلىپ يېزىلىدۇ، يەنى

$$a \cdot b = |a||b|\cos\langle a, b \rangle.$$

نۆل ۋېكتور بىلەن ھەرقانداق بىر ۋېكتورنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسى 0 بولىدۇ.

ئالاھىدە ئەھۋالدا، $a \cdot a = |a||a|\cos\langle a, a \rangle = |a|^2$ بولىدۇ.

بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسى تۆۋەندىكى ئەمەل قانۇنلىرىنى قانائەتلەندۈرىدۇ:

$$(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b);$$

$$a \cdot b = b \cdot a \text{ (ئورۇن ئالماشتۇرۇش قانۇنى)};$$

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c \text{ (تارقىتىش قانۇنى)}.$$

$a \cdot b$ نىڭ گېئومېتىرىيىلىك مەنىسىنى

تەكشۈرۈش ئۈچۈن. دىكىسىگە تەققاسلاپ ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

سىز بۇ ئەمەل قانۇنى

لىرىنى ئىسپاتلىيالايمىز؟

سىز بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش


بىلەن تەكشۈرۈش ئۈچۈن. ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش

مۇلاھىزە؟

1. نۆل بولمىغان ئۈچ سان a, b, c لارغا نىسبەتەن، ئەگەر $ab=ac$ بولسا، ئۇ ھالدا $b=c$ بولىدۇ. ۋېكتور a, b, c لارغا نىسبەتەن، $a \cdot b = a \cdot c$ دىن $b=c$ نى كەلتۈرۈپ چىقارغىلى بولامدۇ؟ ئەگەر كەل- تۈرۈپ چىقارغىلى بولمىسا، ئەكسى مىسال كەلتۈرۈڭ.

2. نۆل بولمىغان ئۈچ سان a, b, c لارغا نىسبەتەن، ئەگەر $ab=c$ بولسا، ئۇ ھالدا $a = \frac{c}{b}$ (ياكى $b = \frac{c}{a}$) بولىدۇ. ۋېكتور a, b لارغا نىسبەتەن، ئەگەر $a \cdot b = k$ بولسا، ئۇنى $a = \frac{k}{b}$ (ياكى $b = \frac{k}{a}$) قىلىپ يېزىشقا

بولامدۇ؟ باشقىچە ئېيتقاندا، ۋېكتورلارنى بۆلۈش ئەمىلى بارمۇ؟
3. نۆل بولمىغان ئۈچ سان a, b, c لارغا نىسبەتەن $(ab)c = a(bc)$ بولىدۇ. ئۇنداق بولسا، ۋېكتور a, b, c لارغا نىسبەتەن $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$ كۈچكە ئىگىمۇ؟ ۋېكتورلارنىڭ سكالېر كۆپەيتىمىسى گۇرۇپپىلاش قانۇنىنى قانائەتلەندۈرمەيدۇ؟



رەسىم 12.1.3 -

① بۇ ھۆكۈملۈك

ئۈچ تىك تېئورېمى -
سى دەپ ئاتىلىدۇ.

2 - مىسال. ئەگەر تەكشىلىكتىكى بىر تۈز سىزىق مۇشۇ تەكشىلىككە چۈشۈرۈلگەن بىر ئاغمىنىڭ پروېكسىيىسىگە تىك بولسا، ئۇ ھالدا بۇ تۈز سىزىق مۇشۇ ئاغمىنىمۇ تىك بولىدۇ. ①

بېرىلگىنى: 12.1.3 - رەسىمدىكىدەك، PA, PO ئايرىم - ئايرىم α تەكشىلىككە چۈشۈرۈلگەن تىك سىزىق ۋە ئاغما، AO بولسا PA نىڭ α تەكشىلىكتىكى پروېكسىيىسى، $l \subset \alpha$ ھەمدە $l \perp OA$.

ئىسپات تەلپى: $l \perp PA$.

تەھلىل: بۇ ھۆكۈملۈكنى ۋېكتور ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئىس- پاتلىغاندا، پەقەت l تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىشلىك ۋېكتورى a بىلەن $\overrightarrow{PA}$ نىڭ سكالېر كۆپەيتىمىسى 0 بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىساقلا بولىدۇ. $\overrightarrow{PA}$ بىلەن $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{PO}$ لار بىر ئۈچبۇلۇڭ ھاسىل قىلىدۇ، يەنە كېلىپ $\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{PA}$ ھەم $PO \perp \alpha, l \perp OA$ بولغانلىقى ئۈچۈن، ھۆكۈم - لۈكنى ئاسانلا ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ.

ئىسپات: 13.1.3 - رەسىمدىكىدەك، l تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىشلىك ۋېكتورى a بىلەن ۋېكتور $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{PO}$ نى سىزىۋالىمىز.

$$\because l \perp OA, \therefore a \cdot \overrightarrow{OA} = 0.$$


$$\because PO \perp \alpha, l \subset \alpha, \therefore l \perp PO,$$

$$\therefore a \cdot \overrightarrow{PO} = 0.$$

$$\therefore a \cdot \overrightarrow{PA} = a \cdot (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}) = a \cdot \overrightarrow{PO} + a \cdot \overrightarrow{OA} = 0,$$

$$\therefore l \perp PA.$$


«ئەگەر تەكشىلىكتىكى بىر تۈز سىزىق مۇشۇ تەكشىلىككە چۈشۈ- رۈلگەن بىر ئاغمىغا تىك بولسا، ئۇ ھالدا بۇ تۈز سىزىق مۇشۇ ئاغمىنىڭ تەكشىلىكتىكى پروېكسىيىسىگىمۇ تىك بولىدۇ» ② دېگەن ھۆكۈملۈكنى ۋېكتور ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلىيالايمىز؟



رەسىم 13.1.3 -

② بۇ ھۆكۈملۈك

ئۈچ تىك تېئورېمى -
نىڭ تەتۈر تېئورېمىسى
دەپ ئاتىلىدۇ.



14.1.3 - رەسىم

3 - مىسال. 14.1.3 - رەسىمىدىكىدەك، n, m لار α تەكشىلىكتىكى ئۆزئارا كېسىشكۈچى ئىككى تۈز سىزىق. ئەگەر $l \perp m$ بولسا، $l \perp n$ نى ئىسپاتلايلى.

تەھلىل: $l \perp \alpha$ نى ئىسپاتلاش ئۈچۈن، l نىڭ α تەكشىلىكتىكى ھەرقانداق بىر g تۈز سىزىققا تىك بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش كېرەك (تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىكنىڭ تىك بولۇشىنىڭ ئېنىقلىمىسى). ئەگەر بىز g بىلەن n, m لار ئا- رىسىدا مەلۇم خىل باغلىنىشنى تۇرغۇزۇۋېلىپ، $l \perp n, l \perp m$ گە ئاساسەن $l \perp g$ نى كەلتۈرۈپ چىقىرساق، ئۇ ھالدا بۇ مەسىلىنى ئاسانلا ھەل قىلالايمىز.

ئىسپات: α تەكشىلىكتە خالىغان بىر g تۈز سىزىقنى سىزىپ، l, m, n, g لار ئۈستىدىن ئايرىم- ئايرىم نۆل بولمىغان l, m, n, g ۋېكتورلارنى ئالىمىز.

m بىلەن n ئۆزئارا كېسىشىدىغانلىقتىن، ۋېكتور m, n لار پاراللېل بولمايدۇ. ۋېكتورلارنىڭ تەكشىلىكداش بولۇشىنىڭ يې- تەرلىك ۋە زۆرۈر شەرتىگە ئاساسەن بىلىشكە بولىدۇكى، بىردىن- بىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) مەۋجۇت بولۇپ، نە- تىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$g = xm + yn.$$

يۇقىرىقى ئىپادىنىڭ ئىككى تەرىپى بىلەن ۋېكتور l نىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىنى ئالساق، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$l \cdot g = xl \cdot m + yl \cdot n.$$

$$(\text{نېمە ئۈچۈن؟}) \quad l \cdot m = 0, \quad l \cdot n = 0,$$

$$\therefore l \cdot g = 0,$$

$$\therefore l \perp g.$$

يەنى $l \perp g$.

شۇنىڭ بىلەن، l تۈز سىزىقنىڭ α تەكشىلىكتىكى خالىغان بىر تۈز سىزىققا تىك بولىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى. شۇنىڭ ئۈچۈن $l \perp \alpha$.


بىز «تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىكنىڭ تىكلىكىگە ھۆكۈم قىلىش تېئورېمىسى» نى ۋېكتور ئۇسۇلىدىن پايدى- لىنىپ ئىسپاتلىدۇق، يەنى بىر تۈز سىزىق بىر تەكشىلىكتىن كىي ئۆزئارا كېسىشكۈچى ئىككى تۈز سىزىققا تىك بول- سا، ئۇ ھالدا بۇ تۈز سىزىق ئا- شۇ تەكشىلىككە تىك بولىدۇ.

تۈز سىزىقنى ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەش ۋە تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىكنىڭ تىك بولۇش مۇ- ناسىۋىتىنى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسى ئىمىلى- دىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلاش جەريانىنى چۈشىنىۋېلىڭ.


مەشىق

1. رەسىمىدىكىدەك، مۇنتىزىم ئۈچ قىرلىق پىرىزما $ABC-A_1B_1C_1$ دا، ئەگەر $AB = \sqrt{2} BB_1$ بولسا، ئۇ ھالدا AB_1 بىلەن C_1B دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى () بولىدۇ.

- (A) 60° (B) 90° (C) 105° (D) 75°




(2 - مىسال ئۈچۈن)



(1 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىق $ABCD-A'B'C'D'$ دا، $AA'=5$ ، $AD=3$ ، $AB=4$ ، $\angle BAA'=\angle DAA'=60^\circ$ ، $\angle BAD=90^\circ$ بولسا، AC' نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.
3. رەسىمىدىكىدەك، BD ، AB كېسىكلەر α تەكشىلىكتە ياتىدۇ، AC ، $BD \perp AB$ كېسىك α تەكشىلىككە تىك ھەمدە $AC=c$ ، $BD=b$ ، $AB=a$ بىلەن D نىڭ ئارىلىقىنى تېپىڭ.



(3 - مىسال ئۈچۈن)

بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ ئورتوگونال ئاجرىلىشى ۋە ئۇنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى

4-1-3

بىزگە مەلۇمكى، تەكشىلىكتىكى خالىغان بىر p ۋېكتورنى سىزىقداش بولمىغان a ، b ئىككى ۋېكتور ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ (تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېما). ئۇنداق بولسا، بوشلۇقتىكى خالىغان بىر ۋېكتورغا نىسبەتەن، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش يەكۈننى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولامدۇ؟

15.1.3 - رەسىمىدىكىدەك، i ، j ، k لار بوشلۇقتىكى ئىككى - ئىككىدىن تىك بولغان ۋېكتورلار ھەمدە ئۇلار ئورتاق باش نۇقتا O غا ئىگە بولسۇن. بوشلۇقتىكى خالىغان بىر ۋېكتور $p = \overrightarrow{OP}$ غا نىسبەتەن، Q نۇقتىنى P نۇقتىنىڭ i بىلەن j بەلگىلىگەن تەكشىلىكتىكى تىك پروېكسىيىسى دەپ پەرەز قىلساق، تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىدىن بىلىشكە بولىدۇكى، $\overrightarrow{OQ}$ بىلەن k بەلگىلىگەن تەكشىلىكتە شۇنداق بىر ھەقىقىي سان z مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} + zk.$$


i بىلەن j بەلگىلىگەن تەكشىلىكتە، تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلارغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىدىن بىلىشكە بولىدۇكى، شۇنداق بىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$\overrightarrow{OQ} = xi + yj.$$

شۇنىڭ بىلەن تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} + zk = xi + yj + zk.$$

بۇنىڭدىن بىلىشكە بولىدۇكى، ئەگەر i ، j ، k لار بوشلۇقتىكى ئىككى - ئىككىدىن تىك بولغان ۋېك-



15.1.3 - رەسىم

تورلار بولسا، ئۇ ھالدا بوشلۇقتىكى خالىغان بىر p ۋېكتورغا نىسبەتەن، شۇنداق بىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى $\{x, y, z\}$ مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$p = xi + yj + zk.$$

بىز xi, yj, zk لارنى ۋېكتور p نىڭ i, j, k لاردىكى تارماق ۋېكتورى دەيمىز.

ئىزدىنىش

بوشلۇقتا، ئەگەر ئىككى - ئىككىدىن تىك بولغان i, j, k ۋېكتورلارنىڭ ئورنىغا تەكشىلىكداش بولمىغان خالىغان ئۈچ ۋېكتور a, b, c نى ئالماشتۇرساق، سىز يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش يەكۈننى كەلتۈرۈپ چىقىرالايسىز؟

تەكشىلىكتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىغا ئوخشاش، بوشلۇقتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىمۇ ئوتتۇرىغا قويالايمىز.

تېئورېما: ئەگەر a, b, c ئۈچ ۋېكتور تەكشىلىكداش بولمىسا، ئۇ ھالدا بوشلۇقتىكى خالىغان بىر p ۋېكتورغا نىسبەتەن شۇنداق بىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى $\{x, y, z\}$ مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$p = xa + yb + zc.$$

بوشلۇقتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېما بىلەن 101 - بەتتىكى «مۇلاھىزە»دىكى 2 - مەسىلىنىڭ قانداق باغلىنىشى بار؟ سىز قانداق چۈشەنچە ھاسىل قىلىدىغىز؟



بۇنىڭدىن بىلىشكە بولىدۇكى، ئەگەر a, b, c ئۈچ ۋېكتور تەكشىلىكداش بولمىسا، ئۇ ھالدا بوشلۇقتىكى بارلىق ۋېكتورلاردىن تەركىب تاپقان توپلام $\{p | p = xa + yb + zc, x, y, z \in \mathbb{R}\}$ بولۇپ، بۇ توپلامنى a, b, c ۋېكتورلاردىن ھاسىل بولغان دەپ قاراشقا بولىدۇ. $\{a, b, c\}$ نى بوشلۇقنىڭ بىر بازىسى (base) a, b, c لارنى بازىس ۋېكتور (base vectors) دەپ ئاتايمىز. بوشلۇقتىكى تەكشىلىكداش بولمىغان ھەرقانداق ئۈچ ۋېكتور بوشلۇقنىڭ بىر بازىسىنى ھاسىل قىلىدۇ.

ئالاھىدە ئەھۋالدا، e_1, e_2, e_3 لەرنى ئىككى - ئىككىدىن تىك ھەم ئورتاق باش نۇقتا O غا ئىگە بىر - لىك ۋېكتور (بىز ئۇلارنى بىرلىك ئورتوگونال بازىس دەپ ئاتايمىز) دەپ پەرەز قىلىپ، e_1, e_2, e_3 لەرنىڭ ئورتاق باش نۇقتىسى O نى كوئوردېنات بېشى، e_1, e_2, e_3 لەرنىڭ يۆنىلىشىنى ئايرىم - ئايرىم x, y, z ئوق، z ئوقنىڭ ئوڭ يۆنىلىشى قىلىپ تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى $Oxyz$ نى تۇرغۇزساق، ئۇ ھالدا بوشلۇقتىكى خالىغان بىر p ۋېكتورنى ئۇنىڭ باش نۇقتىسى كوئوردېنات بېشى O بىلەن ئۈستىمۇ ئۈست چۈشىدىغان قىلىپ پاراللېل يۆتكەش ئارقىلىق، ۋېكتور $\overrightarrow{OP} = p$ غا ئېرىشكىلى بولىدۇ. بوشلۇقتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىغا ئاساسەن بىلەلەيمىزكى، شۇنداق بىر تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى $\{x, y, z\}$ مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

بىرلىك ئورتوگونال بازا - زىستىكى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىنى ھېسابلاڭ:

$$e_1 \cdot e_2, e_1 \cdot e_3, e_2 \cdot e_3, e_1 \cdot e_1, e_2 \cdot e_2, e_3 \cdot e_3.$$


$$p = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$



$p = (x, y, z)$ لارنى z, y, x ۋېكتورنىڭ بىرلىك ئورتوگونال بازىسى e_1, e_2, e_3 تىكى كوئوردېناتى دەپ ئاتاپ، $p = (x, y, z)$ قىلىپ يازىمىز.

بۇ چاغدا، ۋېكتور p نىڭ كوئوردېناتى دەل P نۇقتىسىنىڭ بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى $Oxyz$ تىكى كوئوردېناتى (x, y, z) تىن ئىبارەت بولىدۇ (ئويلاپ بېقىڭ، نېمە ئۈچۈن؟). شۇنىڭ بىلەن، ئورتوگونال بازىستىن تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىغا بولغان ئالماشتۇرۇشقا ئىگە بولىمىز.

بوشلۇقتىكى ۋېكتورغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىدىن بىلىشكە بولىدۇكى، بوشلۇقتىكى خالىغان بىر ۋېكتورنى ھامان تەكشىلىكداش بولمىغان ئۈچ ۋېكتور ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ، بۇ، بىزنىڭ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىمىزغا قۇلايلىق ئېلىپ كېلىدۇ.



رەسىم 16.1.3

4 - مىسال. 16.1.3 - رەسىمدىكىدەك، M, N ئايرىم - ئايرىم تۆت ياقلىق $OABC$ نىڭ OA, BC تەرەپلىرىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى، P, Q بولسا MN نى تەڭ ئۈچ بۆلەككە بۆلگۈچى نۇقتىلار بولسا، $\overrightarrow{OP}$ بىلەن $\overrightarrow{OQ}$ نى $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ ۋېكتورلار ئارقىلىق ئىپادىلەيلى.

يېشىش:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MP} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} \overrightarrow{MN}$$

$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} (\overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM})$$

$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} (\overrightarrow{ON} - \frac{1}{2} \overrightarrow{OA})$$

$$= \frac{1}{6} \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

$$= \frac{1}{6} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{OB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{OC};$$

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{MN}$$

$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM})$$


$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{ON} - \frac{1}{2} \overrightarrow{OA})$$

$$= \frac{1}{3} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

$$= \frac{1}{3} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{6} \overrightarrow{OB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{OC}.$$

مەشىق

1. ۋېكتور $\{a, b, c\}$ بوشلۇقنىڭ بىر بازىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن. a, b, c لارنىڭ ئىچىدىن قايسى ۋېكتور - نى تاللىساق، ئۇنىڭ بىلەن $p=a+b, q=a-b$ ۋېكتورلار بوشلۇقنىڭ يەنە بىر بازىسىنى ھاسىل قىلىدۇ؟



(3 - مىسال ئۈچۈن)

2. O, A, B, C لار بوشلۇقتىكى تۆت نۇقتا بولۇپ، $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ ۋېكتورلار بوشلۇقتا بىر بازىس ھاسىل قىلمايدىغانلىقى بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا O, A, B, C نۇقتىلار تەكشىلىكداش بولامدۇ؟
3. پاراللېل ئالتە ياقلىق $OABC-O'A'B'C'$ بېرىلگەن. ئەگەر G نۇقتا يان ياق $BB'CC'$ نىڭ مەركىزى ھەمدە $\vec{OA}=a, \vec{OC}=b, \vec{OO'}=c$ بولسا، تۆۋەندىكى ۋېكتورلارنى a, b, c ئارقىلىق ئىپادىلەڭ:

(1) $\vec{OB}, \vec{BA}, \vec{CA}$; (2) $\vec{OG}$.

بوشلۇقتىكى ۋېكتور ئەمەللىرىنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى

5-1-3

بىزگە مەلۇمكى، تەكشىلىكتە a ۋېكتورنى تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) بىلەن، بوشلۇقتا بولسا تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى $\{x, y, z\}$ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. بىز تەكشىلىك ۋېكتورلىرى ئۈستىدىكى كوئوردېنات ئەمەللىگە تەقلىد قىلىپ، بوشلۇق ۋېكتورلىرىنى قوشۇش، ئېلىش، سانغا كۆپەيتىش ۋە ئۇلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسى قاتارلىق ئەمەللەرنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز.

$$a = (a_1, a_2, a_3), b = (b_1, b_2, b_3)$$

دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3),$$

$$a - b = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3),$$

$$\lambda a = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3),$$

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

تۆۋەندە ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىنى ئىسپاتلايمىز. i, j, k لارنى بىرلىك ئورتوگونال بازىس دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k, b = b_1 i + b_2 j + b_3 k.$$

$$\therefore a \cdot b = (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \cdot (b_1 i + b_2 j + b_3 k).$$

ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىگە دائىر تارقىتىش قانۇنى

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1, i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

دىن پايدىلىنىپ تۆۋەندىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىمىز:

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

تەكشىلىكتىكى ۋېكتور ئەمەللىرىنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىگە تەقلىد قىلىپ، بىز يەنە تۆۋەندىكىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز.

قالغان ئەمەللەرنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىنىمۇ ئوخشاش ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلاشقا بولىدۇ، بۇنى ئۆزۈڭلار ئىسپاتلاپ كۆرۈڭلار.



رۈپ چىقىرايلىمىز:

$$a \parallel b \Leftrightarrow a = \lambda b \Leftrightarrow a_1 = \lambda b_1, a_2 = \lambda b_2, a_3 = \lambda b_3 (\lambda \in \mathbb{R});$$

$$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0;$$

$$|a| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2};$$


$$\cos \langle a, b \rangle = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$$

$$= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىدا، $A(a_1, b_1, c_1)$ ، $B(a_2, b_2, c_2)$ نۇقتىلار بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا A ، B ئىككى نۇقتا ئارىسىدىكى ئارىلىق:

$$d_{AB} = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}.$$

بوشلۇقتىكى ۋېكتور ئەمەللىرى بىلەن ۋېكتورلارنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىنى بىر-لەشتۈرگەندە، ئارا بۇلۇڭ ۋە ئارىلىقنى ھېسابلاش مەسىلىلىرىنى ھەل قىلغىلى بولۇپلا قالماي، يەنە بەزى مەسىلىلەرنىڭ ھەل قىلىنىشىنى ئاددىيلاشتۇرغىلىمۇ بولىدۇ.



رەسىم 17.1.3

5 - مىسال. 17.1.3 - رەسىمدىكىدەك، كۇب $ABCD-A_1B_1C_1D_1$

دا، E_1 بىلەن F_1 ئايرىم - ئايرىم A_1B_1 ، C_1D_1 نى تەڭ تۆت بۆلەككە بۆلگۈچى نۇقتىلارنىڭ بىرى بولسا، BE_1 بىلەن DF_1 دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تاپايلى.

تەھلىل: BE_1 بىلەن DF_1 دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭ دەل $\overrightarrow{BE_1}$ بىلەن $\overrightarrow{DF_1}$ دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭ ياكى ئۇنىڭ تولدۇرغۇچى بۇلۇڭى بولىدۇ. شۇڭا، $\overrightarrow{BE_1}$ بىلەن $\overrightarrow{DF_1}$ نىڭ سكالېر كۆپەيتىمىسى ۋە مودۇلىنى ئۇلارنىڭ كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاپ

چىقىپ، بۇ ئارقىلىق ئۇلاردىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تاپالايمىز.

يېشىش: 17.1.3 - رەسىمدىكىدەك، كۇبنىڭ قىر ئۇزۇنلۇقىنى 1 دەپ پەرەز قىلايلى. ئاندىن $\overrightarrow{DA}$ ، $\overrightarrow{DD_1}$ ، $\overrightarrow{DC}$ نى بىرلىك ئورتوگونال بازىس قىلىپ بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى $Oxyz$ نى تۇرغۇزساق، ئۇ ھالدا

$$B(1, 1, 0), E_1\left(1, \frac{3}{4}, 1\right), D(0, 0, 0), F_1\left(0, \frac{1}{4}, 1\right).$$

$$\therefore \overrightarrow{BE_1} = \left(1, \frac{3}{4}, 1\right) - (1, 1, 0) = \left(0, -\frac{1}{4}, 1\right),$$

$$\overrightarrow{DF_1} = \left(0, \frac{1}{4}, 1\right) - (0, 0, 0) = \left(0, \frac{1}{4}, 1\right),$$


$$|\overrightarrow{BE_1}| = \frac{\sqrt{17}}{4}, |\overrightarrow{DF_1}| = \frac{\sqrt{17}}{4},$$

$$\overrightarrow{BE_1} \cdot \overrightarrow{DF_1} = 0 \times 0 + \left(-\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}\right) + 1 \times 1 = \frac{15}{16}.$$

$$\therefore \cos \langle \overrightarrow{BE_1}, \overrightarrow{DF_1} \rangle = \frac{\overrightarrow{BE_1} \cdot \overrightarrow{DF_1}}{|\overrightarrow{BE_1}| \cdot |\overrightarrow{DF_1}|}$$

$$= \frac{\frac{15}{16}}{\frac{\sqrt{17}}{4} \cdot \frac{\sqrt{17}}{4}} = \frac{15}{17}.$$

شۇڭا، BE_1 بىلەن DF_1 دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتى $\frac{15}{17}$ بولىدۇ.



رەسىم - 18.1.3

ئالاقىدار ئېلېمېنتلارنى
ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەش ۋە
مەسىلىلەرنى ۋېكتور ئەمەل-
لىرى (كوئوردېنات كۆرۈنۈش-
شىدىكى ئەمەللەرنىمۇ ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ) دىن پايدىلىنىپ
يېشىشتىكى پىكىر يولىنى
چۈشىنىۋېلىڭ.

6 - مىسال. 18.1.3 - رەسىمدىكىدەك، كۇب $ABCD-A_1B_1C_1D_1$

دا، F, E نۇقتىلار ئايرىم - ئايرىم BB_1, D_1B_1 نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، $EF \perp DA_1$ نى ئىسپاتلايلى.

ئىسپات: 18.1.3 - رەسىمدىكىدەك، كۇبنىڭ قىر ئۇزۇنلۇقىنى 1 دەپ پەرەز قىلايلى. ئاندىن $\vec{DA}, \vec{DC}, \vec{DD_1}$ نى بىرلىك ئورتوگونال بازىس قىلىپ بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى $Oxyz$ نى تۇرغۇزساق، ئۇ ھالدا

$$E(1, 1, \frac{1}{2}), F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1),$$

$$\therefore \vec{EF} = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

$$\therefore A_1(1, 0, 1), D(0, 0, 0),$$

$$\therefore \vec{DA_1} = (1, 0, 1).$$

$$\therefore \vec{EF} \cdot \vec{DA_1} = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cdot (1, 0, 1) = 0.$$


شۇڭا، $\vec{EF} \perp \vec{DA_1}$ ، يەنى $EF \perp DA_1$.

مەشىق


1. $a = (-3, 2, 5), b = (1, 5, -1)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن، تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

- (1) $a+b$; (2) $3a-b$; (3) $6a$; (4) $a \cdot b$.

2. رەسىمدىكىدەك، كۇبنىڭ قىر ئۇزۇنلۇقى 2 ئىكەنلىكى بېرىلگەن. مۇۋاپىق بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇپ، كۇبنىڭ ھەر بىر چوققىسىنىڭ كوئوردېناتىنى يېزىڭ ھەم ساۋاقداشلىرىڭىز بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇڭ.



(3 - مىسال ئۈچۈن)




(2 - مىسال ئۈچۈن)

3. رەسىمدىكىدەك، كۇب $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ دا، M نۇقتا AB نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، DB_1 بىلەن CM دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تېپىڭ.

1.3 - كۆنۈكمە

A گۈرۈپپا



(1 - مىسال ئۈچۈن)


1. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىق $ABCD-A'B'C'D'$ بېرىلگەن. تۆۋەندىكى ئىپادىلەرنى ئاددىيلاشتۇرۇڭ ھەم ئاددىيلاشتۇر. غاندىن كېيىنكى ۋېكتورنى سىزنىڭ:

- (1) $\vec{AB} + \vec{BC}$; (2) $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$;
(3) $\vec{AB} + \vec{BD} + \frac{1}{2}\vec{CC'}$; (4) $\frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$;


2. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىق $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ دا،

$\vec{A_1A} = \vec{c}$, $\vec{A_1D_1} = \vec{b}$, $\vec{A_1B_1} = \vec{a}$ ئەگەر $\vec{BD}$, $\vec{AC}$ لار M نۇقتىدا كېسىشىدۇ. ئەگەر $\vec{B_1M}$ بىلەن تەڭ بولىدىغان ۋېكتور () .

- (A) $-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$ (B) $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$ (C) $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$ (D) $-\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$



(3 - مىسال ئۈچۈن)




(2 - مىسال ئۈچۈن)


3. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىق $ABCD-A'B'C'D'$ دا، $\angle BAD = 60^\circ$, $AA' = 7$, $AD = 3$, $AB = 5$ ، $\angle BAA' = \angle DAA' = 45^\circ$ بولسا، AC' نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.

4. رەسىمىدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $ABCD$ نىڭ ھەر بىر تەرىپى ۋە BD , AC لارنىڭ ئۇزۇنلۇقى a غا تەڭ ھەم E , F , G لار ئايرىم - ئايرىم DC , AD , AB نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

- (1) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$; (2) $\vec{AD} \cdot \vec{DB}$; (3) $\vec{CF} \cdot \vec{AC}$;
(4) $\vec{EF} \cdot \vec{BC}$; (5) $\vec{FG} \cdot \vec{BA}$; (6) $\vec{GE} \cdot \vec{GF}$.



(5 - مىسال ئۈچۈن)



(4 - مىسال ئۈچۈن)

5. رەسىمىدىكىدەك، كۇب $ABCD-A'B'C'D'$ نىڭ قىر ئۇزۇنلۇقى a ئىكەنلىكى بېرىلگەن. (1) $A'B$ بىلەن $B'C$ نىڭ ئارا بۆلۈشىنى تېپىڭ; (2) $A'B \perp AC'$ نى ئىسپاتلاڭ.


6. ۋېكتور a, b, c لار ئايرىم - ئايرىم x ئوق، y ئوق، z ئوققا پاراللېل ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، ئۇلار - نىڭ كوئوردېناتلىرى قانداق ئالاھىدىلىككە ئىگە؟

7. $a = (2, -3, 1)$ ، $b = (2, 0, 3)$ ، $c = (0, 0, 2)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

(1) $a \cdot (b + c)$; (2) $a + 6b - 8c$.

8. $b = (-4, 2, x)$ ھەمدە $a \perp b$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. x نىڭ قىممىتىنى تېپىڭ.

9. $A(3, 5, -7)$ ، $B(-2, 4, 3)$ لار بېرىلگەن. $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BA}$ لارنى، AB كېسىكىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىنىڭ كوئوردېناتى ۋە AB كېسىكىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.




10. رەسىمدىكىدەك، كۇب $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ دا، N, M لار ئايرىم - ئايرىم A_1A ۋە B_1B قىرلىرىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، CM بىلەن D_1N دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تېپىڭ.

11. ۋېكتور a, b, c لار بوشلۇقنىڭ يەنە بىر بىرلىك ئورتوگونال بازىسى، ۋېكتور $a+b, a-b, c$ لار بوشلۇقنىڭ يەنە بىر بازىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ئەگەر ۋېكتور p نىڭ بازىسى a, b, c دىكى كوئوردېناتى $(1, 2, 3)$ بولسا، p نىڭ بازىسى $a+b, a-b, c$ دىكى كوئوردېناتىنى تېپىڭ.


(10 - مىسال ئۈچۈن)

B گۇرۇپپا

1. رەسىمدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $OABC$ دا، $OA \perp BC$ ، $OB \perp AC$ بولسا، $OC \perp AB$ نى ئىسپاتلاڭ.



(2 - مىسال ئۈچۈن)



(1 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $OABC$ دا، $OA = OB$ ، $CA = CB$ بولۇپ، E, F, G, H لار ئايرىم - ئايرىم OA, OB, OC, CA نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۆت تەرەپلىك $EFGH$ نىڭ تىك تۆتبۇلۇڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

3. ئىسپاتلاڭ: ئەگەر ئىككى تۈز سىزىق ئوخشاش بىر تەكشىلىككە تىك بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى تۈز سىزىق پاراللېل بولىدۇ.

ئوقۇش ۋە مۇلازىمەت



ۋېكتور ئۇقۇمىنىڭ كېڭەيتىلىشى ۋە قوللىنىلىشى

بىزگە مەلۇمكى، تەكشىلىكتە ئورتوگونال بازىس بېكىتىلىپ، كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن، كوئوردېنات تەكشىلىكىدىكى خالىغان بىر ۋېكتورنى ئىككى نامەلۇم-لۇق تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (a_1, a_2) بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلار ئىككى ئۆلچەملىك ۋېكتور دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بوشلۇقتا بىر ئورتوگونال بازىس بېكىتىلسە، بوشلۇقتىكى خالىغان بىر ۋېكتورنى ئۈچ نامەلۇملىق تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى (a_1, a_2, a_3) بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. بوشلۇقتىكى ۋېكتورلار ئۈچ ئۆلچەملىك ۋېكتور دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئىككى ئۆلچەملىك ۋېكتور بىلەن ئۈچ ئۆلچەملىك ۋېكتور ئو-مۇلاشتۇرۇلۇپ گېئومېترىيىلىك ۋېكتور دەپ ئاتىلىدۇ.

ئەمەلىي مەسىلىلەردە، بىز كۆپ ھاللاردا تېخىمۇ كۆپ ھەقىقىي سانلار بىلەن ئىپادىلەشكە توغرا كېلىدىغان مىقدارلارنى ئۇچرىتىمىز. مەسىلەن، مەۋسۇم ئاخىرىدا بەش پەندىن ئىمتىھان ئېلىنغان بولسا، ھەربىر ئوقۇغۇچىنى تەرتىپ بويىچە تىزىلغان بەش پەننىڭ نەتىجىسى بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ؛ ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسىدە، قۇراشتۇرۇلۇپ بولغان ئاپتو-موبىل تورمۇزلىنىش ئارىلىقى، ئەڭ يۇقىرى تېزلىك، ھەر 100 كىلومېتىر ماڭغاندىكى ماي سەرپىياتى، سىيرىلىش ئارىلىقى، شاۋقۇن ئاۋازى، كېرەكسىز گاز چىقىرىش مىقدارى قاتارلىق ئالتە كۆرسەتكۈچ بويىچە سىنالىسا، ئۇ ھالدا ھەربىر يېڭى ئاپتوموبىلنىڭ سۈپىتىنى ئالتە نامە-لۇملىق تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. ئومۇمەن، n نامەلۇملىق تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسى $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ نى n ئۆلچەملىك ۋېكتور دەپ ئاتايمىز، ئۇ گېئومېترىيىلىك ۋېكتورنىڭ كېڭەيتىلىشىدۇر. n ئۆلچەملىك ۋېكتورلارنىڭ بارلىقىدىن ھاسىل بولغان توپلامغا ماس قۇرۇلما بېرىلگەندىن كېيىن، ئۇ n ئۆلچەملىك ئېۋكلىد بوشلۇقى دەپ ئاتىلىدۇ. n ئۆلچەملىك ئېۋكلىد بوشلۇقىنىڭ ھەر-بىر ئېلېمېنتىنى n ئۆلچەملىك ۋېكتورلار بوشلۇقىدىكى بىر نۇقتا دەپ قاراشقا بولىدۇ.

ئىككى ئۆلچەملىك ۋېكتوردىكىگە ئوخشاش، n ئۆلچەملىك ئىككى ۋېكتورنى قوشۇش ئەمىلى، ئېلىش ئەمىلى، ۋېكتورنى سانغا كۆپەيتىش ئەمىلى، ئىككى ۋېكتورنىڭ سكاليار كۆ-پەيتىمىسى، ۋېكتورنىڭ ئۇزۇنلۇقى (مودۇلى)، ئىككى نۇقتا ئارىسىدىكى «ئارىلىق» قاتار-لىقلارغىمۇ تۆۋەندىكىدەك ئېنىقلىما بېرىشكە بولىدۇ:

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_n), a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا}$$

$$a \pm b = (a_1, a_2, \dots, a_n) \pm (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, \dots, a_n \pm b_n);$$

$$\lambda a = \lambda(a_1, a_2, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n), \lambda \in \mathbf{R};$$

$$a \cdot b = (a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_n) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n;$$

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}.$$

n ئۆلچەملىك ۋېكتورلار بوشلۇقىدىكى ئىككى نۇقتا $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ، $B(b_1, b_2, \dots, b_n)$ ئا-

رىسىدىكى «ئارىلىق»:

$$d_{AB} = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2}.$$

ۋېكتور ئەمەللىرىدىن پايدىلىنىپ نۇرغۇنلىغان ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا بولىدۇ. مەسىلەن، مەلۇم خىل تاۋارنىڭ سېتىلىش مىقدارىدا پەسىل ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ قانۇنىيەتلىك ئۆزگىرىش بولۇش - بولماسلىقىنى تەتقىق قىلىش ئۈچۈن، مۇشۇ خىل تاۋارنىڭ بەش يىل ئىچىدىكى ھەر ئايلىق سېتىلىش مىقدارىغا دائىر سانلىق مەلۇماتلار توپلانغان بولسا، ئۇ ھالدا بۇ خىل تاۋارنىڭ ھەر يىللىق سېتىلىش مىقدارىنى 12 ئايدىكى سېتىلىش مىقدارىدىن ھاسىل بولغان 12 ئۆلچەملىك ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. بەش يىل ئىچىدىكى سېتىلىش مىقدارىنى ئايرىم - ئايرىم

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_{12}),$$

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_{12}),$$

$$c = (c_1, c_2, \dots, c_{12}),$$

$$d = (d_1, d_2, \dots, d_{12}),$$

$$e = (e_1, e_2, \dots, e_{12})$$

دەپ پەرەز قىلىپ، بۇ بەش يىل ئىچىدىكى ئايلىق ئوتتۇرىچە سېتىلىش ۋېكتورى

$$\frac{1}{2} (a + b + c + d + e)$$

نى ھېسابلىساق، بۇ ۋېكتورنىڭ 12 تارماق مىقدارىنى كۆزىتىش ئارقىلىق مۇشۇ بەش يىل ئىچىدىكى ئايلىق ئوتتۇرىچە سېتىلىش مىقدارىنىڭ پەسىل ئۆزگىرىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇش - بولماسلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز.

يۇقىرىدىكىسى ۋېكتورلارنى قوشۇش ئەمىلى ۋە ۋېكتورنى سانغا كۆپەيتىش ئەمىلىنىڭ قوللىنىلىشىغا دائىر مىسال، ئەمدى ئەمەلىي مەسىلىلەرنى «ئارىلىق» ئۇقۇمىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشقا دائىر بىر مىسال كۆرەيلى.

«ئارىلىق» تىن پايدىلىنىپ تۈرگە ئايرىش كۆپ قوللىنىلىدىغان تۈرگە ئايرىش ئۇسۇلىدۇر. بۇنىڭدا، ھەربىر ۋېكتور بىلەن ئۆلچەملىك نۇقتىنىڭ ئارىلىقى ھېسابلىنىدۇ، ۋېكتور بىلەن قايسى ئۆلچەملىك نۇقتىنىڭ ئارىلىقى ئەڭ يېقىن بولسا، ئۇ شۇ تۈرگە تەۋە بولىدۇ.

جاگالماي بىلەن لاچىننىڭ ھەر ئىككىسى لاچىنسىمانلار ئەترىتىدىكى لاچىن ئائىلىسىگە تەۋە قۇشلاردۇر. ئۇلارنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى كەپتەرچىلىك كېلىدۇ، شەكلى قارلىغاچقا ئوخشاشراق بولۇپ، بەدىنىنىڭ مورفولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى بىر - بىرىگە ئوخشىشىپ كېتىدۇ، ئەمما لاچىن جاگالمايدىن سەل چوڭراق كېلىدۇ. ئەۋرىشكە ئېلىپ ئۆلچەش ئارقىلىق جاگالماينىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 31 cm، ئوتتۇرىچە قانات ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 27 cm؛ لاچىننىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 35 cm، ئوتتۇرىچە قانات ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 25 cm ئىكەنلىكى ئېنىقلانغان.

يېقىندا مەلۇم جايدا بەدەن شەكلى جاگالماي ياكى لاچىنغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان ئىككى قۇش بايقالدى. ئۆلچەش ئارقىلىق بۇ ئىككى قۇشنىڭ بەدەن ئۇزۇنلۇقى بىلەن قانات ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم $A(32.65, 25.2)$ ، $B(33.4, 26.9)$ ئىكەنلىكى ئېنىقلانغان بولسا، مۇشۇ سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسەن بۇ ئىككى قۇشنىڭ جاگالماي ياكى لاچىن ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلالامسىز؟
يېشىش: جاگالماينىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقىنى x_1 ، ئوتتۇرىچە قانات ئۇزۇنلۇقىنى y_1 ، لاچىننىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقىنى x_2 ، ئوتتۇرىچە قانات ئۇزۇنلۇقىنى y_2 دەپ پەرەز قىلايلى.

ھۆكۈم قىلماقچى بولغان قۇشنىڭ بەدەن ئۇزۇنلۇقىنى x ، قانات ئۇزۇنلۇقىنى y دەپ پەرەز قىلىپ، بۇ قۇش بىلەن جاغالماي ۋە لاچىن ئارىسىدىكى «ئارىلىق» قا ئايرىم - ئايرىم تۆۋەندىكىدەك ئېنىقلىما بېرىمىز:

$$D_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2},$$

$$D_2 = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2}.$$

بۇنداق ئېنىقلىما بېرىلگەن «ئارىلىق» ھۆكۈم قىلماقچى بولغان قۇشنىڭ بەدەن ئۇزۇنلۇقى ۋە قانات ئۇزۇنلۇقىغا دائىر سانلىق مەلۇماتلار بىلەن جاغالماي ۋە لاچىننىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقى ۋە قانات ئۇزۇنلۇقىغا دائىر سانلىق مەلۇماتلار ئارىسىدىكى ئارىلىقنىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ھۆكۈم قىلىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

ئەگەر $D_1 > D_2$ بولسا، بۇ، ھۆكۈم قىلماقچى بولغان قۇشنىڭ بەدەن ئۇزۇنلۇقى ۋە قانات ئۇزۇنلۇقى لاچىننىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقى ۋە قانات ئۇزۇنلۇقىغا يېقىنلىشىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ، شۇڭا بۇ قۇش لاچىن بولىدۇ.

ئەگەر $D_1 < D_2$ بولسا، بۇ، ھۆكۈم قىلماقچى بولغان قۇشنىڭ بەدەن ئۇزۇنلۇقى ۋە قانات ئۇزۇنلۇقى جاغالمايىنىڭ ئوتتۇرىچە بەدەن ئۇزۇنلۇقى ۋە قانات ئۇزۇنلۇقىغا يېقىنلىشىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ، شۇڭا بۇ قۇش جاغالماي بولىدۇ.

ئەگەر $D_1 = D_2$ بولسا، بۇ، پەقەت يۇقىرىقى سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلىنىپ ھۆكۈم چىقىرىشقا بولمايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. بېرىلگەن شەرتلەردىن بىلەلەيمىزكى:

$$x_1 = 31, y_1 = 27, x_2 = 35, y_2 = 25;$$

ئۇنىڭدىن باشقا:

$$x_A = 32.65, y_A = 25.2, x_B = 33.4, y_B = 26.9.$$

ھېسابلاش ئارقىلىق تۆۋەندىكى نەتىجىلەرگە ئېرىشىمىز:

$$D_{A1} = \sqrt{(x_A - x_1)^2 + (y_A - y_1)^2} = \sqrt{5.9625} \approx 2.44,$$

$$D_{A2} = \sqrt{(x_A - x_2)^2 + (y_A - y_2)^2} = \sqrt{5.5625} \approx 2.36,$$

$$D_{B1} = \sqrt{(x_B - x_1)^2 + (y_B - y_1)^2} = \sqrt{5.77} \approx 2.40,$$

$$D_{B2} = \sqrt{(x_B - x_2)^2 + (y_B - y_2)^2} = \sqrt{6.17} \approx 2.48.$$

$D_{A1} > D_{A2}$ بولغانلىقتىن، A نىڭ لاچىن ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز؛ $D_{B1} < D_{B2}$ بولغانلىقتىن، B نىڭ جاغالماي ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز.

يۇقىرىقى ئىككى مىسالدىن تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسىدىن ھاسىل قىلىنغان ۋېكتورنىڭ قوللىنىلىشى گېئومېترىيىلىك ۋېكتورغا قارىغاندا تېخىمۇ كەڭ ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە ئىلمىي تەتقىقاتلاردا، نۇرغۇن مىقدارلارنى تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار گۇرۇپپىسىدىن ھاسىل قىلىنغان ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەشكە ھەم بۇ مىقدارلارنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ۋېكتور نەزەرىيىسىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشقا بولىدۇ.


ستېرېئومېترىيىدىكى ۋېكتور ئۇسۇلى

ئالدىنقى پاراگرافتا، بىز ۋېكتورنى تەكشىلىكتىن بوشلۇققا كېڭەيتتۇق ھەم بەزى ستېرېئومېتىرىيىلىك مەسىلىلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ ھەل قىلدۇق. سىز بوشلۇقتىكى ۋېكتور - نىڭ ستېرېئومېتىرىيىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىكى رولىنى دەسلەپكى قەدەمدە ھېس قىلىدىڭىز - مۇ؟ بۇ پاراگرافتا بىز يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ستېرېئومېتىرىيىدىكى ۋېكتور ئۇسۇلىنى ئۆگىنىمىز. ستېرېئومېتىرىيىنىڭ ئاساسىي تەتقىق قىلىش ئويىچىسى نۇقتا، تۈز سىزىق، تەكشىلىك ۋە ئۇلار - دىن ھاسىل بولغان بوشلۇقتىكى شەكىللەر. ستېرېئومېتىرىيىلىك مەسىلىلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن نۇقتا، تۈز سىزىق ۋە تەكشىلىكنىڭ ئورنىنى چوقۇم ۋېكتور ئارقىلىق ئىپادىلىۋېلىش كېرەك.

مۇلاھىزە؟

بىر نۇقتىنىڭ بوشلۇقتىكى ئورنىنى قانداق بەلگىلەش كېرەك؟ بوشلۇقتا بىر مۇقىم نۇقتا A ۋە بىر مۇقىم يۆنىلىش (ۋېكتور) بېرىلسە، بىر تۈز سىزىقنىڭ بوشلۇقتىكى ئورنىنى بەلگىلەشكە بولامدۇ؟ بىر مۇقىم نۇقتا ۋە ئىككى مۇقىم يۆنىلىش (ۋېكتور) بېرىلسە، بىر تەكشىلىكنىڭ بوشلۇقتىكى ئورنىنى بەلگىلەشكە بولامدۇ؟ بىر مۇقىم نۇقتا ۋە بىر مۇقىم يۆنىلىش (ۋېكتور) بېرىلسە، بىر تەكشىلىكنىڭ بوشلۇقتىكى ئورنىنى بەلگىلەشكە بولامدۇ؟

1.2.3 - رەسىم (1) دىكىدەك، بوشلۇقتا بىر مۇقىم نۇقتا O نى ئاساس نۇقتا قىلىپ ئالساق، ئۇ ھالدا بوشلۇقتىكى خالىغان بىر P نۇقتىنىڭ ئورنىنى ۋېكتور $\overrightarrow{OP}$ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. ۋېكتور $\overrightarrow{OP}$ نى P نۇقتىنىڭ ئورۇن ۋېكتورى دەپ ئاتايمىز.



رەسىم 1.2.3 -

بوشلۇقتىكى خالىغان بىر l تۈز سىزىقنىڭ ئورنىنى l ئۈستىدىكى بىر مۇقىم نۇقتا A ۋە بىر مۇقىم يۆنىلىش ئارقىلىق بەلگىلەشكە بولىدۇ. 1.2.3 - رەسىم (2) دىكىدەك، A نۇقتا l تۈز سىزىق ئۈستىدە. كى نۇقتا، a ۋېكتور l تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىشى (يۆنىلىش ۋېكتورى) نى ئىپادىلەيدۇ. l تۈز سىزىق ئۈستىدىن $\vec{AB} = a$ نى ئالساق، ئۇ ھالدا l تۈز سىزىق ئۈستىدىكى خالىغان بىر P نۇقتىغا نىسبەتەن، شۇنداق بىر ھەقىقىي سان t چوقۇم مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:

$$\vec{AP} = t \vec{AB}.$$

شۇنداق قىلىپ، A نۇقتا بىلەن a ۋېكتور l تۈز سىزىقنىڭ ئورنىنى بەلگىلەپلا قالماستىن، يەنە l تۈز سىزىق ئۈستىدىكى خالىغان بىر نۇقتىنىمۇ كونكرېت ئىپادىلەپ بېرەلەيدۇ.

بوشلۇقتا α تەكشىلىكنىڭ ئورنىنى α دىكى ئۆزئارا كېسىشكۈچى ئىككى تۈز سىزىق ئارقىلىق بەلگىلەشكە بولىدۇ. 1.2.3 - رەسىم (3) دىكىدەك، بۇ ئىككى تۈز سىزىقنى O نۇقتىدا كېسىشىدۇ، ئۇلارنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورلىرىنى ئايرىم - ئايرىم a ۋە b ، P نى α تەكشىلىكتىكى خالىغان بىر نۇقتا دەپ پەرەز قىلساق، تەكشىلىكتىكى ۋېكتورلارغا دائىر ئاساسىي تېئورېمىدىن بىلەلەيمىزكى، تەرتىپلىك ھەقىقىي سانلار جۈپى (x, y) مەۋجۇت بولۇپ، نەتىجىدە تۆۋەندىكى كۈچكە ئىگە بولىدۇ:


$$\vec{OP} = xa + yb.$$

شۇنداق قىلىپ، O نۇقتا بىلەن ۋېكتور a ، b لار α تەكشىلىكنىڭ ئورنىنى بەلگىلەپلا قالماي، يەنە α دىكى خالىغان بىر نۇقتىنىمۇ كونكرېت ئىپادىلەپ بېرەلەيدۇ. بۇ خىل ئىپادىلەش گېئومېترىيىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ.

ئەگەر $m \perp \alpha$ بولغان باشقا بىر m تۈز سىزىق ئۈستىدىن خالىغان بىر b ۋېكتورنى ئالساق، b بىلەن a قانداق مۇناسىۋەتتە بولىدۇ؟

تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورىغا ئوخشاش، بىز بوشلۇقتىكى تەكشىلىكنىڭ ئورنىنى تەكشىلىكنىڭ نورمال ۋېكتورىدىن پايدىلىنىپمۇ ئىپادىلەيلىمىز. 1.2.3 - رەسىم (4) دىكىدەك، $l \perp \alpha$ بولغان l تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورى a نى ئالساق، ئۇ ھالدا a ۋېكتور α تەكشىلىكنىڭ نورمال ۋېكتورى (normal vectors) دەپ ئاتىلىدۇ. بىر A نۇقتا ۋە a ۋېكتور بېرىلسە، ئۇ ھالدا A نۇقتىدىن ئۆتكەن ھەم a ۋېكتورنى نورمال ۋېكتور قىلغان تەكشىلىك پۈتۈنلەي بەلگىلەنگەن بولىدۇ.

يۆنىلىش ۋېكتورى ۋە نورمال ۋېكتور تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىكنىڭ ئورنىنى بەلگىلەيدىغانلىقىنى، بىز بوشلۇقتىكى تۈز سىزىق، تەكشىلىكلەر ئارىسىدىكى پاراللېللىق، تەكلىك، ئارا بۆلۈك قاتارلىق ئورۇن مۇناسىۋەتلىرىنى تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورى ۋە تەكشىلىكنىڭ نورمال ۋېكتورلىرىدىن پايدىلىنىپ ئىپادىلەيلىمىز.



رەسىم - 2.2.3

بىز ۋېكتور ئەمەللىرىنىڭ رولىنى ھەر ۋاقىت، ھەر جايدا كۆرەلەيمىز. سىز «ۋېكتور ئادەمنىڭ گەۋدىسى، ئەمەل بولسا ئادەمنىڭ روھى»، «ئەمەلى بولمىغان ۋېكتور پەقەت يول بەلگىسىنىڭ رولىنى ئوينىيالايدۇ» دېگەن قاراشقا قوشۇلالمىسىز؟

مەسىلەن، 2.2.3 - رەسىمدىكىدەك، l تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورىنى $u = (a_1, b_1, c_1)$ ، α تەكشىلىكنىڭ نورمال ۋېكتورىنى $v = (a_2, b_2, c_2)$ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$l // \alpha \Leftrightarrow u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0 \quad (1) \quad (2.2.3 - \text{رەسىم});$$

$$l \perp \alpha \Leftrightarrow u // v \Leftrightarrow u = kv$$

$$\Leftrightarrow (a_1, b_1, c_1) = k(a_2, b_2, c_2)$$

$$\Leftrightarrow a_1 = ka_2, b_1 = kb_2, c_1 = kc_2 \quad (2) \quad (2.2.3 - \text{رەسىم}).$$

ئىزدىنىش



- 2.2.3.1 - رەسىم (3) دىكىدەك، ئەگەر l تۈز سىزىق بىلەن α تەكشىلىكىنىڭ ئارا بۆلۈڭى θ بولسا، θ نى u, v لار بىلەن ئىپادىلەيمىز؟
- ئوخشاشلا، بوشلۇقتىكى ئىككى تۈز سىزىقنىڭ پاراللېل بولۇش، تىك بولۇشتىن ئىبارەت ئورۇن مۇناسىۋىتىنى ۋە ئۇلارنىڭ ئارا بۆلۈڭىنى تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورىدىن پايدىلىنىپ ئىپادىلەيمىز. سىز؟ بوشلۇقتىكى ئىككى تەكشىلىكنىڭ پاراللېل بولۇش، تىك بولۇشتىن ئىبارەت ئورۇن مۇناسىۋىتىنى ۋە ئۇلاردىن ھاسىل بولغان ئىككى ياقلىق بۆلۈڭىنىڭ گرادۇس سانىنى تەكشىلىكنىڭ نورمال ۋېكتورىدىن پايدىلىنىپ ئىپادىلەيمىز؟

ئومۇمەن، تۈز سىزىق، تەكشىلىكلەرنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتى بىلەن تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورى ۋە تەكشىلىكنىڭ نورمال ۋېكتورى ھەققىدە تۆۋەندىكى يەكۈنلەرنى يىغىنچاقلاپ چىقىشقا بولىدۇ.

تۈز سىزىق l ، m نىڭ يۆنىلىش ۋېكتورىنى ئايرىم - ئايرىم a, b ، تەكشىلىك α, β نىڭ نورمال ۋېكتورىنى ئايرىم - ئايرىم u, v دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$l // m \Leftrightarrow a // b \Leftrightarrow a = kb, k \in \mathbf{R};$$

$$l \perp m \Leftrightarrow a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0;$$

$$l // \alpha \Leftrightarrow a \perp u \Leftrightarrow a \cdot u = 0;$$

$$l \perp \alpha \Leftrightarrow a // u \Leftrightarrow a = ku, k \in \mathbf{R};$$

$$\alpha // \beta \Leftrightarrow u // v \Leftrightarrow u = kv, k \in \mathbf{R};$$

$$\alpha \perp \beta \Leftrightarrow u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0.$$

ئەمدى «ماتېماتىكا ②» دىكى «تەكشىلىك بىلەن تەكشىلىكنىڭ پاراللېللىقىغا ھۆكۈم قىلىش تېئورېمىسى» نى ۋېكتور ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلايمىز.

تېئورېما: بىر تەكشىلىكتىكى ئۆزئارا كېسىشكۈچى ئىككى تۈز سىزىق ئىككىنچى بىر تەكشىلىككە پاراللېل بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئىككى تەكشىلىك پاراللېل بولىدۇ.

بېرىلگەن: l, m تۈز سىزىق ۋە α, β تەكشىلىك، بۇنىڭدىكى $l \subset \alpha, m \subset \alpha$ بىلەن m ئۆزئارا كېسىشىدۇ، $l // \beta, m // \beta$. ئىسپات تەلپى: $\alpha // \beta$.

ئىسپات: ئۆزئارا كېسىشكۈچى تۈز سىزىق l, m نىڭ يۆنىلىش ۋېكتورىنى ئايرىم - ئايرىم a, b ، تەكشىلىك α, β نىڭ نورمال ۋېكتورىنى ئايرىم - ئايرىم u, v دەپ پەرەز قىلىمىز.

$$\therefore l // \beta, m // \beta, \therefore a \perp v, b \perp v.$$

$$\therefore a \cdot v = 0, b \cdot v = 0.$$

$l \subset \alpha, m \subset \alpha$ ھەمدە m, l لار ئۆزئارا كېسىشىدىغانلىقتىن، α دىكى خالىغان بىر تۈز سىزىقنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورى p نى تۆۋەندىكى كۆرۈنۈشتە ئىپادىلەشكە بولىدۇ:

$$p = xa + yb, x, y \in \mathbb{R}.$$

ئۇنىڭ ئۈستىگە

$$p \cdot v = (xa + yb) \cdot v = xa \cdot v + yb \cdot v = 0,$$

يەنى β تەكشىلىكىنىڭ نورمالى α تەكشىلىكتىكى خالىغان بىر تۈز سىزىققا تىك بولغانلىقتىن، β تەكشىلىكىنىڭ نورمال ۋېكتورى α تەكشىلىكىنىڭمۇ نورمال ۋېكتورى بولىدۇ، يەنى $u // v$.

$$\therefore \alpha // \beta.$$

ئوخشاشلا، بىز «ماتېماتىكا ②» دىكى تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىكىنىڭ پاراللېللىقىغا ھۆكۈم قىلىش تېئورېمىسى، تەكشىلىك بىلەن تەكشىلىكىنىڭ تىكلىكىگە ھۆكۈم قىلىش تېئورېمىسىنىمۇ ۋېكتور ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئىسپاتلىيالايمىز. قىزىقىدىغان ساۋاقداشلار بۇلارنى ئۆزلىرى ئىسپاتلاپ باقسا بولىدۇ.

مەشىق

1. a, b نى ئايرىم - ئايرىم l_1, l_2 تۈز سىزىقلارنىڭ يۆنىلىش ۋېكتورى دەپ پەرەز قىلىپ، تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئاساسەن l_1, l_2 تۈز سىزىقلارنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتىگە ھۆكۈم قىلىڭ:

$$(1) a = (2, -1, -2), b = (6, -3, -6);$$

$$(2) a = (1, 2, -2), b = (-2, 3, 2);$$

$$(3) a = (0, 0, 1), b = (0, 0, -3).$$

2. u, v نى ئايرىم - ئايرىم α, β تەكشىلىكلەرنىڭ نورمال ۋېكتورى دەپ پەرەز قىلىپ، تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئاساسەن α, β تەكشىلىكلەرنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتىگە ھۆكۈم قىلىڭ:

$$(1) u = (-2, 2, 5), v = (6, -4, 4);$$

$$(2) u = (1, 2, -2), v = (-2, -4, 4);$$


$$(3) u = (2, -3, 5), v = (-3, 1, -4).$$

ستېرېئومېترىيىدە ھەل قىلىنىدىغان ئاساسىي مەسىلىلەر بوشلۇقتىكى شەكىللەرنىڭ كۆرۈنۈشى، چوڭ - كىچىكلىكى ۋە ئۇلارنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتىدۇر. بۇنىڭدىكى نۇقتىدىن تۈز سىزىققىچە، نۇقتىدىن تەكشىلىكىگىچە بولغان ئارىلىق مەسىلىسى ۋە تۈز سىزىق بىلەن تۈز سىزىق، تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىك، تەكشىلىك بىلەن تەكشىلىكنىڭ ئارا بۆلۈڭ مەسىلىسى ستېرېئومېترىيىدە تەتقىق قىلىنىدىغان مۇھىم مەسىلە ھېسابلىنىدۇ. بوشلۇقتىكى ۋېكتور ئەمەللىرى (بولۇپمۇ سكاليار كۆپەيتىمە) ۋېكتورلارنىڭ مودۇلى ۋە ۋېكتورلارنىڭ ئارا بۆلۈڭىغا چېتىلىدۇ. ئالدىدا ئېيتىلغاندىكىگە ئوخشاش، بىز نۇقتا، تۈز سىزىق ۋە تەكشىلىكنى ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەپ، ئاندىن نۇقتا، تۈز سىزىق، تەكشىلىكلەرنىڭ ئارا بۆلۈڭى ۋە ئۆزۈنلۈك قاتارلىق مەسىلىلەرنى ۋېكتور ئەمەللىرى (بولۇپمۇ سكاليار كۆپەيتىمە) دىن پايدىلىنىپ ھەل قىلالايمىز.

تەكشىلىك گېئومېترىيىسىدىكى مەسىلىلەرنى تەكشىلىك ۋېكتورىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلغاندىكى «ئۈچ باسقۇچلۇق ئۇسۇل» غا ئوخشاش، ستېرېئومېترىيىدىكى مەسىلىلەرنى بوشلۇق ۋېكتورىدىن پايدى-

لىنىپ ھەل قىلىشنىڭ «ئۈچ باسقۇچلۇق ئۇسۇلى» نىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرالايمىز:

- (1) ستېرېئو شەكىللەر بىلەن بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ باغلىنىشىنى تۇرغۇزۇپ، مەسىلىگە چېكىلىدىغان نۇقتا، تۈز سىزىق، تەكشىلىكلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەپ، ستېرېئومېتىردىكىگە دائىر مەسىلىلەرنى ۋېكتورغا دائىر مەسىلىلەرگە ئايلاندۇرۇش؛
- (2) ۋېكتور ئەمەللىرىدىن پايدىلىنىپ، نۇقتا، تۈز سىزىق، تەكشىلىكلەر ئارىسىدىكى ئورۇن مۇناسىۋىتىنى ۋە ئۇلار ئارىسىدىكى ئارىلىق، ئارا بۆلۈك قاتارلىق مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىش؛
- (3) ۋېكتورلارنى ھېسابلاش نەتىجىسىنىڭ ماس گېئومېترىيىلىك مەنىسىنى بېرىش.



رەسىم 3.2.3

1 - مىسال. 3.2.3 - رەسىمدىكىدەك، بىر كرىستال پاراللېل ئالتە ياقلىق شەكلىدە بولۇپ، ئۇنىڭ A چوققىسى ئۈچ نۇقتا قىلغان ئۈچ قىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۆز ئارا تەڭ ھەمدە بۇ ئۈچ قىرىنىڭ ئارا بۆلۈڭلىرى ئوخشاشلا 60° بولسا، ئۇ ھالدا كرىستالنىڭ مۇشۇ چوققىسىنى ئۈچ نۇقتا قىلغان دىئاگونالنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن قىر ئۇزۇنلۇقىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

تەھلىل: 3.2.3 - رەسىمدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىقنىڭ قىرلىرى ئارىسىدا پاراللېللىق مۇناسىۋەت بولغانلىقتىن، ھەرقايسى قىرلارنى A نى باش نۇقتا قىلغان ئۈچ ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. مىسالدا بېرىلگەن شەرتكە ئاساسەن، بۇ ئۈچ ۋېكتورنىڭ مودۇلىنى ئوخشاشلا 1 گە تەڭ دەپ پەرەز قىلىمىز. AC_1 دىئاگونالنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىش ئۈچۈن، $\overrightarrow{AC_1}$ نى قىرلارغا مۇناسىۋەتلىك ۋېكتور بىلەن ئىپادىلىۋېلىش كېرەك.

يېشىش: 3.2.3 - رەسىمدىكىدەك، $AB=AA_1=AD=1$ ، $\angle BAD=\angle BAA_1=\angle DAA_1=60^\circ$ دەپ پەرەز قىلىمىز.

ۋېكتور مەسىلىسىگە ئايلاندۇرىمىز

ۋېكتورلارنى قوشۇش قائىدىسىگە ئاساسەن،

$$\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}.$$

ۋېكتور ئەمەلىنى بېجىرىمىز

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC_1}^2 &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 \\ &= \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + \\ &\quad 2(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1}) \\ &= 1 + 1 + 1 + 2(\cos 60^\circ + \cos 60^\circ + \cos 60^\circ) \\ &= 6. \end{aligned}$$

$$\therefore |\overrightarrow{AC_1}| = \sqrt{6}.$$

شەكىل مەسىلىسىگە قايتىمىز

بۇ كرىستالنىڭ AC_1 دىئاگونالنىڭ ئۇزۇنلۇقى قىر ئۇزۇنلۇقىنىڭ $\sqrt{6}$ ھەسسىسىگە تەڭ.


بوشلۇقتىكى ئىككى نۇقتا ئارىسىدىكى ئارىلىقنى بۇ ئىككى نۇقتىنى باش نۇقتا ۋە ئاخىرقى نۇقتا قىلغان ۋېكتورنىڭ مودۇلى بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. ۋېكتور u نىڭ مودۇلى مۇناسىۋەت ئىپادىسى $|u|^2 = u \cdot u = u^2$ نى قانداق ئەتەلەندۈرىدۇ.

ستېرېئومېترىيىدە، ئارىلىققا دائىر مەسىلىلەرنى كۆپ ھاللاردا بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ سكالار يار كۆپەيتىمىسىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشقا بولىدۇ.



مۇلاھىزە؟

1. يۇقىرىقى مەسىلىدىكى پاراللېل ئالتە ياقلىقنىڭ BD_1 دىئاگونالىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن قىر ئۇزۇنلۇقى قىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟
2. ئەگەر بىر پاراللېل ئالتە ياقلىقنىڭ ھەرقايسى قىر ئۇزۇنلۇقلىرى ئۆزئارا تەڭ ھەم مەلۇم بىر چوققىنى ئۆچ قىلغان قىرلارنىڭ ئارا بۆلۈڭى ئوخشاشلا α گە تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا بۇ پاراللېل ئالتە ياقلىقنىڭ دىئاگونالىنىڭ ئۇزۇنلۇقىغا ئاساسەن قىر ئۇزۇنلۇقىنى ئېنىقلىغىلى بولامدۇ؟
3. بۇ مەسىلىدىكى كرىستالنىڭ قارىمۇقارشى ئىككى يېقىننىڭ ئارىلىقى قانچە بولىدۇ؟ (كۆرسەتمە: ئىككى پاراللېل تەكشىلىكنىڭ ئارىلىقىنى تېپىش ئادەتتە ئىككى نۇقتىنىڭ ئارىلىقىنى تېپىشقا يېغىنچاقلىنىدۇ)



رەسىم 4.2.3 -

2 - مىسال. 4.2.3 - رەسىمدىكىدەك، «ئا» بېكەتىنىڭ ئورنى سۇ ئامبىرىنىڭ ئاستى يۈزى ياتقان تەكشىلىكتىكى A نۇقتىدا، «ب» بېكەت-نىڭ ئورنى توسمىنىڭ يان يۈزىدىكى B نۇقتىدا. A, B دىن l تۈز سىزىق (ئامبارنىڭ ئاستى يۈزى بىلەن توسمىنىڭ كېسىشىش سىزىقى) قىچە بولغان ئارىلىق AC ۋە BD نىڭ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم - ئايرىم a ۋە b ، CD نىڭ ئۇزۇنلۇقى c ، AB نىڭ ئۇزۇنلۇقى d بولسا، ئامبارنىڭ ئاستى يۈزى بىلەن توسمىدىن ھاسىل بولغان ئىككى ياقلىق بۆلۈڭىنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تاپايلى.

تەھلىل: تاپماقچى بولغان ئىككى ياقلىق بۆلۈڭىنىڭ سىزىقلىق بۆلۈڭى دەل 4.2.3 - رەسىمدىكى BD, AC تۈز سىزىقلاردىن ھاسىل بولغان بۆلۈڭ ياكى ئۇنىڭ تولدۇرغۇچى بۆلۈڭى بولىدۇ (ئويلاپ بېقىڭ، نېمە ئۈچۈن؟). شۇڭا، بىز ئاۋۋال مىسالدا بېرىلگەن شەرتكە ئاساسەن، AC ۋە BD كېسىكىنىڭ يۆنىلىشىنى ۋېكتور بىلەن ئىپادىلەۋالغىمىز، ئاندىن بۇ بۆلۈڭنى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىدىن پايدىلىنىپ تاپىمىز.

يېشىش: 4.2.3 - رەسىمدىكىدەك، $AB=d, CD=c, BD=b, AC=a$.

ۋېكتور مەسىلىسىگە ئايلاندۇرىمىز

ۋېكتورلارنى قوشۇش قائىدىسىگە ئاساسەن،

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}.$$

ۋېكتور ئەمىلىنى بېجىرىمىز

$$\begin{aligned} d_2 = \overrightarrow{AB}^2 &= (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB})^2 \\ &= \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{CD}^2 + \overrightarrow{DB}^2 + 2(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{DB}) \\ &= a^2 + c^2 + b^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} \\ &= a^2 + c^2 + b^2 - 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{DB}. \end{aligned}$$

شۇنىڭ بىلەن تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{DB} = a^2 + b^2 + c^2 - d^2.$$

ۋېكتور $\overrightarrow{CA}$ بىلەن $\overrightarrow{DB}$ نىڭ ئارا بۆلۈڭىنى θ دەپ پەرەز قىلساق، θ ئامبارنىڭ ئاستى يۈزى بىلەن توسمىدىن ھاسىل بولغان ئىككى ياقلىق بۆلۈڭ بولىدۇ.

$$\therefore 2ab \cos \theta = a^2 + b^2 + c^2 - d^2.$$

ستېرېئومېتىرىدىكى ئارا بۆلۈڭلارنى ھامان ئىككى ۋېكتور-نىڭ ئارا بۆلۈڭىغا ئايلاندۇرۇۋېلىشقا بولىدۇ. ۋېكتور u ۋە v نىڭ ئارا بۆلۈڭى θ مۇناسىۋەت ئىپادىسى $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|}$ نى قانائەتلىمەندۈرىدۇ.

ستېرېئومېتىرىدە، ئارا بۆلۈڭغا دائىر مەسىلىلەرنى كۆپ ھاللاردا بوشلۇقتىكى ۋېكتورلارنىڭ سكاليار كۆپەيتىمىسىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشقا بولىدۇ.

$$\therefore \cos \theta = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - d^2}{2ab}$$

شەكىل مەسىلىسىگە قايتىمىز

ئامبارنىڭ ئاستى يۈزى بىلەن تۈسمىدىن ھاسىل بولغان ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتى


$$\frac{a^2 + b^2 + c^2 - d^2}{2ab} \text{ بولىدۇ.}$$

مۇلاھىزە؟


1. ئەگەر يۇقىرىقى مىسالدا AB نامەلۇم بولۇپ، ئارا بۇلۇڭ θ نى ئۆلچىگىلى بولسا ھەم قالغان شەرتلەر ئۆزگەرمىسە، AB نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ھېسابلاپ چىقىشقا بولامدۇ؟
2. ئەگەر بىر پاراللېل ئالتە ياقلىقنىڭ ھەرقايسى قىرلىرىنىڭ ۋە بىر دىئاگونالىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بېرىلسە ھەم ئۇنىڭ ئوخشاش بىر چوققىنى ئۈچ نۇقتا قىلغان ھەرقايسى قىرلىرىنىڭ ئارا بۇلۇڭى ئۆزئارا تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا ھەرقايسى قىرلارنىڭ ئارا بۇلۇڭىنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى ئېنىقلىغىلى بولامدۇ؟
3. ئەگەر بىر پاراللېل ئالتە ياقلىقنىڭ ھەرقايسى قىرلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئوخشاشلا a غا تەڭ ھەم ئۇنىڭ مەلۇم بىر چوققىنى ئۈچ نۇقتا قىلغان ھەرقايسى قىرلىرىنىڭ ئارا بۇلۇڭى ئوخشاشلا θ غا تەڭ بولسا، ئۇ ھالدا قوشنا ئىككى ياقنىڭ ئارا بۇلۇڭىنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى ئېنىقلىغىلى بولامدۇ؟

مەشىق

1. رەسىمىدىكىدەك، كۇب $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ دا، F, E لار ئايرىم - ئايرىم BB_1, CD لارنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، $AD \perp D_1F$ تەكشىلىك نى ئىسپاتلاڭ.



(2 - مىسال ئۈچۈن)




(1 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمىدىكىدەك، A, B لار 60° لۇق ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ قىرى ئۈستىدىكى ئىككى نۇقتا بولۇپ، تۈز سىزىق AC, BD لار ئايرىم - ئايرىم بۇ ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ ئىككى دانە يېرىم تەكشىلىكى ئۈستىدە ياتىدۇ ھەمدە ئۇلارنىڭ ھەر ئىككىسى AB غا تەڭ، ئەگەر $AB=4, AC=6, BD=8$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، CD نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.

ئەمدى 1.3 - پاراگرافنىڭ بېشىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلىنى ھەل قىلىمىز.

3 - مىسال. 5.2.3 - رەسىمىدىكىدەك، مۇنتىزىم ئۈچبۇلۇڭ شەكىللىك بىر پارچە تەكشى پولات تاختىنىڭ ماسسىسى 500 kg بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈچ چوققىسى ئايرىم - ئايرىم F_1, F_2, F_3 كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ، ھەربىر كۈچ بىلەن ئۈچبۇلۇڭنىڭ شۇ كۈچكە قوشنا بولغان ئىككى تەرىپىنىڭ ئارا




رەسىم - 5.2.3

بۇلۇڭى ئوخشاشلا 60° ھەمدە $|F_1| = |F_2| = |F_3| = 200 \text{ kg}$. بۇ پولات تاختا مۇشۇ كۈچلەرنىڭ تەسىرىدە قانداق ھەرىكەت قىلىدۇ؟ بۇ ئۈچ كۈچ كەم دېگەندە قانچىلىك بولغاندا، ئاندىن بۇ پولات تاختىنى كۆتۈرەلەيدۇ؟
تەھلىل: پولات تاختا ئۇچرايدىغان ئېغىرلىق كۈچى 500 kg بولۇپ، ئۈچبۇلۇڭنىڭ مەركىزى O غا تىك ھالدا تەسىر قىلىدۇ. ئەگەر ھەرقايسى چوققىلار ئۇچرىغان F_1, F_2, F_3 كۈچلەرنى ۋېكتور كۆرۈنۈشىدە ئىپادىلەپ، بۇ ئۈچ كۈچنىڭ تەڭ تەسىر قىلغۇچى كۈچىنى تاپالسا، پولات تاختىنىڭ ھەرىكەت ھالىتىگە ھۆكۈم قىلالايمىز.

يېشىش: 6.2.3 - رەسىمدىكىدەك، A نۇقتىنى كوئوردېنات بېشى، تەكشىلىك ABC نى xOy - ئوردېنات تەكشىلىكى، $\overrightarrow{AB}$ نىڭ يۆنىلىشىنى y ئوقىنىڭ ئوڭ يۆنىلىشى، $|\overrightarrow{AB}|$ نى y ئوقىنىڭ بىرلىك ئۇزۇنلۇقى قىلىپ بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى $Axyz$ نى تۇرغۇزساق، ئۇ ھالدا مۇنتىزىم ئۈچبۇلۇڭنىڭ چوققىلىرىنىڭ كوئوردېناتى ئايرىم - ئايرىم

$$A(0, 0, 0), B(0, 1, 0), C\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right).$$



رەسىم - 6.2.3

F_1 كۈچىنىڭ يۆنىلىشى ئۈستىدىكى بىرلىك ۋېكتورنىڭ كوئوردېناتىنى (x, y, z) دەپ پەرەز قىلساق، F_1 بىلەن $\overrightarrow{AB}$ لارنىڭ ئارا بۇلۇڭى 60° شاشلا بولغانلىقتىن، ۋېكتورلارنىڭ سكالېار كۆپەيتىمىسى ئەمىلىدىن پايدىلىنىپ تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2} = (x, y, z) \cdot (0, 1, 0), \quad (1)$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2} = (x, y, z) \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right). \quad (2)$$

①، ② لەرنى يېشىپ تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$x = -\sqrt{\frac{1}{12}}, \quad y = \frac{1}{2}.$$

ۋېكتور (x, y, z) نىڭ بىرلىك ۋېكتور ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلساق، $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ بولىدۇ، شۇڭا

$$z = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

$$\therefore F_1 = 200\left(-\sqrt{\frac{1}{12}}, \frac{1}{2}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

ئوخشاش يول بىلەن، تۆۋەندىكىلەرنى تاپالايمىز:

$$F_2 = 200\left(-\sqrt{\frac{1}{12}}, -\frac{1}{2}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

$$F_3 = 200\left(\sqrt{\frac{1}{3}}, 0, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

شۇنىڭ بىلەن، بۇ ئۈچ كۈچنىڭ تەڭ تەسىر قىلغۇچى كۈچى:

$$F_1 + F_2 + F_3$$

$$= 200\left[\left(-\sqrt{\frac{1}{12}}, \frac{1}{2}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right) + \left(-\sqrt{\frac{1}{12}}, -\frac{1}{2}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right) + \left(\sqrt{\frac{1}{3}}, 0, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)\right].$$

$$= 200(0, 0, \sqrt{6}),$$

F_2 ۋە F_3 نى كونكرېت ھېسابلاپ، ۋېكتورنى كوئوردېنات ئارقىلىق ئىپادىلەش بىلەن ۋېكتور ئەمەللىرىنىڭ قۇلايلىق تەرەپلىرىنى ھېس قىلىڭ.

بۇ يېشىش ئۇسۇلىدا، تار-
ماق كۈچ F_1, F_2, F_3 لەرنى
بوشلۇقتىكى ۋېكتور كۆرۈ-
نۈشىدە ئىپادىلەش مۇھىم
ھالقا بولۇپ، ۋېكتور ئەمىلى
بىلەن ۋېكتورنى كوئوردېنات
ئارقىلىق ئىپادىلەشنى ئۆزئارا
بىرلەشتۈرۈش مەسىلىنى ھەل
قىلىشىمىزغا قۇلايلىق يارىتىپ
بەردى.



بۇ، پولات تاختىغا تەسىر قىلغان تەسىر قىلغۇچى كۈچنىڭ
يۆنىلىشى يۇقىرىغا قارايدىغانلىقى، ئۇنىڭ چوڭلۇقى $200\sqrt{6}$ kg
بولۇپ، تەسىر قىلىش نۇقتىسى O ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.

$$200\sqrt{6} < 500$$

بولغانلىقتىن، پولات تاختا مىدىرماي تىنچ ھالەتتە تۇرىدۇ.

بۇ پولات تاختىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، $|F_1|, |F_2|, |F_3|$ لەرنى
ئوخشاشلا x دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا

$$\sqrt{6}x > 500$$

بولۇشى كېرەك، بۇنى يەشسەك:


$$x > \frac{500}{\sqrt{6}}.$$

شۇڭا، بۇ پولات تاختىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، $|F_1|, |F_2|, |F_3|$ لەرنىڭ ھەربىرى $\frac{500}{\sqrt{6}}$ kg دىن چوڭ
بولۇشى كېرەك.

ئىزدىنىش



بۇ مەسىلىنى كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزماي قانداق ھەل قىلىش كېرەك؟



رەسىم 7.2.3

4 - مىسال. 7.2.3 - رەسىمدىكىدەك، تۆت قىرلىق پىرامىدا
 $P-ABCD$ نىڭ ئاساسى $ABCD$ كۋادرات، يان قىرى PD ئاساسى
 $ABCD$ غا تىك، E نۇقتا PC نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى،
 $EF \perp PB$ بولۇپ، ئۇ PB بىلەن F نۇقتىدا كېسىشىدۇ.

(1) EDB تەكشىلىك $PA \parallel$ نى ئىسپاتلايلى؛

(2) EFD تەكشىلىك $PB \perp$ نى ئىسپاتلايلى؛


(3) ئىككى ياقلىق بۇلۇڭ $C-PB-D$ نىڭ گرادۇس سانىنى تاپايلى.

تەھلىل: بۇ مىسالنى يېشىشتە تۈز سىزىق بىلەن تەكشىلىكنىڭ
پاراللېللىقى ۋە تىكلىكىگە ھۆكۈم قىلىش ۋە ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ

گرادۇس سانىنى ھېسابلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. بۇ مەسىلىلەرنى ۋېكتور ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ھەل
قىلىشقا بولىدۇ. مىسالدا تۆت قىرلىق پىرامىدانىڭ ئاساسى كۋادرات، ئۇنىڭ بىر يان قىرى ئاساسىغا
تىك دەپ بېرىلگەنلىكتىن، بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇپ ۋېكتورنى
ئىپادىلەسەك ناھايىتى مۇۋاپىق بولىدۇ.

يېشىش: 8.2.3 - رەسىمدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۈز-
غۇزۇپ، D نۇقتىسىنى كوئوردېنات بېشى قىلىپ ئالىمىز ھەم $DC=1$ دەپ پەرەز قىلىمىز.

(1) ئىسپات: A بىلەن C نى تۇتاشتۇرساق، AC بىلەن BD ئۆزئارا G نۇقتىدا كېسىشىدۇ، يەنە E



رەسىم 8.2.3 -

بىلەن G نى تۇتاشتۇرىمىز.

مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن $P(0, 0, 1)$ ، $A(1, 0, 0)$

$E(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ لارغا ئېرىشىمىز.

ئاساس $ABCD$ كۆادرات بولغانلىقى ئۈچۈن، G نۇقتا بۇ كۆادراتنىڭ مەركىزى بولىدۇ، شۇڭا G نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى

$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ھەمدە

$$\overrightarrow{PA} = (1, 0, -1), \overrightarrow{EG} = (\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}).$$

شۇڭا $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{EG}$ ، يەنى $PA \parallel EG$.

EGB تەكشىلىك $EG \subset$ ھەمدە EGB تەكشىلىك $PA \not\subset$

بولغاچقا، EGB تەكشىلىك $PA \parallel$ بولىدۇ.

(2) ئىسپات: مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن $B(1, 1, 0)$ ، $\overrightarrow{PB} = (1, 1, -1)$ غا ئېرىشىمىز.

يەنە $\overrightarrow{DE} = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ، شۇڭا

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DE} = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

$$\therefore PB \perp DE.$$

بېرىلگەن شەرت $EF \perp PB$ ھەمدە $EF \cap DE = E$ گە ئاساسەن، EFD تەكشىلىك $PB \perp$ كە ئېرىشىمىز.

(3) يېشىش: $PB \perp EF$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن، (2) دىن $PB \perp DF$ نى بىلىشكە بولىدۇ، شۇڭا $\angle EFD$ ئىككى ياقلىق بۇلۇڭ $C-PB-D$ نىڭ سىزىقلىق بۇلۇڭى بولىدۇ.

F نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى (x, y, z) دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا $\overrightarrow{PF} = (x, y, z-1)$ بولىدۇ.

$$\therefore \overrightarrow{PF} = k\overrightarrow{PB},$$

$$\therefore (x, y, z-1) = k(1, 1, -1) = (k, k, -k),$$

$$y = k, z = 1 - k, x = k.$$

$$\therefore \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DF} = 0,$$

$$\therefore (1, 1, -1) \cdot (k, k, 1-k) = k + k - 1 + k = 3k - 1 = 0.$$

شۇڭا، $k = \frac{1}{3}$ بولۇپ، F نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ بولىدۇ.

E نۇقتىنىڭ كوئوردېناتى $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ بولغانلىقتىن،

$$\overrightarrow{FE} = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}).$$

$$\therefore \cos \angle EFD = \frac{\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{FD}}{|\overrightarrow{FE}| |\overrightarrow{FD}|}$$

$$= \frac{(-\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}) \cdot (-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})}{\frac{\sqrt{6}}{6} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}.$$


شۇنىڭ ئۈچۈن $\angle EFD = 60^\circ$ ، يەنى ئىككى ياقلىق بۇلۇڭ $C-PB-D$ نىڭ گرادۇس سانى 60° بو-
لىدۇ.

مۇلاھىزە؟

4.1 - مىسالدىكى ئۇسۇلدا كوئوردېنات ئۇسۇلى بىلەن ۋېكتور ئۇسۇلىنىڭ قانداق بىرلەشتۈرۈلگەنلىكىنى، كوئوردېنات سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇشنىڭ مەسىلىنى يېشىشتە قانداق رول ئوينىدىغانلىقىنى ھېس قىلىڭ.

4.2 - مىسالنى سىنىپ ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ قانداق يېشىش كېرەك؟ سىنىپ ئۇسۇلى بىلەن 4 - مىسالدىكى ئۇسۇلنى سېلىشتۇرۇپ بېقىڭ.


بۇ پاراگرافتىكى مەزمۇنلارنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، ستېرېئومېتىرىيىدىكى ۋېكتور ئۇسۇلى ھەققىدە بەلگىلىك تونۇشقا ئىگە بولىدىغىزمۇ؟ دەرسلىكتە كەلتۈرۈلگەن مىساللار ۋە تۆۋەندىكى رامكىلىق سخېمىغا بىرلەشتۈرۈپ، چۈشەنچىڭىزنى سۆزلەپ بېرىڭ.



ستېرېئومېتىرىيىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا، سىنىپ ئۇسۇلى، ۋېكتور ئۇسۇلى، كوئوردېنات ئۇسۇلىدىن ئىبارەت ئۈچ خىل ئۇسۇلنى قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇ ئۇسۇللارنىڭ ھەرقايسىسىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز؟

سىنىپ ئۇسۇلىدا مەسىلىلەرنى لوگىكىلىق خۇلاسە چىقىرىشنى قورال قىلىپ ھەل قىلىمىز؛ ۋېكتور ئۇسۇلىدا مەسىلىلەرنى ۋېكتور ئۇقۇمى ۋە ۋېكتور ئەمىلىدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىمىز، مەسىلەن، مۇشۇ پاراگرافتا كەلتۈرۈلگەن 1، 2 - مىساللار؛ كوئوردېنات ئۇسۇلىدا مەسىلىلەرنى سان ۋە سانلارنى ھېسابلاشتىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىمىز؛ كوئوردېنات ئۇسۇلىنى كۆپ ھاللاردا ۋېكتور ئەمىلى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىمىز، مەسىلەن، مۇشۇ پاراگرافتا كەلتۈرۈلگەن 3 - مىسالدىكى كونكرېت مەسىلەلەرنى يېشىشتە، مەسىلىنىڭ كونكرېت شەرتى ۋە ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن مۇۋاپىق ئۇسۇلنى تاللاش كېرەك.

مەشىق




(1 - مىسال ئۈچۈن)


1. رەسىمدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $ABCD$ نىڭ ھەر بىر تەرىپى ۋە BD ، AC لارنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئوخشاشلا a غا تەڭ بولۇپ، M ، N لار ئايرىم - ئايرىم AB ۋە CD نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، $MN \perp CD$ ، $MN \perp AB$ نى ئىسپاتلاڭ.

2. رەسىمدىكىدەك، ئىككى ئۇچراشماس تۈز سىزىق a ، b دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭ θ بولۇپ، تۈز سىزىق a ، b نىڭ ئۈستىدىن ئايرىم - ئايرىم AA' ، $AA' \perp b$ ، $AA' \perp a$ ئۇچراشماس تۈز سىزىق a ، b نىڭ ئورتاق تىك

سزىقى دېيىلىدۇ) بولىدىغان قىلىپ A' ، E ۋە A ، F نۇقتىلار ئېلىنغان ھەمدە $A'E=m$ ، $AF=n$ ، $EF=l$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ئورتاق تىك سىزىق AA' نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.



(3 - مىسال ئۈچۈن)



(2 - مىسال ئۈچۈن)

3. رەسىمىدىكىدەك، كۆپ $ABCD-A'B'C'D'$ بېرىلگەن بولۇپ، CB' ، BC' لار O نۇقتىدا كېسىشىدۇ، D بىلەن O تۇتاشتۇرۇلغان. $DO \perp BC'$ نى ئىسپاتلاڭ.


2.3 - كۆنۈكمە

A گۈرۈپپا


1. رەسىمىدىكىدەك، M ، N لار ئايرىم - ئايرىم كۆپ $ABCD-A'B'C'D'$ نىڭ BB' ، $B'C'$ قىرلىرىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

(1) MN ۋە CD' دىن ھاسىل بولغان بۆلۈشنىڭ گرادۇس سانى؛

(2) MN ۋە AD دىن ھاسىل بولغان بۆلۈشنىڭ گرادۇس سانى.




(2 - مىسال ئۈچۈن)




(1 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمىدىكىدەك، كۆپ $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ بېرىلگەن. ACD_1 تەكشىلىك $DB_1 \perp$ نى ئىسپاتلاڭ.

3. رەسىمىدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $OABC$ دا، $OB=OC$ ، $\angle AOB=\angle AOC=\theta$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. $OA \perp BC$ نى ئىسپاتلاڭ.



(4 - مىسال ئۈچۈن)




(3 - مىسال ئۈچۈن)

4. رەسىمىدىكىدەك، كۇب $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ دا، E, F, G, H, L لار ئايرىم - ئايرىم $AB, BB_1, DA, D_1D, C_1D_1, B_1C_1$ قىرلارنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن.
(1) $EFGHKL$ تەكشىلىك $A_1C \perp$ نى ئىسپاتلاڭ؛


(2) DB_1 بىلەن $EFGHKL$ تەكشىلىكتىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تېپىڭ.
5. رەسىمىدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $OABC$ نىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرى ۋە BO, AC لارنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئوخشاشلا 1 گە تەڭ، E, D لار ئايرىم - ئايرىم OA, BC تەرەپلەرنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى، D بىلەن E تۇتاشتۇرۇلغان.

(1) DE نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ھېسابلاڭ؛

(2) O نۇقتىدىن ABC تەكشىلىكىگىچە بولغان ئارىلىقنى تېپىڭ.



(6 - مىسال ئۈچۈن)



(5 - مىسال ئۈچۈن)

6. $\triangle ABC$ ۋە $\triangle DBC$ ياتقان تەكشىلىكلەر ئۆزئارا تىك ھەمدە $AB=BC=BD$ ، $\angle CBA=\angle DBC=120^\circ$ ، ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

(1) AD تۈز سىزىق بىلەن BCD تەكشىلىكتىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ گرادۇس سانى؛

(2) AD تۈز سىزىق بىلەن BC تۈز سىزىقتىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ گرادۇس سانى؛


(3) ئىككى ياقلىق بۇلۇڭ $A-BD-C$ نىڭ كوسىنوس قىممىتى.

7. $A(1, -2, 0)$ نۇقتا ۋە ۋېكتور $a=(-3, 4, 12)$ بېرىلگەن، ۋېكتور $\overrightarrow{AB} \parallel a$ ھەمدە $|AB|=2|a|$ نى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان B نۇقتىنىڭ كوئوردىناتىنى تېپىڭ.


8. تەرەپ ئۇزۇنلۇقى $2a$ بولغان $ABCD$ كۋادراتنىڭ مەركىزى O ئارقىلىق $ABCD$ تەكشىلىكىنىڭ تىك سىزىقى ئۆتكۈزۈلۈپ، بۇ تىك سىزىق ئۈستىدىن $OV=h$ بولىدىغان قىلىپ V نۇقتا ئېلىنغان، ئاندىن V بىلەن A, V بىلەن B, V بىلەن C, V بىلەن D تۇتاشتۇرۇلۇپ، VC نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى E ئېلىنغان.
(1) $\cos \langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle$ نى تېپىڭ؛

(2) ئەگەر $BE \perp VC$ بولسا، $\cos \langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle$ نى تېپىڭ.

9. رەسىمىدىكىدەك، كۇب $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ نىڭ قىر ئۇزۇنلۇقى 1، M نۇقتا AA_1 قىرىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى، O بولسا BD_1 نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى. OM نىڭ ئۇچراشماس تۈز سىزىق AA_1 ۋە BD_1 نىڭ ئورتاق تىك سىزىقى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاڭ ھەم OM نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.



(10 - مىسال ئۈچۈن)



(9 - مىسال ئۈچۈن)


10. رەسىمىدىكىدەك، AB كېسىك α تەكشىلىكتە ياتىدۇ، $BD \perp AB$ ، $AC \perp \alpha$ ھەمدە $AB=7$ ، $CD=25$ ، $AC=BD=24$ كېسىك BD بىلەن α تەكشىلىكتىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنى تېپىڭ.

11. تىك ئۈچ قىرلىق پىرىزما (يان قىرى ئاساسىغا تىك بولغان ئۈچ قىرلىق پىرىزما) $ABO-A'B'O'$ دا، $\angle AOB=90^\circ$ ، $OB=3$ ، $OA=4$ ، $OO'=4$ بولسا يان قىر BB' نىڭ ئۈستىدىكى نۇقتا ھەمدە $OP \perp BD$ بولسا، OP بىلەن AOB ئاساستىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭ. نىڭ تانگېنس قىممىتىنى تېپىڭ.


12. بىر كېسەك بىر تىك ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ ئىككى دانە يېرىم تەكشىلىكىنىڭ ئارىلىقىدا بولۇپ، ئۇ. نىڭ بىلەن بۇ ئىككى دانە يېرىم تەكشىلىكتىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭلار ئوخشاشلا 30° لۇق بۇلۇڭ بولسا، بۇ كېسەك بىلەن مۇشۇ ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ قىرىدىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ گرادۇس سانىنى تېپىڭ.

B گۇرۇپپا

1. رەسىمدىكىدەك، تۆت ياقلىق $DABC$ دا، $AB=BC=2$ ، BD ، BC ، AB لار ئىككى - ئىككىدىن تىك ھەمدە AC نۇقتا E نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى؛ θ بولسا ئۇچراشماس تۈز سىزىق AD ۋە BE دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭ ھەمدە $\cos \theta = \frac{\sqrt{10}}{10}$. تۆت ياقلىق $DABC$ نىڭ ھەجىمىنى تېپىڭ.



(2 - مىسال ئۈچۈن)




(1 - مىسال ئۈچۈن)

2. رەسىمدىكى تەجرىبە قۇرۇلمىسىدا، كۇادرات شەكىللىك رامكىنىڭ تەرەپ ئۇزۇنلۇقى 1 ھەمدە $ABCD$ تەكشىلىك بىلەن $ABEF$ تەكشىلىك ئۆزئارا تىك. ھەرىكەتچان شارىك M ، N لار ئايرىم - ئايرىم كۇادراتنىڭ AC ۋە BF دىئاگونالى ئۈستىدە يۆتكىلىدۇ ھەمدە ئىككى شارنىڭ يۆتكىلىش جەريانىدا BN ، CM لارنىڭ ئۇزۇنلۇقى باشتىن - ئاخىر تەڭ بولىدۇ، بۇ ئۇزۇنلۇق $CM=BN=a$ ($0 < a < \sqrt{2}$) دەپ خاتىرىلەنگەن.

(1) MN نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ؛

(2) a قانداق قىممەتنى ئالغاندا، MN نىڭ ئۇزۇنلۇقى ئەڭ كىچىك بولىدۇ؟

(3) MN نىڭ ئۇزۇنلۇقى ئەڭ كىچىك بولغان چاغدىكى MNA تەكشىلىك بىلەن MNB تەكشىلىكتىن ھاسىل بولغان ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تېپىڭ.



(3 - مىسال ئۈچۈن)

3. رەسىمدىكىدەك، قىر ئۇزۇنلۇقى a بولغان كۇب $OABC-O'A'B'C'$ دا، E ، F لار ئايرىم - ئايرىم AB ، BC قىرلارنىڭ ئۈستىدىكى ھەرىكەتچان نۇقتا ھەمدە $AE=BF$.


(1) $A'F \perp C'F$ نى ئىسپاتلاڭ؛

(2) ئۈچ قىرلىق پىرامىدا $B'-BEF$ نىڭ ھەجىمى ئەڭ چوڭ قىممەت ئالغان

چاغدىكى ئىككى ياقلىق بۇلۇڭ $B'-EF-B$ نىڭ تانگېنس قىممىتىنى تېپىڭ.

خۇلاسە

I بۇ بابتىكى بىلىملەرنىڭ قۇرۇلما سىخېمىسى



II ئەسلىھەش ۋە مۇلاھىزە


1. بوشلۇقتىكى ۋېكتور تەكشىلىكتىكى ۋېكتورنىڭ كېڭەيتىلىشىدىن بارلىققا كەلگەنلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭ بىلەن تەكشىلىكتىكى ۋېكتور نۇرغۇنلىغان ئورتاق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە. ئەگەر تەكشىلىكنى ئىككى ئۆلچەملىك بوشلۇق، ئادەتتىكى بوشلۇقنى ئۈچ ئۆلچەملىك بوشلۇق دەپ قارىساق، ئۇ ھالدا ۋېكتور ئۇقۇمىنى تۆت ئۆلچەملىك (مەسىلەن، «ئۈزۈنلۈك»، «كەڭلىك»، «ئېگىزلىك»، «ۋاقىت» قاتارلىق تۆت ئۆلچەمدىن ھاسىل قىلىنغان بوشلۇق)، بەش ئۆلچەملىك، قاتارلىق «بوشلۇق» لارغا كېڭەيتىشكە بولامدۇ؟

2. بوشلۇق ۋېكتورلىرى ئۈستىدىكى ئەمەل قائىدىسى گېئومېترىيىلىك ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ كىرگۈزۈلگەن، مەسىلەن، ۋېكتورلارنى قوشۇشنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسى دېگەندەك. بوشلۇقتىكى تەك بۇلۇڭلۇق كوردېنات سىستېمىسىدا، گېئومېترىيىلىك ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ كىرگۈزۈلگەن ۋېكتور ئەمىلىنى يەنە ئالگېبرالىق ئەمەل (ھەقىقىي سانلار ئۈستىدە ئەمەل) گە ئايلاندۇرۇۋېلىشقا بولىدۇ. سىز بۇنىڭ بوشلۇقتىكى ۋېكتورلار ئۈستىدە ئەمەل بېجىرىشىمىزگە ئېلىپ كېلىدىغان قۇلايلىق تەرەپلىرىنى ھېس قىلالامسىز؟

3. ساۋاقداشلار سانلار ئۈستىدە ئەمەل بېجىرىشكە ئادەتلەنگەن، ۋېكتور سانغا ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭدىمۇ بىر ئەمەل سىستېمىسىنى ھاسىل قىلىشقا بولىدۇ، شۇڭا ۋېكتورنى «سان، مىقدار، ئەمەل» نىڭ تەرەققىيات تۇرغۇسىدىن چىقىپ چۈشىنىش كېرەك. سانلار ئۈستىدىكى ئەمەل قانۇنلىرىنىڭ قايسىلىرى ۋېكتور ئەمىلىگە نىسبەتەن يەنىلا كۈچكە ئىگە؟ قايسىلىرى كۈچكە ئىگە ئەمەس؟

4. ستېرېئومېترىيىلىك مەسىلىلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشتا، ئالدى بىلەن نۇقتا، تۈز سىزىق، تەكشىلىكنىڭ بوشلۇقتىكى ئورنى ۋە ئۇلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بوشلۇق.

تىكى ۋېكتوردىن پايدىلىنىپ قانداق ئىپادىلەش ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك. باشقىچە ئېيتقاندا، ستېرېئومېتىرىيەلىك مەسىلىلەرنى بوشلۇقتىكى ۋېكتور مەسىلىسىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. بۇ بابتىكى بىلىملەرنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، ستېرېئومېتىرىيەلىك ۋېكتور ئۇسۇلى ھەققىدە قانداق تونۇشقا ئىگە بولىدىغىز؟ تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرىدا بېرىلگەن كونكرېت مىساللارغا بىرلەشتۈرۈپ، چۈشەنچىڭىزنى سۆزلەپ بېقىڭ. 5. بۇ بابتىكى بىلىملەرنى ئۆگىنىش جەريانىنى ئەسلىڭ، ماتېماتىكىلىق يېڭى بىلىملەرنى ئۆگىنىش، مەسىلىلەرنى ماتېماتىكىلىق بىلىملەردىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشتىكى ئىدىيە ۋە ئۇسۇللار ھەققىدە قانداق تونۇشقا ئىگە بولىدىغىز؟ تۆۋەندىكى لوگىكىلىق سىخىمغا بىرلەشتۈرۈپ، چۈشەنچىڭىزنى سۆزلەپ بېقىڭ.




تەكرارلاشتا پايدىلىنىش مىساللىرى


A گۇرۇپپا

1. رەسىمىدىكىدەك، بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $OABC$ دا، $\vec{OA} = \mathbf{a}$ ، $\vec{OB} = \mathbf{b}$ ، $\vec{OC} = \mathbf{c}$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. ئەگەر M نۇقتا OA ئۈستىدىكى نۇقتا ھەمدە $OM = 2MA$ بولۇپ، N نۇقتا BC نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، ئۇ ھالدا $\vec{MN} = (\quad)$ بولىدۇ.

- (A) $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c}$ (B) $-\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c}$
 (C) $\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{c}$ (D) $\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{c}$



(2 - مىسال ئۈچۈن)




(1 - مىسال ئۈچۈن)


2. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىق $ABCD - A'B'C'D'$ دا، $\vec{AB} = \mathbf{a}$ ، $\vec{AD} = \mathbf{b}$ ، $\vec{AA'} = \mathbf{c}$ بولۇپ، M ، P ، N لار ئايرىم - ئايرىم CA' ، CD' ، $C'D'$ لارنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى، Q نۇقتا CA' نىڭ ئۈستىدىكى نۇقتا ھەمدە $CQ : QA' = 4 : 1$ بولسا، تۆۋەندىكى ۋېكتورلارنى بازىس $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ بىلەن ئىپادىلەڭ.

- (1) $\vec{AP}$; (2) $\vec{AM}$; (3) $\vec{AN}$; (4) $\vec{AQ}$.

3. رەسىمىدىكىدەك، تىك ئۈچ قىرلىق پىرىزما $ABC - A_1B_1C_1$ دا، $\angle ABC = 90^\circ$ ، $CB = 1$ ، $CA = 2$ ، $AA_1 = \sqrt{6}$ بو. لۇپ، M نۇقتا CC_1 نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا، $AM \perp BA_1$ نى ئىسپاتلاڭ.



(4 - مىسال ئۈچۈن)



(3 - مىسال ئۈچۈن)

4. رەسىمىدىكىدەك، مۇنتىزىم ئۈچ قىرلىق پىرىزما (ئاساسى مۇنتىزىم ئۈچبۇلۇڭ بولغان تىك پىرىزما) $ABC - A_1B_1C_1$ نىڭ ئاساسىنىڭ تەرەپ ئۇزۇنلۇقى a ، يان قىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى $\sqrt{2}a$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

- (1) مۇۋاپىق كوئوردېنات سىستېمىسى تۇرغۇزۇپ، A ، B ، A_1 ، C_1 نۇقتىلارنىڭ كوئوردېناتىنى يېزىڭ;
 (2) AC_1 بىلەن يان ياق ABB_1A_1 دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنى تېپىڭ.
 5. بوشلۇقتا $A(0, 2, 3)$ ، $B(-2, 1, 6)$ ، $C(1, -1, 5)$ ئۈچ نۇقتا بېرىلگەن.
 (1) AC ، AB لارنى تەرەپ قىلغان پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ يۈزىنى تېپىڭ;
 (2) ئەگەر a ۋېكتور ئايرىم - ئايرىم $\vec{AB}$ ، $\vec{AC}$ غا تىك ھەمدە $|\mathbf{a}| = \sqrt{3}$ بولسا، a نىڭ كوئوردېناتىنى تېپىڭ.

6. بوشلۇقتىكى ئىككى بىرلىك ۋېكتور $\vec{OA} = (m, n, 0)$ ، $\vec{OB} = (0, n, p)$ بىلەن ۋېكتور $\vec{OC} = (1, 1, 1)$ نىڭ ئارا

بۇلۇڭلىرى ئوخشاشلا $\frac{\pi}{4}$ گە تەڭ بولسا، $\cos \angle AOB$ نىڭ قىممىتىنى تېپىڭ.

7. ۋېكتور $a = (1, 1, 0)$ ، $b = (-1, 0, 2)$ ھەمدە $ka + b$ بىلەن $2a - b$ نىڭ ئۆزئارا تىك ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا $k = (\quad)$ بولىدۇ.

- (A) 1 (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{7}{5}$

8. $b = (2, t, t)$ ، $a = (1 - t, 2t - 1, 0)$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، ئۇ ھالدا $|b - a|$ نىڭ ئەڭ كىچىك قىممىتى $(\quad)$ بولىدۇ.

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$


9. مۇنتىزىم ئۈچ قىرلىق پىرىزما $ABC - A_1B_1C_1$ نىڭ يان قىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 2، ئاساسىنىڭ تەرەپ ئۇزۇنلۇقى 1 بولۇپ، M نۇقتا BC نىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۈز سىزىق CC_1 ئۈستىدىن $MN \perp AB_1$ بولىدىغان قىلىپ بىر N نۇقتىنى تېپىڭ.

10. رەسىمدىكىدەك، قىر ئۇزۇنلۇقى 1 بولغان كۇب $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ دا، G, F, E لار ئايرىم - ئايرىم DD_1, BB_1, BD لارنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن.


(1) $EF \perp CF$ نى ئىسپاتلاڭ؛

(2) EF بىلەن CG دىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تېپىڭ؛

(3) CE نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ.



(11 - مىسال ئۈچۈن)



(10 - مىسال ئۈچۈن)


11. رەسىمدىكىدەك، تىك ئۈچ قىرلىق پىرىزما $ABC - A_1B_1C_1$ نىڭ ئاساسى ABC دا، $CA = CB = 1$ ، $\angle BCA = 90^\circ$ ، $AA_1 = 2$ بولۇپ، N, M لار ئايرىم - ئايرىم AA_1, A_1B_1 لارنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

(1) BN نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تېپىڭ؛


(2) $\cos \langle \vec{BA_1}, \vec{CB_1} \rangle$ نىڭ قىممىتىنى تېپىڭ؛

(3) $A_1B \perp C_1M$ نى ئىسپاتلاڭ.

12. رەسىمدىكىدەك، كۇۋادرات شەكىللىك بىر ۋاراق قەغەزنى $ABCD$ نى AC دىئاگونالى بويىچە قاتلاپ ئىككى ياقلىق بۇلۇڭ ھاسىل قىلىنغان، E, F لار ئايرىم - ئايرىم BC, AD لارنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى، O نۇقتا ئەسلىدىكى كۇۋادرات $ABCD$ نىڭ مەركىزى. قاتلانغاندىن كېيىنكى $\angle EOF$ نىڭ گرادۇس سانىنى تېپىڭ.



(13 - مىسال ئۈچۈن)



(12 - مىسال ئۈچۈن)

13. رەسىمىدىكىدەك H, G, F, E لار ئايرىم - ئايرىم بوشلۇقتىكى تۆت تەرەپلىك $ABCD$ نىڭ DA, CD, BC, AB تەرەپلىرىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

- (1) H, G, F, E تۆت نۇقتىنىڭ تەكشىلىكداش بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ؛
- (2) $EFGH$ تەكشىلىك $BD \parallel$ نى ئىسپاتلاڭ؛
- (3) M نى EG بىلەن FH نىڭ كېسىشىش نۇقتىسى دەپ پەرەز قىلىپ، بوشلۇقتىكى خالىغان بىر O نۇقتىغا نىسبەتەن



$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$$

بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

B گۇرۇپپا


1. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېل ئالتە ياقلىق $ABCD-A'B'C'D'$ نىڭ ئاساسى $ABCD$ تەرەپ ئۇزۇنلۇقى a بولغان كۇادرات بولۇپ، يان قىرى AA' نىڭ ئۇزۇنلۇقى b ھەمدە $\angle A'AB = \angle A'AD = 120^\circ$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن. تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

- (1) AC' نىڭ ئۇزۇنلۇقى؛
- (2) تۈز سىزىق BD' بىلەن AC نىڭ ئارا بۆلۈشنىڭ كوسىنوس قىممىتى.



2. رەسىمىدىكىدەك، پاراللېلېپېد $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ دا، F, E نۇقتىلار ئايرىم - ئايرىم DD_1, BB_1 لەرنىڭ ئۈستىدە ياتىدىغانلىقى ھەمدە $AF \perp A_1D, AE \perp A_1B$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

- (1) AEF تەكشىلىك $A_1C \perp$ نى ئىسپاتلاڭ؛
- (2) $AA_1=5, AD=3, AB=4$ بولغان چاغدىكى AEF تەكشىلىك بىلەن D_1B_1BD تەكشىلىكتىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى تېپىڭ.



3. رەسىمىدىكىدەك، تۆت قىرلىق پىرامىدا $S-ABCD$ نىڭ ئاساسى $ABCD$ تىك بۇلۇڭلۇق تراپېتسىيە بولۇپ، $AB \perp BC, AB \perp AD$ ، ئاساس $ABCD$ $SA \perp$ يان قىر، $AD=0.5, SA=AB=BC=1$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

- (1) تۆت قىرلىق پىرامىدا $S-ABCD$ نىڭ ھەجىمىنى تېپىڭ؛
- (2) SCD ياق بىلەن SAB ياقىتىن ھاسىل بولغان ئىككى ياقلىق بۇلۇڭنىڭ گرادۇس سانىنى تېپىڭ.

(3 - مىسال ئۈچۈن)

خاتىمە

پارتىيىنىڭ مائارىپ فاڭجېنىنى ئۇمۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇش ھەمدە دەۋر تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجىغا ماسلىشىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆمۈر بويى تەرەققىي قىلىشىغا ئاساس ھازىرلاش ئۈچۈن، مائارىپ مىنىستىرلىكى بېكىتكەن ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ھەرقايسى پەنلەر دەرس ئۆلچەملىرى (تەجرىبە نۇسخا) گە ئاساسەن، ھەرقايسى پەنلەرنىڭ ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ دەرس ئۆلچىمى تەجرىبە دەرسلىكلىرىنى تۈزۈپ چىقتۇق، تۈزۈش جەريانىدا مائارىپ ساھەسىدىكى كۆپلىگەن پېشقەدەملەر ۋە ھەرقايسى پەن دەرسلىكلىرى دەرس ئىسلاھاتى تەجرىبە رايونلىرىدىكى ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىلار بىلەن ئاخىر يۈز كۆرۈشكەن بۇ پەيتتە، دەرسلىكلەرنىڭ باش مەسلىھەتچىسى بولغان دىڭ شىسۇن، شۈ جىياڭ، يې جىشەن، گۇ مىڭيۈەن، لۇ شىڭۋېي، ۋاڭ زىكۇن، لياڭ خېڭ، جىن چۇڭجى، بەي چۈنلى، تاۋ شىپىڭ قاتارلىق يولداشلارغا ئالاھىدە رەھمەت ئېيتىمىز، شۇنداقلا دەرسلىك تۈزۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش كۈمبىتىنىڭ مۇدىرى يولداش لىيۇ بىن ۋە كومىتېت ئەزالىرى جياڭ لەنشياڭ، لى جىلىن، ياڭ خۇەن-مىڭ، گۇ لىڭيۈەن، يۈەن خاڭيېي قاتارلىق يولداشلارغىمۇ مىننەتدارلىق بىلدۈرىمىز.

بىز بېيجىڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى پروفېسسور لىيۇ شاۋشۈنى باش تۈزگۈچىلىككە تەكلىپ قىلىپ، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ماتېماتىكا دەرس ئۆلچىمىنى تەتقىق قىلىپ تۈزۈش گۇرۇپپىسىدىكى بىر قىسىم ئەزالار، ئالىي مەكتەپ ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىلىرى، ماتېماتىكا تەلىم - تەربىيە نەزەرىيىسى خىزمەت خادىملىرى، ئوتتۇرا مەكتەپ ماتېماتىكا ئوقۇتۇش تەتقىقاتى خادىملىرى ۋە ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىلىرىدىن تۈزۈش كومىتېتى تەشكىللەپ، مائارىپ مىنىستىرلىكى بېكىتكەن «ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ماتېماتىكا دەرس ئۆلچىمى (تەجرىبە نۇسخا)» گە ئاساسەن، بۇ بىر يۈرۈش ماتېماتىكا تەجرىبە دەرسلىكىنى تۈزۈپ چىقتۇق. بۇ يەردە، بېيجىڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ماتېماتىكا پېنى ئىنستىتۇتى رەھبەرلىرىنىڭ بۇ بىر يۈرۈش دەرسلىكىنى تۈزۈش خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بەرگەنلىكى ۋە زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا ئالاھىدە رەھمەت ئېيتىمىز، شۇنداقلا مۇشۇ بىر يۈرۈش دەرسلىككە تۈزىتىش پىكرى بەرگەن ۋە ياردىمىنى ئايمىغان مۇتەخەسسس، ئالىم، ئوقۇتقۇچى ھەمدە جەمئىيەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلىرىدىكى دوستلارغا مىننەتدارلىق بىلدۈرىمىز.

بۇ قىسىم دەرسلىك، تۈزۈش كومىتېتىدىكى بارلىق ئەزالارنىڭ كۈللۈك تەلپىتىگە ئېرىشكەن پاراسىتىنىڭ نەتىجىسىدۇر. دەرسلىككە بېرىلگەن ئاساسلىق تۈزگۈچىلەردىن سىرت، بۇ قىسىم دەرسلىكىنى مۇزاكىرە قىلىشقا قاتناشقانلاردىن لىيۇ يىجۇ، سۇڭ لىلى، لى لۇڭسەي، جاڭ شۈمېي، لى يۇڭ، لى جىيەنخۇا، شۈ يۇڭ، لۇ ۋېيچۈەن قاتارلىقلار بار.

بىز يەنە مۇشۇ بىر يۈرۈش ئوقۇتۇش ماتېرىيالىنى ئىشلىتىۋاتقان ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىلارغىمۇ رەھمەت ئېيتىمىز. سىلەرنىڭ بۇ بىر يۈرۈش ئوقۇتۇش ماتېرىيالىنى ئىشلىتىش جەريانىدا پىكىر ۋە تەكلىپلەرنى بىزگە ئۆز ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز، شۇنداقلا سىلەرگە چوڭقۇر مىننەتدارلىق بىلدۈرىمىز. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ ئوقۇتۇش ماتېرىيالى قۇرۇلۇش خىزمىتىنى بىرلىكتە ئورۇندايلى.

ئالاقىلىشىش شەكلى:


Tel: (010) 58758321

E-mail: zhangjs@pep.com.cn

خەلق مائارىپ نەشرىياتى دەرس ۋە ئوقۇتۇش ماتېرىيالى تەتقىقات ئورنى
ئوتتۇرا مەكتەپ ماتېماتىكا دەرسى ۋە ئوقۇتۇش ماتېرىيالى تەتقىقات - ئېچىش مەركىزى



ISBN 978-7-5370-7295-3



9 787537 072953 >

بھاسی: 8.22 یوہن