

تۇردى مۇھەممەت ئاخۇن

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى قوللانمىسى

AltunOq

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىگى قوللانمىسى

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلدى

شىنجاڭ شىنخۇا باسما زاۋۇدىدا بېسىلدى

شىنجاڭ شىنخۇا كىتاپخانىسى تارقىتىدۇ

1977 - يىل 12 - ئاي 1 - نەشرى

1977 - يىل 12 - ئاي 1 - بېسىلىشى

كىتاپ نومۇرى: M14098.23 باھاسى: 1.73 يۈەن

كېرىش سوز

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلمى ۋە تىنىمىزنىڭ ئۇلۇغ مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ بىرى بولغان جۇڭگىيى تىبابىتى - نىڭ تەركىۋى قىسمىدىن ئىبارەت. ئۇ - ئۇيغۇر ئەمگەكچى - لىرىنىڭ تەبىئەتكە قارشى، ئاغرىق - سىلاقلارغا قارشى ئېلىپ باغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشلىرى جەريانىدا بارلىققا كەلگەن ۋە راۋاجلانغان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئەگە. ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇ، جۇڭگىيى تىبابىتى، شىزاڭ تىبابىتى بىلەن، شۇنىڭدەك ئەرەپ، يۇنان، ھىندىستان تىبابەتچىلىك ئىلىملىرى بىلەن ئۆز ئارا تەسىر، كۆرسىتىش ئۆزئارا ئۆگىنىش ئارقىلىق تەدرىجىي بېيىپ، تاكامۇللىشىپ ئۆزىگە خاس نەزىرىيە تىشىسى شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، تارىختىن بۇيان شىنجاڭدىكى ھەر قايسى قېرىنداش مىللەت خەلقلەرنىڭ ساقلىقنى ساقلاش، كېسەللىكلەرگە قارشى تۇرۇش كۈرەشلىرىدە تايانغان ئاساسىي تىبابەتچىلىك ئىلمى بولۇپ كەلدى.

فېوداللىق جەمىيەتتە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىنىڭ تەدرىجىي زور چەكلىمىگە ئۇچرىغان. بولۇپمۇ گومىنداڭ ئەكسىيەتچىلىرىنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا

كەمسىتىلىپ، چەكلىنىپ، كومۇلۇپ قېلىش، يوقىلىپ كېتىشتەك ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتكە دۇچار بولغان ئىدى.

ئازاتلىقتىن كېيىن، ئۇلۇغ جۇڭگو گۇڭچەنداڭ - نىڭ توغرا رەھبەرلىكى، ئۇلۇغ داھىمىز ماۋجۇشىنىڭ پارلاق مىللىي سىياسىتىنىڭ نۇرى ئاستىدا ماۋجۇشىنىڭ **”جۇڭگو تىببىي - دورىگەرلىك ئىلمى ئۇلۇغ بىر غەزىنە، ئۇنى تەتقىق قىلىش ۋە يۇقۇرى كۈتىرىش لازىم”** دىگەن شانلىق يوليۇرۇغىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىمۇ قەدىمىي كۈتىرىپ، خەلق ساقلىغىنى ساقلاش ئىشلىرىدا ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئىم - كانىيىتىگە ئىگە بولالمىدى. جايلاردىكى ئۇيغۇر تىۋىپلار كوللىكتىپلىشىش يولىغا مېڭىپ، بىرلەشمە داۋالاش شىپاخانىلىرىغا ئۇيۇشۇپ، دولەت ئىگىدارلىغىدىكى دوخ - تۇرخانىلارغا ئورۇنلىشىپ، ھەر مىللەت ئىشچى، دىخانى، ئەسكەرلەر ئاممىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلماقتا.

قولىڭىزدىكى كىتاپنى خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسىدىكى پىشقەدەم تىۋىپ تىۋىپ تىۋىپ مەھەممەت ئاخۇن ئۆزىنىڭ 60 نەچچە يىللىق ئەمىلىي داۋالاش تەجرىبىلىرى ئاساسىدا، قەدىمقى تىبابەت ئىم - سەرلىرىدىن پايدىلىنىپ تۈزۈپ چىققان. كىتاپتا كېسەل - لەرگە دىئاگنوز قويۇش، داۋالاش ئۇسۇللىرى بىر قەدەر تەپسىلىي سۈزلەنگەن ۋە 200 نەچچە خىل مۇھىم مۇرەككەپ دورا نۇسخىلىرى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ،

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىگى ھەققىدىكى نىسبەتەن تولۇغراق
بىر ئەسەردىن ئىبارەت. بۇ كىتاپ يېڭى ئەۋلات ئۇيغۇر
تىۋىپلىرىنى تەربىيەلەشتە، ئاغرىق-سىلاقلارنى داۋالاشتا
قوللانمىلىق رولىغا ئىگە بولۇپلا قالماي، ئۇيغۇر تىبا-
بەتچىلىگىنى تەتقىق قىلىش ئۈچۈنمۇ مەلۇم ئەھمىيەتكە
ئىگە.

كىتاپتا كەمچىلىك ۋە خاتالىقلارنىڭ بولۇشمۇ
مۇمكىن. كەڭ كىتاپخانىلارنىڭ تەتقىقىي پىكىرلىرىنى
بېرىشنى سورايمىز.

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ئىدارىسى

1975 - يىل 9 - ئاي

مۇندەرىجە

بىرىنچى قىسىم. ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ نەزىرىيە ئاساسلىرى

I	ماقالا. تەبىئەت ۋە كەيپىيات	1
	1 - پەسىل: مىزاج	3
II	ماقالا. توت خىلىت (ئەخلاىتى ئەربەئە)	5
	1 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولىشى	6
	2 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ خۇسۇسىيىتى ۋە ئۆزگە- رىشى	8
	قان	8
	سەپرا (ئوت)	9
	بەلغەم	10
	سەۋدا	11
	3 - پەسىل: ياش ۋە رەڭگى - رويىنىڭ خىلىتلار بىلەن مۇناسىۋىتى ۋە ئالامەتلىرى	12
	4 - پەسىل: خىلىتلار ئۆزگىرىشىنىڭ ئالامەتلىرى ...	14
III	ماقالا. ئەزالار ۋە ئۇلارنىڭ خىزمىتى	16
	1 - پەسىل: ئەزالارنىڭ دەرىجىسى	16
	2 - پەسىل: ئەزالار خىزمىتى	18

- 3 - پەسىل: ئەزالاردا بولىدىغان قۇۋۋەتلەر..... 19
- IV ماقالا. بەدەننىڭ ئۆزگىرىشى ۋە كېسەللىكنىڭ
- يۇز بېرىشى..... 23
- 1 - پەسىل: كېسەللىكلەرنىڭ تۈرلەرگە بولىنىشى... 24
- 2 - پەسىل: كېسەللىكلەرنىڭ دەۋرى..... 26
- 3 - پەسىل: زورۇر ۋاستىلار..... 26
- V ماقالا. كېسەل پەيدا بولىشنىڭ سەۋەپلىرى... 32
- 1 - پەسىل: ئىسسىقلىقتىن بولغان كېسەللەرنىڭ
- سەۋەپلىرى..... 33
- 2 - پەسىل: سوغاقتىن بولغان كېسەللەرنىڭ
- سەۋەپلىرى..... 33
- 3 - پەسىل: قۇرۇق ۋە ھولىلىكتىن بولغان كېسەل-
- لەرنىڭ سەۋەپلىرى..... 34
- 4 - پەسىل: ئوتۇش يوللىرىنىڭ كېڭىيىشى ۋە
- تارىيىپ قېلىشى..... 35
- 5 - پەسىل: بەدەن تېرىلىرىدىكى ئۆزگىرىش (قۇ-
- رۇپ قېلىش)..... 36
- 6 - پەسىل: شەكىل (قىياپەت) بۇزۇلىشنىڭ
- سەۋەپلىرى..... 36
- VI ماقالا. تومۇر ھەركەتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ
- ئەھمىيىتى..... 37
- 1 - پەسىل: تومۇرنىڭ ئەھمىيىتى..... 38
- 2 - پەسىل: تومۇردىن نىمىلەرنى بىلىگىلى ۋە قان-
- داق بىلىگىلى بولىدۇ..... 39
- 3 - پەسىل: تومۇرنىڭ تۈرلىرى ۋە ھەركىتى..... 40

4 - پەسىل: تومۇرنىڭ سەۋەبلىرى	50
VII ماقالا. نەپەس ۋە ئۇنىڭ بۇزۇلۇشى	71
VIII ماقالا. سۇيدۇك ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش	73
1 - پەسىل: سۇيدۇك تۇرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى	73
2 - پەسىل: سۇيدۇكنىڭ قويۇق - سۇيۇقلۇقى	82
(قەۋامى)	82
3 - پەسىل: سۇيدۇك ئۈستىدە كۇپۇك بولۇشى	87
ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى	87
4 - پەسىل: سۇيدۇكتىكى پۇراق ۋە ئەر - ئاياللار -	95
نىڭ سۇيدۇگىنى پەرقلەش	95
IX ماقالا. چوڭ تەرەت (بەۋل) نى تەكشۈرۈش	97
1 - پەسىل: چوڭ تەرەتتىكى ئارىلاشمىلار	97
2 - پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ سۇيۇق ياكى قويۇق كېلىشى	98
3 - پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ رەڭگى	100
X بەلغەم ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش	102
1 - پەسىل: بەلغەمنىڭ مىقدارى	102
2 - پەسىل: بەلغەمنىڭ رەڭگى	102
XI ماقالا. كېسەل ئاقىۋىتىنىڭ ياخشى - يامان بولۇش ئالامەتلىرى	104
1 - پەسىل: كېسەل ئاقىۋىتى ياخشى بولۇشتىن دېرەك بېرىدىغان ئالامەتلەر	104
2 - پەسىل: كېسەل ئاقىۋىتى يامان بولۇشتىن ئالامەتلىرى	106

XII ماقالا. كېسەللىكنى تونۇش ۋە توغرا

- تەشخىس قىلىش 110
1 - پەسىل: كېسەلنى تونۇش 110
2 - پەسىل: ماددىنىڭ پىششىق ۋە ئۇنىڭ
ئەھمىيىتى 111

XIII ماقالا. كېسەلنى داۋالاش ئۇسۇللىرى 116

- 1 - پەسىل: سۇرۇپ چىقىرىش 117
(1) قان ئېلىش 117
(2) ھىجامەت (شەخەك) قويۇش 123
(3) قۇستۇرۇش (قەي قىلدۇرۇش) 125
(4) سۇرگە بېرىش 129
(5) ھوقنە - شامچە 135
(6) تەرلىتىش 138
(7) بۇرۇن ۋە تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش 139
(8) سۇيدۇك ھەيدەش 140
2 - پەسىل: ماددىلارنى پىشۇرۇش (مۇنزىج)
چارىلىرى 143
3 - پەسىل: دورا ئىچكۈزۈش 148
4 - پەسىل: بوۋاقلارنى داۋالاش 160
5 - پەسىل: كېسەللەر تامىقى 162
XIV ماقالا. ساقلىقنى ساقلاش ۋە كېسەلنىڭ ئال-

- دىنى ئېلىش 165
1 - پەسىل: جىسمانى ھەركەت 165
2 - پەسىل: روھى ھەركەت 166
3 - پەسىل: ھامىلدار ئاياللار ۋە قېرى كىشىلەرنىڭ
ساقلىقنى ساقلاش تەدبىرلىرى 167

ئىككىنچى قىسىم. كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارنى داۋالاش

- 1 168 1. باش ۋە مىڭە كېسەللىكلىرى
- 168 1 - پەسىل: باش، ئاغرىغى (سەدائى ساددە)
- 182 2 - پەسىل: مىڭە كېسەللىكلىرى
- 184 ئۇيۇشۇش (سەھرى)
- 187 مىڭە پەردىسىنىڭ ياللۇغى
- 190 مىڭىنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى دىماغ)
- 195 قىتىمىش كېسىلى (رەئىشە)
- 197 ساراڭلىق (جۇنۇن)
- 198 مالىخۇلىيا
- ئاياللارنىڭ تۇتاقلىق كېسىلى (ئەتىناقى رەھىم)
- 199 ھىستېرىيە
- 202 مالىخۇلىيا مەراقى
- 203 قارا بېشىش (كابۇس)
- 204 پالەچ ۋە ئىستىرخا
- 211 تارتىشىپ قېلىش (تەشەنۇج)
- 214 گەردەن قېتىپ قېلىش (كوزاز - تەمەددۇد)
- قۇۋۇرغا ئارىلىق ئەسەپلىرىنىڭ ئاغرىشى (ۋەجىئىل خاسىرە)
- 216 خاسىرە
- 217 بەل ئاغرىغى (ۋەجىئىل قەتەن)
- 218 يانپاش ئاغرىغى (ئەرقۇننىسا)
- 222 قاش ئارىسى ئاغرىشى (ئۇسابە)

- بەدەن بۇلجۇڭ گۈشلىرىنىڭ تارتىشىشى (ئىخ-
 2 2 3 (تىلاچ)
 2 2 4 II ماقالا. كوز كېسەللىكلىرى
 1- پەسىل: كوز كېسەللىكلىرىنىڭ سەۋەبى ۋە
 2 2 4 داۋالاش چارىلىرى
 2- پەسىل: كوز مۇڭۇز پەردىسى (تەبىقە سەلبە)
 2 2 8 كېسەللىكلىرى
 3- پەسىل: قاپاق كېسەللىكلىرى 2 3 0
 2 3 0 كوزدە گۈش ئۈسۈپ قېلىش (شىرناق)
 2 3 1 كوز قوتۇرى (جەرە بۇلغەين)
 2 3 3 قاپاقنىڭ ئۆزۈمەسىمان ئۈسۈپ (تۈتەتۈل ئەجفان)
 2 3 4 قاپاقنىڭ قىزىپ ئىششىشى (شىرايى بۇلەك)
 2 3 5 يىڭنە ئاسقۇ (شەئىرە)
 ياش خالىتىنىڭ يىرىڭلىق ئاقىمىسى (غەرەپ،
 2 3 5 فاسۇرى چەشم)
 كوزگە قۇم تىقىلغاندەك ئاغرىش (جە سائىل ئەج-
 2 3 6 فان)
 كىرىپكىنىڭ توكىلىشى (ئىنتىشارۇل ئەھداپ، رەزد-
 2 3 7 دەئى مۇزگان)
 2 3 8 كىرىپكىنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى
 2 3 8 كوز ياشاڭغۇراش (دەمەئە)
 4- پەسىل: كوزنىڭ ھەرخىل ئاغرىقلىرى 2 3 9
 2 3 9 كوز ۋە قاپاق قىرلىرىنىڭ ياللۇغى (رەمەد)
 2 4 3 كوز ئىچىدىكى قىزىل چىكىت (تۇرفە)
 كوزگە قانات گۈش ئۈنۈپ قېلىش (زەپەر ياكى
 2 4 4 ناخۇنە)

كوز ئېقىنىنىڭ يەللىك ئىششىغى (ئىنتىفاخى

مۇلتەھەمە) 245

كوز ئېقىنىنىڭ قىچىشى (ھىككە مۇلتەھەمە) 245

كوز قارچۇغىنىنىڭ ياللىغى (ۋەرمى قەرىنە) 246

كوزگە ئاق چۈشۈش (بەيازۇلئەيىن) 247

كورۇش زەئىپلىكى (زەئىپىل بەسەر) 249

كوزدىكى يات نەرسىلەر (قەزى) 251

كوزگە زەربە تىگىش (زەرە بۇلئەيىن) 252

كەچقۇرۇن كورمەسلىك (ئەشا - شەبكورى) 252

كوزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇما) 253

ماقالا. قۇلاق، بۇرۇن ۋە گال (تاماق) III

كېسەللىكلىرى 264

1 - پەسىل: قۇلاق كېسەللىكلىرى 264

قۇلاق ئاغرىش (ۋەجىل ئۇزۇن) 264

ئاڭلاشنىڭ بۇزۇلۇشى (تەرەش) 266

قۇلاق قىچقىرىش (تىنىن) 268

قۇلاق قان ئېقىش 268

2 - پەسىل: بۇرۇن كېسەللىكلىرى 269

پۇراش سېزىمىنىڭ يوق بولۇشى 269

پۇراشنىڭ بۇزۇلۇشى 270

بۇرۇندىكى جاراھەت 271

بۇرۇن قاناش 272

بۇرۇندىن سېسىق پۇراق كېلىش (نەتولى

ئەنەق) 273

چۈشكۈرۈش (ئەتسە) 274

بۇرۇن قىچىشى (ھىككە تۇل ئەنەق) 275

- 3 - پەسىل: تىل كېسەللىكلىرى 275
- 1) تىلنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى لىسان) 275
- تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلىشى 277
- تىلنىڭ ئېغىرلىقى 277
- تىلنىڭ چوڭىيىپ كېتىشى (ئىدىلا ئۇللىسان) 280
- تىل ئاستى ئوسمىسى (زەپدەغ) 280
- تىلنىڭ يېرىلىپ كېتىشى 281
- تىلنىڭ قۇرۇپ كېتىشى 281
- تىلنىڭ جاراھەتلىنىشلىرى 282
- ئېغىزنىڭ ئاق يارىسى (قىلا) 283
- ئېغىزنىڭ يەل يارا كېسىلى (ئاكىلە تۇلقەم) 284
- ئېغىزدىن شولگەي سۇ ئېقىش 285
- تاڭلاي ياللۇغى 286
- كالىپۇكنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى 286
- 4 - پەسىل: چىش كېسەللىكلىرى 287
- چىش ئاغرىش (دەردى دەندان) 287
- چىشنىڭ قاماپ قېلىشى 289
- قۇرۇت يىگەن چىش 290
- چىش رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى (تەغىرىرى رەڭگى دەندان) 290
- چىشنىڭ مىدىرلاپ قېلىشى 291
- چىش مۇلۇكلىرىنىڭ قانىشى 292
- 5 - پەسىل: گال ئاغرىقلىرى 292
- بوغما (ھوناق) 292
- گال ئاغرىقى (ۋەرەمى ھەلەق) 295
- كەچىك تىل ۋە يۇتقۇچ ئەتراپىنىڭ پىلىچى (ئىسە -

2 9 6	 (تەرخانى لۇھات)	
2 9 8	 قىزىل ئۆگىگەچتىكى يات نەرسىلەر	
2 9 9	 قىزىل ئۆگىگەچ ۋە يۇتقۇچنىڭ قىچىشى	
3 0 0	 يۇتقۇشنىڭ قىيىنلىشىشى	
3 0 2	 قىزىل ئۆگىگەچ يارىسى	
3 0 2	 ئاۋاز پۇتۇش (بەتلانى سوت)	
	 ماقالا. كۆكرەك بوشلۇغى (سىنە) كېسەللىك -	IV

3 0 5	 لىسىرى	
3 0 5	 1 - پەسىل: ئۆپكە كېسەللىكلىرى	
3 0 5	 دەم سىقىش (زەيقۇلنەپەس، زەبۇە)	
3 1 0	 يوتەل (سوتال)	
3 1 5	 قان تۆكۈرۈش (نەپەس دەم)	
3 1 8	 ئۆپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)	
3 2 4	 ئۆپكە سىلى	
3 2 9	 كۆكرەك پەردە ياللۇغى (زاتلىجەنە)	
3 3 4	 شۇشە كېسىلى	
	 توش ئىچكى پەردىسىنىڭ ياللۇغى (زاتلى)	
3 3 5	 سەدرى	
3 3 6	 كىرگىت پەردە ياللۇغى (بەرسام)	
	 كۆكرەك بوشلۇغىغا يىرىك تولۇش (ئەتىقانى	
3 3 7	 سىنە)	
3 3 9	 ماقالا. يۈرەك كېسەللىكلىرى	V

	 1 - پەسىل: يۈرەكنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان	
3 3 9	 كېسەللىكلىرى	
3 3 9	 يۈرەكنىڭ ئىسسىق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى	
3 4 0	 يۈرەكنىڭ سوغاق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى	

- 3 4 1 يۈرەكنىڭ قۇرۇق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى
- 3 4 2 يۈرەكنىڭ ھول مىزاجلىق كېسەللىكلىرى
- 2 - پەسىل: يۈرەك ئويناش (خاپقانى قەلب)
- 3 4 2 كېسىلى
- يۈرەك تومۇرلىرىغا سەپرا قۇيۇلۇشتىن بولغان
- 3 4 4 خاپقان
- يۈرەك تومۇرلىرىغا سەۋدا قۇيۇلۇشتىن بولغان
- 3 4 6 خاپقان
- كوپ قان يوقىتىش ۋە ئۇزۇقلىنىشنىڭ ناچار
- 3 4 7 بولمىدىن بولغان خاپقان
- يۈرەكنىڭ سەزگۈ ئەسەپلىرىنىڭ قوزغۇلۇشچان
- 3 4 8 بولۇپ قېلىشىدىن بولغان خاپقان
- باشقا ئەزالاردىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ يۈرەككە
- 3 4 8 تەسىرىدىن بولغان خاپقان
- 3 4 9 ئايلىنىپ كېتىش (غەشيان)
- يۈرەك قۇلىغىنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى ئۇزۇنە -
- 3 5 6 لقەلب)
- 3 5 7 يۈرەكنىڭ سىقىلىشى (زېقىتىل قەلب)
- 3 5 8 يۈرەك قېپىغا سۇ يىغىلىش
- 3 5 9 ماقالا. ئەمچەك كېسەللىكلىرى
- 3 5 9 1 - پەسىل: سۇت چىقىرىشنىڭ بۇزۇلىشى
- 3 5 9 سۇتنىڭ كېمىيىشى
- 3 6 0 خىلىتلار سەۋەبىدىن سۇتنىڭ ئازىيىشى
- 3 6 3 سۇتنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق كوپىيىپ كېتىشى
- 3 6 4 2 - پەسىل: ئەمچەك ياللۇغى (ۋەرەمى پىستان)
- 3 6 8 ماقالا. مەيدە كېسەللىكلىرى

VI

VII

- 1 - پەسىل: مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەل -
 368 لىملىرى
 368 خاس ئىسسىقلىقتىن مەيدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى...
 سەپرا ھېشپ كېتىشتىن بولغان مەئدە
 370 بوزۇلۇشى
 مەئدەنىڭ ماددىسىز ھول ئىسسىق ۋە قۇرۇق ئىس-
 373 سىقتىن بۇزۇلۇشى
 373 مەئدەنىڭ سەۋدا ۋە قۇرۇق سوغاقتىن بۇزۇلۇشى...
 375 2 - پەسىل: مەئدە ئاغرىش (ۋە جىلەمەئدە)
 مەئدەنىڭ يەلدىن ئاغرىشى
 377 ناچار يىمەكلىكلەر سەۋەپلىك مەئدە ئاغرىشى
 مەئدە ئەسەپلىرىنىڭ قوزغىلىشىدىن مەيدە
 378 ئاغرىش
 379 3 - پەسىل: ھەزىم كېسەللىملىرى
 379 تاماق سىڭىشنىڭ بۇزۇلۇشى
 382 ئىشتەي تۇتۇلۇش
 386 يەپ تويماسلىق كېسەلى (شەھۋەت كەلبى)
 387 كالا ئىشتەي (جۇئىلەقەر)
 389 ئاچلىقتىن ئايلىنىپ كېتىش (جۇئىلەش)
 غەلىتى نەرسىلەرنى يېيىشكە مايىللىق (فاسادى
 390 شەھۋەت)
 391 كۆپ ئۇسساش كېسەلى (ئەتىش)
 4 - پەسىل: ئاشقازان ياللۇغلىرى (ۋەرەمى -
 393 مەئدە)
 ئاشقازان ھوكۇنەك پەردە ياللۇغى (پىلغىمۇنى -
 393 مەئدە)

- بەلغەمدىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى (ۋەرمە) -
 395 مەئدە بەلغەمىيە)
 سەۋدادىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى (ۋەرمە مەئدە
 396 سەۋداۋىيە)
 مەئدەنىڭ يىرىڭلىق جاراھىتى (دۈبەيلىتۈل-
 397 مەئدە)
 ئاشقازان يارىسى
 398
 ئاشقازان كوپۇش (نەفىخە مەئدە)
 400
 كىكىرىش ۋە ئەسنەش
 400
 قۇسۇش (قەي) ۋە كوگۇل ئاينىش (غەشىي) ...
 402
 قان قۇسۇش (قەي دەمەۋى)
 404
 ھىق تۇتۇش (پەۋاق)
 407
 ئاشقازاننىڭ يوتكىلىشى (مۇنقەلىبى مەئدە)
 408
 مەئدەنىڭ ئېچىشى
 409
 مەئدە بوشىش كېتىش
 410
 ئاشقازاننىڭ تارتىش قېلىشى (تەشەنمۇجى
 مەئدە)
 411
 مەئدەنىڭ قېتىپ قېلىشى
 412
 مەئدە سەۋەپلىك ئىچ سۇرۇش (زەرەپ)
 413
 ۋابا (ھەيزە ۋابائى)
 416
 421 ماقالا. جىگەر كېسەللىكلىرى VIII
 1- پەسىل: جىگەرنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەل-
 لىكلىرى
 421
 421 (1) جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىق بۇزۇلۇشى
 423 (2) جىگەر مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى
 424 (3) جىگەر مىزاجىنىڭ قۇرۇقلۇقتىن بۇزۇلۇشى

- 4 2 5 (4 جىگەر زەئىپلىكى (زەئىپۈلكە بەد).....)
- 4 2 6 2 - پەسىل: جىگەردىكى توسىلىش (سۇددىلىكە بەد)...
- 4 2 6 (1 جىگەر ئوز تومۇرلىرىدىكى توسىلىش.....)
- 4 3 1 (2 ماسارنىڭ توسىلىشى.....)
- 4 3 1 (3 جىگەر كۆپۈپ قېلىش.....)
- 4 (4 جىگەر سانچىلىپ ئاغرىش (شىرقە تۈلكە -
- 4 3 2 بەد).....)
- 4 3 3 3 - پەسىل: جىگەر ئىششىقلىرى.....)
- 4 3 3 (1 جىگەرنىڭ ماددىلىق ئىششىقى.....)
- (2 قوساق كىرگىت گوشلىرىنىڭ ئىششىقى (ۋە -
- 4 3 9 رەمى ئەزلى بەتمى).....)
- (3 جىگەرنىڭ يىرتىلىق ئىششىقى (دۈبەيلى -
- 4 4 0 تۈلكە بەد).....)
- 4 4 1 (4 جىگەرنىڭ تارتىشى (خەفە تۈلكە بەد).....)
- 4 4 2 (5 جىگەر (ئوتتە) تاش پەيدا بولۇش.....)
- (6 جىگەرنىڭ كىچىكلىشىپ قېلىشى (ھىزال -
- 4 4 3 كە بەد).....)
- (7 جىگەر كېسىلى سەۋىيەدىن بولىدىغان ئىچ
- 4 4 4 سۈزۈشلەر.....)
- 4 4 6 سۇلۇق ئىششىقلار.....)
- 4 4 6 سۇ ئالەمىنىڭ بۇزۇلۇشى (سۇ ئىلقۇنىيە).....)
- 4 4 8 سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا).....)
- 4 4 9 گوش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقاى لەھمى).....)
- 4 5 2 قىسقۇچى سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقاى زىققى)....)
- ئاغراسىھان سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقاىى
- 4 5 4 تەبەلى).....)

4 5 6	 سېرىق كېسەل (يەرقان)	
4 6 3	 ماقالا. تال كېسەللىكلىرى	IX
	1 - پەسىل: تالنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك	
4 6 3	 ئاغرىقلىرى	
4 6 6	 تالنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى تھال)	
4 6 8	 تالنىڭ زەئىپلىكى	
4 6 9	 ماقالا. ئۇچەي كېسەللىكلىرى	X
4 6 9	1 - پەسىل: ئۇچەيدىكى ھەزىمەتنىڭ بۇزۇلۇشلىرى...	
4 6 9	 ئۇچەي تارتىشىپ قېلىش (زەيىقۇلئەمما)	
4 7 2	2 - پەسىل: ئىچ سۇرۇش (ئىسھال) لار	
4 7 3	 قانلىق ئىچ سۇرۇش (ئىسھال دەمەۋى)	
4 7 8	 يىرىڭلىق ئىچ سۇرۇش	
4 8 0	 تولغاق (زەھىرە)	
4 8 4	 ئۇچەيگە يەل تولۇش	
	3 - پەسىل: چوڭ ئۇچەي كېسەللىكلىرى	
4 8 5	 (قۇلۇنجى)	
4 8 5	 قۇرۇق قوساق ئاغرىش (قۇلۇنجى)	
4 8 8	 ئۇچەي توسىلىش	
5 0 0	 چوڭ تەرەت كەلمەسلىك (ھەسرە)	
5 0 1	4 - پەسىل: ئۇچەي مەددە قۇرۇتلىرى	
5 0 1	 يىلان مەددە (ھەيات)	
5 0 3	 قاپاق ئۇرۇغى مەددە (كودۇ دانە)	
5 0 5	5 - پەسىل: سولڭ (مەقئەد) كېسەللىكلىرى	
5 0 5	 بوۋاسىر	
5 1 1	 سولڭ يىرىڭلىق ئاقمىسى (ناسورى مەقئەد)	
5 1 3	 سولڭ ياللۇغلىنىش (ۋەرەمى مەقئەد)	

- 5 1 5 سولك يېرىلىشى.
- 5 1 6 سولكنىڭ پالەچلىنىشى (ئىستىرخاينى مەقەد).
- 5 1 7 سولك چىقىپ قېلىش (خۇرۇجى مەقەد).
- 5 1 8 سولك يارىلىرى (قۇرۇقى مەقەد).
- 5 1 9 سولك قىچىشى.
- 5 2 0 ماقالا. بۆرەك كېسەللىكلىرى. XI
- 1 - پەسىل: بۆرەكنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك ئاغرىقلىرى بۆرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلىشى.
- 5 2 0 قان سەۋىيىسى بىلەن بۆرەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى.
- 5 2 1 بۆرەك مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلىشى.
- 5 2 2 بۆرەكنىڭ كىچىكلىشىپ كېتىشى.
- 5 2 3 بۆرەك زەئىپلىكى (زەئىفى گۇردە).
- 5 2 4 بۆرەكنىڭ يەللىك ئاغرىشى (بادى گۇردە).
- 5 2 5 بۆرەك ئاغرىش (ۋەجىئەلەكەبەد).
- 2 - پەسىل: بۆرەك ياللۇغلىرى (ۋەرەمى گۇردە)
- 5 2 6 بۆرەكنىڭ ماددىلىق ياللۇغلىنىشلىرى.
- 5 2 9 بۆرەك يارىسى.
- 5 3 1 قەنت سىيمىش كېسەلى (زىياپەتئۇس).
- 5 3 3 بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش.
- 5 3 5 3 - پەسىل: دوساق كېسەللىكلىرى.
- 5 3 5 دوساق ياللۇغى (ۋەرەمى ماسانە).
- 5 3 8 دوساق چاراهەتلىرى.
- 5 3 9 دوساقتا قان ئۆيۈپ قېلىش.
- 5 3 9 دوساق ئاغرىش (ۋەجىئەلەكە سەنە).
- 5 4 1 دوساق كۆيۈپ قېلىش.

- 5 4 2 دوساقتا تاش تۇرۇپ قېلىش
- 5 4 4 سۇيدۇك كويگەندەك ئېچىشىپ كېلىش
- 5 4 5 سۇيدۇك تۇتۇلۇش (ئېھتىباسى بەۋۇل)
- 5 4 9 سۇيدۇك تامچىلاپ كېلىش
- 5 5 0 سۇيدۇك تۇتالما سلىق (سەلسىل بەۋۇل)
- 5 5 2 كېچىسى سىيىپ يېتىش (بەۋۇلى بىلىغىراش)
- 5 5 2 قان سىيىش (بەۋلىدەم)
- XII ماقالا. قوساق كىرگىت گۈشلىرىنىڭ

- 5 5 4 يىرتىلىشى
- 5 5 4 1- پەسىل: چۇقۇق (قېيىل) كېسەللىكلىرى
- 5 5 4 پەنەق
- 5 5 7 قوساق پەتەغى
- 5 5 8 يەل كىندىك

XIII ماقالا. قول، پۇت ۋە بەل كېسەللىكلىرى...

- 5 5 9 1- پەسىل: بەل ئۇمۇرتقا كېسەللىكلىرى
- 5 5 9 ئۇمۇرتقا چىقىپ كېتىش (ھۇدۇبە)
- 5 6 1 غول ئاغرىش (ۋەجىللەرە)
- 5 6 4 بەل ئاغرىش (ۋەجىللەخاسرە)
- 5 6 4 2- پەسىل: سولڭ ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرى
- 5 6 7 بوغۇملارنىڭ ئاغرىشى (ۋەجىللەمۇ پاسىل)
- يانپاش بوغۇمى ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئاغرىشى (ۋەج-)
- 5 7 4 ئىلۋەرەك
- ھوشۇق ۋە تاپان سۆڭەك بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىشى
- 5 7 5 (نۇقىرىسى)
- 5 7 6 3- پەسىل: ئاياق قانتومۇرلىرى كېسەلى

ئاياق كوك تومۇرىنىڭ ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىپ

5 7 7 كېتىشى (داۋالى)

5 7 7 پىل پۇتى كېسىلى (دائىل پىل)

5 8 0 ماقالا. قىزىتمىلار (تەپلەر) XIV

1 - پەسىل: بىر كۈنلۈك قىزىتمىلار (تەپى

5 8 0 يەۋى)

2 - پەسىل: خىلمىلىك قىزىتمىلار (تەپى خىلمىلى

5 8 2 ياكى ھۇممىياتى خىلمىلى)

5 8 2 قان ماددىسىدىن بولغان قىزىتما (تەپى دەمەۋى) ...

5 8 4 سەپرادىن بولغان قىزىتما (تەپى سەپراۋى) ...

5 9 0 بەلغەمدىن بولغان قىزىتما (تەپى بەلغەمى) ...

5 9 4 سەۋدادىن بولغان قىزىتما (تەپى سەۋداۋى) ...

5 9 8 چۈدەتكۈچى قىزىتما (تەپىدىق) ...

6 0 6 3 - پەسىل: يۇقۇملۇق قىزىتمىلار (تەپىۋابائى) ...

6 0 8 تائۇن (چۇما) كېسىلى ...

6 1 1 قىزىل (ھوسبە) ...

6 1 4 ياۋا چىچەك (چۇدرى) ...

6 1 5 4 - پەسىل: بوھران ھەققىدە ئومۇمى چۈشەنچە ...

6 1 6 بوھراننىڭ تۈرلىرى ...

6 1 8 بوھران كۈنلىرى ...

6 1 9 بوھران ئالامەتلىرى ...

6 2 0 بوھران ئالدىدىكى ئالامەتلەر ...

6 2 2 ماقالا. تاناسىل ئەزالار كېسەللىكلىرى XV

6 2 2 1 - پەسىل: ئەرلەر تاناسىل ئەزا كېسەللىكلىرى ...

6 2 2 جىنسى ئاجىزلىق (زەئفى باھ) ...

6 2 3 جىنسى ئىنتىلىشىنىڭ بولماسلىقى ...

- جىنىسى ئەزا بوشاپ پالەچلىنىش (ئىستىرخائى -
 6 2 5 (زەكەر)
 6 2 6 مەنى تېز كېتىپ قېلىش (سۇرئىتى ئىنزال)
 6 2 8 جىنىسى ھەۋەسىنىڭ كۆپ بولۇشى
 6 2 9 قانلىق مەنى كىلىش (مەنىمىدەم)
 6 2 9 كۆپ ئېھتىلام بولۇش (كەسرەتى ئېھتىلام)
 2 - پەسىل: ئۇرۇقدان ۋە جىنىسى ئەزا كې -
 6 3 1 سەللىكلىرى
 6 3 1 ئۇرۇقدان ياللۇغى (ۋەرەمى ئۇنسەيىن)
 6 3 3 ئۇرۇقداننىڭ چوڭىيىپ كېتىشى
 ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى كېڭىيىپ ئەگرى -
 6 3 4 بۇگرى كۆپۈپ قېلىش (داۋالى سەفەن)
 جىنىسى ئەزا ۋە ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ قىچىشقاق
 6 3 4 كېسىلى
 6 3 5 سۇيۈك يولىنىڭ توسىلىپ قېلىشى
 6 3 6 2 - پەسىل: ئاياللار كېسەللىكلىرى
 6 3 6 تۇغماسلىق
 ھامىلدارلىق ئالامەتلىرى ۋە دىققەت قىلىشقا
 6 4 2 تېگىشلىك ئىشلار
 6 4 2 ھامىلدارلىقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار
 6 4 4 كۆپ بويىدىن ئاجراش (كەسرەتى ئىسقات)
 6 4 6 قىيىن تۇغۇت
 6 4 8 بالا ھەمىرىنى چۈشمەسلىك
 6 4 9 ھامىلىنى چۈشۈرۈش
 6 5 0 ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش چارىلىرى
 6 5 1 يالغان ھامىلدارلىق (رىجا)

- 6 5 2 ھېيىز كوپ كېلىش.
- 6 5 3 بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى.
- 6 5 5 بالىياتقۇنىڭ يىرىڭلىق ئاقىمىسى (ناسۇر رەھىمى) ...
- 6 5 5 ئاق خۇن كېسىلى (سەيلانى رەھىم)
- 6 5 7 ھېيىز كەلمەسلىك
- 6 5 8 بالىياتقۇ چىقىپ قېلىش (خۇرۇجى رەھىم)
- بالىياتقۇ يامان سۈپەتلىك ئوسمىسى (سەرتانى رەھىم)
- 6 6 1 ھىستېرىيە (ئېھتىناقى رەھىم)
- 6 6 2 بالىياتقۇ سۇلۇق ئىشىشى
- 6 6 4 بالىياتقۇ يەللىك ئىشىشى
- 6 6 5 XVI ماقالا. تاشقى ئەزا كېسەللىكلىرى
- 6 6 6 1 - پەسىل: تېرە كېسەللىكلىرى
- تېرە ئاستى ھوكۇنەك توقۇلما يىرىڭلىق ياللۇغى
- 6 6 6 (فېلىغمونى)
- 6 6 9 قاراسان كېسىلى (سقاقىلۇس)
- 6 7 0 يامان يارا (ھۆمرە، سۇرخى باد)
- 6 7 1 كوز يارا (جەمەرە)
- 6 7 2 كويدۇرگە (قۇرۇھى سائىلە)
- 6 7 4 نار فارىسى
- 6 7 5 سۇلۇق قاپارتما
- 6 7 6 يەلتاشما (شىمرا)
- 6 7 7 تىلما (ماشىمرا)
- 6 7 8 بەزلەر ياللۇغى (مۇغابىن)
- 6 8 0 چىقان (دۈمۈل)
- 6 8 2 بىرىڭ خالىتىسى (دۇبەيلە)

- 684 ئاغرىقسىز ئىشىقلىقلار (ۋەزەمى روخۇر)
- 685 يەل ئىشىق (نەغمە)
- 685 پوقاق (سەلئە)
- 687 تويۇق (ئوقدە)
- 688 چاشقان يارىسى (خانازىر)
- 690 سەرتان (راك)
- 700 ماخاۋ (جوزام - دائىل ئەسەد)
- 702 تاز كېسىلى (سۇئىقە)
- 706 قوتۇر (جەرەپ)
- 708 قوتۇر - قىچىشقاق (ھىككە)
- 711 ئىسسىقلىق (ھەسەپ)
- 712 قارا تەمرەتكە (قۇبا)
- 714 سوغان (سوبوز)
- 715 سۈگەل (سالىل)
- 716 پاخالچەك يارىسى (بەتەم)
- 717 ئۆزەسمان ئۈسمە (تۇتى)
- 718 تېرە ئاستىغا قان چۇشۇش (ئوبۇرسىمان)
- 719 يەل يارا (ئابىلە فەرەڭگى، ئاتىشەك)
- 2 - پەسىل: تېرە رەڭگى ئۈزگىرىش كېسەل -
- 725 لىمىكلىرى
- 725 ئاق كېسەل (بەرەس)
- 732 قارا داغ (بەرەس ئەسۋەد)
- 732 داغ (كەلەف)، سەبكۈن (نەمەش)
- 734 مەڭ (خىلال)
- 735 تېرە كۆكۈرۈپ قېلىش
- 735 تېرە رەڭگىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى
- 737 3 - پەسىل: تېرىنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى

- 7 3 7 باش كېمەكلەشمىش (ھۇزار)
- 7 3 7 تېرە يېرىلمىش
- 7 3 8 چالاش (قۇبا)
- 7 4 0 4 - پەسىل: چاچ كېسەللىكلىرى
- 7 4 0 چاچ چۇشۇش (دائىل سۇئەپ)
- 7 4 4 چاچنىڭ يېرىلىپ كېتىشى (تەشەققۇقى شەئىر)
- 7 4 4 باشتىن ياغنىڭ تەپچۇرەپ چىقىشى
- 7 4 5 چاچنىڭ بۇرۇن ئاقىرىپ كېتىشى
- 7 4 8 5 - پەسىل: تىرناق كېسەللىكلىرى
- 7 4 8 تىرناققا ئاق چۇشۇش
- 7 4 9 تىرناق ساغىرىپ قېلىش
- 7 4 9 پور تىرناق
- 7 5 0 تىرناقنىڭ باشقا زەخمىلەنىشلىرى
- 7 5 1 سويىدەك (داخەس)
- 7 5 2 6 - پەسىل: تەر كېسەللىكلىرى
- 7 5 2 كۆپ تەرلەش
- 7 5 4 سېسىق تەرلەش
- 7 5 5 7 - پەسىل: سېمىزلىك ۋە ئورۇقلاش كېسىملى
- 7 6 0 8 - پەسىل: ئۇششۇك ۋە كويۇك
- 7 6 0 ئۇششۇك
- 7 6 1 كويۇك
- 7 6 5 9 - پەسىل: جاراھەت ۋە يارا
- 7 6 5 جاراھەتلەر
- 7 6 9 يارىلار
- 7 7 4 چاچراتقۇ (قورۇھى سائىيە)
- 7 7 4 10 - پەسىل: يېقىلمىش، ئۇرۇلۇش (زەربە)
- 7 7 9 11 - پەسىل: باشقا تېرە كېسەللىكلىرى

- 779 پىتلاپ كېتىش (قەمىل، سەمىيەش)
- 780 يۈز، پىشانە تېرىسىگە قورۇق چۈشۈش
- 781 ياتاق يارىسى
- 781 XVII ماقالا. سۇنۇق ۋە چىقىقلار
- 782 1- پەسىل: سۇنۇق
- 782 تېرە زەخمىلەنمىگەن سۇنۇق (يېپىق سۇنۇق)
- 785 تېرە- گۈشنى بۇزغان سۇنۇق (ئوچۇق سۇنۇق)
- 786 چىقىقلار (خۇلى)
- 788 كۆپ ئۇچرايدىغان چىقىقلار
- XVIII ماقالا. زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى
- 794 چارىلار
- 794 1- پەسىل: دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش
- 796 مەئدەن جىنسلىق دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش
- 801 ئوسۇملۇك دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش
- 2- پەسىل: زەھەرلىك ھاشارەتلەر چېقىش ۋە ئۇ-
- 809 لارنى داۋالاش
- 809 ئومۇمى چارىلار
- 812 مەخسۇس چارىلار
- 816 غالجىر ئىت چېشلەش (غالجىر كېسىلى)
- 820 قوشۇمچە:
- مەدەن دورىلارنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ۋە ئىش-
- 820 لىتىلىشى
- 823 ئالتۇننى كۈشتە قىلىش
- 824 كۈمۈشنى كۈشتە قىلىش
- 826 تومۇر، پولاتنى كۈشتە قىلىش
- 827 مىسنى كۈشتە قىلىش
- 828 سىمپىنى كۈشتە قىلىش
- 830 ياقۇتنى كۈشتە قىلىش

دورنلار مۇندەرىجىسى

ھەب (كۇمۇلاچ) دورنلار

9 5 0	 I	ھەبىي ئازراقى (كۇچۇلا كۇمۇلىسى)
9 5 1	 II	ھەبىي ئازراقى (كۇچۇلا كۇمۇلىسى)
8 3 6		ھەبىي ئايارەج
8 3 4		ھەبىي سەبرە
8 5 7		ھەبىي سۇرۇنجان
8 7 6		ھەبىي سۇئال
8 9 1		ھەبىي سەككىنەج
9 5 4		ھەبىي شەبىيار
9 5 5		ھەبىي تەنكار
8 3 9		ھەبىي ئىستەمخىقۇن
9 4 8		ھەبىي ئىمساك
8 4 1		ھەبىي ئىپتىمۇن
8 4 3		ھەبىي قۇقىيا
8 5 2		ھەبىي جەدۋار
8 7 3		ھەبىي پىلىپىل (قارمۇچ كۇمۇلىسى)
8 5 2		ھەبىي پەرىمىيۇن
8 6 1		ھەبىي زەھەب
9 1 0		ھەبىي رەۋەن
8 7 2		ھەبىي غارنقۇن

8 5 1		مەنتىن	هەبىي
8 6 0		مۇسھەل	هەبىي
9 2 1		مۇقىل I	هەبىي
9 2 1		مۇقىل II	هەبىي
9 4 7		مۇقەۋۋى باھ	هەبىي

قۇرسى (تابىلىت) دورىلار

8 9 1		ئەنسۇن	قۇرسى
9 0 8		ئەپسەنتىن	قۇرسى
9 1 4		ئەنپەر بارىس	قۇرسى
8 9 8		ئىلاۋۇتىس	قۇرسى
8 6 3		فەلدىپىتون	قۇرسى
9 1 6		بۇزۇرى	قۇرسى
9 2 8		بەۋلىمدەم	قۇرسى
9 1 6		ئوردان	قۇرسى
9 0 1		ئۇد	قۇرسى
8 7 7		كەھرىبا	قۇرسى
8 8 0		كافۇر	قۇرسى
8 9 2		كەۋكەب	قۇرسى
8 9 9		كوھلى	قۇرسى
9 1 2		كەبىر	قۇرسى
9 2 3		كاكىمەنج	قۇرسى
9 1 7		گۇلنار	قۇرسى
9 2 9		گۈل I	قۇرسى
9 2 9		گۈل II	قۇرسى

9 1 5	I غاپپەسى	قۇرسى
9 3 0	II غاپپەسى	قۇرسى
8 9 8	سۇمبۇل	قۇرسى
9 0 1	تاباشىر	قۇرسى
9 0 2	راسەن	قۇرسى
9 1 8	زەرنىخ	قۇرسى
9 2 4	زىيا بىتۇس	قۇرسى
9 1 3	I مازەرىيۇن	قۇرسى
9 1 3	II مازەرىيۇن	قۇرسى
9 3 7	مور	قۇرسى
9 3 0	مەرۋايىت	قۇرسى
9 3 1	خەشخاش	قۇرسى

سۇيۇپ (تالقان) دورىلار

8 5 6	I سۇرۇنجان	سۇيۇپى
8 5 7	II سۇرۇنجان	سۇيۇپى
9 5 2	I سوزاك	سۇيۇپى
9 5 3	II سوزاك	سۇيۇپى
9 0 0	رۇممان	سۇيۇپى
9 1 8	تىن	سۇيۇپى
9 3 5	مۇقەۋۋى مەئدە	سۇيۇپى

ئىتىرىپىللەر

8 3 5	سەغىر	ئىتىرىپىل
8 3 5	كەشەنەز	ئىتىرىپىل

8 3 2	ئىترىپىل كەبىر
9 2 2	ئىترىپىل مۇقىل
9 3 9	ئىترىپىل غۇدۇرى

مەجۇن دورىلار

8 4 2	سەجۇنى ئايارەج پەيقارا
8 8 7	مەجۇنى ئايارەج لوغانىزىيا
9 0 3	مەجۇنى ئاساناسىيا
9 4 8	مەجۇنى ئازاراقى
8 5 2	مەجۇنى بالادۇر I
9 4 2	مەجۇنى بالادۇر II
9 3 2	مەجۇنى بۇزۇرى
9 2 4	مەجۇنى بەلىلۇت
8 7 4	مەجۇنى بىنەپشە
8 4 4	مەجۇنى فىلاسىپە (مەجۇنى مەدەتۇلەيات)
8 8 3	مەجۇنى فىلۇنىيا
8 8 4	مەجۇنى فىلافى I
9 1 9	مەجۇنى فىلافى II
8 4 4	مەجۇنى نۇجاھ
8 4 9	مەجۇنى مەشىدىر تۇس
8 6 4	مەجۇنى جاۋارش كۇمۇنى
8 9 3	مەجۇنى جاۋارش شەھرىياران
9 1 9	مەجۇنى جاۋارش خەۋزى
9 0 4	مەجۇنى داۋا ئىلكور كەم

8 4 6		مەجۇنى داۋا ئىلمىشكى شېرىن
8 8 3		مەجۇنى داۋا ئىلمىشكى تەلخى
9 3 0		مەجۇنى داۋا ئىلمىشكۇر بۇت
9 3 5		مەجۇنى داۋا ئىلمىشكۇك
8 3 8		مەجۇنى مۇفەررىھى ياقۇتى I
8 8 1		مەجۇنى مۇفەررىھى ياقۇتى II
8 8 5		مەجۇنى مۇفەررىھى ياقۇتى III
8 4 6		مەجۇنى نۇشىدارى ساددە
8 5 5		مەجۇنى سەنجەرىنا
8 5 5		مەجۇنى سۇرۇنجان
9 4 6		مەجۇنى سوم (سامساق مەجۇنى)
9 3 2		مەجۇنى زەرگۇنى
8 7 5		مەجۇنى زىراۋەندە
8 9 5		مەجۇنى خۇسۇلەددىد (تومۇر پوقى مەجۇنى)
9 0 9		مەجۇنى پودىنە
9 2 5		مەجۇنى ھەجەرلىيەھۇد
9 1 2		مەجۇنى كەلكەلانەج I
9 1 2		مەجۇنى كەلكەلانەج II
9 2 0		مەجۇنى تۇر بۇت
9 3 3		مەجۇنى لۇبۇبى كەبىر I
9 5 3		مەجۇنى لۇبۇبى كەبىر II
9 2 2		مەجۇنى لۇبۇبى سەغىر
9 2 5		مەجۇنى ئەقرەب
9 3 6		مەجۇنى لوغانىزىيا
9 5 1		مەجۇنى قەمبىل

خېمىرلار

8 4 7	خەمىرى ئەۋرىشىم
8 5 4	خەمىرى گازىۋان
8 8 0	خەمىرى سەندەل

جاۋارشالار

8 3 3	جاۋارش جالىنىش
9 0 0	جاۋارش خەرنۇپ
8 9 6	جاۋارش بۇزۇرى
8 8 9	جاۋارش تەمىرى ھىندى
8 9 0	جاۋارش ئۇد I
8 9 0	جاۋارش ئۇد II
8 9 3	جاۋارش سەپەرچىلى
8 9 4	جاۋارش نارمىشكى
8 9 6	جاۋارش مۇناسىبى
8 9 7	جاۋارش مۇقەۋۋى مەئدە
8 9 9	جاۋارش كۈندۈر

ئىسكەنجىمىن (ئىسكەنجىۋىل) لار

8 8 7	ئىسكەنجىمىن سەپەرچىلى
8 9 5	ئىسكەنجىمىن بۇزۇرى

9 0 4	 ئىسكەنجىيىن بۇزۇرى مۇتەدىل
9 0 5	 ئىسكەنجىيىن بۇزۇرى ھار

مەتبۇخ (قايىنىتىلما) لار

8 4 5	I مەتبۇخى ئىپتىمۇن
9 0 8	II مەتبۇخى ئىپتىمۇن
9 4 1	III مەتبۇخى ئىپتىمۇن
8 5 8	I مەتبۇخى ھېلىلى
9 3 8	II مەتبۇخى ھېلىلى
8 5 8	I مەتبۇخى شاتەرە
9 3 4	II مەتبۇخى شاتەرە
8 6 7	 مەتبۇخى خىيارى شەنپەر
9 2 7	 مەتبۇخى سۇرۇنجان
8 7 8	 مەتبۇخى مۇلەيىمىن
9 0 2	 مەتبۇخى تەمرى ھىندى

شەرۋەت (شەربەت) لەر

8 3 3	 I شەرۋىتى بىنەپشە
8 7 9	II شەرۋىتى بىنەپشە
8 3 8	 شەرۋىتى زۇفا
8 7 3	 شەرۋىتى زۇفا
8 4 1	 شەرۋىتى فەۋاكە (مېۋىلەر شەرۋىتى)
8 6 4	 شەرۋىتى تۇققاھ (ئالما شەرۋىتى)

8 6 8	شەرۋىتى دىنارى I
9 0 6	شەرۋىتى دىنارى II
8 6 3	شەرۋىتى رۇممان (ئانار شەرۋىتى)
8 7 5	شەرۋىتى ئەنسېل
8 7 7	شەرۋىتى ئەنجىبار
8 8 5	شەرۋىتى ئەۋرىشم
8 8 9	شەرۋىتى ئەپسەنتىن I
9 0 9	شەرۋىتى ئەپسەنتىن II
8 7 6	شەرۋىتى خەشخاش
8 7 9	شەرۋىتى نىلۇپەر
8 8 1	شەرۋىتى بىادىرەنجىبۇيا
8 8 1	شەرۋىتى گازىۋان
8 8 8	شەرۋىتى زىرىشك (زىرىخ شەرۋىتى)
9 1 1	شەرۋىتى بۇزۇرى I
9 1 1	شەرۋىتى بۇزۇرى II
9 1 5	شەرۋىتى كۇشۇش
9 2 3	شەرۋىتى بىنادىق بۇزۇرى

مائىل ئۇسۇللار

8 4 0	مائىل ئۇسۇل I
8 4 9	مائىل ئۇسۇل II
8 6 1	مائىل ئۇسۇل III
8 6 2	مائىل ئۇسۇل IV
8 9 7	مائىل ئۇسۇل V

9 0 6	مائىل ئۇسۇل VI
9 2 7	مائىل ئۇسۇل VII
9 3 9	مائىلجىيىمىن
8 8 2	سەندەل ئەرەقى

مەلھەم (مەرھەم) دورىلار

8 6 5	مەلھەمى ئىسپىداج I
9 3 8	مەلھەمى ئىسپىداج II
9 3 7	مەلھەمى داخىلمون
9 4 0	مەلھەمى زەنكار
9 0 7	زىمار
9 0 7	زىمار

رەۋغەن دورىلار

8 5 3	رەۋغەنى قۇست (قۇستە يېغى)
8 5 4	رەۋغەنى قىرۇتى
8 6 6	رەۋغەن
9 2 6	رەۋغەنى ئەقرب (چايان يېغى)

لۇئۇق (يالانچۇق) دورىلار

8 6 9	لۇئۇقى زەنجىۋىل
8 7 0	لۇئۇقى ئىسەنجۇر

8 7 0		هۇلبە	لۇتۇقى
8 7 1		سەرىپىستان	لۇتۇقى
8 7 1		خەشخاش	لۇتۇقى

باشقىلار

8 6 0		سۇرمە (كوزنى روشەنلەشتۈرگۈچى سۇرمە)	
8 7 4		دەملەمسى	شۇمشە
8 6 8		ھەندى	نۇقۇتى تەمىرى
8 4 0		دورسى	ھوقنە
8 6 7			ھوقنە
8 5 9		ئەھمەرلەيىن	شىياڧى
9 2 1		كوھلى	شىياڧى

بىرىنچى قىسىم. ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ نەزىرىيە ئاساسلىرى

I ماقالا. تەبىئەت ۋە كەيپىيات

ئىنساننىڭ بارلىققا كېلىشى مۇختىلىپ (قارىمۇ - قارشى) بولغان توت تەبىئەت^① يەنى - ئوت، سۇ، تۇپراق ۋە ھاۋالارنىڭ ئوزۇن ئاراللىرىدىن بىرىكىشىدىن ئىبارەت. بۇ ئىنساننىڭ سانلار دىئالېكتى بولماستىن، بەلكى ھاياتلار ۋە ئۆسۈملۈكلەردىن شۇنداق. مەسىلەن، ئۆسۈملۈكنىڭ ئۆسۈپ ئۆسۈشىنى ئالدىنقى بولساق يەر (تۇپراق)، سۇ، ھاۋا ۋە ئىسسىقلىق (ئوت) نىڭ ئۇرۇققا بولغان ئوزۇن ئاراللىرى بىلەن بولىدۇ. ئادەم مۇ خۇددى شۇ توت تەبىئەتنىڭ بىرىكىشى بىلەن قۇۋۋەتلى مۇغەييىرە (ئۆزگەرتكۈچى كۈچ) گە يولۇ - قۇپ جىسمىيات (ئورگان) ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ھال تىبابەتتە "ئەجسامى بەسەت" دىيىلىدۇ. توت تەبىئەتنىڭ

① توت تەبىئەت - ئۇيغۇر تىبابەت ئەسەرلىرىدە "ئاناسىر ئەربىئە" (4 ماددا نەزىرىيىسىگە ئاساسەن تەھلىل قىلىنىدۇ. بۇ يەردە مۇھىم جايلارنى قىسقارتىپ سۆزلىنىدۇ.)

داۋاملىق ئەسىر قىلىشى ئارقىسىدا قۇۋەتلى نامىيە (ئوسۇش كۈچى) گە يېتىپ تەرەققى قىلىدۇ. ۋە قۇۋەتلى مۇسەۋىرە (شەكىللىنىش كۈچى) بارلىققا كېلىپ ئادەم سۈرىتى شەكىللىنىدۇ. بۇ ھال "ئەجسام مەنەد" دەپ ئاتىلىدۇ. توت تەبىئەت ئىنسان بەدىنىدە توت كەيپىياتنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. ئۇلار: رۇتۇبەت (ھوللۇك)، يۇبۇسەت (قۇرۇقلۇق)، ھارارەت (ئىسسىغىلىق)، بۇرۇدەت (سوغاق-لىق) دىن ئىبارەت بولۇپ، ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن بەكمۇ مۇھىم. مەسىلەن، بەدەندە ئىسسىغىلىق بولمىسا ئوزۇقلۇق پىشمايدۇ (پارچىلانمايدۇ)، سۇيۇقلۇق بولمىسا ئوزۇقلۇقلار شىمىرىلمەيدۇ. سۇيۇقلۇق بولمىسا بەدەندە ھاياتنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. ساپ ھاۋا بولمىسا نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىدۇ. تەبىئەتتە قۇرۇقلۇق بولمىسا مىڭنىڭ قولى مانىدانلىق قىلىش كۈچى ئاجىزلىشىپ مەقلى جايدا بولماسلىق، ئېغىزدا تاماق تەمىنى سېزەلمەسلىككە ئوخشاش ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. سوغاقلىق بولمىسا يۈرەكنىڭ خىزمىتى ياخشى بولمايدۇ. بۇنىڭدىن كورگىلى بولىدۇكى توت كەيپىيات ئادەم بەدىنىدە باراۋەر بولۇشى لازىم. بىر بىرىدىن كەم بولماسلىقى، ئارتۇق ياكى ناچار بولماسلىقى كېرەك. توت كەيپىياتنىڭ ئادەم بەدىنىدىكى بىر بىرىگە قارىمۇ - قارشى پائالىيەتلىرى نەتىجىسىدە "مىزاج" ھاسىل بولىدۇ.

1 - پەسىل: مىزاج.

“مىزاج” توت خىل كەيپىيات يەنى ئىسسىق، سوغاق، قۇرۇق، نەمنىڭ ئومۇمىي بەدەندە ئىپادىلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، توت كەيپىيات تەكشى بولغان مىزاجنى ياخشى مىزاج يەنى مۇۋاپىق مىزاج دەپ؛ توت كەيپىيات تەكشى بولمىغان مىزاجنى بۇزۇق مىزاج (سۇئىلىمىزاج) دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. سۇئىلىمىزاج ئوز نوۋىتىدە خىلىت ئارىلاشمىغان مىزاج (سازەج) ۋە بۇزۇلغان ماددىلار قوشۇلغان مىزاج (ماددى مىزاج)لارغا بۆلىنىدۇ. ياخشى مىزاج ئوز نوۋىتىدە 8 تۈرگە بۆلىنىدۇ.

- (1) موتىدىل ھالدىكى ئىسسىقلىق.
- (2) موتىدىل ھالدىكى سوغاقلىق.
- (3) موتىدىل ھالدىكى قۇرۇقلۇق.
- (4) موتىدىل ھالدىكى ھوللۇك (نەملىك).
- (5) سوغاقلىق بىلەن قۇرۇقلۇقنىڭ بىرىكىپ مو-تىدىل ھالغا كېلىشى.
- (6) سوغاقلىق بىلەن سۇيۇقلۇقنىڭ بىرىكىپ مو-تىدىل ھالغا كېلىشى.
- (7) قۇرۇقلۇق بىلەن ئىسسىقلىقنىڭ بىرىكىپ مو-تىدىل ھالغا كېلىشى.
- (8) ئىسسىقلىقنىڭ ھوللۇك بىلەن بىرىكىپ موتىدىل ھالغا كېلىشى.

“ناچار مىزاج” مۇ 8 تۇرگە بولىنىدۇ.

(1) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن. ئىسسىقلىق.

(2) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن قۇرۇقلۇق.

(3) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن سوغاقلۇق.

(4) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن ھوللۇك.

(5) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن ئىسسىقلىق

بىلەن قۇرۇقلۇقنىڭ بىرىكىشى.

(6) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن ئىسسىقلىق

بىلەن ھوللۇكنىڭ بىرىكىشى.

(7) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن سوغاقلۇق

بىلەن ھوللۇكنىڭ بىرىكىشى.

(8) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن سوغاقلۇق

بىلەن قۇرۇقلۇقنىڭ بىرىكىشى.

كىشىلەرنىڭ مىزاجى مەلەت ئايرىمىسى، ئولتۇراق

جايى (كىلىمات)، تۇرمۇش شارائىتى قاتارلىق ئەھۋاللارغا

قاراپ ھەر خىل ۋە مۇرەككەپ بولىدۇ. تىۋىپ كېسەلنى

تەكشۈرگەندە كېسەلنىڭ قايسى مىزاجدا ئىكەنلىكىنى ۋە

قانداق ئۆزگەرگەنلىكىنى ئوبدان بايقىشى لازىم. مىزاجنىڭ

ئۆزگىرىشىگە ۋە ئادەم مىزاجىنىڭ ھول، قۇرۇق، ئىسسىق،

سوغاقلۇقىغا قاراپ دورا بەلگىلەش كېرەك. ئەگەر مىزاج

بەلگىلەشتە توغرا بولمىسا تەشخىس (دىئاگنوز) مۇ ۋە

بېرىلگەن دورىمۇ خاتا بولىدۇ.

II ماقالا. توت خىلىت (ئەخلاىتى ئەربەئە)

خىلىتلار بىر خىل ھول سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئادەم بەدىنىدە دائىم ئېقىپ يۇرىدۇ. خىلىتلار توتكە بولىنىدۇ. قان، سەپرا، بەلغەم^①، سەۋدا.

بەدەننىڭ ساغلام تۇرىشى (قەۋامى) توت خىلىت-نىڭ ئېتىدالدا (نورمال) بولىشىغا باغلىق بولۇپ، كەم-زىيادە بولىشى ياكى مۇرەككەپ بولىشى كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خىلىتلەر "تەبىئى" ۋە "غەيرى تەبىئى" بولۇپ، ئولچەمگە لايىق "نورمال" بولغىنى تەبىئى، ئۇ-نىڭ ئەكسىنچە بولغىنى غەيرى تەبىئى ھىساپلىنىدۇ. مە-سىلەن، توق جىگەر رەڭلىك تازا قان تەبىئى قان، قا-رامتۇل، كۈيەك ياكى كوك يېشىلغا مايىل قان غەيرى تەبىئى قان دىيىلىدۇ. بۇ-قانغا ھەر خىل بۇزۇق خىلىت ۋە ئۇفۇنەت (بۇزۇق گاز) ئارىلىشىپ قالغانلىق — نەتە-جىسى بولۇپ كېسەل تۇغدۇرىدۇ.

① بەلغەم: بۇ يەردىكى بەلغەم ئادەتتە يوتەلگەندە چىقە-دىغان شىلىمىشقى خەپرۇك ئەمەس. بەلكى بىر خىل رەڭسىز (ئاق) شىلىمىشقى سۇيۇقلۇق ماددا بولۇپ، يونان ۋە مىسىر تىۋىپلىرى ئۆز ئەسەرلىرىدە بەلغەمنى لىمفا سۇيۇقلۇقى دەپ ئىزاھلايدۇ (مەخزەنلىجاۋاھىر كىتاۋىدىن).

1 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولىشى

خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولىشى ئادەم يىگەن تاماق-نىڭ خۇسۇسىيىتىگە باغلىق. مەسىلەن، ئىستىمال قىلىنغان ئوزۇقلۇق ئېغىز بوشلىقىدا بىر قەدەر ئىزىلىپ قىزىل ئوڭگەچ ئارقىلىق ① مەيدىگە چۈشىدۇ. مەيدىنىڭ ھەزىم قىلىش كۈچى ۋە ھەزىم بەزلىرى (غۇدۇدى ھەزىمىيە) نىڭ ياردىمى بىلەن ئارپا ئۇنىنىڭ ئۇمىچىدەك شىرە ھالىغا يەنى "كەيلۇس" كە ئايلىنىدۇ. ئوزۇقلۇق ماددىلار (كەي-لۇسنىڭ جەۋھىرى) مەئدە ۋە ئۈچەيلەردىن جىگەرنىڭ تارتىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى جازىبەسى) بىلەن ماسارىقە دەپ ئاتىلىدىغان تومۇر ئارقىلىق جىگەرگە كىرىدۇ. كېرەكسىز قالدۇقلىرى ئۈچەي ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. جىگەرگە كەلگەن قىسمى يۈرەكنىڭ نورمال ھارارىتى (ھارارىتى غەرىزىيىسى) نىڭ ياردىمى بىلەن پىشىدۇ ②. پارچىلىنىپ پىشش ئۆلچەم ئىچىدە بولغاندا قان ئىشلىنىپ چىقىدۇ.

① مەئدە: ئاشقاران.

② بۇ يەردىكى قايناش پىشش سۇنىڭ ۋاراقشاپ قايناشى ياكى نەرسىلەرنىڭ ئوتتا پىشقىنى ئەمەس بەلكى ئوزۇقلۇقنىڭ بەدەن ھارارىتى بىلەن بەدەنگە ئۆزلەشكەن ھالەتتە پارچىلىنىشىنى كوزدە تۇتىدۇ. قاننىڭ قاينىشىمۇ ئۇنىڭدىكى خىمىيەۋى ئۆزگىرىش لەرنى كوزدە تۇتىدۇ.

ئاندىن تاماق ماددىسى جىگەرنىڭ ھەزىم قىلىش كۈچى بىلەن سۈتكە ئوخشاش بىر سۇيۇقلۇققا ئايلىنىدۇ. بۇ كەيمۇس دىيىلىدۇ. كەيمۇس داۋاملىق قىيام بولۇپ، جىگەر كۈچىنىڭ ياردىمى بىلەن جىگەر رەڭگە كىرىدۇ. بۇ تەبىئىي قاننىڭ ھاسىل بولۇشىدىن ئىبارەت.

قاننىڭ ئېتىدال ھالەتتە قىيامغا كېلىشى نەتىجەدە سىدە ئۇنىڭ يۈزىگە سېرىق رەڭلىك بىر نەرسە ھاسىل بولىدۇ. بۇ، قاننىڭ كىيىمى ھىساپلىنىپ نورمال سەپرا (سەپرايى تەبىئىي) دەپ ئاتىلىدۇ. قاننىڭ داۋاملىق قىيامغا يېتىشى بىلەن قاننىڭ تېگىدە چوكمىسى (رۇسۇپى) ئولا-تۇرىدۇ. ئۇ تەبىئىي سەۋادىن ئىبارەت بولىدۇ. يەنە دا-ۋاملىق قىيامغا كېلىشىدىن تۇخۇم ئېقىغا ئوخشاش بىر نەرسە ھاسىل بولىدۇ. بۇ تەبىئىي بەلغەم دىيىلىدۇ.

خىلىتلەرنىڭ ھاسىل بولۇشى ۋە ئوزگىرىشىگە تۈۋەندىكىلەر تەسىر كۆرسىتىدۇ.

- (1) شۇ كىشىنىڭ ئەسلى ئەسلىنىڭ تەبىئىيىتى
- (2) ئوزۇقلىنىشنىڭ ياخشى-ناچار بولۇشى؛ (3) ئولتۇراق جايىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى (شۇ جايىنىڭ ئىسسىق، قۇرغاق، نەم ياكى سوغاق بولۇشى؛ (4) پەسلىنىڭ بىر خىل بولماسلىقىغا قاراپ خىلىتلارمۇ ھەر خىل بولىدۇ. مەسىلەن، ياز، كۈز، ئەتىياز ۋە قىش كۈنلىرى تۇغۇلغان خىلىتلار ئوخشاش بولمايدۇ. كۈچلۈك تاماق بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان كىشىدە شۇ جايىنىڭ ھاۋاسى قۇرۇق ئىسسىق ۋە پەسلى

ياز بولۇش سەۋبىدىن قاننىڭ قاينىشى ئېتىدالدىن ئېشىپ كەتسە ئەسلىدە ھاسىل بولىدىغان سېرىق كىپەك كوپۇك شەكلىدە بولىدۇ. بۇ سەۋدا غەيرى تەبىئى (مۇۋاپىق بولمىغان ھالدىكى سەپرا) نىڭ ھاسىل بولىشىدىن ئىبارەت. شۇنداقلا قاننىڭ ئارتۇق قاينىشى بىلەن ئەسلىدىكى رۇسۇپ (چوكمە) كويۇپ كۇيۇندىگە ئوخشاش قارا رەڭلىك بولۇپ سەۋدايى غەيرى تەبىئى ھاسىل بولىدۇ. ئەگەر قايناش بەك توۋەن بولغاندا خام قالغان بەلغەم، بەلغىمى غەيرى تەبىئى (مۇ-ۋاپىق بولمىغان ھالدىكى بەلغەم) بولىدۇ.

2 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ خۇسۇسىيىتى ۋە ئۆزگىرىشى

قان: تەبىئى قان يەنى ئېتىدالدا قايناپ سۇزۇك ھالدا ھاسىل بولغان قان خىزمەت قىلغۇچى قان (خۇنى فائىلى) دىيىلىدۇ.

قاننىڭ كەيپىياتى ھول ئىسسىقلىقىدۇر.

ئۇ توۋەندىكى خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە:

(1) بەدەننى ساپ ھاۋا ۋە ئوزۇقلۇقلار بىلەن تەمىنلەيدۇ.

(2) بەدەننى ئىسسىتىدۇ. (3) بەدەن ھارارىتىنى ھاسىل

قىلىدۇ. (4) بەدەننى سۇغىرىدۇ. (5) بەدەننىڭ شەكلىنى

چىرايلىق قىلىدۇ. (6) بەدەننى يۇمشاق، ياغلىق قىلىدۇ.

قاننىڭ ئۆزگىرىشى — مىقدارىنىڭ كۆپ بولۇشى،

قىيامى (قويۇق - سۇيۇقلۇق دەرىجىسى) نىڭ قۇيۇلۇپ

قېلىشى، قىيامىنىڭ سوۋۇپ قېلىشى ياكى قانغا تۇرلۇك خىلىتلار ۋە تۇرلۇك ئۇفۇنەت (بۇزۇق گاز) ھەم ھەر خىل جەراسىم (مىكروپىلار) نىڭ ئارىلىشىپ قېلىشى تۈپەيلىدىن بولىدۇ.

سەپرا (ئوت): مۇۋاپىق ھالدىكى سەپرا ياكى سەپرائى تەبىئىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى (1) مەئدە (ئاشقازان) دىكى تاماق ماددىلىرىنى سۇيۇقلاندۇرىدۇ، يۇمشىتىپ بېرىدۇ؛ ئېغىز تەمىنى تاتلىقلاشتۇرىدۇ. (2) يۇمشىغان تاماق ماددىلىرىنىڭ ئىنچىكە ئۈچەيلەردىن ئوتىشىگە ياردەم بېرىدۇ. (3) ئۈچەيدە ئېچىش جەريانىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ چوڭ تەرەت (بەۋۋل) نىڭ ئادا بولىشىغا ياردەم بېرىدۇ، مەئدە ۋە ئۈچەيلەردە توختاپ قالغان نەرسىلەرنىڭ چىقىرىلىشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، مەئدەنى قىزىتىش، تاماقنى تېز پارچىلاش سەپرانىڭ تەسىرىدە ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. سەپرا كەيپىيات جەھەتتىن قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، ئىسسىقلىق ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەندە سەپرائى غەيرى تەبىئى ھاسىل بولىدۇ. بۇ تۈتكە بولىنىدۇ:

1 - چۈچمەل سەپرا: سەپراغا بەلغەم ياكى سەۋ-دادىن كېلىپ چىققان بىر خىل شىلىمىشقىق ماددا قوشۇلۇپ تەمىنى چۈچمەل قىلىپ قويىدۇ.

2 - كۆيگەن سەپرا (سەپرائى موھتەرىقە): غەيرى تەبىئى سەۋدانىڭ سەپراغا قوشۇلۇپ قېلىشى بىلەن بەدەندە

ئېچىشىش ۋە قىزىرىش بارلىققا كېلىدۇ. ياز پەسلىلىرىدە كۆپ ئۇچراپ ئۇفۇنەت ۋە جەراسىملەرنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ھەر خىل تەپ (قىزىتما) كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

3 - ئارىلاشما سەپرا (سەپرائى گىراسە): چۈچىمەل سەپرا بىلەن كويىگەن سەپرانىڭ بىرىكىشى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ. سەپرانىڭ شەكلى قاتۇرۇلغان ئالتۇن گۈڭگۈرت سېرىغىغا ئوخشايدۇ. (بەزىلەر تۇخۇم سېرىغىغا ئوخشىتىدۇ). كويۇك ۋە ئاچچىق نەرسە مەئىدەدە قالىدۇ.

4 - زەھەرلىك ياكى يامان سۈپەتلىك سەپرا: سەپرائى غەيرى تەبىئىنىڭ باشقا تۈرلىرىگە نىسبەتەن زەھەرلىگىرەك بولۇپ، بەدەندە ھاسىل بولغاندا ھەر خىل يامان سۈپەتلىك كېسەللەرنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ.

بەلغەم: تەبىئى بەلغەم قويۇق ئاق رەڭدە بولۇپ كەيپىيات جەھەتتىن ھۆل سوغاق، بەلغەم بەدەندە سەرپ بولغان تۇغما ھالدىكى سۇيۇقلۇق (روتوبەتى غەرىزى) نىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ. بەدەندىكى ياغ ماددىسىنىڭ كۆپىيىپ شىگە ياردەم بېرىدۇ. بەدەننىڭ نەملىكىگە بولغان ئېھتىيا - جىنى قامداشقا خىزمەت قىلىپ، ئوسۇپ تەرەققى قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بەدەننى يۇمشاق ساقلايدۇ، ئادەم ئاغرىپ ياكى ئاچ قېلىپ تاماقتىن ئايرىلغاندا بەلغەم بەدەننىڭ ئوزۇقلۇق ئېھتىياجىنى ۋاقىتنىچە تەمىنلەپ تۇرىدۇ. بەل - غەمىنىڭ سەرپ بولۇش ئورنى مىڭە - يۇلۇن ھىساپلىنىدۇ.

بەلغەمنىڭ ئۆزگىرىشى بەلغەمى غەيرى تەبىئى بولۇپ، تو-
ۋەندىكى 5 خىلدىن ئىبارەت:

1 - بەلغەمى شىرىن (تاتلىق بەلغەم): تەبىئى
ھالدا قەن ئارىلاشقان بولىدۇ.

2 - بەلغەمى شور (ئاچچىق بەلغەم): تەبىئى بەل-
غەمگە خىلىتلار كۆيۈندىسى ئارىلاشقان بولۇپ، بۇنى
جالىنۇس سەپرائى غەيرى تەبىئىنىڭ بىر قىسمى دەپ
ئاتايدۇ. بۇ خىلدىكى بەلغەم باشقىلارغا قارىغاندا ئىسسىق
لىغى يۇقۇرى كېلىدۇ.

3 - چۆچىمەل بەلغەم: بىر ئاز تاتلىق تەمگە
ئىگە توۋەن ھارارەتلىك بەلغەم.

4 - بەلغەم ئەپەس (موزا تەملىك بەلغەم) ياكى
بەلغەمى ئەرزىيە (ئۆيۈپ قالغان بەلغەم): بەلغەمدە سو-
غاقلىق غالىپ بولغانلىقتىن كېلىپ چىققان بولۇپ، ئۇ-
يىغان ھاكقا ئوخشايدۇ.

5 - بەلغەمى بېمەزە (تەمسىز بەلغەم): ھېچقانداق
تەمى بولمايدۇ. سوغاقلىقنىڭ كۆپلىگىدىن كېلىپ چىققان
بولۇپ، كۈچ جەھەتتىن ناچارلىقنىڭ بەلگىسى بولىدۇ.
خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا، بەلغەم تەبىئىنىڭ ئۆز-
گىرىشى بەلغەمگە ھەر خىل زەھەرلىك ماددىلارنىڭ
ئارىلىشىشى بىلەن ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. ھەر خىل كېسەللىك
لەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

سەۋدا: ئېتىدال ئىسسىقلىق بىلەن پىشىپ ھاسىل
بولغان تەبىئى سەۋدا تال ۋە جىگەر ئارقىلىق سېزىش

ئەزالىرىغا تارقىلىدىغان قويۇق قارامتۇل سۇيۇقلىقتۇر.
بۇنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى:

1. سەزگۈ ئەزالىرىنىڭ سېزىش قابىلىيىتىنى ئا-
شۇرىدۇ.

2. پىكىر قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ.

3. قوساق ئاچقاندا تالدىن كېلىپ مەئىدىنى
غىدىغلاپ قوساقنى ئاچۇرىدۇ، مەئىدىنىڭ تارتىش (جەزبە)
كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

سەۋدا كەيپىيات جەھەتتىن قۇرۇق سوغاق ھىساپ-
لىنىدۇ. سەۋدانىڭ ئۆزگىرىشى شۇكى، تەبىئى سەۋدانىڭ
مىقداردىن ئارتۇق بولۇشىدىن ۋە يۇقۇرقى 3 خىللىتىنىڭ
كويىگە ئىلگىدىن — غەيرى تەبىئى سەۋدا ھاسىل بولىدۇ.

3 - پەسىل: ياش ۋە رەڭ - رويىنىڭ خىلىتىلەر بىلەن مۇناسىۋىتى ۋە ئالامەتلىرى

1 - ياش: ياشلار 4 دەۋرگە بولىنىدۇ:

1. بىر ياشتىن 28 ياشقىچە ئۆسۈش دەۋرى. بو-
لۇپ، بۇ دەۋردە مىزاج ئىسسىق ۋە سوغاقلىقتا مۇتەدىل،
ھوللۇك زىيادە بولىدۇ.

2. ياشلىق دەۋرى (سەنەئى شىباپ) 28 دىن 36
ياكى 40 ياشقىچە بولغان دەۋر بولۇپ، ئىسسىقلىق
تەرەققى قىلىدۇ. ئەقلى پاراسەت ئاشىدۇ. ئادەتتە مىزاجى
ھول ئىسسىق كېلىدۇ.

3. يېتىلگەن دەۋر (كۈھولىيەت) 40 دىن 60 گىچە بولغان دەۋرى بولۇپ، قۇۋۋەتنىڭ تەرەققى قىلىشى توختايدۇ. ئىسسىقلىق، ھوللۇك تەرەپكە مايىل بولىدۇ. تەبىئى ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەربىزى) توۋەنلەشكەنلىكتىن خىلىتلەر خام قېلىشقا باشلايدۇ.

60 ياشتىن ئومرىنىڭ ئاخىرىغىچە قېرىلىق دەۋرى بولۇپ، بۇ دەۋردە ئادەم ئەقلى پاراسەت، ھەركەت ۋە جىسمانى كۈچ جەھەتلىرىدىن دەرىجە بويىچە بارغانسېرى توۋەنلەپ بارىدۇ. تەجرىبىلەرگە ئاساسلانغاندا بەدەندە غەربىزى سۇيۇقلۇق قانچە كۆپ بولسا، شۇنچە ئۇزۇن ياشايدۇ.

2 - بەدەن رەڭگى: بەدەن رەڭگىنىڭ ھەر خىل بولىشى مەلۇم بىر تۈردىكى خىلىتقا ۋاكالىتلىك قىلىدۇ. مەسىلەن،

(1) بەدەننىڭ رەڭگى قىزىل بولسا، قاننىڭ غالىپلىقى (كۆپلىگى) نى كۆرسىتىدۇ.

(2) بەدەننىڭ رەڭگى سېرىق بولسا سەپىرانىڭ غالىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

(3) بەدەننىڭ رەڭگى ئاق بولسا بەلغەمنىڭ غالىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

(4) بەدەننىڭ رەڭگى قارا بولسا سەۋدانىڭ غالىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ ۋە باشقا خىلىتلەرنىڭ كۆپىگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

4. مېزاجنىڭ بەدەندىكى ئالامەتلىرى:

(1) ئىسسىق مىزاج — بەدەننىڭ قىزىق بولۇشى، كۆپ ئۇسساش، سوغاقتىن راھەتلىنىش، ئىسسىقتىن قېچىش، چىرايى قىزىل بولۇش قاتارلىقلار ئىسسىق مىزاجلىقنىڭ ئالامەتلىرىدىن ئىبارەت.

(2) سوغاق مىزاج — بەدەننىڭ سوغاق بولۇشى، توڭۇشقا مايىل كېلىش، ئەسەپ ۋە پەيلەرنىڭ بوش بولۇشى، ھەزىمنىڭ ناچارلىقى ۋە مەۋجۇت ئاچچىق سۇ پەيدا بولۇشلار سوغاق مىزاجلىقنىڭ بەلگىسىدىن ئىبارەت.

(3) قۇرۇق مىزاج — بەدەن ئورۇق بولۇپ ئۇيۇقۇ كەلمەسلىك، مەۋجۇت ئاغرىقلىرىغا ئاسان مايىل بولۇش، كۆپ سوزۇلۇش، ئېغىز ئىچى كالىپۇكلار دائىم قۇرۇق تۇرۇش قۇرۇق مىزاجلىقنىڭ ئالامىتى.

(4) ھول مىزاج — كۆپ ئۇخلاش، ھورۇن تەبىئەتلىك، بەدەنلىرى بوش ۋە غەيرى تەبىئى سېمىز بولۇش ھول مىزاجلىقتىن دېرەك بېرىدۇ.

ئەرلەرنىڭ مىزاجى ئادەتتە ئىسسىق ياكى ھول ئىسسىق، ئاياللارنىڭ ھول سوغاق ياكى قۇرۇق سوغاق كېلىدۇ.

4 - پەسىل: خىلىمىتلار ئۆزگىرىشىنىڭ ئالامەتلىرى

1 - قاننىڭ كۆپ بولۇشى: باش ئېغىر بولىدۇ، تولا كېرىلىدۇ، ئەسنەيدۇ، ئۆگىدەيدۇ، ئاغزى تاتلىق، چىرايى قىزىل بولىدۇ. تېرە ئۆستىگە ھەر خىل قاپارتمىلار كۆپرەك چىقىدۇ.

2 - سەپرانىڭ كۆپ بولۇشى: چىرايى سېرىق، ئاغ-
زى ئاچچىق، تىل ۋە بۇرنى قۇرۇق كېلىدۇ. ئىشتىھاسى
كەم، ئىچكى ئەزالاردا ئېچىش ۋە سانجىق بولىدۇ،
كوڭلى ئايىنىدۇ، كۆزنىڭ ئېقى سېرىق رەڭگە كىرىپ
تىلىنىمۇ سېرىق گەز باغلايدۇ، ئورۇقلاپ كېتىدۇ.

3 - بەلغەمنىڭ كۆپ بولۇشى: چىرايى ئاق، بە-
دىنى يۇمشاق ۋە بوشىغان بولىدۇ، مەئىدىنىڭ خىزمىتى
ناچارلىشىدۇ، مىڭە خىزمىتى، جۈملىدىن ھەركەت ۋە سەز-
گۇ ئەسەپ (نېرۋا) لىرىنىڭ خىزمىتى ئاجىز كېلىدۇ. ئۇ-
نۇتقاق بولىدۇ، تولا ئۇخلايدۇ.

4 - سەۋدا كۆپ بولغاندا چىرايى قارا بولۇپ،
مەنىسىز خىياللارنى تولا قىلىش، يالغان ئىشتەي ھا-
سىل بولۇش، مەئىدە سانجىقلىشىش ۋە يۈرەك خىزمىتى
ئاجىزلىشىش ئەھۋاللىرى كۆرىلىدۇ. كەم قانلىق، ئۇيقۇ-
سىزلىق ياكى ھەر خىل ئەسەپى (نېرۋا) كېسەللىكلىرى
كېلىپ چىقىدۇ.

“يەل” دېگەن مۇستەقىل خىلىت ئەمەس، بەلكى
خىلىتلاردىن ھاسىل بولغان بوخارات (ھور) بولۇپ ئىس-
سىق يەل ۋە سوغاق يەل دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ. ئىس-
سىق يەل سەپرا ۋە قاندىن ئاجرىلىپ چىقىدۇ. سوغاق
يەل بەلغەم ۋە سەۋدادىن ئاجرىلىپ چىقىدۇ. يەلنىڭ
بەدەنگە پايدىسى يوق، ئەكسىچە زىيانلىق بولۇپ، كې-
سەللىك كەلتۈرىدۇ.

III ماقالا. ئەزالار ۋە ئۇلارنىڭ خىزمىتى

1 - پەسىل: ئەزالارنىڭ دەرىجىسى

(1) باشقۇرغۇچى ئەزالار (ئەزاىى رەئىسە) — پۈتۈن بەدەننى باشقۇرۇپ تەمىنلىگۈچى ئەزالارغا ئېيتىلىدۇ. باشقۇرغۇچى ئەزاغا بىرەر ھادىسە يەتسە باشقا ئەزالارنىڭ ساغلام تۇرۇشى مۇمكىن ئەمەس، بەلكى ئولۇم خەۋپى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن باشقۇرغۇچى ئەزالارنى تونۇش مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ توۋەندىكىچە:

(1) **مىڭە:** پۈتۈن ھەركەت ۋە سېزىش ئەسەپ-لىرىگە قومانىلىق قىلىپ، باشقا ئەزالار خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ. باشقا ئەزالار خىزمىتىنىڭ ياخشى ياكى ناچار بولىشى مىڭىنىڭ قۇۋۋىتى ۋە سالامەتلىكىگە باغلىق.

(2) **يۈرەك:** پۈتۈن بەدەنگە قان يېڭى ھاۋا يەتكۈزۈپ ۋە ئىسسىقلىق بېرىپ ھاياتلىقنى داۋاملاشتۇرىدۇ.

(3) **جىگەر:** بەدەندىكى ماددىلارنى باشقۇرىدۇ. باشقا ئەزالارنى كېرەكلىك ماددىلار بىلەن تەمىنلەپ تۇرىدۇ. جىگەرگە تەسىر يەتسە ماددىلار قالايمىقانلىشىپ پۈتۈن بەدەن خىزمىتىگە دەخلى يېتىدۇ. قەدىمقى ھو -

كۇما (تېۋىپ) لارنىڭ بەزىلىرى يۇقۇرىدىكى 3 ئەزادىن تاشقىرى ئۇرۇق بېزى ۋە مەئىدەنىمۇ باشقۇرغۇچى ئەزالار قاتارىغا كىرگۈزۈشنى تەكىتلەيدۇ.

(2) ياردەمچى ئەزالار (ئەزايى مەروسىيە): ئوپكە، مەئىدە، تال، ئوت خالتىسى ۋە بورەكلەر بولۇپ، بۇ خىلدىكى ئەزالار بىر تەرەپتىن باشقۇرغۇچى ئەزادىن مەدەت ئالسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۈنمىگە ياردەملىشىدۇ. مەسىلەن ئوپكە سىرتتىن ھاۋايى نەسمى (ساپ ھاۋا)نى تارتىۋېلىپ يۈرەككە يەتكۈزىدۇ. يۈرەكتىن چىققان قاننى تازا ھاۋا بىلەن ئالماشتۇرۇپ يۈرەك ھەرىكىتى ۋە ئىسسىقلىقىغا ماسلىشىدۇ. مەئىدەنىڭ ھەرىكەتلىنىشى ۋە ھارارىتى يۈرەك ياردىمى بىلەن بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن جىگەردىن ئوت ئارقىلىق سەپرا، تالدىن سەۋدا قۇيۇلۇپ مەئىدەنىڭ تاماق ھەزىم قىلىشىغا ياردەم قىلىدۇ.

(3) خىزمەتچى ئەزالار (ئەزايى خادىمە): يۈرەك-نىڭ خىزمەتچى ئەزالىرى شىريان (قىزىل تومۇر — ئار-تېرىيە)، ۋەرىد (كۆك تومۇر — ۋېنا) بولۇپ، تال ۋە ئوت خالتىسى جىگەرگە خادەم ئەزا بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ. سەزگۈ ۋە ھەرىكەت ئەسەپلىرى مىڭنىڭ خىزمەتچى ئەزالىرى ھىساپلىنىدۇ. خىزمەتچى ئەزالار باشقۇرغۇچى ئەزانىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلغۇچىلاردىن ئىبارەت.

2 - پەسىل: ئەزالار خىزمىتى

ئىستىمال قىلىنغان تاماق ئېغىزدا چاپىلىپ قىزىل ئوڭگەچ ئارقىلىق مەئىدىگە چۈشىدۇ. مەئىدىدە تاماق ماددىلىرىغا ھەزىم سۈيۈقلۈغى ئارىلىشىدۇ. توۋەنگە چۈشكەندە ئوت خالىتىسىدىن سەپرا ۋە مەئىدە ئاستىدىكى "لەيلەبە" دىگەن بەز ئىشلەپچىقارغان سۈيۈقلۈقلار قوشۇلىدۇ. مىڭدىن كەلگەن ئەسەپ يىپچىلىرىنىڭ تەسىرى بىلەن پىشپ تاماق بوتىقىسى "كەيلۇسى"غا ئايلىنىدۇ. كەيلۇسىنىڭ جەۋھىرى سەئىدىنىڭ ھەزىم قىلغۇچى كۈچى (قۇۋۋەيى مازىمە) ۋە شىمىرگۈچى كۈچى (قۇۋۋەيى جازىبە)، ھەيدىغۇچى كۈچى (قۇۋۋەيى داپىە) نىڭ ياردىمى بىلەن ئۈچەيگە ئوتۇپ، ماسارىقە تومۇرى ئارقىلىق جىگەرگە بارىدۇ. جىگەردە تېخىمۇ پىشپ (پارچىلىنىپ) كەيمۇسقا ئايلىنىدۇ. دىمەك كەيلۇس ئوزۇقلۇقلارنىڭ مەئىدە ئىچىدە پىشقان جەۋھىرى، كەيمۇس بولسا جىگەردە پىشقان جەۋھىرى بولۇپ ئارپا يارمىسىنىڭ شىرىسىگە ئوخشايدۇ.

كەيمۇس داۋاملىق پىشپ توت خىل جەۋھەر ئايرىلىپ چىقىدۇ. يۈزىگە سېرىق كىپەكتەك ئورلپ چىق قىنى سەپرا بولۇپ ئوت خالىتىسىغا كىرىدۇ. ئىككىنچى ئاق سۈيۈقلۈقنىڭ ئەڭ سۈيۈق قىسمى بورەككە سۇيىدۇك يوللىرىغا ئاجرىلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ تەركىبىدە بىرئاز قان بولىدۇ. يەنە بىر قىسمى بىرئاز قويۇغراق بولۇپ

بەلغەم ماددىسىنى تەشكىل قىلىپ ئۆپكەگە ئوخشاش سۇيۇقلۇق جەلپ قىلغۇچى ئورۇنغا تارقىلىدۇ. ئۈچىنچىسى ساپ قان بولۇپ، كۆك تومۇرلار ئارقىلىق يۈرەككە بارىدۇ. قاننىڭ روسۇبى (لېيى) — سەۋدا بولۇپ جىگەر بۇنى تالغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ. تال سەۋدانى ساقلىغۇچى بولۇپ كېرەك بولغاندا ئەزالارغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ.

3 - پەسىل: ئەزالاردا بولىدىغان قۇۋۋەتلەر

پۈتۈن بەدەننىڭ كۈچى 3 خىل قۇۋۋەت (روھ) ① نىڭ بىرىكىشىدىن ئىبارەت.

1. ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋەيى ھاياۋانى): بۇنىڭ مەركىزى يۈرەك بولۇپ، ئۇ ئەزالارغا تارقالغان ھاياتلىق كۈچىدىن ئىبارەتتۇر، تىرىكلىك شۇنىڭغا باغلىق. يۈرەك بۇ قۇۋۋەتنىڭ تەسىرىدە كېڭىيىش (ئىنبىسات)، تارىيىش (ئىنقىباز) ۋە توختاش (سۈكۈنەت) ھەركەتلىرىنى ئىجرا قىلىدۇ. شۇ ھەركەتلەر ياردىمى بىلەن ئۆپكە ئارقىلىق قانغا سىرتتىن ساپ ھاۋا ئېلىپ، قىزىل تومورغا ماڭدۇ. رىدۇ ۋە قاندىكى بۇزۇق ھاۋا (بوخاراتى دۇخانى) نى سىرتقا چىقىرىدۇ. كېڭىيىش - تارىيىشتىن ئىبارەت ئىككى ھەركەت ئوتتۇرىسىدا بىر توختاش بولۇپ چېگرىسى ئېنىق

① تىبابەتتە قۇۋۋەتلەر روھ دىگەن ئومۇمىي ئاتالغۇ بىلەن ئاتىلىدۇ.

كېلىدۇ. ئادەمنىڭ قورقۇش، ئاچچىغلىنىش ۋە خوشاللىق-
ئىشلىرىمۇ قۇۋۋەيى ھايۋانغا باغلىق.

2. سېزىش ۋە ھەركەتلىنىش كۈچى (قۇۋۋەيى
نەپسانى): بۇنىڭ مەركىزى مىڭە بولۇپ، ئەسەب (نېرۋا)لار
ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىپ، سەزگى ۋە ھەركەت
ئەزالىرىغا قۇۋۋەت بېرىدۇ. قۇۋۋەيى نەپسانى ئوز نوۋد-
تىدە سېزىش كۈچى (قۇۋۋەيى مۇدىرىكە) ۋە ھەركەت
قىلىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى مۇھرىكە) دەپ 2 چوڭ تۈرگە
بولىنىدۇ.

1) سېزىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى مودىرىكە): سەزگۈچى
كۈچلەرمۇ 2 گە بولىنىدۇ. بىرىنچىسى سىرتقى تەسىراتنى
سەزگۈچى بەش كۈچ (خاۋاسى خەمسە زاھىرى): مەسىلەن،
كوز كورۇش قۇۋۋىتىگە؛ بۇرۇن پۇراش قۇۋۋىتىگە؛ قۇلاق
ئاڭلاش قۇۋۋىتىگە؛ تېرىدىكى ئەسەپلەر سىرتتىن كەلگەن
ئىسسىق - سوغاقنى ۋە ئاغرىشنى سېزىش قۇۋۋىتىگە؛ تىل
ئاچچىق - تاتلىق، ئىسسىق سوغاقنى سېزىش قۇۋۋىتىگە
ئىگە. ئىككىنچىسى، ئىچكى تەسىراتنى سەزگۈچى بەش
كۈچ (خاۋاسى خەمسە باتىنى) بولۇپ، سېزىملەرنى توپلاش
قۇۋۋىتى (ھىسسى مۇشتەرىكە)، خىيال قىلىش قۇۋۋىتى
(ھىسسى مۇخەييەلە)دىن ئىبارەت. بۇلارنىڭ ئورنى مىڭە-
نىڭ ئالدىنقى بىرىنچى بۆلۈمىدە بولۇپ ھىسسى مۇش-
تەرىك كەلگەن تەسىراتنى قوبۇل قىلىپ، ھىسسى مۇخەي-
يەلەرگە ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ. دېمەك ھىسسى مۇشتەرىكەنىڭ

جەلپ قىلغۇچى كۈچى ئارتۇق بولسا ھىسسى مۇخەببەت -
لەرنىڭ ساقلاش كۈچى (قۇۋۋەتلىرى ماسكە) مۇ كۈچلىك
بولىدۇ. ئۇلار بىر بىرىگە يېقىن مۇناسىۋەتلىك.

(1) سەزگۈنى سەرپ قىلغۇچى كۈچ (قۇۋۋەتلىرى
مۇتەسەررىپە). بۇ پىكىر قىلىش، پىلان تۈزۈش، ئىجات
قىلىش كۈچلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(2) قوغدىنىش تۇيغۇسى (قۇۋۋەتلىرى ۋەھمىيە): قورقۇش،
قوغدىنىش ئىستەكلىرى مۇشۇ قۇۋۋەتكە تەئەللۇق بولۇپ
مىڭە قوشىلىدىغان ئىككىنچى بولۇمنىڭ ئارقا تەرىپىدە
ئورۇنلاشقان.

(3) ساقلاش كۈچى (قۇۋۋەتلىرى ھاپىزە): بۇ يۇقۇر -
دىكى قۇۋۋەتلەر توپلاپ، تەھلىل قىلىپ چىقارغان خۇلا -
سىلارنى ساقلاش كۈچى بولۇپ، ئۆتمۈشتە بولۇپ ئۆتكەن
ئىشلارنى يادىغا كەلتۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. ئۇنىڭ
ئورنى ئارقا مىڭىگە يېقىن مىڭە قوشىلىدىغان 3 - بولۇمىدە.

(2) ھەركەتلىنىدۇرگۈچى كۈچ (قۇۋۋەتلىرى مۇھرىگە)
ئەزالارنىڭ ھەركەتلىنىشىگە ياردەم بېرىپ پەيلەرنى ھە -
كەتكە كەلتۈرىدۇ. بۇ كۈچمۇ 2 قىسىمغا بولىنىدۇ.

(1) سەۋەپچى كۈچ (قۇۋۋەتلىرى بائىسە): مىڭىدە
نەپەس ھاسىل قىلىدىغان، قوزغايدىغان ياكى نەپەسنى ئۆز -
گەرتىدىغان كۈچ بولۇپ غەزەپ، قىزىق قانلىق، تەرىكىش
قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) قىزىقىش كۈچى (قۇۋۋەتلىرى شەھۋانى) كىشىلەردە

زوق - شوق (قىزىقىش) ئويغىتىپ نەرسىلەرگە مۇھەببەت پەيدا قىلىدىغان كۈچ.

(3) قۇۋۋەيى تەبئىيە.

بۇ كۈچنىڭ مەركىزى جىگەر بولۇپ كوكتومۇرلار ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ. بۇ تۈۋەندىكىچە بىر قانچە تۈرلەرگە بولىنىدۇ:

(1) ئوزۇقلاندۇرۇش كۈچى (قۇۋۋەيى غىزائىيە) — ئوزۇقلۇقلار جەۋھىرىنى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ بېرىدىغان ئومۇمى كۈچ. توت ھەزىمىدىن ئۆتكەن ئوزۇق لۇقلارنى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزىدۇ.

(2) ئۆستۈرۈش كۈچى (قۇۋۋەيى نامىيە) — بەدەننىڭ ئۆسۈش ۋە تەرەققى قىلىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان يېرىم كۈچ. ئوزۇقلاندۇرۇش كۈچى بىلەن بىرلىشىپ ئەزالارنىڭ ئۆسۈشىگە خىزمەت قىلىدۇ.

(3) ئوزگەرتكۈچى كۈچ (قۇۋۋەيى مۇئەددىلىيە) — ماددىلارنى يوشۇرۇن ھالىتىدىن ئەسلى ھالىتىگە چىقىرىشقا خىزمەت قىلىدۇ. نەسىللىنىشكە يەلى ئەر - ئايالدىن مەنى قوزغاشتىن تاكى قوساقنىكى بالا تۇغۇلۇشقا قەدەر تەسىر كۆرسىتىدىغان قوشۇمچە كۈچتىن ئىبارەت.

(4) سۈرەت، شەكىل ھاسىل قىلغۇچى كۈچ (قۇۋۋە - ۋەيى مۇسەۋۋىرە) — بۇ كۈچ بىلەن بەدەننىڭ تۈزىلىشى ۋە شەكىللىنىشى بارلىققا كېلىدۇ.

IV - ماقالا. بەدەننىڭ ئوزگىرىشى ۋە

كېسەللىكنىڭ يۈز بېرىشى

بەدەننىڭ ئوزگىرىشى ۋە كېسەللىنىشى تاشقى ۋە ئىچكى سەۋەپلەردىن بولىدۇ. ئادەم بەدىنىدە ساغلاملىق ۋە كېسەللىكتىن ئىبارەت 2 خىل ئەھۋال بولۇپ، تەبىئى جەريان (مەجرئى تەبىئى) (توغرا ھاۋا ئالمىشىش، توغرا ئوزۇقلىنىش، توغرا ھەركەت ۋە ئەزالارنىڭ توغرا خىزمىتى) ئۈستىدە جارى بولۇپ تۇرىدۇ. مەسىلەن: يىگەن تاماق مۇناسىۋەتلىك ئەزالاردا ياخشى پىشىپ، ھەزىم قىلىنىپ قان قاتارلىق خىلىتلەرنىڭ ھاسىل بولۇپ تۇرۇشى ۋە ئالمىشىپ كونا ھاۋانىڭ ئورنىغا يېڭى ھاۋا كىرىپ تۇرۇشى ساغلاملىق دىيىلىدۇ. بۇنىڭ ئەكسى كېسەللىك بولۇپ تەبىئى جەريان ئەمەس. كېسەللىك: (1) بىرەر ئەزا خىزمىتىنىڭ ناچار بولۇپ قېلىشى ياكى قۇۋۋەتنىڭ ناچار بولۇشى؛ (2) ئەزانىڭ ئەسلى خىزمىتىنىڭ ئوزگىرىپ كېتىشى (پاك، گاچا بولۇپ قېلىش)؛ (3) ئەزانىڭ يوقىلىشى (قول - پۇت ياكى باشقا ئەزالارنىڭ ئوزۇلۇپ كېتىشى، كېسىلىپ كېتىشى) قاتارلىق ھالەتلەردە كۆرىلىدۇ.

1 - پەسەل: كېسەللىكلەرنىڭ تۈرلەرگە بۆلۈنىشى

كېسەللىك ئومۇمەن يەككە (مۇفرەد) ۋە مۇرەككەپ دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ.

1. يەككە كېسەللىك (مەرىزى مۇفرەد). بۇ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان، كېسەللىك، تەركىپ كېسىلى ۋە زەخىملىنىش كېسەللىكلىرى دېگەن تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ. (1) مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىك (مەرىزى سۇ ئىلمىزاج): بۇ بەدەندىكى خىلىتلەرنىڭ ئاددى (سازەج) ئۆزگىرىشلىرى ياكى خىلىتلەرنىڭ ماددىلىق (ماددى) ئۆزگىرىشلىرىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنى قان، سەۋدا، سەپرا ياكى بەلغەملەردىن بىرسىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ھاسىل بولىدۇ. مۇنداق كېسەللىكلەرگە خىلىتلەر ئۆزگەرگەندىكى ئالامەتلەر ۋە باشقا بەلگىلەر ئاساس قىلىنىپ كېسىلىگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ.

(2) تەركىپ كېسىلى (مەرىزى تەركىپ): بۇنىمۇ توۋەندىكىچە 4 تۈرگە بۆلۈپ چۈشەندۈرۈش مۇمكىن:

(1) تۇغما كېسەللىك (مەرىزى مەۋلۇدى): تۇغما ھالىدىكى ھەر خىل كەمتۈكلىكلەر: مەسىلەن، باشنىڭ ئادەتتىكىدىن چوڭ بولۇشى ياكى باش ئۆز جايىدا بولماي گەجگىدە ئورۇنلىشىش، قۇلاق، كوز، بۇرۇن، ئېغىزلار ئۆز جايىدا بولماسلىق ياكى زادىلا يوق بولۇشى ۋە باشقىلار. بۇنىڭ سەۋىيىسى — ئوتۇش يوللىرىدا ھەر خىل توسالغۇ —

لارنىڭ بولۇشى ياكى ئاياللار بالىياتقۇسىنىڭ تۇتۇۋېلىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى ماسكەسى) كۈچلۈك، بالىياتقۇ تار بولۇشىدىن ئىبارەت.

(2) مىقدار كېسىلى (مەرزى مىقدارى): بىرەر ئەزانىڭ تېگىشلىك ھەجمىدىن كىچىك ياكى چوڭ بولۇشى مەسىلەن، پىل پۇتى كېسىلى (دائىل فىل) كېسىلىدە بىر پۇتنىڭ چوڭ بولۇپ قېلىشى، سۈڭەك سىل كېسىلىدە سۈڭەكلەرنىڭ كىچىكلىشىپ قېلىشى قاتارلىقلار.

(3) سان كېسىلى (مەرزى ئەدەدى): ئەزالارنىڭ سان جەھەتتە كەم - ئارتۇق بولۇشى مەسىلەن، بارماقلار 4 ياكى 6 بولۇپ تۇغۇلۇش.

(4) ئورۇنلىشىش كېسىلى (مەرزى ۋەزىئىي): ئەزا-لارنىڭ ئەسلى ھالىتىگە قارىغاندا يېقىن ياكى يىراق بولۇشى مەسىلەن، بارماق ئارىلىقى بەك كەڭ ياكى تار بولۇپ تۇغۇلۇش، بەدەندە ھەرخىل قاقاق سۈڭەللەرنىڭ بولۇشى.

(5) زەخمىلىنىش كېسىلى (مەرزى تەبەرقىي ئىستال): بۇ ئايرىم كىشىلەردە ئۇچرايدىغان ئەزانىڭ سۇنۇشى، چىقىپ كېتىشى قاتارلىقلار.

2. مۇرەككەپ كېسەللىك (مەرزى مۇرەككەبە). بىر كېسەلگە يەنە باشقا بىر كېسەلنىڭ قوشۇلۇپ قېلىشى مەسىلەن، بىر ئەزاغا يىرىڭلىق جاراھەتنىڭ چىقىشى بىلەن پۇتۇن بەدىنىدە ھارارەت كۆتىرىلىپ، ئۈزگىرىش يۈز بېرىشى.

2 - پەسىل: كېسەللىكلەرنىڭ دەۋرى

- ھەر قانداق كېسەلدە توت زامان (دەۋر) بولىدۇ:
1. باشلانغان دەۋر: بۇ دەۋردە كېسەللىك يېڭىلا باشلىنىپ ئالامەتلەر (بەلگىلەر) ئاشكارا بولمايدۇ.
 2. ئېغىرلاشقان دەۋر: ئالامەتلەر ئېنىق كورۇلۇپ تەرەققى قىلىپ ئېغىرلاشقان دەۋرى بولۇپ دەرھال داۋا-لاشنى تەلەپ قىلىدۇ.
 3. توختىغان دەۋر: كېسەلنىڭ ئالامەتلىرى بىر ئىزدە توختايدىغان دەۋرى.
 4. قايتقان دەۋر: كېسەل ئالامەتلىرى تەدرىجى قايتىپ ساقىيىش بەلگىلىرى كورۇلۇشكە باشلايدۇ.

3 - پەسىل: زورۇر ۋاستىلار

ئادەمنىڭ ھاياتى ۋە سالامەتلىكىگە زورۇر بولغان مۇھىم ئامىللار 6 بولۇپ، ئۇلار ھاۋا، يىمەك-ئىچمەك، ھەركەت ۋە جىملىق (سۈكۈت) ئۇيقۇ ۋە ئويغاقلىق (بىدارلىق)، چىقىرىش ۋە قوبۇل قىلىش (ئىستىغراق ۋە ئېھتىباس)، ئەرازى نەفسانىيىدىن ئىبارەت. ئۇلارنى سىتتە زورۇرىيە دەپ ئاتىلىدۇ.

1. ھاۋا — ھاۋا بەدەندىكى ھاياتلىق كۈچى (روھى ھاياتى) نى تەرتىپكە سالىدۇ. يۈرەك ۋە ئوپكىنىڭ

ھەركىتى ئارقىلىق قاندىكى سېسىق (بەد بوي) ھاۋا بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلىنىدۇ. ساپ ھاۋا قاتنا قوشۇلۇپ ئومۇمىي بەدەننى تەمىنلەيدۇ. ھاۋا پەسىل ۋە يەر شارائىتىغا قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن باھار پەسلىدىكى ھاۋانىڭ كەيپىياتى ھول (بەزى تىۋىپلەر موتىدىل دەپ قارايدۇ)، يازنىڭ ھاۋاسى ئىسسىق، كۈزنىڭ قۇرۇق ۋە قىشنىڭ سوغاق كەيپىياتقا ئىگە. كېسەلنى تەكشۈرۈپ دورا بېرىشتە پەسىل ئەھۋالى ۋە ھاۋانىڭ ئۆزگىرىشىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ. ئادەتتىكى ۋاقىتلاردىكى ھاۋانىڭ كەيپىياتى بىردەك بولمايدۇ. مەسىلەن، جەنۇبتىن كەلگەن شامال ھول ئىسسىق؛ شىمالدىن كەلگەن شامال ھول سوغاق؛ كۈن چىقىشتىن كەلگەن شامال موتىدىل؛ كۈن پېتىشتىن كەلگەن شامال قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ.

ئەگەر تاغ شۇ جاينىڭ جەنۇپ تەرىپىدە بولسا شۇ ئورۇننىڭ ھاۋاسى سوغاق تاغ شىمال تەرەپتە بولسا ئىسسىق كەيپىياتلىق بولىدۇ.

دەريا جەنۇبتا بولسا ھاۋا قاتتىق ئىسسىق، شە-
مالدا بولسا، قاتتىق سوغاق بولىدۇ.

تاشلىق جايلارنىڭ ھاۋاسى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، مۇنداق جايلاردا ياشىغۇچى كىشىلەر كوپرەك مىگە كېسىلىگە ئۇچرايدۇ. سېغىز تۇپراقلىق يەر ھول ئىسسىق بولۇپ، مۇنداق جايلاردا ياشىغۇچى كىشىلەر ساغلام ئۆسۈپ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدۇ.

كوك قۇملۇق يەرلەر قۇرۇق سوغاق بولۇپ، مۇنداق ئورۇنلاردىكى كىشىلەر كوپرەك يۈرەك كېسىلىگە دۇچار بولىدۇ. چول باياۋان تاغلىق جايلارنىڭ ھاۋاسى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ كىشىلەردە قان كوپىيىپ كېتىدۇ.

2. يىمەك - ئىچمەك: ئادەم بەدىنىگە كىرگەن يىمەك - ئىچمەكلەردىن سۇدىن باشقىسى ئوزگىرىدۇ. سۇنىڭ ئەڭ ياخشىسى بۇلاق سۈيى بولۇپ، تۇپرىقى سېغىزلىق بولۇشى ۋە بۇلاقنىڭ ئاغزى كۈنگە قاراپ تۇرۇشى لازىم. بۇلاق ئەتراپىدا گۈڭگۈرت ياكى قەلەي كېنى بولغاندا بەكمۇ ياخشى. بۇلاقنىڭ ئورنى ئىگىز بولۇشى لازىم. دەريا سۇلىرى (قار - يامغۇر سۈيى) نىڭ ئېقىش ماسا - پىسى ئۇزۇن، تاش قوراملارغا ئۇرۇلۇپ ئېقىپ كەلگىنى ۋە تاتلىق تەملىك بولغىنى ياخشى. ئەكسىچە غەيرى تەملىك زەيكەش ۋە ئوت - چوپ لەشلىرى بولغان سۇ زىيانلىق بولۇپ، كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ. خام سۇ ئىچمەسلىك، سۇنى قاينىتىپ ئىچىش كېرەك.

غىزا (تاماق) لار توۋەندىكى بىر قانچە تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ:

(1) غىزايى مۇتلەق — بۇ خىلدىكى ئوزۇقلۇقلار بەدەنگە كىرىپ ئوزگىرىدۇ. لېكىن بەدەننى ئوزگەرتىمەي ئەزالارغا تارقايدۇ.

(2) شىپالىق تاماق (غىزايى داۋائى) بەدەنگە كىرىپ ئوزىمۇ ئوزگىرىدۇ، بەدەننىمۇ ئوزگەرتىدۇ، مەسى-

لەن، قەن، گۈلىقەن ۋە ھەسەل قاتارلىقلار، بۇلار بىر تەرەپتىن ئوزۇق، بىر تەرەپتىن داۋا بولىدۇ.

تاماقلار سىڭىشلىق (لەتپ)، ئېغىر (كەشىپ) دەپ 2 تۈرگە ئايرىلىدۇ؛ ياخشى قان سىڭىشلىق غىزادىن ھاسىل بولىدۇ. قويۇق قان ئېغىر غىزادىن ھاسىل بولىدۇ. ئوزۇقلۇق-قا باي بولغان تاماق ماددىلىرىنى كەسىرىلغىزا دەپ ئاتە-لىدۇ. توۋەندىكى جەدۋەلدە قىسقىچە تونۇشتۇرۇلىدۇ.

3. ئۇيىقا ۋە ئويغاقلىق: ئاز ئۇخلاش تاشقى ئەزانى سوۋۇتۇپ ئىچكى ئەزانى ئىستىدۇ. مىزاجى ھول كىشە-لەر كۆپ ھەركەت قىلىشى لازىم. مىزاجى قۇرۇق كىشە-لەر كۆپ ئۇخلاپ ئوتتۇرىچە ھەركەت قىلىش كېرەك.

4. ئەمگەك ۋە دەم ئېلىش: ئوتتۇرا دەرىجىدىكى ئەمگەك بەدەننى ئىستىدۇ. ھەددىدىن تېز ھاسىراپ ئىش قىلىش، بىردەم ئولتۇرۇپ يەنە بىردەم تېز ئىش قىلىش بەدەننى قۇرۇتىدۇ. ئۇزۇن دەم ئېلىپ ئاز مە-نەت قىلىش بەدەننى سوۋۇتىدۇ، بوغۇم ئاغرىقلىرىنى كەل-تۈرۈپ چىقىرىدۇ. كېرەكسىز ماددىلار بەدەندە تۇرۇپ قالىدۇ. جىنسى ئالاقە ھەركىتى كۆپ بولغاندا بەدەننى سوۋۇتىدۇ. تەبىئى ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەرىزى) نى كېمەيتىدۇ. يۈرەك كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

5. تېپەنمەس ۋە ئىستىفراغ: ئىستىفراغ دېگەن

بەدەندىن سۇيۇقلۇقنىڭ چىقىپ كېتىشى، ئىچى سۇرۇش، ھېيىزنىڭ كۆپ ۋە تېز مېڭىپ كېتىشكە ئېيتىلىدۇ. بۇ، بەدەننىڭ چىقىرىپ تاشلاش كۈچىنىڭ كۈچلۈك بولۇشى

تاماق تۈرلىرىنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى ۋە ھاسىل بولىدىغان كەيپۇس ئەھۋالى.

ناچار كەيپۇس			يۇقۇرى قىممەتكە ئىگە كەيپۇس.			ھاسىل بولىدىغان كەيپۇس
ئېغىر (كەشپ)	ئوتتۇراھال	سىڭىشلىك (لەتپ)	ئېغىر كەشپ	ئوتتۇراھال	سىڭىشلىك (لەتپ)	
كېمىك، توش-قان، قوتاز	بەسەي، قېرى قوي گۆشى	ئوپكە، كەپتەر باچكىسى	قالتىق پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىغى ياشە گۆشى	نان، بىرىش-لىق پاخالان گۆشى (ئەر-كەك)	چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىغى، مائۇل لەھەمىسى گۆش سۇيى ئۈزۈم (شارابى) سۇيى	ئوزۇقلۇق ماددە-لارغا باي (كەسە-رىلىقنىزا)
گۆش	تۈزلانغەن بېلىق گۆشى، گۆش	قۇرۇق ئەند-جۇر، خەرقاق پىشقان نان	موزاي گۆشى، كالا-پالچەك گۆشلىرى	ساغلىق قوي ۋە توگە تاي-لاق گۆشى	ئۈزۈم، نان (بۇغداي نېنى)	ئوتتۇرا ھال
باقلا، ئەدەس (بىر خىل پۇر-چاق)، چەيزە، قۇرۇتۇلغان گۆش.	سەۋزە	سامساق، قىچا	پىشلاق (يېڭى) ئۈگىرە ئاش، ئورۇق كالا گۆشى	چامغۇر	قاياق ئانا	ئوزۇقلۇق ماددىلىرى مول ئەمەس (قەللىل غىزا)

ياكى بەدەندە كېرەكسىز ماددىلارنىڭ كۆپلىگىدىندۇر. ئىستىفراغ بىلەن بۇ ماددىلار سىرتقا چىقىرىلىدۇ. ئېھتىياس ئىستىفراغنىڭ ئەكسى بولۇپ، تەرەتتىڭ ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى قاتارلىقلار بىلەن پۈتۈن بەدەن ئېغىرلىشىش، ئىشتىھاس تۇتۇلۇشلار كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى چىقىرىش يولىنىڭ تارىيىپ قېلىشى، توسالغۇلارنىڭ بولۇشى (بەدەننىڭ تۇتۇلۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئارتۇق بولۇشى ياكى بەدەن ماددىنى ئۆزىگە تارتىۋېلىپ ئەزالاردا سەرىپ بولمىغانلىقى)دىن كېلىپ چىقىدۇ.

6. ئەرازى نەفسانى: قۇۋۋىتى نەفسانىنىڭ مەڭگىدە بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ خىزمىتى ھەققىدە يۇقۇردىمىزدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق. شۇ خىزمەتلەرنىڭ ئۆز-گىرىشى ياكى جايىدا بولماسلىقى كېسەللىك كەلتۈرىدۇ. مەسىلەن، غەزەپلىنىش، قورقۇش قاتارلىق ئەھۋاللارمۇ كېسەل كەلتۈرىدۇ. چۈنكى قۇۋۋەيى نەفسانى پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالارغا قوماندانلىق قىلىدىغان كۈچتۇر.

۷ ماقالا. كېسەل پەيدا بولمىشنىڭ سەۋەپلىرى

1. توت خىلىتلەرنىڭ غەيرى تەبىئى ئۆزگىرىش-لىرى (يوقۇرىدا بايان قىلىندى).
2. تاشقى سەۋەپ: (بادىسە) — ئىسسىق ھاۋا ياكى قاتتىق سوغاقتا يالاڭ يۈرۈپ ئىش قىلىشقا ئوخشاش سىرتقى ئامىللارنىڭ تەسىرى. مۇنداق ھاللاردا بەدەن-نىڭ قارشىلىق كۈچى تۈۋەنلەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەدەن-دە يوشۇرۇنغان جەراسىم (مىكروپىلار) پۇرسەت تېپىپ كېسەل كەلتۈرىدۇ. ھەم مىڭىنىڭ قارشى تۇرۇش قابى-لىيىتى تۈۋەنلىگەنلىكتىن بەدەن ئاجىزلاشىپ ھەر خىل كېسەللەرگە شارائىت تۇغۇلىدۇ.
3. ۋاستىلىق ھالدا كېسەل پەيدا بولۇش (سايىقە): ھەر خىل پاكىز بولمىغان يەل-يېمىش، كوكتات ۋە تاماقلارنى، چىۋىنى، چاشقان، بۇرگە، پاشا قاتارلىق زىيان-داشلار بولغان يېمەك-ئىچمەكلەرنى ئىستىمال قىلىش بىلەن قېرىن ئۈچەي كېسەللىرى مەسىلەن، ئىچى سۇرۇش، قۇسۇش ۋە قوساق ئاغرىش قاتارلىقلار كىلىپ چىقىدۇ.
4. ۋاسىلە: چاڭ-توزاڭلاردىكى ھەر خىل ئوفونەت (بۇزۇق ھاۋا) ۋە جەراسىملەر نەپەس ئېلىش ئارقىلىق

ئوپكە قاتارلىق ئىچكى ئەزالارغا چۇشۇپ ئوپكە كېسىلى، ئاشقازان، ئۇچەي قاتارلىق كېسەللەرنى كەلتۈرىدۇ. تېرىگە ئورۇنلىشىپ ئاتمىشەك(سەمىلىس)، كويدۇرگە (قورۇھى سائىلە) قاتارلىق كېسەللەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

1 - پەسىل: ئىسسىقلىقتىن بولغان كېسەللەرنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) مىڭنىڭ پائالىيىتى (ھەركىتى نەفسانى) نىڭ تەسىرى، مەسىلەن قاتتىق غەزەپلىنىش قاتارلىقلار، قان ۋە سەپرالار بىرلىشىپ ھارارىتى غەربەنى ئاشۇرىدۇ. ھارارەتنىڭ ئېتىدالىدىن ئېشىپ كېتىشى ھەر خىل كېسەللەرنى كەلتۈرىدۇ. جىنسى ئالاقىمۇ ھەركىتى نەفسانى بولۇپ ئارتۇق بولۇپ كەتسە يۈرەك ۋە بورەك كېسەللىرىنى كەلتۈرىدۇ.

(2) جىسمانى ھەركەت (ھەركىتى بەدىنى) نىڭ تەسىرى. ھەر قاچان ئىنسان كۈچىگە قاراپ ئىش قىلىشى لازىم. كۈچى كۆپ بولسىمۇ ئىش قىلماسلىق بوغۇم كېسەللىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەركەت قابىلىيەتتىن ئارتۇق بولسا، بەدەن ھارارىتىنى ئاشۇرىدۇ. نەتىجىدە خىلىتلار ئوزگىرىپ كېسەل تۇغدۇرىدۇ.

2 - پەسىل: سوغۇقتىن بولغان كېسەللەرنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) تاشقى تەرەپتىن سوغۇق تېگىش.

2. ئىشتەينىڭ تولۇق بولماسلىقى - بۇ بەدەننى

سوۋۇتۇپ ھارارەتنى ۋە نەملىكنى كېچەيتىدۇ. كوپ يەپ ئاز ھەركەت قىلىش سۈۋۋىتىدۇ. مەئىدە ۋە ئوپكىگە كېرەكسىز ماددىلارنى توپلاپ قويىدۇ.

(3) ھاراقنى كوپ ئىچسە يەدەننى سوۋۇتىدۇ (ئاز ئىچسە قىزىتىدۇ).

(4) يەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ يىغىلىپ قېلىشى (تەكاسىپ)، بۇ ئەھۋال يەدەن ھارارىتىنى توۋەنلەش-تۇرۇپ يەدەننى سوۋۇتىدۇ. ئوشۇقچە ھوللۇك (رۇتوبەتى فوزۇلى) ھاسىل قىلىدۇ.

3 - پەسىل: قۇرۇق ۋە ھوللۇكتىن بولغان كېسەللەرنىڭ سەۋەپلىرى

(1) قۇرۇق تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى كوپ ئىستە - مال قىلىش.

(1) چوللۇك ۋە قۇرغاق جايلاردا ياشاپ كۆكتات، يەل يىمىشلىرىنى يىمەسلىك.

(2) ئاز يەپ كوپ ھەركەپ قىلىش.

(3) ئۇخلىماسلىق.

(2) ھوللۇكتىن بولىدىغان كېسەللەر سەۋەپلىرى

ھوللۇكتىن بولىدىغان كېسەللەرنىڭ سەۋەپلىرى ئاسا -

سەن ئۇزاققىچە ئەمگەكتىن ئايرىلىپ قېلىش، كوپ -

ئۇخلاش، سوغاق سۇنى كوپ ئىچىش ۋە كوپ يەپ

ئاز ئىش قىلىشلاردىن ئىبارەتتۇر.

4 - پەسىل: ئوتۇش يوللىرىنىڭ كېڭىيىشى ۋە تارىيىپ قېلىشى

1. ئوتۇش يوللىرىنىڭ كېڭىيىشى: قانتومۇر، تەرەت يولى ۋە تاماق يوللىرىدا ئۇچرايدۇ. سەۋىيى ئىزالاردىكى تۇتۇش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەت ماسىكە) نىڭ كۈچسىز بولۇشى ۋە چىقىرىپ تاشلىغۇچى كۈچ (قۇۋۋەت) داپىئە) نىڭ كۈچلۈك بولۇشىدۇر. ياكى بوشاشتۇرغۇچى دورىلارنى (زىرخ، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى) ئىستىمال قىلىشتىن بولۇشى مۇمكىن.

2. ئوتۇش يوللىرىنىڭ تارىيىشى: (1) تۇتۇش قۇۋۋىتى كۈچلۈك ۋە چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز بولۇشى، (2) كۈچنى ئاجىزلاشتۇرغۇچى دورىلار (ئاق لەيلى، ئەكىل مېلىك قاتارلىقلار) نى ئىشلىتىش (بۇلار چىقىرىپ تاشلاش كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ). قورغۇچى ئىسسىق دورىلارنى (مەسىلەن، ئاقىر قەرە، دارچىن، گۈل سۇسەن، سۇپارى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش؛ (4) سوغاق دورىلار (كافور، يۇمىلاقسۇت، سېمىز ئوت، پاقا يوپۇرمىغى) نى ئىشلىتىش؛ (5) ئوتۇش يوللىرىغا جاراھەت چىقىپ ئارنۇق ھاسىل بولۇش ياكى ئۈلۈك گۆش ئۇنۇپ قېلىش؛ (6) يات جىسىملار شۇ يوللارغا چۈشۈپ توسۇپ قويۇش ياكى سۇيىدۇك يوللىرىدا تاش ھاسىل بولۇش. بەزى ۋاقىتلاردا مەقەت (ئارقا يول) نىڭ پۈتەيلى.

شېپ قېلىشمۇ ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى مەقئەتنىڭ يارد-
لىنىشى ياكى سوغاقلۇقنىڭ ھەددىدىن ئېشىپ كېتىشىدۇر.

5 - پەسىل: بەدەن تېرىلىرىدىكى ئوزگىرىش (قۇرۇپ قېلىش)

بۇ تاشقى ۋە ئىچكى سەۋەپتىن بولىدۇ. ئىچكى
سەۋەپتىن بولىدىغىنى ھاۋا، قان ۋە سەپرا ھارارىتىنىڭ
كوتۇرۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. تاشقى سەۋەپتىن بولىدۇ-
غىنى توپا - چاڭ ۋە ھاۋادىكى جەراسىم (مىكروپ)لارنىڭ
تېرىگە ئورۇنلىشىپ تەسىر قىلىشى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ.
6 - پەسىل: شەكىل (قىياپەت) بۇزۇلۇشىنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) بالىنىڭ ئانا قوسىغىدىكى تۇزۇلۇشنىڭ
يېتەرسىز بولۇشى. مەسىلەن، شەكىللەندۈرۈش قۇۋۋىتى
(قۇۋۋەيى مۇسەۋۋىرە) نىڭ ناچارلىغىدىن بالا قىياپەت
جەھەتتىن كەمتۈك تۇغۇلىدۇ. ياكى ئوزگەرتكۈچى قۇۋۋەت
(قۇۋۋەيى مۇغەييىرە) نىڭ ناچار بولۇشىدىن شەكىلى ئوز-
گەرگەن ھالدا تۇغۇلىدۇ.

(2) ئاتىلىق ئۇرۇغى، ئانىلىق تۇخۇمنىڭ ياخشى
بولماسلىقى، (ساغلام ياكى تازا بولماسلىقى) سۇس
بولۇشى تۈپەيلىدىن بالا شەكىل جەھەتتىن ھەرخىل يې-
تەرسىزلىكلەر بىلەن تۇغۇلىدۇ.

(3) تۇغۇلۇش جەريانىدا زەخمىلىنىش، تۇغۇلغاندىن
كېيىن كېسەللىنىش، زەخمىلىنىش تۈپەيلىدىن بالىدا
ھەرخىل مېمپىلىقلار، دوكلۇق يۈز بېرىدۇ.

VI ماقالا. تومۇر ھەركەتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئەھمىيىتى

تومۇرنىڭ ھەركىتى نەبىز دىيىلىدۇ. نەبىز قىزىلتومۇر (شېرىيان) نىڭ ھەركىتىدىن ئىبارەت. شېرىياندا ئىككى ھەركەت ۋە ئىككى سۈكۈت (جىملىق) بولىدۇ. ئىككى ھەركەت كېڭىيىش (ئىنبىسات) ۋە تارىيىش (ئىنقىباز) دىن ئىبارەت. ھەركەت ئوتتۇرىسىدىكى جىملىق دەۋرى روشەن مەلۇم بولمايدۇ. تەۋپ تومۇرنى تۇتقاندا كېڭىيىش ۋە تارىيىشنىڭ مۇددىتى قانچىلىك ھەم سۈكۈتنىڭ مۇددىتى قانچىلىك ئىكەنلىگىنى ئېنىق بىلىش لازىم. كېڭىيىش ھەركىتى ئاسان سېزىلىدۇ، دائىم قول ئۇچىغا ئۇرۇنىدۇ. تومۇر كۈچى ناچارلاشقاندا تارىيىشنى بىلىش قىيىن. مۇنداق ھاللاردا تومۇر ھەركىتىدە قاتتىقلىق، تېزلىك ۋە كىچىكلىكىنى سېزىش (سۈزدەش) لازىم.

قىزىلتومۇرنىڭ ھەركىتى يۈرەك ھەركىتىگە تەۋە بولۇپ، ئۇنىڭ ھەركىتى يۈرەك ھەركىتى بىلەن باراۋەر كېلىدۇ، ئارتۇق، كەم بولمايدۇ. قىزىلتومۇر يۈرەكنىڭ پۈتۈن ئەزالارغا بارىدىغان شاخچىسى بولۇپ، بىرەر ئەزادە ئىوزگىرىشى يۈز بېرىپ قىزىلتومۇر ھەركىتىدە

توسالغۇ بارلىققا كەلسە يۈرەككىمۇ ئۇنىڭ تەسىرى پەيدا بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ. قىزىلتومۇرمۇ تېزلىشىدۇ.

1 - پەسىل: تومۇرنىڭ ئەھمىيىتى

يۈرەك باشقۇرغۇچى ئەزا بولۇپ، بەدەندىكى قىزىلتومۇرنىڭ ھەممىسى يۈرەكتىن چىقىدۇ. يۈرەك نەپەس (ساپ ھاۋا) ئېلىش ئۈچۈن ئۆپكىدىن ياردەم ئالىدۇ. بەدەنگە ھاياتلىق ھاۋا ۋە قۇۋۋەتلەرنى قىزىلتومۇرلار يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. قاندىكى بۇزۇق ھاۋا ۋە كېرەكسىز ماددىلار يۈرەك ۋاستىسى بىلەن ئۆپكە ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىدۇ. دىمەك بەدەننىڭ ھاياتلىغى تەبىئىي ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەرىزى) بىلەن مەۋجۇت تۇرىدۇ. بۇ كۈچ يۈرەكتە بو-لىدۇ. شۇڭا ھارارىتى غەرىزىنىڭ ئەھۋالى يۈرەكتىن بىلىنىدۇ. تىۋىپ بۇنى تومۇردىن تاپىدۇ. چۈنكى قىزىل-تومۇر ئىچىدە قان - ھاياتلىق كۈچ بار.

شۇنىڭ ئۈچۈن تىۋىپ بەدەندە ھاياتلىق كۈچ (قۇۋۋەيى ھاياۋانى) ۋە ھاجەتنىڭ ئاز - كوپلىگىنى بىلىشنى مەقسەت قىلغان ھالدا تومۇرنى تۇتۇپ قىزىلتومۇر ھەرىكىتىدىن ئىزلەش لازىم. كېسەل ئادەمنىڭ تومۇرىنى تۇتۇش بىلەن ئەڭ ئاۋال تومۇرنىڭ تېز ياكى ئاستىلە - غىنى، باراۋەر ياكى ئىگىز - پەسلىگى، ئىسسىق - سوغاق، قاتتىق - يۇمشاقلىق ئەھۋاللىرىنى بىلىشى لازىم. بۇلارنى

تەكشۈرۈپ تېپىلسا يۈرەكنىڭلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن بەدەننىڭ ئەھۋالىنى مولچەرلەپ بىلگىلى بولىدۇ.

2-پەسىل: تومۇردىن نىمىلەرنى بىلگىلى ۋە قانداق بىلگىلى بولىدۇ

تومۇرنى بىلىش ئۈچۈن بىلەيزۇك بېغىشىدىكى شىريان تومۇرىنى تۇتۇش لازىم. بۇ تومۇرنى ئوبدان سەزگىلى بولىدۇ، چۈنكى گۆش قاتلاملىرى قېلىن ئەمەس ۋە تومۇر ئۈزە جايلاشقان بولۇپ يەل ياكى باشقا نەرسىلەر تولغان ئەمەس. باشنىڭ چېكە تومۇرىدىنمۇ ئاسان بىلگىلى بولىدۇ. ئەمما كۆپ ئىشلىتىلمەيدۇ.

تەۋىپ باشبارماقتىن باشقا 4 بارمىغىنى كېسەلنىڭ تومۇرى ئۈستىگە قويۇپ تۇتۇدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تەۋىپ ئوزنىڭ قول بارماق ئۈچىنى ياخشى ئاسرىشى كېرەك. كېسەل قولىنى ئالدى ياكى كەينىگە قىلماستىن تۈز تۇتۇشى، بىر نەرسىگە تايانماسلىقى لازىم. ئالدى بىلەن تەۋىپ تومۇرىنىڭ سۇس ياكى كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بايقاپ ئېلىپ، كۈچلۈك بولسا ئوتتۇرا كۈچ بىلەن، ئاجىز بولسا يېنىك كۈچ بىلەن بارماق ئۈچىنى كېسەلنىڭ بىلەيزۇك بېغىش تومۇرى ئۈستىگە قويۇشى كېرەك. كېسەل مۇرەككەپ بولسا ئۇزۇنراق تۇتۇپ قانداق ئوزگىرىش بارلىغىنى ئېنىق بىلىش لازىم. تۇتۇپ

تۇرغاندا تومۇر ئوز ھالدىن ياندىۇ. بۇنى ئەستىن چىقارماسلىق كېرەك.

تومۇرنىڭ چوڭ - كىچىكلىگى، ئىسسىق - سوغاقلېغى، كۈچلۈك - ئاجىزلىغى، توختاپ - توختاپ ياكى ئارقا - ئارقىدىن سېلىشى قاتارلىق ئەھۋالنى ئېنىق بىلگىچە تۇتۇش لازىم.

تومۇرنى تۇتقاندا كېسەل كىشى قورقۇش، خۇشلۇق، غەم، ھىرىش، مونچىغا كىرىش، كوپ ئۇخلاش، ئۇيقۇ - سىزلىق، تولا ئاچلىق، تولا توقلۇق، غەزەپكە ئوخشاش 10 ئىشتىن خالى بولۇشى شەرت. ھەربىر كىشىنىڭ مىزاجى ھەرخىل بولىدۇ. پەسىل ھاۋا ۋە ئولتۇراق جاي - مۇ بىردەك بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تومۇر تۇتقاندا ھەر ئادەمنىڭ يېشىغا، پەسىلگە، ھاۋانىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالىغا قاراپ تومۇرنى ئايرىش، تومۇر ئەھۋالىدىن ئۆزگىرىش مەلۇم بولسا، ئۆزگىرىشنىڭ سەۋەپلىرى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈش كېرەك.

3 - پەسىل: تومۇرنىڭ تۇرلىرى ۋە ھەركىتى

تومۇرنىڭ ئۇرۇشى 7 خىل بولۇپ، بۇ 7 قىس - مەت دىيىلىدۇ.

1. تومۇرنىڭ ھەركەت مىقدارىدىن ئولچەش.

ھەركەت مىقدارىدىن ئولچەش دىگىنىمىز، تومۇر -

نىڭ كېڭىيىش (ئىسبىسات) ۋە تارايىش (ئىنقىباز) ھە -

كىتىدىن ئىزلەش دىگەنلىك بولۇپ 7 خىلغا بولىنىدۇ.
(1) ئۇزۇن (تەۋىل): تومۇرنىڭ ھەركىتى تىۋىپنىڭ بارماقلىرىغا مولچەرايلىغاندىن ئۇزۇنراق (شۇ كىشىنىڭ ساق ھالىتىدىكى تومۇر ھەركىتىدىن ئۇزۇن) سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى مەزكۇر كىشىدە ھارارەتنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن ئىبارەت.

(2) قىسقا (قەسىر): تومۇرنىڭ ھەركىتى قىياسقا نىسبەتەن قىسقىراق سېزىلىدۇ، ئۇزۇن داۋام قىلمايدۇ. سەۋىبى بەدەن ھارارىتىنىڭ تۆۋەن بولغانلىقىدۇر.

(3) موتىدىل: تومۇر ھەركىتى تىۋىپنىڭ قولىغا ئۇزۇن - قىسقىلىقتا تەكشى بىلىنىدۇ. بۇ مىزاجنىڭ ياخشىلىغى ۋە كەيپىياتنىڭ تەكشى ھالدا تۇرغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
(4) توم (ئەرز): تومۇر ھەركىتى قىياستىن توم - راق سېزىلىدۇ، سەۋىبى بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپىيىگەنلىكىدۇر، بۇ كۆپرەك بەلغەم مىزاجلىق ئادەملەردە كۆرىلىدۇ.

(5) ئىنچىكە (زەيىق): پۇتۇن تومۇر بويىچە قان - نىڭ دولقۇنى قىياستىن ئىنچىكە سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى بەدەندە سۇيۇقلۇق ئازىيىپ، قۇرۇقلۇق غەلبە قىلغانلىقىدىن ئىبارەت.

(6) موتىدىل: پۇتۇن تومۇر ھەركىتىدە توم ۋە ئىنچىكىلىكنىڭ تەكشىلىكى بولۇپ، بۇ بەدەندە كەيپىياتنىڭ ئوتتۇرا ھالىتى ۋە مىزاجنىڭ ياخشىلىغىنى بىلدۈرىدۇ.

7) پەس (مۇنخەفېز): پۇتۇن تومۇر بويىچە تومۇر چوڭقۇر ۋە پەسەلەپ كەتكەن سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى ھارارەتنىڭ تۈۋەنلەپ كەتكەنلىكىگىدۇر.

8) ئۇستۇن (مەشرۇپ) تومۇر ھەركىتى قىياسقا قارىغاندا ئۇستۇن كوتىرىلىپ، لەيلىگەن سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى ھارارەتنىڭ ئۇستۇنلىكىدىن ئىبارەت.

9) موتىدىل: تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۇستۇن ۋە تۈۋەنلىكتە تەكشىلىكى بولۇپ، بەدەن ھارارىتى ئۈلچەمگە لايىق (ئېتىدالدا) ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

يۇقۇرقىلار تىۋىپنىڭ بارماقلىرىغا قىزىلتومۇرنىڭ كېڭىيىش - تارىيىش ھەركەتلىرىدە بىلىنىدىغان بەلگىلەر بولۇپ، تۈۋەندىكىچە پەرق ئېتىلىدۇ:

1) ئۇزۇن: تومۇر ھەركىتى 3 بارماق ئاستىدا سىزىلىدۇ.

2) قىسقا: تومۇر ھەركىتى 3 بارماق ئاستىدا

ئەمەس، بەلكى بىر بارماق ئاستىدا سىزىلىدۇ.

3) كەڭ (توم): بارماق ئۇچى تومۇرنىڭ كەڭلىكىنى

سېزىدۇ.

4) ئىنچىكە: كەڭنىڭ ئەكسى.

5) ئۇستۇن: تومۇر ھەركەت قىلغاندا تېرە تەرد...

پىگە كوتىرىلىپ ھەركەت قىلىدۇ.

6) پەس: تومۇر گۆش ئىچىگە چۈشۈپ ھەركەت قىلىدۇ.

2 خىل ھەركەتنىڭ بىرگە كېلىشى جۈپ تومۇر

(نەبىزى شىنائى) دىيىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇزۇن بىلەن توم

(يوغان)، توم بىلەن ئۇستۇن (ئىگىز)، قىسقا بىلەن توم

بىللە كېلىدۇ. لېكىن بۇلارنىڭ ئەكسىچە كېلىشى مەسەلەن، ئۇزۇن ۋە قىسقا، توم ۋە ئىنچىكە، ئۇستۇن ۋە پەس تومۇرنىڭ بىللە كېلىشى مۇمكىن ئەمەس. ئەگەر تەسادىپى كۆرىلىپ قالسا، بۇ كېسەلنىڭ ئۆلۈمىدىن خەۋەر بېرىدۇ. چۈنكى يۈرەك ۋە ھاياتلىق قۇۋۋىتىنىڭ قالايمىقانلىغىدىن بۇ ئەھۋال كېلىپ چىقىدۇ. 3 خىل ھەركەتنىڭ بىرگە كېلىشى 3 بىرلەشمە تومۇر (نەبىزى سۇلاسى) دىيىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇزۇن - توم ۋە ئۇستۇننىڭ بىللە سېزىلىشى ياكى قىسقا - ئىنچىكە - پەسنىڭ بىللە سېزىلىشى، مۇنداق ئەھۋاللار كېسەلنىڭ داۋالاش دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى بولۇپ، بۇ خىل ئاغرىق - لارنى داۋالاشتا كۆپ ئېھتىيات قىلىش كېرەك. چۈنكى تىبابەت قانۇنىدا كۆپ ھەم ئاز، ئىسسىق ھەم سوغاق ۋە قۇۋۋەتلىك بىلەن ئاجىزلىقلار بىر كەيپىياتتا جەمئىي كەلمەيدۇ دەپ قارىلىدۇ.

2. تومۇر ھەرىكىتىنى ئۇنىڭ دولقۇن كەيپى - ياتىدىن ئۆلچەش:

(1) كۈچلۈك - تومۇر تىۋىپنىڭ بارماقلىرىغا قاتتىق ئۇرۇنىدۇ. لېكىن ئۇنى شۇ ئادەمنىڭ ساغلام ۋاقتىدىكى تومۇرنىڭ كۈچى بىلەن قىياسەن سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش لازىم. كۈچلۈكنىڭ سەۋىيى ھاياتلىق كۈچىنىڭ ئارتۇقلىغىدۇر.

(2) كۈچسىز - بارماق ئۇچىغا تومۇر ھەرىكىتى كۈچسىز ئۇرۇنۇپ، قىيىنلىق بىلەن سەزگىلى بولىدۇ. بۇ،

بەدەندە ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋەتى ھاياۋانىي) نىڭ ئاجىز -
لىغىدىندۇر.

3) موتىدىل - تومۇرنىڭ بارماققا تېپىش كۈچىنىڭ
قىياس بىلەن تەڭ بولۇشى. بۇ، ھاياتلىق كۈچىنىڭ
ئولچەمگە لايىق (ئېتىدال) ھالەتتە ئىكەنلىكىدىن دېرەك
بېرىدۇ.

3. تومۇر ھەركىتىنىڭ ۋاقتى جەھەتتىن ئول -
چەش: بۇ تۈۋەندەكى 3 خىلغا بۆلىنىدۇ.

1) تېز - تومۇر ئوز ھەركىتىنى قىياستىن قىسقا
ۋاقىت ئىچىدە تامام قىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى ساپ ھاۋا -
غا (ھاۋايى نەنسىھىگە) بەدەننىڭ تەلىۋى كۈچلۈك
بولغانلىغىدۇر.

2) ئاستا - تومۇر ئوز ھەركىتىنى قىياستىن ئۇزۇن
ۋاقىت ئىچىدە تاماملىغانلىقى بولۇپ، بەدەننىڭ ساپ
ھاۋاغا تەلىۋىنىڭ ئازلىغىدۇر.

3) موتىدىل - تومۇر ئوز ھەركىتىنى قىياس بىلەن
تەڭ بولغان ۋاقىت ئىچىدە تاماملىغانلىقى بولۇپ،
بەدەننىڭ ھاۋاغا بولغان تەلىۋىنىڭ ئوتتۇرا ھالدا
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

4 - تومۇر ھەركىتىنىڭ جىملىق ۋاقتىدىن ئول -
چەش: بۇ، 2 ھەرىكەت ئوتتۇرىسىدىكى دەم ئېلىش
(جىم تۇرۇش) ۋاقتىدىن ئىبارەت بولۇپ، 3 كە بۆلىنىدۇ.
1) بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) - جىملىق ۋاقتى

ئۈلچەمدىكى ۋاقىتتىن قىسقا بولغانلىقى بولۇپ، قۇۋۋەيى ھايۋانىيىنىڭ ناچارلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

(2) پەرقلىق (مۇتەفاۋۇت) — بۇ، جىملىق ۋاقتى ئۈلچەمدىن ئۇزۇنراق بولغانلىغىدۇر. بۇنىڭ سەۋىيى قۇۋۋىتى ھايۋاننىڭ ئارتۇق بولغانلىقى.

(3) موتىدىل — جىملىق ۋاقتىنىڭ ئۈلچەمگە لايىق بولغانلىقى بولۇپ، قۇۋۋىيى ھايۋاننىڭ ئوتتۇرا ھالدا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

5. تومۇرنىڭ كەيپىياتىدىن ئۆلچەش:

(1) قاتتىق — تومۇر قىياسقا قارىغاندا قاتتىق بەللىنىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەندە قۇرۇقلۇقنىڭ ئارتۇق بولغانلىغىدۇر.

(2) يۇمشاق — تومۇر بارماق ئۇچىغا يۇمشاق بىلەنىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپلىگەندىن ئىبارەت.

(3) ئىسسىق — تومۇرنى تۇتقاندا قول ئۇچىغا ئىسسىق سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەننىڭ ھارارىتى ئارتۇق بولمىشىدىن ئىبارەت.

(4) سوغاق — تومۇرنى تۇتقاندا قول ئۇچىغا سوغاق سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەندە ھارارىتنىڭ ئاجىزلىغىدىن ئىبارەت.

(5) موتىدىل — تومۇرنى تۇتقاندا ئىسسىق-سوغاقلىقنىڭ ئوتتۇراھال بولۇشى بولۇپ، بەدەندىكى ئىسسىق-سوغاقنىڭ باراۋەرلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

6. تومۇر ئىچىدىكى روھ يەنى كۈچتىن ئۇل-
چەش: يەنى تومۇرنىڭ تولۇق، بوش ۋە ئوتتۇراھال
بولىشىدىن ئۆلچەش.

(1) تولۇق بولغاندا تومۇر ھەركىتى قولغا تولۇق
سېزىلىدۇ. بۇ بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ مولچەردىن كۆپ
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

(2) بوش بولغاندا تومۇر ئىچى خۇددى بوشاپ
قالغاندەك سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بەدەندە سۇيۇقلۇق-
نىڭ ئازايغانلىقىدىن ئىبارەت.

(3) مۆتىدىل بولغاندا تولۇق ۋە بوشلۇقى ئۇل-
چەمگە لايىق بولىدۇ. بۇ، بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ ئوت-
تۇراھال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

7. تومۇر ھەركىتىنىڭ تەركىبىگە ئاساسەن ئۆلچەش:
(1) تومۇر ھەركىتىدىكى تەكشىلىك (ئىستىۋا) ۋە
پەرق (ئىختىلاپ) دىن ئۆلچەش:

ئىستىۋا دەپ تومۇر ھەركىتىدىكى تەكشىلىككە،
يەنى چوڭ-كىچىك، كۈچلۈك-كۈچسىز، ئاستا-تېز بىر
تۇتاش (مۇتەۋاتىر) ۋە ئارىلىغۇچى (مۇتافاۋۇت)لىققا
ئوخشاش ئەھۋاللارنىڭ بىردەك مەۋجۇتلۇغىغا ئېيتىلىدۇ.
ئىختىلاپ دەپ ئۇنىڭ ئەكسىگە ئېيتىلىدۇ.

(1) پۇتۇن تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۈچ باسقۇچىدا
بىر-بىرىگە ئوخشاشلىق (مۇتەشەبھە) ياكى بىر-بىرىگە
قارشىلىق (مۇتەخالىپ) بولىدۇ. ئەگەر ئوخشاشلىق بولسا

مۇتلەق تەكشىلىك؛ ئوخشاشلىق بولمىغاندا مۇتلەق مۇختەلىپ دىيىلىدۇ.

مۇتلەق تەكشى (مۇستەۋى مۇتلەق)؛

ئەگەر بەزىدە باراۋەر بولۇپ، بەزىدە باراۋەرلىك بولمىسا باراۋەر بولغان تەرىپى تەكشى (مۇستەۋى)، باراۋەر بولمىغان تەرىپى مۇختەلىپ دىيىلىدۇ.

(2) توت بارماق ئاستىدا بولغان تومۇرنىڭ باسقۇچىدا ئوخشاشلىق بولسا مۇتلەق تەكشى، ئەگەر قارشىلىق بولسا مۇتلەق مۇختەلىپ دىيىلىدۇ.

(3) بىر باسقۇچ تومۇرنىڭ بىر قىسمى يەنى بىر بارماقتىكى بەلگىلەر ئوخشاش بولغاندا تەكشى؛ ئوخشاش بولمىغاندا قارىمۇ-قارشى (مۇتەخالىپ) دىيىلىدۇ.

تەكشىلىك (مۇستەۋى) نىڭ سەۋىيىسى بەدەن ئەھۋالى ۋە مىزاجنىڭ ياخشىلىغى، مۇختەلىپنىڭ سەۋىيىسى مىزاج-نىڭ ناچارلىغى ۋە خىلىتلەرنىڭ ئېغىرلىغى (كوپلىغى) دۇر.

(2) مۇنتىزىملىق — بۇ مۇنتىزىم ۋە غەيرى مۇنتىزىملىق دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ:

(1) مۇنتىزىم — بۇ، تومۇر ئوز ھەرىكىتىدە بىر، ئىككى ياكى ئۈچىدىن ئارتۇق دەۋرنى ساقلاپ قېلىشتىن ئىبارەت.

مەسىلەن، تومۇرنىڭ تېزلىكى دەسلەپكى باسقۇچتا بىر قىياسكە توغرا بولۇپ، ئىككىنچى باسقۇچلۇق ۋە ئۈچىنچى باسقۇچلۇق دەۋرىدە مۇشۇ تېزلىكنى ساقلاپ

قېلىشى مۇنتىزىم دىيىلىدۇ. ھەر بىر تومۇرنىڭ بەلگىلىك تېزلىكى شۇ تومۇرنىڭ ئالدىنقى تېزلىكى بىلەن تەڭ بولۇپ، بۇ مۇئەييەن مىقدارغا بارىدۇ - دە، كېيىن يەنە ئەسلىدىكى مىقدارغا قايتىدۇ. مۇنداق بولىشى ئىختىلاپ سەۋىيىنىڭ ئاجىزلىغىدىن ئىبارەت. ئەگەر بۇ سەۋەپ كۈچ - لۈك بولغاندا پەرقلىق (مۇتەفاۋۇت) ۋە بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) لىق پەيدا بولۇپ، بىر ھالەت بىلەن تۇرماسلىقى مۇمكىن.

(2) غەيرى مۇنتىزىم - ئىككى دەۋر ئىچىدە تېزلىكنى بىردەك ساقلاپ قالالمايدۇ. ئۈزگىرىپ كېتىدۇ.

(3) تومۇرنىڭ ۋەزىنىدىن ئۆلچەش: ۋەزنى دېگىنىمىز ئېغىر ۋە يەڭگىللىك بىلەن چىقىشتۇرىدىغان قىياستىكى ئۆلچەمدىن ئىبارەت. ئادەملەردە تومۇر مىزاج، تەن قۇرۇلۇشى، يېشى، ئولتۇراق جايىنىڭ ھاۋاسى ۋە تومۇرنى ئۆلچىگەن پەسلىنىڭ تەبىئىيىتىگە قاراپ ھەر خىل ۋە ئالاھىدە بولىدۇ. تومۇر ھەرىكىتىنىڭ مۇنداق ئەھ- ۋاللارغا ئۇيغۇن ھالدا بولۇشى ئادەم سالامەتلىكىنىڭ توغرا يول بىلەن كېتىپ بارغانلىغىدۇر. بۇنى مۇئەييەن ۋەزىن دىيىلىدۇ. ئەگەر ئەھۋال ئۇنىڭ ئەكسىچە بولسا - بۇزۇق ۋەزىن (رەددۇلۋەزىن) دىيىلىدۇ. بۇ توۋەندىكىچە 3 كە بولىنىدۇ.

(1) چېكىندىن ئاشقان ۋەزىن (مەجاۋۇزۇلۋەزىن) - بىر ياشلىق بالىنىڭ تومۇرى ئۆسمۈر ياكى ياشلارنىڭ تومۇرىغا ئوخشاپ قېلىشى.

(2) تەرتىپسىز ۋەزىن (خارىجۇلۋەزنى): بالىنىڭ تومۇر ھەركىتى ھەر قانداق ياشتىكىلىرىنىڭ تومۇرىغا ئوخشىماسلىقى بەلكى كېسەل ئادەم تومۇرىدەك تىترەپ تۇرۇشى.

تومۇرنىڭ يۇقۇرقى تۇرلىرى يامان ئاقىۋەت ۋە بەدەندىكى چوڭ ئۆزگىرىشلەرنىڭ بەلگىسى بولۇپ، تەبىئى قۇۋۋەتنىڭ ساپ ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن تومۇرغا مۇھتاج بولغانلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئەگەر ئىچكى بەدەندە ھارارەت زىيادە بولۇپ، سوۋۇتۇشتىن (تەۋرى) ھاجەت كۆپ بولسا ھەركەت كۆپ. چىنىڭ يېتەرلىك بولۇشى بىلەن ھەركەتلىنىدىغان تومۇر تەسىرىنى قوبۇل قىلىپ نەتىجىدە تومۇر يوغان سالىدۇ. ئەگەر ساپ ھاۋاغا مۇھتاجلىق قاندۇرۇشقا بولمايدىغان دەرىجىدە بولسا تومۇر تېز، مۇتەۋاتىر ياكى يوغان بولىدۇ. تومۇرنىڭ ھەمكارلىشىش كۈچى ناچار بولسا، تومۇر تېز ۋە ئىنچىكە بولىدۇ.

تومۇرنىڭ يۇمشاق بولۇشى ھوللۇكنىڭ، قاتتىق بولۇشى قۇرۇقلۇقنىڭ بەلگىسى. ئەگەر تومۇر ھەركىتىدىكى دولقۇنغا ئازراق قاتتىقلىق قوشۇلسا، بۇ — مىڭ، مەئدە ۋە ئۈچەيلەردىن ماددىلارنىڭ باشقا ئەزالارغا ھەيدەلگەنلىكىدۇر. تومۇرنىڭ قالايمىقانلىقى بەدەندىكى قۇۋۋەتلەر يوقىلىپ كېتىپ بارغانلىقىنىڭ ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ. ئەگەر بۇ ھال داۋاملىق يۈز بەرسە تومۇر ئۆزىنىڭ ھەركەت نىزامى (قانۇنىيىتى) ۋە ۋەزىنى يوقىتىدۇ.

4 - پەسىل: تومۇرنىڭ سەۋەپلىرى

تومۇر ھەركىتىنى بارلىققا كەلتۈرگۈچى ئامىللار (ئەسۋابى ماسىكە) توۋەندىكىچە 3 كە بۆلىنىدۇ.

(1) ئالەت: يۈرەك ۋە قىزىلتومۇر (شېرىيان) ئالەت دېيىلىدۇ.

(2) پائىل: ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋەيى ھاياۋانى)، يەنى تومۇرنى ھەركەتلەندۈرگۈچى قۇۋۋەت.

(3) ھاجەت: يەنى بەدەننىڭ ساپ ھاۋانى قوبۇل قىلىپ، بۇزۇق ھاۋانى چىقىرىپ تاشلاش ئېھتىياجى. تومۇر كېڭىيىش بىلەن سىرتتىن تازا ھاۋانى ئېلىپ قىزىلتومۇرلار ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يۈرەكنىڭ ھاۋاغا بولغان ئېھتىياجىنىمۇ قاندۇرىدۇ. تومۇر تارىيىش (ئىنقىباز) بىلەن ھاۋا ئىچكى ئەزالارنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا ئورنىتىۋالغان كېرەكسىز بۇس بۇخارات ۋە باشقا كېرەكسىز ماددىلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ.

ئالەت، ھاياتلىق كۈچ ۋە ھاجەتنىڭ يۇمشاق - قاتتىقلىق، كۈچلۈك ۋە كۈچسىزلىك جەھەتتىن مۆتىدىل بولىشى تەبىئىدۇر. تەبىئى بولغاندىلا ھەركەت پۈتۈن بولىدۇ. ئەگەر پائىل كۈچلۈك بولسا ھاجەتنىڭ ئوتتۇرا ھالدىن كەم ياكى ئارتۇق بولىشى مۇمكىن ئەمەس. ئالەتلەرنىڭمۇ ئەسلىدىن قاتتىق ياكى يۇمشاق

بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. تومۇرنىڭ كۇچى تەبىئى ھال-
دىن ئۆزگىرىشى ھاجەتنىڭ ئارتۇق ياكى كەم، قۇۋۋەتنىڭ
كەم ياكى ناچارلىغى، ئالەتنىڭ يۇمشاق ياكى قاتتىقلىق-
غىدىن بولىدۇ. لېكىن ئەڭ مۇھىم سەۋەپ ھاجەت (كې-
ڭىيىش-تارىيىش) دۇر. ھاجەتنىڭ زىيادە بولۇشىغا
تۈۋەندىكىلەر سەۋەپ بولىدۇ.

(1) ئىسسىقلىقنىڭ كۆپ بولۇشى

(2) دەرتنىڭ (ئاغرىقنىڭ) قاتتىقلىغى ياكى ئەم-
گەكتىن ھېرىش.

(3) قاننىڭ سىرتتىن كىرگەن بۇزۇق ھادىدېلار
بىلەن بىرىكىپ ئۆزگىرىپ ناچار بۇس بۇخارات (گاز)لارنى
ھاسىل قىلىشى.

تارىيىش ھەركىتى قىسقا، كېڭىيىشكە نىسبەتەن
زىچراق بولۇپ جىملىق (سۈكۈت) ۋاقتى ئاز بىلىنسە،
بۇ بەدەننىڭ ئىچكى قاتلاملىرىدا كېرەكسىز بۇس بۇخارات
ۋە سېسىقچىلىقلارنى سىرتقا چىقىرىشقا بولغان ئېھتىياج-
نىڭ زورلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. ئەگەر بۇنىڭ ئەكسىچە،
يەنى كېڭىيىش تېز، تارىيىشقا نىسبەتەن سۈكۈت قىسقا
بولسا يۈرەك ۋە قىزىلتومۇرلارنىڭ سىرتتىن كىرىدىغان
ساپ ھاۋاغا ھاجىتى كۆپلىگەن ئىپادىلەيدۇ. شۇنىڭ
بىلەن چوڭقۇر نەپەس ئېلىش ھاجىتىمۇ كۈچىيىدۇ. سۇ-
كۇتنىڭ تېز بولۇشى ھاياتلىق كۈچىنىڭ ناچارلىغى
ۋە روھنىڭ تارقاپ كەتكەنلىگىدۇر.

ئۇنىڭدىن باشقا ھاجەتنىڭ يۇقۇرىلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

مەسىلەن، غەزەپ، جاپالىق ئەمگەك ۋە بەك ئىسسىق مونچىلارغا چۈشۈش بىلەن ھارارەت زىيادە بولىدۇ، لېكىن بۇ يەردە سەۋەپ ۋاقىتلىق بولغانلىقتىن ھارارەتمۇ ۋاقىتلىق بولىدۇ.

1. تومۇر ھەر خىل سېلىشنىڭ سەۋەپلىرى.

(1) تومۇر تېز سېلىشنىڭ سەۋەبى:

(1) ھاجەتنىڭ كوپلىگى، قۇۋۋەتنىڭ ئاجىزلىغى.

(2) ھاجەتنىڭ ئاجىز (كەم) ۋە ئالەتنىڭ قاتتىقلىغى.

(2) تومۇر بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) ئۇرۇشنىڭ

سەۋەبى:

(1) قۇۋۋەتنىڭ بوش ۋە ئالەتنىڭ قاتتىق بولۇشى.

(2) قۇۋۋەتنىڭ بوش (ئاجىز) ۋە ھاجەتنىڭ ئاز

بولۇشى.

(3) تومۇر كىچىك سېلىشنىڭ سەۋەبى.

(1) ھارارىتى مۇھرىقە (كېزىك ئىستىمىسى) بولۇپ

قۇرۇقلۇقنىڭ نەملىك ئۈستىدىن غەلبە قىلغانلىغى.

(2) تەبىئى ئىسسىقلىقنىڭ ئاجىزلىشىشى، سوغاق

سۇنى كوپ ئىچىش، سوۋۇتقۇچى يىمەكلىكلەرنى كوپرەك

ئىستىمال قىلىش، جىنسى ئالاقىنى كوپ قىلىش، ئۇزاق

ئەمگەك قىلماسلىق ۋە كۆكتاتلارنى ھەددىدىن ئارتۇق

ئىستىمال قىلىش.

(3) سۈرگە دورىلارنى ئىچىش بىلەن تومۇردىۋار-

لىرى تارىيىپ بەدەنگە قۇرۇقلۇقنىڭ ھاسىل بولۇشى.

(4) ئىچكى ئەزالاردا ئېغىر ئىششىقنىڭ بارلىغى

مەسلەن، ئوپكە، جىگەر، قېرىن، يۈرەكنىڭ ئىششىقلىرى.
(5) ئۇيىقا كەم بولۇشى، قۇرۇق تاماقلارنى كۆپ
ئىستىمال قىلىش، ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكى ياكى مۇن-
چىغا چۈشمەسلىك.

(4) تومۇرنىڭ كېچىكىپ ئۇرۇشى ۋە قاتتىق
ئۇرۇشى: — تەبىئەت بىلەن كېسەللىك ئارىسىدىكى كۈرەش
نەتىجىسىدە تومۇرنىڭ ئۇرۇشى كېچىكىپ قالىدۇ.
(5) تومۇرنىڭ يۇمشاق بولۇشى: بۇ تەبىئى ۋە
غەيرى تەبىئى دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ.

(1) تەبىئى: ھۆلۈك تاماقلارنى ئىستىمال قىلىش،
شاراپ قاتارلىق ئىچمەكلىكلەرنى ئىچىش، ھاۋا ۋە ئەم-
گەك مۇتەدىل بولۇش.

(2) غەيرى تەبىئى: قوساققا يەل چۈشۈش ياكى
مىڭە كېسەللىكلىرى بىلەن ئاغرىش مەسىلەن، پالەچ،
لەقۋا، ئىستىرخا (چالا پالەچ)، تەشەننۇج (تارتىشىپ قې-
لىش) ۋە رەئىشە (تېترەپ تۇرۇش) قاتارلىق كېسەللىك-
لەرنىڭ بولۇشى.

(6) تومۇر قۇۋۋىتىنىڭ سۇس بولۇش سەۋەپلىرى:

(1) ئوزۇقلىنىشنىڭ يېتەرسىزلىكى؛

(2) ئوزۇقلىنىش سۈرگە ئىچىپ بەدەندىكى كېرەك-

سىز نەرسىلەرنى تازىلاپ تۇرماسلىق؛

(3) قابىلىيەتكە قاراپ ئەمگەك قىلماسلىق؛

(4) قالايمىقان تاماق يېيىش؛

(5) بۇرۇن يولىنىڭ توسىلىپ قېلىشى؛

(6) ھۇشسىزلىقنى كەلتۈرىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ مەۋجۇتلۇغى.

2. تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە مۇرەككەپ-لىشىشى.

تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۆزگىرىشى توت خىلىت ۋە كەيپىياتتىكى موتىدىللىك بۇزۇلۇپ، بۇ ھال يۈرەك ۋە قىزىلتومۇرلاردىمۇ پەيدا بولىشى بىلەن يۈز بېرىدۇ. ئۇندىن باشقا، ئوزۇقلۇقلارنىڭ بەدەندە كۆپ بولۇپ كېتىشى، ئوتۇش يوللىرىدىكى توسالغۇ (ۋاقىتلىق ياكى دائىملىق)، غەزەپ ياكى خوشاللىقنىڭ بەك ئارتۇق بولۇپ كېتىشى، ئاشقازاننىڭ ئاجىزلىشىپ قېلىشى ۋە قۇۋ-ۋەتنىڭ ناچار ياكى زىيادە بولۇشى بىلەنمۇ تومۇر ھەركىتى ئۆزگىرىدۇ. قۇۋۋەت زىيادە بولغاندا تومۇر ھەركىتى يۇقۇرىغا، قۇۋۋەت ئاجىز بولغاندا تۆۋەنگە قاراپ ئۆزگىرىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بەدەن ماددا بىلەن كۈرەش قىلىپ مەغلۇپ بولغانلىغىدىندۇر. بەزىدە بەدەندە قاننىڭ كۆپ بولۇشى بىلەنمۇ تومۇر مۇختىلىپ بولىدۇ، قان ئېلىشى بىلەن ئۇ ئەھۋال يوقىلىدۇ. قاننىڭ قويۇلۇپ قېلىشى بىلەن يۈرەك ئەتراپى تومۇرلىرىدا ھاۋا توسىلىپ قېلىپ (يۈرەك سانجىغى) خەنناق قەلبى دىگەن كېسەلنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ كېسەل تۇيۇقسىز تۇ-تۇپ ھۇشسىزلىق بىلەن داۋام قىلىپ ئولۇم يۈز بېرىدۇ. ھاراقنى كۆپ ئىچىدىغان كىشىلەردە ئۇچرايدۇ.

تومۇرنىڭ ھەرخىل ئۆزگىرىشى ۋە مۇرەككەپلىشىشى بەدەندىكى كېسەل ئەھۋالدىن ۋە كېسەلنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالدىن خەۋەر بېرىدۇ. تەۋبىي بۇنى ئىنچىكەلىپ تەكشۈرۈشى لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن يېتەرلىك دىققەت قىلىش ۋە تەجرىبىنىڭ بولۇشى كېرەك. مۇختىلىپ تومۇرلار ھەركىتى توۋەندىكى بىر قانچە خىل بولىدۇ.

1) چاشقان قۇيرۇقسىمان تومۇر (زەنبىلپار): تومۇر ھەركىتىنىڭ خۇددى چاشقان قۇيرۇغىدەك تەرتىپسىز مىدىرلىشى مۇشۇنداق ئاتىلىدۇ. تومۇر ھەركىتى ئولچەمگە قارىغاندا پەيدىن - پەي يوغان سېلىپ، بىردىنلا پەسلىپ كېتىدۇ، ياكى 2 - 3 قېتىم يوغان سېلىپ 1 - 2 قېتىم كىچىك سالىدۇ، ياكى 1 - 2 قېتىم چوڭ سېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە كىچىك سالىدۇ (ھەركەتنىڭ دەۋرى مۇختىلىپ بولىشىمۇ، لېكىن دەۋر ئاياغلاشماستىن تۇرۇپ ھەركەتنىڭ توختاپ قېلىشى بولۇپمۇ ئۈستۈن ھەركەتتىن توۋەنلەشكە باشلىشى ئۇنىڭ يامان. ئەگەر توۋەنلىشىش يۇقۇردىلاشقا ئۆتسە، بۇ ياخشىلىقنىڭ ئالامىتىدۇر).

تومۇر ھەركىتى باشلانغان مىقداردىن تېخىمۇ چوڭ سېلىپ، ئۆز مىقدارىغا يانسا ئۇنىڭ باشلانغان تەرىپى ئىنچىكە بولىدۇ. ئىككىنچى قىسمىدا باشلانغان مىقداردىن كىچىكلىشىپ يەنە ئۆز مىقدارىغا قايتىدۇ. بۇ ھال تومۇر تۇتقۇچى تىۋىپنىڭ بارماقلىرى ئاستىدا - بىرىنچى بارماق ئاستىدىكى ھەركەت ئىككىنچى بارماق ئاستىدىكىگە قارىدۇ.

غاندا سۇسى، ئۇچىنچى ۋە تۆتىنچى بارماقلار ئاستىدىكى ھەركەتلەرمۇ بىر-بىرىگە نىسبەتەن سۇسى سېزىلىدۇ. بۇ قايتقۇچى چاشقان قۇيرۇغىدەك تومۇر (زەنبىلى راجىئى) دىيىلىدۇ. يەنە بىر قىسمى تومۇر ھەركىتى قايتىمىغان ھالدا سېلىپ تۇرۇش بىلەن دەۋرنى تامام قىلىدۇ، بۇ زەنبى مۇنقازا دىيىلىدۇ. ئەگەر قايتىمىسا ۋە دەۋرنى تامام قىلىدىغان ۋاقتى سەزگىلى بولمايدىغان دەرىجىگە يەتمىسە بۇ يېرىم قايتقان چاشقان قۇيرۇغىسىمان تومۇر (زەنبى ناقىس رۇجۇئى) دىيىلىدۇ. ئومۇمەن زەنبىلپار تومۇر كېسەلنىڭ ئېغىر ئەھۋالىدا ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

2) مۇسەللى: تومۇرنىڭ قۇۋۋەت جەھەتتە چوڭ سېلىشى كەمرەك بولۇپ، تاتىشقان ھالدا سالىدۇ. كۈچ جەھەتتە زەنبىلپارغا نىسبەتەن 3دىن 2 قىسىم ئارتۇق بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى ھاجەتنىڭ كۆپلىگىدۇر، ئۇ كېسەل دە ھارارەت بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ ياخشى ئاقىۋەت نىڭ بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ. ئەگەر ھارارەت بولمىسا كېسەل ئاقىۋىتىنىڭ ناچارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ، تىۋىپ بۇنىڭغا دىققەت قىلىپ چارە كۆرۈشى كېرەك.

3) مىنشارى: تومۇر ھەركىتى قالايىمقان خۇددى جادى ھەرە ھەركىتىدەك بولىشى، يەنە بىر ئاستىن، بىر ئۈستۈن، بىر ئۇزۇن، بىر قىسقا، بىر ئىلگىرى، بىر كېيىن، بىر يۇمشاق، بىر قاتتىق بولۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ خىل ئىختىلاپلارنىڭ سەۋىيى تۈۋەندىكى نەرسىگە باغلىق:

(1) سەۋەپلەرگە باغلىق ئىختىلاپلار (ئىختىلاپنى مەسبۇب): تومۇرلارنىڭ ئوز ئىچىدىكى مەسىلەن، قان، سەپرا، بەلغەم ۋە سەۋدا قاتارلىق خىلىتلەرنىڭ بىرەرسى مۇرەككەپ ھالدا كۆپىيىپ ئۆزگىرىشىگە باغلىق ھالدا كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش خىلىتىنىڭ سېستىمىلىق (ئۇفۇنەت) پەيدا قىلىشى ياكى پىششىق - پىشماستىلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارغا باغلىق. چۈنكى ئۇفۇنەت يۇمشاق - لىق پەيدا قىلىپ، تومۇرنىڭ كېڭىيىش كۈچىنى كېڭەيتىدۇ. ئۇفۇنەت يوقلۇقى بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.

(2) ئەسەپ (نېرۋا) ۋە پەيلەرگە باي بولغان ئەزا - لارنىڭ بىرسىدە ئىششىق بارلىقى، ياكى تومۇر دىۋارىدا قاتتىق - يۇمشاقلىقنىڭ بولۇشى ئاستىن ھەركەت پەيدا قىلىدۇ. بۇ ئەھۋال كۆكرەك پەردە ياللىقى (زاتىل جەنبە) كېسەلىدە كورۇلىدۇ. چۈنكى زاتىل جەنبە كېسەلىدە نەپەسلىنىش ئەزالىرىنى ئوراپ تۇرغان كىرگىت گۆش ياكى مەئدە بىلەن نەپەسلىنىش ئەزالىرى ئوتتۇرىسىدىكى پەردىدە ۋەرم بولىدۇ. بۇ پەردە ئىچكى ۋە تاشقى تەرەپتىن قان تومۇر ۋە ئەسەپلەرگە باي، ئىششىغان ئەزادىكى قان تومۇرلار تارتىشىشقا باشلايدۇ. نەتىجىدە شۇ تەرەپتىكى تومۇر ھەركەتلىرىدە ئۆزگىرىش پەيدا بولۇپ قاتتىق، يۇمشاق، بىرتۇتاش، پەرقلىق، لەيلىگەن ۋە چوڭكەن تومۇر ھەركەتلىرى كورۇلىدۇ. لېكىن ئىششىق بولمىغان تەرەپتىكى قان تومۇرلار ھەركىتى ئازراق تەسىرگە ئۇچرىدۇ - سىمۇ كۆپ ئۆزگىرىش بولمايدۇ.

4) دولقۇنسىمان (مەۋجى): تومۇر ھەركىتى تىۋىپ قولىغا دولقۇنلاپ ئاققاندىك بىلىنىپ ئۇچ بارماقنىڭ ھەرقايسىسىغا ئىگىز - پەس، ئىلگىرى - كېيىن، ئۇدۇلغا ۋە توغرىسىغا ئۇرۇلغىنى سېزىلىدۇ. تومۇرنىڭ بۇ خىل ھەركىتى بەك ئىسسىق مۇنچىغا كىرگەندە، ھاراقنى كۆپ ئىچكەندە، ئىستىسقا، پىسالەچ، سەكتە، ئۆپكە ئىششىقى قاتارلىق كېسەللەردە ئۇچرايدۇ. بۇ خىل تومۇر ھەركىتى قىزىتمىلىق كېسەللەردە كورۇلسە، كېسەل تەرلەپ بوھ-رانغا كىرىشىدىن دىرەك بېرىدۇ. سەۋىبى قۇۋۋەت ئاجىز - لىشىپ تەبىئەتنىڭ تومۇر ھەركىتىنى باشقۇرۇشى ناچار - لاشقانلىقى، يۈرەكنىڭ ئىنسىسات ۋە ئىنقىباز پائالىيەت - لىرىنىڭ ناچارلاشقانلىقىدۇر.

5) قۇرۇت ئومىلىگەندەك تومۇر ھەركىتى (دۇدى): تومۇر ھەركىتىنىڭ خۇددى قۇرۇت ماڭغاندىك سېزىلىش - گە ئېيتىلىدۇ. دولقۇنسىمان تومۇرغا ئوخشاپ كەتسىمۇ لېكىن كۈچسىز، ئىنچىكە بولۇپ، پەيدىن - پەي سالىدۇ. تىۋىپ بىر قېتىم ئۇرغان تومۇرنى 2 قېتىم ئۇرغاندىك سېزىدۇ. تومۇر تېزدەك بىلىنىدۇ، لېكىن تېز بولمايدۇ. دىمەك بۇ مۇرەككەپلەشكەن تومۇر بولۇپ، قۇۋۋەتنىڭ بىردىنلا يوقىلىپ كېتىپ بارغانلىقىنى يەنى ھاياتلىقنىڭ تۈگەش ئالدىدا ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

6) چۇمۇلە ماڭغاندىك تومۇر ھەركىتى (نەملى): تومۇر ھەركىتى تىۋىپقا چۇمۇلە ماڭغاندىك سېزىلىدۇ. بىر تەرەپتىن دۇدى تومۇرغا ئوخشاپ كەتسىمۇ بىراق

كېچىك، مۇتەۋاتىر، قاتتىقراق، ئەمما تاجىز بولىدۇ. سەۋىبى يۈرەكنىڭ ساپ ھاۋاغا ھاجىتى كۆپ ئىكەنلىكى ھاياتلىق كۈچىنىڭ خەۋپ ئاستىدا قالغانلىغىدىندۇر.

7) ئىككى چوققىلىق تومۇر ھەركىتى (غوزالى): تومۇر ھاجەتكە لايىق ئۇرىدۇ، لېكىن تومۇرنىڭ قاتتىقلىقىدىن بىرلا ھەركەت قىلالماي ئىككى ھەركەت ئوت-تۇرسىدا بىر توختايدۇ، بۇ ھاجەتنىڭ كۆپلىگەنلىكى ئىپادىلەيدۇ.

8) قوش باشلىنىشلىق تومۇر ھەركىتى (زۇلفىت-رەت): ھەركەت باسقۇچىدا سۈكۈت (توختاش) نىڭ بولىشى، بۇنىڭ سەۋىبى قۇۋۋەتنىڭ (تەبىئەتنىڭ) ئاجىزلاشقانلىغىدىندۇر.

9) مېترىقى: تومۇر ھەركىتىدە بازغان ئۇرغاندەك سېزىمنىڭ بولۇشى — يەنى تومۇردىكى دولقۇن بارماققا ئۇرۇلۇپ بولۇپ ئارقىغا بىر ئاز قايتىپ، ھەركەتكە بار-ماسلىق كېڭىيىش ھەركىتىنى تامام قىلىدۇ. بۇ خۇددى سوقۇلغان بازغاننىڭ قايتىشىغا ئوخشايدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى بىر تەرەپتىن ھاياتلىق قۇۋۋىتىنىڭ كۈچلۈك بولغانلىقى، يەنە بىر تەرەپتىن روھنىڭ ساپ ھاۋاغا بولغان ھاجەتنىڭ كۆپلىگەنلىكىدۇر.

10) تەرتىپسىز تومۇر ھەركىتى (ۋاقىي فېلۇسەت): جىملىق ئورنىدا ھەركەت يۈز بېرىش. مەسىلەن، كېڭىيىش تامام بولغاندىن كېيىن تېزلا تارىيىش باشلىنىدۇ. ياكى بىر

ئاز جىملىق بولۇپ تارىيىش باشلىنىدۇ، شۇ ھالدا تومۇر ئالدىراشلىق بىلەن قاتتىق ئۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن جىملىق بولۇش لازىم بولغان ۋاقىت ئىچىدە يەنە ھەركەت يۈز بېرىدۇ. تەرتىپسىز تومۇر بىلەن مېترىقى پەرقى شۇكى تەرتىپسىز سوققان تومۇردا كېڭىيىش تامام بولغاندىن كېيىن كېڭىيىشكە قاراشلىق تارىيىش تامام بولۇشتىن بۇرۇن ئىككىنچى سوقۇش (تېۋىپنىڭ بارمىغى ئۇچىغا تومۇرنىڭ ئۇرۇشى) يۈز بېرىدۇ. مېترىقىدە كېڭىيىشتىن ئىلگىرى بولىدۇ. تەرتىپسىز تومۇرنىڭ سەۋىيىسى بەدەننىڭ ساپ ھاۋاغا ھاجىتىنىڭ كۆپلىگەندىن ھەركەت قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان ۋاقىت ئىچىدىمۇ ھەركەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. بۇنىڭغا ئەگىشىپ نەپەس ئېلىشمۇ تېزلىشىدۇ.

11) تىترىگەن (مۇر ئەتىش) تومۇر ھەركىتى: تومۇرنىڭ تىترەپ ھەركەت قىلىشى بولۇپ، بەدەندە خىلىتىلەرنىڭ كۆپلىگى، قۇۋۋەتنىڭ كۈچلۈكلىگى، تومۇر-نىڭ قاتتىقلىغى، قۇۋۋەتنىڭ كېسەلگە قارشى كۈرەش قىلغانلىغى تۈپەيلىدىن ھاجەتنىڭ كۆپ بولۇپ كېتىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

12) تەكشى ئەمەس (نامەۋزۇن) تومۇر ھەركىتى: تومۇرنىڭ قالايمىقانلىشىپ بىر قۇر يانغا، بىر قۇر ئۇدۇلغا ئۇرىدۇ. سەۋىيىسى كۆپىنچە قۇۋۋەت ناچار، ھاجەت كۆپ بولىشىدىن ئىبارەتتۇر.

13) تەكشى (مەۋزۇن) تومۇر ھەركىتى: تومۇر ھەركىتىنىڭ بىر ھالدا بولۇشى. بۇ ھاجەتنىڭ تەبىئەت

بىلەن كۈرەش قىلىپ غەلبە قىلالىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

3. تومۇرنىڭ ياش، جىنسى، پەسىل ۋە مىزاجلار ۋە باشقا جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكلىرى.

(1) تومۇرنىڭ ياش جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكى: كىچىك بالىنىڭ تومۇرى تېز ۋە مۇتەۋاتىر (پەيدىن - پەي)، يوغان - كىچىكلىكتە مۆتىدىل بولىدۇ. سەۋىيى ھاجەتنىڭ كۆپلىگىدىن ئىبارەتتۇر. چۈنكى بالىنىڭ بەدىنىدە نەم - لىك كۆپ بولۇپ، قۇۋۋەت تۇلۇق ھاسىل بولۇپ كەت - مىگەن بولىدۇ.

ياشلارنىڭ تومۇرى كۈچلۈك بولىدۇ، چۈنكى ئۇلارنىڭ يۈرەك ۋە باشقا ئەزالىرىدا 4 خىل كۈچ تولۇقلىنىپ بولغان ۋە بالىلىق ۋاقتىدىكى نەملىك تار - قىلىپ كەتكەن بولىدۇ. ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ تومۇرى يوغان سالغاندا ناھايىتى كۈچلۈك سېزىلىدۇ، بۇ ھاجەت - نىڭ كۆپلىگىدۇر.

قېرىلىق تومۇرى (نەبىزى كۈھولپەت) ياشلىق دەۋ - رىگە نىسبەتەن كىچىك ۋە ئاستا بولىدۇ.

(2) تومۇرنىڭ مىزاجلار جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكى: مىزاجنىڭ ئىسسىق تەرەپكە ئۆتۈشى ھاياتلىق قۇۋۋەت - لىرىنىڭ تەبىئىيلىكىدىن ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. لېكىن بەدەنگە ئۆزلەشمىگەن ھەددىدىن ئارتۇق ئىسسىقلىق غەيرى تەبىئى بولىدۇ. بۇ ھال ئېتىدالدىن قانچىلىك ئوشۇق بولسا

قۇۋۋەتنى شۇنچە ئاجىزلاشتۇرۇپ قويدۇ. مۇنداق ئەھ-
ۋال كۆپىنچە يۇقۇرى ئىستىمىلىق كېسەللەردە كۆرۈلۈپ
تومۇر ھەركىتىدە مۇخالىپەتلىك ئۆزگىرىشلەرنى بارلىققا
كەلتۈرىدۇ. مەسىلەن، يۇقۇرى ئىستىمىلىق كېزىك كې-
سەللىرىدىن ئەسۋىلىك كېزىك (تەپى مۇھرىقە) قاتارلىقلاردا
قۇۋۋەت ئاجىز بولغانلىقتىن تومۇر ئىنچىكە، ئاستا ھەم
مۇتەفاۋەت سالىدۇ. تومۇر دولقۇنسىمان ياكى موتىدىل
بولۇشى تومۇرنىڭ مىزاجىغا باغلىق؛ ئەگەر قۇرۇق بول-
غاندا ئىنچىكە ۋە قاتتىق ئۇرىدۇ. قۇۋۋەت كۈچلۈك
بولۇپ، ھاجەت ئارتۇق بولسا تومۇر ئىككى چوققىلىق
(يۇقۇرى پەللىلىك) ياكى تىترىگەن (مۇر ئەتەش) بولىدۇ،
يەنى تىترەپ سالىدۇ.

(2) ئەر ۋە ئاياللارنىڭ تومۇرىدىكى پەرق؛ ئەر-
لەرنىڭ تومۇرى ئاياللارنىڭ تومۇر ھەركىتىدىن چوڭ
ھەم كۈچلۈك بولىدۇ. چۈنكى ئەر كىشىنىڭ مىزاجى ئىس-
سىق، ھارارىتى يۇقۇرى كېلىدۇ. شۇنىڭدەك ئەرلەرنىڭ
تومۇرىنى تۇتۇش ئورنى كۆپرەك ئۇزۇن ۋە ئازادە
بولىدۇ. تومۇرنىڭ سۈكۈت ئارىلىغى ۋە ۋاقتى ئۇزۇن
ھەم تەپاۋۇتلىق بولىدۇ.

(3) سېمىز ۋە ئورۇق كىشىنىڭ تومۇرى؛ ئورۇق
كىشىنىڭ تومۇرى سېمىز كىشىنىڭ تومۇرىغا قارىغاندا
چوڭ ھەم ئاستا بولىدۇ. چۈنكى ئورۇق كىشىنىڭ تومۇرى
ئەركىن ھەركەت قىلىدۇ. لېكىن سېمىز ئادەمنىڭ تومۇرى

گوشنىڭ مەلۇم دەرىجىدە توسقۇنلۇغىغا ئۇچراپ ئەركىن ھەركەت قىلالمايدۇ. سېمىز كىشىنىڭ تومۇرى تېز ۋە ئىنچىكە بولىدۇ. ئەگەر سېمىزلىك گوشنىڭ كوپلىگىدىن بولسا تېزلىكى ئارتۇغراق، ياغنىڭ تۇلالىغىدىن بولسا، تېزلىك ئازراق بولىدۇ.

4) يىل پەسىللىرىدىكى تومۇرلارنىڭ ئالاھىدىلىكى: باھار پەسىلىدە تومۇر ھەركىتى موتىدىل بولىدۇ. شەھەر ۋە بازار ئىچىدە ياشىغۇچىلارنىڭ تومۇرى موتە-دىل بولىدۇ. ياز كۈنلىرى تومۇرنىڭ ھەركىتى تېز ھەم پەيدىن-پەي، بەزىدە ئاجىزمۇ بولىشى مۇمكىن. تېز بولۇشنىڭ سەۋىيىسى ئىسسىقلىق بولۇشى بىلەن بەدەندىكى ھاجەتنىڭ كوپلىكى، ئاجىز ھەركەت قىلىشى ئىسسىقلىق-نىڭ تارقاپ كەتكەنلىگىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كۈز ۋاقىتىدىكى تومۇرلار ئادەتتە موتىدىل بولىدۇ. ئەگەر پەسىل ئۆز تەبىئىتىدە بولماي ئەكسىچە بولسا تومۇر ئۆزگىرىدۇ. مەسىلەن، باھار ۋاقتىدا شامال، بوران ۋە يامغۇر-يېغىن كوپ بولۇپ، ھاۋا تۈتەك ۋە سوغاق بولسا ياكى قىش كۈنلىرى قار ياغماي ھاۋا ئېچىلىپ ئىسسىق بولۇپ كەتسە تومۇر ھەركىتىدە ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ. ئۇندىن باشقا پەسىل ئۆز ئېتىدالىدىن ئېشىپ كەتسە مەسىلەن، ياز كۈنلىرى ھاۋا ناھايىتى قىزىپ، يامغۇر ياغماي ھاۋا دېمىق بولۇپ قالسا ۋە قىش كۈنلىرى ھاۋا دائىم تۈتەك بولۇپ توختىماي قار يېغىپ تۇرسا بۇنداق ھال-

لاردىمۇ تومۇر ئوزگىرىدۇ. قىش كۈنلىرى تومۇر ئاستا ۋە كىچىك بولىدۇ، سەۋەپ ھازارەتنىڭ تۈۋەن بولۇپ ھاجەتنىڭ ئاز بولغانلىغىدىندۇر. ئوي ئىچىنىڭ ھاۋاسى ياخشى بولماسلىق، چاڭ-توزاڭ كۆپ بولۇش، سېسىق پۇراق چىقىپ تۇرىدىغان ئورۇنلارنىڭ ئولتۇراق جايغا بەك يېقىن بولۇشىمۇ تومۇردا ئوزگىرىش ھاسىل قىلىدۇ.

(5) ئەمگەك قىلغۇچىلارنىڭ تومۇرى: ئەمگەك قىل-

غۇچىلاردا تومۇر دەسلەپ مۆتىدىل بولۇپ قىزىغانسېرى كۈچلۈك ۋە چوڭ سالىدۇ. چۈنكى ئەمگەك تەسىرى بىلەن بەدەن قىزىپ ھازارەت ئاشىدۇ. ھەركەتنىڭ ئاخىرىدا تومۇر ناھايىتى تېز سالىدۇ. سەۋىيى ھاجەتنىڭ ۋە قۇۋۋەتنىڭ كۈچلۈك بولىشىدۇر. ئەگەر ئەمگەك بەدەن ئىقتىدارىنىڭ چېكىدىن ئېشىپ كەتسە تومۇر سۇس سالىدۇ. سەۋىيى مىگە چارچاپ قۇۋۋەتنىڭ تارقاپ كەتكەنلىكىگىدۇر. كۈچى ئاز، ئىش ھەددىدىن زىيادە بولغاندا تومۇر قۇرۇت ئومىلىگەندەك ياكى چۇمۇلە ماڭغاندەك سالىدۇ. سەۋىيى كۈچىنىڭ يوقالغانلىغىدىن ئىبارەت.

(6) ئۇخلاۋاتقان، ئويغاق كىشىلەرنىڭ تومۇرى: ئۇيقىنىڭ دەسلەپتە تومۇر كىچىك ھەم سۇس بولىدۇ. بەزىدە تەپاۋۇتلىق بولىشىمۇ مۇمكىن. قىسسىمەن كىشىلەردە توختاپ ئاستا سالىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى تەبىئى ئىسسىقلىقنىڭ بەدەن ئىچكى قاتلاملىرىغا چۈشكۈشىدۇر. بۇ چاغدا ئاشقازان ھەزىم قىلىشقا قاتنىشىپ

قۇۋۋەت ھاسىل قىلىپ بەدەننىڭ سىرتىغا بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تومۇر چوڭ ۋە كۈچلۈك ھەركەت قىلىشقا باشلايدۇ. ئۇيىقا ئوز ئولچىمىدىن ئېشىپ كەتسە تومۇر كىچىك ۋە زەئىپ بولىدۇ. ياكى تېز ۋە تەپاۋۇتلىققا ئۆتىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بەدەندە ھاسىل بولۇپ ئۆزلەشمىگەن ھارارەت كېرەكسىز بۇ خاراكتېرلارنى پەيدا قىلىپ بەدەندىكى ئىچكىرى قىسمىغا قايتىدۇ. ئەگەر ئۇخلىغاندا مەئىدە تاماق بولمىسا، ئۇ چاغدا مەئىدە ھەزىم قىلىش ئۈچۈن بىر نەرسە بولمىغانلىقتىن قۇۋۋەت ياندۇ، شۇڭا ئاچ ئۇخلىغان ئادەمنىڭ تومۇر ھەركىتى كىچىك، ناچار ۋە كېچىكىپ سالىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى قۇۋۋەتنىڭ زەئىپلەشكەنلىكى ۋە كەيپىياتنىڭ ئوزگەرگەنلىكىگىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاخشىمى بالدۇر ياتقان كىشى ئەتىگەندە ئۇخلىماسلىقى لازىم. ئادەتتىكى ئۇيقۇدىن تۇرغان كىشىدە تومۇر چوڭ، تېز بولۇپ، كېيىن ئوز ھالىغا قايتىدۇ. ئۇيقۇدىن قورقۇپ ئويغانسا تومۇر ناچار ۋە زەئىپ بولىدۇ. چۈنكى قورقۇنۇشتىن قۇۋۋەت ئىچكى قاتلىمىغا ياندىدۇ. تومۇر بەزىدە چوڭ، تېز، مۇختەلىپ ۋە مورئەتەش بولىدۇ. قورقۇش ھەقىقىي بولمىسا تومۇر تېز ئوز ھالىغا ياندىدۇ. ئەگەر ھەقىقىي بولسا ئۇزۇن ۋاقىت شۇ ھالدا قالىدۇ.

(7) تاماقنى ئاز، كۆپ يىگەن ۋاقىتتىكى تومۇر ئەھۋالى: ئىستىمال قىلىنغان تاماقنىڭ ئاز-كۆپلىكى، تاماقنىڭ مەئىدە ھەزىم بولۇش-بولماسلىقى، ئوزۇقلۇققا

باي بولۇش - بىرلىكلىرىغا ۋە تاماقنىڭ كەيپىياتىغا
ئاساسلانغان قۇۋۋەتنىڭ مىقدارىغا قاراپ تومۇر ھەركىتى
ھەر خىل بولىدۇ.

تاماقنى كۆپ يەيدىغان كىشىلەرنىڭ تومۇرى تېز
ۋە مۇختەلىپ سالىدۇ. چۈنكى مىقدارى كۆپ بولغان
تاماقنىڭ مەئىدەدە ھەزىم قىلىنىشى كېچىكىپ ئېغىرلىق
پەيدا قىلىپ ئىختىلاپ ھاسىل قىلىدۇ. يەمەك - ئىچمەك
ئۆز ئۆلچىمىدە بولغاندا تومۇر قۇۋۋەتلىك سالىدۇ. چۈنكى
مۇنداق تاماقتىن روھ ۋە بەدەن ھارارىتى ياردەم ئالىدۇ.
تاماقنى ئاز يىگەندە تومۇر شۇ تاماقنىڭ كۈچىگە قاراپ
ھەركەت قىلىدۇ. ئىسسىق مىزاجلىق كىشى ياكى قىزىق -
مىسى بار كىشى كۆپ مىقداردىكى ئىسسىقلىق تاماقنى
ئىستىمال قىلغاندا تومۇر ھەركىتى زەئىپ بولىدۇ. چۈنكى
مىزاج تېخىمۇ ئىسسىقلىققا ئوزگىرىپ مىزاجىنى بۇزۇپ
قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەبىئەت زەئىپلىشىپ تومۇر ھەر -
كىتىنى ناچارلاشتۇرىدۇ. ئەسلى مىزاجى ئىسسىق بولغان
كىشىلەر سوغاق تەبىئەتلىك تاماقلارنى يىيىشى لازىم.
سوغاق مىزاجلىقلار ئىسسىق تاماقلار بىلەن ئوزۇقلانسا
مىزاجى موتىدىل ھالەتكە كېلىدۇ. شۇنداقلا قۇرۇق مە -
زاجلىق كىشىلەر ھوللۇگى زىيادە ئوزۇقلۇقلار بىلەن ئوزۇق -
لانغاندا مىزاجى موتىدىللىشىدۇ. ئۇنداق قىلمىغاندا
ئەھۋال ئەكسىچە بولۇپ، مىزاجى بۇزۇلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن
تومۇر ھەركىتى مۇختەلىپلىشىدۇ. چۈنكى سوغاق مىزاج

ئۇستىگە يەنە سوغاقلق قىلىش مىزاجىنى چوقۇم بۇزىدۇ. بۇ يېتەرسىز بولۇپ تۇرغان ھارارەتنى تېخىمۇ ئاجىز-لاشتۇرۇپ نەتىجىدە تومۇرلار ھەركىتىنىلا ئەمەس بەلكى مىگە ۋە ئەسەبلەرنىمۇ زەئىپلەشتۈرۈپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تومۇر ھەركىتى بىر كېچىكىپ، بىر يوغان ۋە بىر ئاستا سالىدۇ. مۇنداق چاغلاردا ئىسسىقلىق نەرسىلەرنى يىسە ئوز ھالىغا-ئېتىدالغا كېلىدۇ.

ياخشى ئۇزۇقلۇقلار بىلەن ناچار نەرسىلەرنى قوشۇپ يىگەندىمۇ مىزاجىنى بۇزىدۇ. بۇنداقتا تىۋىپكە ئەسلى يىگەن نەرسىلەرنى ئېيتىمىغاندا كېسەلنى ئېنىقلاش ۋە ئالدىنى ئېلىش قىيىن بولىدۇ.

ئەشە، تاماكا چېكىش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش مىڭمىڭ قىۋۇۋىتىنى بۇزۇپ تەپەككۇر قابىلىيىتىنى تو-ۋەنلەشتۈرىدۇ. تومۇر ھەركىتىنى سۇلاشتۇرۇپ قويۇش بىلەن مۇختىلىپ ھەركەتلىك تومۇر كېلىپ چىقىدۇ. ھاراقنىڭ ئېغىرلىق پەيدا قىلىشى باشقا غىزالارغا نىس-بەتەن يېنىك، لېكىن بەك كۆپ ئىچىۋەرسە ھارارىتى غەرىزىنى بوغۇپ قويۇپ نەتىجىدە سەكتە (ئولۇكتەك ھۇشسىزلىق)، خاپاقان ۋە كوڭۇل ئېلىشىش قاتارلىق كېسەللەرگە دۇچار قىلىپ تۇيۇقسىزلا ئولۇپ قېلىش خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(8) سۈرگە ئىچكەندىن كېيىنكى تومۇر ھەركىتى: سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغ) دىن كېيىن تەۋر بوش

ۋە زەئىپ ياكى ئاستا سالىدۇ. ئەگەر سۇرۇش ھەددىدىن ئارتۇق بولسا، ئۇ چاغدا تومۇرنىڭ ھەركىتى قۇرۇت ۋە چۇمۇلە ماڭغاندەك بىلىنىدۇ. لېكىن ھۇقنە (كىلىزما) دىن كېيىن تولۇق بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى خىلىتلەرنىڭ كۆرىشىدىن ئىبارەت.

9) روھى كەيپىيات بىلەن تومۇر ھەركىتىنىڭ مۇناسىۋىتى: خۇشلۇق، خاپىلىق، قورقۇش، غەزەپ ۋە ئاچچىغلىنىشلار ئۆز ئېتىدالىدا بولسا، تومۇرنىڭ ھەركىتىمۇ ئاستا، قاتتىق، بوشلۇق، چوڭ ۋە كىچىكلىك جەھەتلىرىدىن مۆتىدىل بولىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ ئەكسىچە بولسا تومۇر ھەركىتىمۇ ئۆزگىرىدۇ.

خۇشلۇق ۋاقتىدا تومۇر يوغان ۋە پەرقلىق (مۇتەفاۋۇت); خاپىلىق ۋاقتىدا زەئىپ ۋە ئىنچىكە ياكى ئاستا؛ قورقۇش ۋاقتىدا تېز ۋە تىتىرىگەن، غەزەپ ۋە ئاچچىغلىنىش ۋاقتىدا يوغان تېز ۋە پەيدىن-پەي (مۇتەۋاتىر) بولىدۇ. خىجالەتلىك ھىس قىلغان چاغلاردا تومۇر مۇختەلىپ؛ لەززەت ۋاقتىدا يوغان سالىدۇ. چۈنكى لەززەت قۇۋۋەتنى ھەركەتلەندۈرىدۇ. تېز ۋە پەيدىن-پەي بولمايدۇ.

10) ھامىم (مونچا) غا كىرگەن كىشىنىڭ تومۇرى: سۇنىڭ ھارارىتىگە باغلىق بولۇپ مونچا بەك ئىسسىق بولسا ھاجەتنى ئاشۇرىدۇ. بۇ ھال قۇۋۋەتنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئىسسىقلىق ئورتا ھال بولسا تومۇر ھەركىتى يوغان، كۈچلۈك ۋە يۇمشاق بولىدۇ. ئەگەر

سوغاق بولسا (سوغاق سۇ قۇيسا) بەدەن ھارارىتى ئىچكى قاتلامغا يىغىلىپ قېلىپ تومۇر ھەركىتى تېز ۋە كۈچ-لۈك؛ زاك، گۇڭگۇرت، قەلەي كانلىرىدىن چىققان ئىسسىق بۇلاقلارغا (ئارىشاڭلارغا) چۈشسە تومۇر ھەركىتى قاتتىق ۋە تېز بولىدۇ.

4) كېسەل كىشىلەرنىڭ تومۇرى.

ساغلام ئادەمنىڭ تومۇرى يۇقۇرىدا سوزلەپ ئوت-كەن تومۇر ھەركىتىنىڭ تۈرلىرىدە يەنى تېز، ئاستا، يوغان، كىچىك، قاتتىق-يۇمشاق قاتارلىقلاردا ئۆز ئېتىدالدا ياكى تەبىئى بولىدۇ. تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ياكى مۇرەككەپلىشىشى غەيرى تەبىئىلىكتىن ياكى كېسەللىكتىن دېرەك بېرىدۇ.

كېسەلنىڭ تومۇر ھەركىتى ئاغرىشنىڭ قاتتىق-يېنىكلىكىگە ۋە ئاغرىق ئورۇقنىڭ يۈرەككە يېقىن-يىراق-لىغىغا ھەم شۇ ئەزانىڭ ئەھۋالىغا قاراپ پەرقلىق بولىشى مۇمكىن. بۇ ھال كۆپرەك ۋەرەم (ياللۇغلىنىش) لىق كېسەللىكلەردە ئۇچرايدۇ. ئاغرىش (دەرت) تومۇرغا بەك تېز تەسىر قىلغانلىقتىن تومۇر تېز ۋە چوڭ سالىدۇ. ۋەرەم يۈرەكتىن يىراق ئەزالاردا بولسا ياكى تومۇر قىسىلغانلىق ئەھۋاللىرى بولسا، يۈرەكنىڭ ھەركىتى تومۇر ھەركىتىدىن ئاستاراق بولىدۇ. لېكىن يۈرەككە يېقىن ئەزالاردىكى ۋەرەم تومۇر ۋە يۈرەك ھەركىتىنى تېزلەشتۈرىدۇ. مەسىلەن، ئوپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)

كوكرەك پەردىسىنىڭ ياللۇغى (زاتىلىجەنەبە) ھەم مەئىدە ۋە جىگەر ۋە رەملىرى قاتارلىق كېسەللەردە تومۇر ھەرىكىتى ناھايىتى تېز بولغاندەك، يۈرەك ھەرىكىتىمۇ تېزلىشىدۇ. يۇقۇرى قىزىتمىلىق ۋە ئەسۋىلىك كېسەللەردە تومۇر بەك تېز بولىدۇ. تەپلەر ① نىڭ باشلىنىشى ھەرخىل بولغانلىقتىن تومۇر ھەرىكەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىش-لىرىمۇ بىردەك بولمايدۇ. بەزىلەردە تېز، بەزىلەردە ئاستا ياكى يۇقۇرى-تۆۋەن باشلىنىدۇ. مەسىلەن، 2 كۈن-لۈك بەزگەك دەسلەپكى قېتىم تۇتقاندا تومۇر ئاجىز ۋە مۇتەۋاتىر بولۇپ، كېيىنچە يوغان ۋە كىچىك سالىدۇ. بەلغەم ئارىلاشقاندا تومۇر ئاجىز ۋە تاپاۋەتلىك سىلەن باشلىنىپ، كېيىن پەيدىن-پەي بولىدۇ. ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا كېسەللەردىكى تومۇرنىڭ ھالىتى بەدەندە بار بولغان خىلىتەلەرنىڭ كەيپىياتى ۋە قۇۋۋىتىگە، شۇنداقلا سىرتتىن كىرىپ قوشۇلغان جەراسىم (مىكروپ) لارنىڭ شۇ ئورۇندا ھاسىل قىلغان كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ كۈچلىرىگە باغلىق.

① تەپ: ئۇيغۇر تىبابىتىدە تەپ بارلىق قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنى كۆرسىتىدۇ. بەزگەك ئەمەس. بەزگەكنى تەپلەرگە دەيدۇ - تەھرىر.

VII ماقالا. نەپەس ۋە ئۇنىڭ بۇزۇلۇشى

نەپەس ئېلىش ھاياتلىق ئۇچۇن ئەڭ مۇھىم بولغان ھەركەتنىڭ بىرىدۇر. خۇددى تەمۇر ھەركىتىدەك پۇتۇن بەدەننىڭ ساقلىق ۋە كېسەللىك ھالىتىدىن خەۋەر بېرىدۇ. يۈرەك ۋە پۇتۇن بەدەندىكى قۇۋۋەت (روھ) نەپەس ئېلىش - چىقىرىش بىلەن ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ. نەپەس ئېلىشنىڭ سەۋەپچىلىرى: پائىل - ھاياتلىق كۈچى؛ ئالەت - كاناي، ئوپكە، كېرگىت پەردىسى (ھىجابى ھاجىزە) ۋە قوۋۇرغىلار.

ھاجەت - بەدەننىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئېھتىياجى يەنى ھاياتلىق كۈچىنىڭ ياردىمى ۋە ئالەتنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ساپ ھاۋانى يۈرەك ئىچىكى قاتلاملىرىغا يەتكۈ - زۇپ يۈرەك ۋە بەدەن ئىچىدىكى كېرەكسىز بۇس - بۇ خاراكتېرلىرى سىرتقا چىقىرىدۇ. يەنى كېرگىت گۆشلۈك پەردىنىڭ تومۇرغا ئوخشاش 2 ھەركەت قىلىپ بىر توختىشى (كېڭىيىش ۋە قىسقىرىش) قوۋۇرغىلارنىڭ سە - قىشى بىلەن ئوپكە سىقىلىپ تەندىكى بۇزۇق بۇس - بۇ خارلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ. بەدەننى ئاپەتلەردىن تازىلايدۇ. كېڭىيىش بىلەن سىرتتىن ساپ ھاۋانى قوبۇل

قىلىپ يۈرەكنى شاماللىتىپ تۇرىدۇ. بۇ تەبىئىي نەپەس ئېلىشتۇر. بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇشى غەيرىي تەبىئىي ياكى مۇۋاپىق بولمىغان نەپەس ئېلىش بولىدۇ. ئانداقتا نەپەس تېز ۋە قىسقا بولىدۇ، ئېغىر ھاللاردا خاقىراپ قېلىش ۋە نەپەس بوغۇلۇشلارمۇ كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق ۋاقىتلاردا كېسەلنىڭ چىرايى كۆكرىپ ئوزى بىئارام بولىدۇ. سەۋىبى سوغاق شامال ياكى سىرتتىن نەپەس ئېلىش بىلەن كىرگەن ھەرخىل ئاپەتلەر سەۋىبىدىن ئۆپكە ۋە كانايىلاردا ۋە رەمگە ئوخشاش توسقۇنلۇقلار يۈز بېرىپ نەپەسنى قىيىنلاشتۇرىدۇ. ياكى ھەرخىل غەيرىي تەبىئىي نەرسىلەر، جەراسىملار قانغا قوشۇلۇپ ھارارەت پەيدا قىلىپ، يۈرەكنى قىزىتىپ كۆپ ۋە تېز نەپەس ئېلىش ھاجىتى كېلىپ چىقىدۇ. نەپەس ئېلىشنىڭ ياخشى بولۇشى ئۇچۇن روھ، كۈچ ۋە ئالەتلەرنىڭ ساغلام بولۇشى ھەم يۈرەك، ئۆپكە ۋە باشقا ئەزالار خىزمىتىنىڭ ياخشى بولۇشى شەرت. نەپەس ئېلىشنىڭ ناتوغرا بولۇشى ئەزالارنىڭ بىرىدە ۋە رەم بارلىغىنى كۆرسىتىدۇ. نەپەس ئېلىش خۇددى تومۇر ھەرىكىتىدەك ئەزالاردىكى ئۆزگىرىش ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ.

VIII ماقالا. سۇيدۇك ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش

سۇيدۇك جىگەردىكى ھەزىمنىڭ داۋاملىشىشى بىلەن بورەكتە ھاسىل بولۇپ دوساق (ماسانە) دا يىغىلىپ سىرتقا چىقىپ كېتىدىغان سۇيۇقلۇقتۇر. سۇيدۇك تەك-شۈرۈش ئارقىلىق بەدەننىڭ مىزاجى، بولۇپمۇ خىلىتلار ئەھۋالىدىن ۋە جىگەر ھەم بورەكنىڭ خىزمىتىدىن خەۋەر تاپقىلى بولىدۇ. تىۋىپ سۇيدۇكتىن ئاساسەن رەڭگى، قىيامى (قويۇق-سۇيۇقلۇغى)، سۈزۈكلۈگى، دۇغ-لۇغى، كوپۇكلۇگى، چوكمىسى (رۇسۇبى)، پۇرىغى ۋە مىقدارىغا ئوخشاش 8 نەرسىنى ئېنىقلىشى كېرەك.

1-پەسىل: سۇيدۇك تۈرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى

ئادەم سۇيدۇگى سۈزۈك ئاق بولسا بۇ تەبىئى سۇيدۇك ھىساپلىنىدۇ، چۈنكى سۇنىڭ رەڭگىمۇ ئاق كېلىدۇ. ئاقلىق سۇيدۇكنىڭ ئەسلىدۇر. ئادەم بەدىنىدىكى خىلىتلار 4 خىل بولغانلىغى ئۈچۈن سۇيدۇكنىڭ خەلىتىلەر رەڭگىدە كېلىشىمۇ تەبىئى ھىساپلىنىدۇ. يەنى

ئاق، قىزىل، سېرىق ۋە قارا رەڭلەرنىڭ ھەربىرى بىر - خىلىتىنىڭ بەلگىسى بولۇپ، بىر رەڭلەرنىڭ ئۈزگىرىشى قايسى بىر خىلىتىنىڭ ئاز - كوپلىغى، غالىپ ياكى مەغلۇپلىغىنى كۆرسىتىدۇ، مەسىلەن، سۇيۇقلۇكنىڭ ئاق بولۇشى تەبىئىي؛ شىشەدەك، مەنى سۇيۇقلۇقىدەك ياكى جىگدە شەرۋىتىدەك ئاق بولۇشى غەيرى تەبىئى بولۇپ كېسەللىك ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇندىن باشقا سېرىق سۇيۇق تۈۋەندىكىچە 6 تۈرگە بۆلىنىدۇ. مەسىلەن:

(1) سامان رەڭلىك.

(2) ئاپلىمىن رەڭلىك (تۇرۇنچى) (بۇ ئىككىمى تەبىئىدۇر).

(3) كاۋا چېچىگى رەڭلىك.

(4) يالقۇن رەڭلىك.

(5) زەپەر سېرىقى رەڭلىك.

(6) سېرىق زاڭ رەڭلىك (بۇ تۈتى غەيرى تەبىئى ھېساپلىنىدۇ).

قىزىل سۇيۇق بولسا، قىزىل گۈل رەڭلىك، قان رەڭلىك (قارىغا مايىل قىزىل)، ئاققا مايىل سۇس قىزىل، ئوردان رەڭلىك دەپ پەرقلىنىدۇ. سۇيۇقلۇقتىكى قىزىللىق بەدەندىكى قان ئەھۋالىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ.

قارا سۇيۇق: سېرىققا مايىل قارا، قىزىلغا مايىل قارا دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ. بۇ سەۋدا ۋە تال ئاغرىقلىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ.

9.1 سۇيىدۇك رەڭگىنىڭ ئاق ۋە قىزىق سەۋەبى

- (1) ھول مېۋە ۋە كۆكتاتلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بولۇپمۇ خاڭگا، قوغۇن، شاپتۇل قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن سۇيىدۇك رەڭگى ئاق كېلىدۇ.
- (2) سەپرادىن بولغان ئاغرىقلاردا ھارارەت مىڭىگە يېتىپ بارغاندا سۇيىدۇك ئاق، سۇيۇق ۋە سۇزۇك بولۇپ، تىڭىدە چوكمىسى بولمايدۇ. بۇ ھال سەپرادىنلىق ياغ بىلەن بىرىككەنلىگىنى ئىپادىلەيدۇ.
- (3) مىڭە سالامەت بولغاندىمۇ سۇيىدۇك ئاق كېلىدۇ. سەپرا ئۇچەيگە قۇيۇلغان چاغدىمۇ سۇيىدۇك ئاق كېلىدۇ، ئەمما بۇ چاغدا ئۇچەيدە يارا پەيدا بولۇش خەۋپى بار. ئاغرىقلارنىڭ سۇيىدۇكى ئۇزۇن ۋاقىت ئۆزگەر-مەي ئاق تۇرسا مىڭە سالامەتلىگىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
- (4) بەلغەم كۆپ بولۇش نەتىجىسىدە سۇيىدۇك ئاق ۋە قىيامى قويۇق يەنى مەندەك ئاق، قويۇق ۋە شىلىملىق كېلىدۇ. بۇ شەكىلدە پالەچ ۋە تارتىشىپ قېلىش (تەشەنئۇج) كېسەلىنىڭ ئالدىنقى بەلگىسىدىن ئىبارەت. ئەگەر سېرىق كۆپۈك بولسا يامان ھېساپلىنىدۇ. سۇيىدۇكنىڭ رەڭگى يۇقۇرقىدەك بولۇپ، بەلغەمدىن بولغان كېسەللەرنىڭ بەلگىلىرى كورۇلمىسە سالامەتلىكىنىڭ نىشانىسى ھېساپلىنىپ، سۈرگە بېرىش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

5) سۇيدۇك ئاق ۋە ياغاغشاڭغۇ بولۇشى چاۋا ياغلاردا ئېرىش يۈز بەرگەنلىگىدىن دېرەك بېرىدۇ.

2. سۇيدۇكنىڭ قىزىل بولۇشىدىكى سەۋەپلەر ۋە ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكى

سۇيدۇك قىزىل بولۇشى سېرىق بولغىنىغا نىسبەتەن تەبىئى (مۇۋاپىق) دۇر. چۈنكى سۇيدۇكنىڭ قىزىل بولغاندا، لىغى قاننىڭ كۆپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ. قان خىلىتلارنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولۇپ، ئادەم ھاياتلىغى قان بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. قاننىڭ ئىسسىقلىغى سەپراغا قارىغاندا كەمرەك. 1) سۇيدۇك قىزىل ئەمما سۇيۇق بولسا خىلىت (ماددا) نىڭ خاملىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇنداقتا كېسەل ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ.

2) قىزىل سۇيدۇكتە چوكمە بولمىسا قۇرۇقلۇقنىڭ بەدەندە كۆپلىگى، تەبىئەتنىڭ ئاچارلىغى، كۈچىنىڭ ئاجىزلىغى ۋە ماددىنىڭ كۆپلىگىنى كۆرسىتىدۇ. ھەم جىگەردە ۋە رەم (ئىششىق) بارلىغىنىڭ بەلگىسى.

3) قىزىل سۇيدۇكتە ئاق چوكمە بولسا بۇ سالاھىيەتلىكنى كۆرسىتىدۇ.

4) چوكمەنىڭ قىزىل بولۇشى كېسەلنىڭ ئاقىدۇر. تى ياخشى بولىدىغانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

5) قىزىل سۇيدۇكتە سەپرا قوشۇلغان بولسا خىلىت كويىن بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى 2 خىل ئىسسىقلىق بىرىكسە ھارارەتنى ئاشۇرىدۇ. بۇ ئەھۋال بەزىدە

كېسەل كىشى تېز تەرلەپ ساقىيىشنىڭ بەلگىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

(6) قىزىل سۇيدۇك تامچىلاپ كەلسە، قويۇق ۋە سېسىق بولسا، قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا ماددىنىڭ خاملىغىنى كورسىتىدۇ. سېسىقلىق تەبىئەت مەغلۇپ بولۇپ، كېسەللىكنىڭ غالىپ بولغانلىق ئالامىتىدۇر. ياكى بورەكتە يىرىڭلىق ۋە رەم بارلىغىنى كورسىتىدۇ.

(7) سۇيدۇك قىزىل، سۇيۇق، شۇنىڭدەك مەئىدە ئاجىز، بەدەندە قىچىشمىش بولسا يەرقان (سېرىق كېسەل) باشلىنىشنىڭ ئالامىتىدىن ئىبارەت. قىزىل سۇيدۇك ئۈستىدە سېرىق كۆپۈك بولسا ياكى سېرىق چۆكمە بۇلۇتقا ئۇخشاپ سۇيدۇك تېگىدە تۇرسا كېسەلنىڭ ئاقىۋىتى بامانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ.

(8) ھارارەتلىك كېسەللەردە سۇيدۇك قىزىل بولسا جىگەرنىڭ ئىسسىقلىغى ئارتۇق ئىكەنلىگىنى كورسىتىدۇ. سۇيدۇك قىزىل بولۇپ، ئارقا تەرىتى قۇرۇق بولسا، كۆكرەك كېسەللىكلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئۆپكەسلى پەيدا بولغانلىغىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ. بەزى ھاللاردا بۇ قان بىلەن بىرىكىپ كەلگەنلىك نەتىجىسى بولۇپ قانتۇمۇر دېۋاللىرى كېڭەيگەنلىك دېيىلىدۇ.

(9) بەزى قاندىن بولمىغان ئېغىر كېسەللەردە، مەسىلەن، ئۇچەي توسىلىش (قولۇنچ) كېسىلىدە سۇيدۇك قىزىل كەلسە بەزىلەر بۇنى قان سەۋىيىدىن دەپ خاتا ئويلىشىدۇ.

10) جىگەر كېسەللىكلەردە ئومۇمەن سۇيىدۇك قىلىش زىل كېلىدۇ.

11) سۇددە كېسەللىكلەردە (قانتۇمۇرلار توپىلىش خاراكتېرلىك ئاغرىقلاردا) مۇ سۇيىدۇك قىلىش بولۇپ، سىل قىزىتمىسى (تەپىدىق) ۋە ئۇچەي سىلىنىڭ پەيدا بولۇشى ياكى كېسەللىك ئېغىرلىشىۋاتقانلىقىنى ھەم چاۋا ئېرىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا چوقۇم كېسەللىك ئىچى سۇرۇپ كېتىدۇ. دوساقتا يارا بولسا، سۇيىدۇك قىلىش بولىدۇ. ئەگەر يىرىڭلىق يارا بولسا، سۇيىدۇك يىرىڭلىق كېلىدۇ ۋە جىنىسى ئەزانىڭ توشىقى ئېچىشىپ قېچىشىدۇ.

12) بەلغەمدىن بولغان كېسەللەردە سۇيىدۇكنىڭ قىزىللىقى بوھران (كېزىس) نىڭ ئالامەتلىرىدىن بىرى ھەم تەرلەشنىڭ بەلگىسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. چوڭ تەرەتنىڭ كۆپلىگى، ئوتۇش يوللىرىنىڭ توسىلىشى بەلغەم ماددىسىنىڭ قويۇلۇپ قېلىشلىرى بەلغەمدىن بولغان كېسەللەرنىڭ ئالامەتلىرىدىن ئىبارەت.

13) سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ سۇيىدىكى قىزىل رەڭلىك، قىزىق ۋە سۇيۇق بولىدۇ.

يۈرەككە يېقىن بولغان ئەزالاردا ۋەزەم بولغاندا سۇيىدۇكنىڭ رەڭگى قىزىل كېلىدۇ. سەۋىيى يۈرەكنىڭ ھارارىتى ئېشىپ كەتكەنلىكىدۇر.

3. سۇيىدۇك سېرىق بولۇشنىڭ سەۋىيىسى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى

- (1) سامان رەڭلىك سېرىق سۇيىدۇك ھارارەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
- (2) تورونجى (ئاپلىسىن رەڭلىكى) سۇيىدۇك بىر ئاز ئىسسىقلىققا مايىللىق بەلگىسىدۇر. سېرىق سۇيىدۇك سۇيۇق بولۇپ تېگىدە پاختىدەك رۇسۇپ چۈكسە ھارا-رەتنىڭ ئۈستۈنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
- (3) زاڭ رەڭلىك (قىزىل سېرىق) سۇيىدۇك بەك ئىسسىقلىقنىڭ بەلگىسى. سېرىق قىزىلغا مايىل بولغانسېرى ئىسسىقلىق كۆپ، سوغاقلىق شۇنچە ئازلىقنى ئىپادىلەيدۇ. سۇيىدۇك دائىم يالقۇن رەڭدە بولىدۇ. سېرىق سۇيىدۇك ئۈستىدە لەيلىگەن چۈكسە بولمىسا بۇ ناھايىتى يامان. لېكىن ساغلام كىشىلەردە سۇيىدۇكنىڭ سېرىق بولۇشى ئۇزۇقلۇق ۋە سەيرانىڭ كەملىكىدىن بولۇپ، بوز-داق كىشىلەر ئۇزۇق كېلىدۇ.

4. سۇيىدۇك قارا بولۇشنىڭ سەۋىيىسى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى

- (1) سۇيىدۇك قارا رەڭلىك بولۇپ 5 كۈنگىچە ئۆزگەرمەسە كېسەلنىڭ ئاقىۋىتى ناچار بولىدۇ دەپ ھىساپلىنىدۇ. ئەگەر قارا سۇيىدۇكنىڭ چۈكۈمىسى تېگىدە بولماي ئۈستىدە بولسا ئاقىۋىتى ياخشى. سۇيىدۇك قويۇق بولسا ماددىنىڭ خاملىقى ۋە قۇۋۋەتنىڭ تاجىزلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ

ھال كېسەللىكنىڭ ئاخىرىدا يۈز بېرىپ، چۈكمە سۈي-
دۇكنىڭ تېگىگە چۈككەن، ئۈستىدە قارا كۆپۈك بولسا
مىڭە ئىششىغانلىقتىن ۋە ئۈلۈمگە يېقىنلاشقانلىقتىن دې-
رەك بېرىدۇ. قارا سۇيدۇكنىڭ ئۈستىدە كۆپۈك بولۇشى
باش ئاغرىش ۋە جويۇلۇشنىڭ سەۋەبچىسى بولۇپ، بۇ-
رۇن قاناش بىلەن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ.

(2) قارا سۇيدۇك زاك رەڭگىدە بولسا ماددىنىڭ
خاملىغىنى بېلدۈرىدۇ.

(3) سۇيدۇك قارا سۇيۇق، لەيلىگەن چۈكمە چې-
چىلاڭغۇ، بەدەن ئېغىرلاشقان بولسا، بۇرۇن قاناش بەل-
گىسىدىن ئىبارەتتۇر. بۇ ھال قارا (ئەسۋىلىك) كېزىك-
تە كۆپ ئۇچرايدۇ. ئەگەر قارا كېزىك قاندىن بولغان
بولسا، بۇ بەلگى قان كۆيگەنلىگىنى كۆرسىتىدۇ. قۇلاق
ئېغىرلىقى بىللە كەلسە، بۇ ماددىنىڭ پىششىغانلىغىنى
بىلدۈرىدۇ.

(4) كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا سۇيدۇكنىڭ قارا
بولۇشى ئۆلۈم يېقىنلاشقانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. سۇيدۇك قا-
رغا مايىل سۇيۇق بولسا، ئاغرىقنىڭ ئۇزۇن يېتىپ-
قالدىغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

(5) سېرىق كېسەل (يەرقان) نىڭ سۇيدۇكى قارا
دۇغ بولسا كېسەل ياخشىلىنىشقا باشلىغانلىغىدىن خەۋەر
بېرىدۇ. قارا سېرىق، قىزغۇچ كۆپۈكسىز بولسا كېسەل-
نىڭ ئېغىر ئۆتكەنلىگىنى كۆرسىتىدۇ. قىزىل بولۇشى
ھارارەتنىڭ بەلگىسى، قارا بولۇشى ماددا كۆيۈپ تەبىئەت-

نىڭ مەغلۇپ بولغانلىغىنى، كوپۇك بولماسلىغىنى ئوتۇش يوللىرىنىڭ توسۇلغانلىغىنى كورسىتىدۇ.

6) ساغلام كىشىلەردە سۇيدۇك بىرنەچچە كۈن قارا نۇرسا بورەككە تاش ئورۇنلاشقانلىغىنىڭ بەلگىسىدۇر. چوڭ تەرەت بىلەن سۇيدۇكنىڭ بىردەك قارا بولۇشى سەپرا ياكى سەۋدانىڭ كويىگە ئىلگىنى، ھارارەت توۋەنلەپ — تەرلىمىگە ئىلگىنى كورسىتىدۇ.

5. باشقا رەڭلەردىكى سۇيدۇكلەرنىڭ

سەۋىبى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى

1) يېشىل رەڭدىكى سۇيدۇك — سەۋدا ۋە بەلغەم — دىن ھاسىل بولغان كېسەللەرنىڭ بەلگىسى ۋە ئاغرىق ئورۇقلىغانلىقىنىڭ نەتىجىسىدۇر. پىشقەدەم تىۋىپلارنىڭ كورسىتىشىچە يېشىل سۇيدۇك جۇزام (ماخاۋ) كېسىلىنىڭ بەلگىسىمۇ بولىدۇ. كىچىك بالىلارنىڭ سۇيدۇكى يېشىل بولسا تېزدىن ئولۇپ كېتىشى ئېھتىمال. سەۋىبى مىڭە سۇيۇقلىقى قۇرۇپ كەتكەنلىكتىن تارتىشىش كېلىپ چىقىپ چىشلىرى كىرىشىپ قېلىپ ئولۇپ كېتىدۇ. ئۇنداق ھاللاردا بەدەنگە ھوللۇك بېرىدىغان نەرسىلەرنى ۋە مايلىق نەرسىلەرنى تېزلىكتە كىرگۈزۈش لازىم.

2) ھاۋا رەڭلىك سۇيدۇك زەھەرلىك نەرسىلەر بىلەن مەسىلەن، زانكار بىلەن زەھەرلەنگەن كىشىلەردە ئۇچرايدۇ.

3) سۇيدۇك زەيتۇن يېغى (سۇس يېشىل) رەڭلىك

بولسا ناچار خىلىتلار ۋە زىيانلىق ماددىلار بەدەندە تۇرۇپ قالغانلىق ئىپادىسى بولۇپ خەتەردىن بەلگە بېرىدۇ. ئەگەر ياغ ئارىلاش بولسا تېخىمۇ خەتەرلىك. (4) قىزىل ياقۇت رەڭلىك، ئوسما رەڭلىك، مایسا رەڭلىك، تۇخۇمەك رەڭلىك ۋە پوررەڭلىك سۇيۇك ئاسا-سەن ھامىلدار ئاياللاردا بولىدۇ. گوش رەڭ ۋە زاك رەڭ ئارىلاش سۇيۇك سەپرا بىلەن سەۋدانىڭ بىرىككەن-لىمىگى بولۇپ خەتەرلىكتۇر.

(5) بىنەپشەرەڭ، نوخۇت رەڭ ۋە بىيەسۇيى رەڭلەردىكى سۇيۇك ئىچكى ئەزالارغا مەسىلەن، مەئىدە، جىگەر، ئۆپكە ۋە تاللاردا ۋە رەم بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ خىل رەڭ-دىكى سۇيۇكلەر كۆپ ئۇچرايدۇ. ئاياللارنىڭ بىنەپشە-رەڭلىك سۇيۇكى قوساققا سۇ چۈشۈش (ئىستىسقا) نىڭ ئالامىتى بولۇپ قەدىمقى تەۋىپلار ئىستىسقانىڭ سۇيۇكى دائىم كاشكاپ رەڭگىدە بولىدۇ دەپ كورسىتىدۇ.

2 - پەسىل: سۇيۇكنىڭ قويۇق - سۇيۇقلۇقى

(قەۋامى)

سۇيۇكنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى سۇيۇق، قويۇق ۋە موتىدىل دەپ 3 خىلغا بولىنىدۇ. سۇيۇك دۇغ بولغاندا قويۇق - سۇيۇقلۇغىغا باھا بېرىش قىيىن، دۇغ-لۇق سۇيۇكنىڭ ئەسلى ماددىسىغا باشقا نەرسىلەر قوشۇلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

1. سۇيىدۇك سۇيۇق بولۇشنىڭ سەۋەپلىرى:

تاماق ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلىغى؛ تومۇر يوللىرىدا توسالغۇ بارلىغى؛ سەۋدا مىزاجىنىڭ قۇرۇق ۋە زاجغا ئۆزگەرگەنلىگى؛ تەبىئى ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەربى) ئاجىزلىشىپ خىلىتلەرنىڭ خام قالغانلىغى؛ سوغاق سۇنى كۆپ ئىچكەنلىك؛ يۈرەكنىڭ ئاجىزلىغى؛ يۈرەكتە ۋەرەم بارلىغى؛ يۈرەك باكى سۇيىدۇك يوللىرىدا تاش پەيدا بولۇش؛ تەبىئەتنىڭ سۇنى سەرپ قىلىش قۇۋۋىتى ناچارلىشىش تۈپەيلىدىن (سوغاق ۋە زاجنىڭ بوزۇلۇشى ياكى قەن سىيىش كېسىلى سەۋىيىسى بىلەن) سۇنىڭ ئۆزگەرەي ئور پېتىچە چىقىپ كېتىشى (بۇنداق ھاللاردا كېسەل كۆپ ئۇسسايدۇ، كۆپ سىيىدۇ).
بالىلار سۇيىدۇگىنىڭ سۇيۇق بولۇشى غەيرى تەبىئىي، قويۇق بولغانلىغى تەبىئىي ھىساپلىنىدۇ.

چوڭ بالىلار سۇيىدۇگىنىڭ سۇيۇق بولۇشى خاس سېسىقلىقتىن بولۇپ، كېسەلنىڭ ئاخىرىدا يۈز بەرسە خىلىت پىشقانلىق، بوھران يۈتكەلگەنلىك ئىپادىسىدۇر. شۇنىڭدەك پۇت - قوللار ئىششىش، يارا چىقىش، ئىچى سۇرۇش ياكى تەرلىمەي ساقسىيىش بەلگىسى بولۇپ قالىدۇ. ساق كىشىلەرنىڭ سۇيىدۇگى سۇيۇق، بە - دەندە قىچىشىش، ئەزالاردا ئېغىرلىق سېزىمى بار بولسا، سۇلۇق قاپارتما چىقىش بەلگىسى بولىدۇ. شۇنىڭدەك مىزاج سوغاقلىقنىڭ ئالامىتى بولۇپ، قېرى كىشى -

لەرنىڭ مىزاجىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئەگەر بۇ ھال كې-
سەللەردە كورۇلسە خىلىت خام قالغانلىقتىن ياكى تو-
مۇر يوللىرى توسىلىپ قالغانلىقىنىڭ، باش ئاغرىش
ۋە كوڭلى ئايىنىشنىڭ بەلگىسىدۇر.

ساغلام كىشىلەرنىڭ سۇيىدۇڭى سۇيۇق، قىزىل
بولسا، ئۇزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكى، ئەمگەكنىڭ كوپلە-
گىنى ۋە غەزەپلەنگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئەھۋال
كېسەلدە كورۇلسە خىلىتتىن خام قالغانلىقى ۋە ھارا-
رىتى غەرىزەنىڭ ناچارلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ. چېچە-
لاڭغۇ چوكمىلىك سۇيۇق قىزىل سۇيىدۇك ۋە كوپۇكلۇك
سۇيىدۇك ھارارەت ئۈستۈن بولۇپ، بەلغەم كويگەنلىكىدىن،
كۆكرەك ئاغرىقلىرىدا بولسا بەلغەم كوپىلىگىدىن دېرەك
بېرىدۇ.

سۇيۇق سۇيىدۇكنىڭ ئادەتتىكىدىن كوپ كىلىشى
باش ئاغرىقى، كوز كېسەللىرى ياكى دەم سىقىش پەيدا
بولۇشنىڭ بەلگىلىرىدۇر. سۇيىدۇك بىردىنلا كوپ كېلىش
بىلەن بەدەنگە راھەت ھاسىل بولسا، بۇ خىلىتلار پىش-
قانلىقتىن ۋە قۇۋۋەتنىڭ ئارتۇقلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ.
ئەگەر ئاز كەلسە قۇۋۋەت ئاجىز ۋە قۇيۇق خىلىتلار
كوپ بولىدۇ

2. سۇيىدۇك قۇيۇق بولۇشنىڭ سەۋەپلىرى

قۇيۇق سۇيىدۇك ماددىنىڭ پىشقانلىغىنى كورسە-
تىدۇ: دەسلەپتە سۇيۇق بولۇپ كېيىن قۇيۇق كەلسە

۱. دادا پىشقان بولىدۇ. دەسلەپتە قويۇق، ئاخىرىدا سۇ-
 يۇق بولسا بۇ ھەقىقىي نام ئەمەس. سۇيۇكنىڭ دۇغ
 بولىشى بەدەندە ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ.
 لېكىن ماددىنىڭ پىشقان-پىشمىغانلىغىنى كېسەلنىڭ
 ئومۇمى ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش كېرەك. بەقرات ①
 "سۇيۇك ئىشەك سۇيۇگىدەك دۇغ بولىشى باش ئاغرىد-
 غىنىڭ ئالامىتىدۇر" دېگەن. خىلىتلارنىڭ تېز چىقىشى بىلەن
 سۇيۇك قويۇق كىلىدۇ. قويۇق سۇيۇكنى بىر سائەت قوي-
 غاندىن كېيىنمۇ چۆكمە دۇغ ھاسىل قىلمىسا ئىسسىقلىقنىڭ
 كۆپلىگىنى، ماددىلارنىڭ قاتتىقلىغىنى، تەبىئەتنىڭ ئاجىز-
 لىغى ۋە ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر بۇھ-
 ران ۋاقتىدا سۇيۇك دۇغ بولسا بوھران بولىشىدىن خەۋەر
 بېرىدۇ. كېزىك ئاغرىقلاردىكى قويۇق سۇيۇك بوھراننىڭ
 تەرلەش بىلەن تامام بولىدىغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. مۇنداق
 ھاللاردا قويۇق سۇيۇك سۇيۇق سۇيۇك بىلەن ئالماشسا
 يۈرەك، بورەك، جىگەر ۋە مەئدە ئەتراپىدا ۋەزەم
 بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. پالەچ كېسەللىكلىرىدە بوھران
 يۈز بەرگەنلىك ئىپادىسى بولىدۇ. تال كېسەللىكلىرىدە
 سۇيۇكنىڭ دۇغ بولىشى كېسەلنىڭ سەۋادىن بولغان-
 لىغىنى كۆرسىتىدۇ.

2) سۇيۇك ئۆتۈش يوللىرىدا توسالغۇ بولسا
 قويۇق سۇيۇكنىڭ بەزىدە يىردىڭ ئارىلاش كېلىشى مۇ-
 كىن. شۇ يوللاردا تاش بولسا چۆكمە كۆپ بولىدۇ.

① بەقرات: ھىپوكرات - تەھرىر

چوڭ يوتا ساھەسىدە ئېغىرلىق بولسا، تاشنىڭ بورەكتە ئىكەنلىكىنى، ئەگەر جىنىسى ئەزانىڭ تۇۋى قىچىشىپ ئاۋ-رىسا تاش دوساقتا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

سۇيىدۇك دەسلەپتە قويۇق بولۇپ، مەئدە ئاغرىش ۋە بەدەن قىچىشىلا بىللە كەلسە سېرىق كېسەل باش-لانغانلىقىنىڭ بەلگىسىدۇر.

سۇيىدۇك ئالدى بىلەن دۇغ چىقىپ كېيىن سۇزۇك كەلسە، بۇ ياخشىلىقنىڭ ئالامىتى، ئەگەر ئالدى بىلەن سۇ-زۇك، كېيىنچە دۇغ بولسا ئىزتىراپ زىيادىلىكىنىڭ، مېگە قوزغالغانلىق ۋە ساراڭلىقنىڭ بەلگىسىدىن ئىبارەت.

3. سۇيىدۇك مىقدارى ئاز - كوپاڭىنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) تەشۋالىق يوق تۇرۇپ سۇيىدۇك كوپ بولمىشى بەدەندىكى نەملىك ۋە سۇيۇقلۇقنىڭ جىق چىقىم بو-لۇپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) ئۇچەي توسىلىش (قۇلىنج) كېسەللىگىدە ۋە قو-يۇق كوپ كەلگەن سۇيىدۇك كېسەلنىڭ تېز ساقىيىپ كېتىش-نى ئىپادىلەيدۇ. كوپ يەپ ئىش قىلمايدىغان كىشىلەر-دە سۇيىدۇك كوپ ۋە ھەرخىل رەڭلىك كېلىدۇ.

(3) سۇيىدۇك مىقدارىنىڭ كوپ ۋە رەڭلىك بول-مىشى ئىسسىقلىقنىڭ ئالامىتى بولۇپ، ئانچە خەتەرلىك ئەمەس. چۈنكى ئىسسىقلىق بولغاندا ئاغرىقلاردا ماددا ئاسان پىشىدۇ.

4) ئىستىمىلىق كېسەللىكلەردە سۇيدۇك ئاز ۋە قىيىنلىق بىلەن چىقسا كېسەلنىڭ ئۇزۇنغا سوزىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

5) تامچىلاپ ياكى ئىختىيارسىز كەلگەن سۇيدۇك مىڭگە ئاپەت يەتكەنلىكىنى كورسىتىدۇ. ئېقىل بۇزۇلغانلىق ۋە جويۇلۇش ياكى مالىخۇلىيا كېسەللىكنىڭ بەلگىسىدۇر. 6) سۇيدۇكى ئاز كىشىلەردە بۇرۇن قاناش-يۇز بەرسە قۇۋۋەتنىڭ ئاجىزلىقىنى بىلدۈرىدۇ. سۇيدۇك ئاز ۋە قارامتۇل رەڭدە كەلسە ماددىنىڭ كويىگەنلىكىنى ۋە سۇيۇقلۇقنىڭ يوقالغانلىقىنى كورسىتىدۇ.

7) بەدەن ھارارىتىنىڭ تەسىرى بىلەن بەدەندىكى سۇ پارغا ئايلىنىپ نەتىجىدە سۇيدۇك مىقدارى ئازىيىدۇ. 8) سۇيدۇك يوللىرىدا توسالغۇ (سوددە) بولغاندا، ئىچ سۇرۇش (ئىسھال) ۋە قۇسۇش كۆپ بولغاندا سۇيىدۇك مىقدارى كېمىيىدۇ.

9) سۇيدۇكنىڭ ئازىيىشى سۇلۇق ئىششىق (ئىستى-قا) نىڭ ئالامىتى بولۇشىمۇ مۇمكىن.

3 - پەسىل: سۇيدۇك ئۈستىدە كۆپۈك بولۇشى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

سۇيدۇكتە كۆپۈك ھاسىل بولۇپ، پات-بوزۇلۇپ كەتمەي ئۇزۇن تۇرۇش ماددىنىڭ خام، چاپلىشاڭغۇلۇغى ۋە يەل بارلىقىنى كورسىتىدۇ.

كوپۇكنىڭ سۇيدۇك رەڭگىدە ياكى ساغۇچ قارا بولۇشى يەر قان كېسىلىنىڭ بەلگىسى. كوپۇكنىڭ ئاق سۈتكە ئوخشاش بولۇشى ئوپكە كېسەللىگى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر كوپرەك دەريا سۈيىنىڭ كوپۇكلىرىدەك كالىك-كالىك بولسا-روھى كېسەللىكنىڭ بەلگىسىدۇر.

1. سۇيدۇكتىكى چوكمە (رۇسۇپ) نىڭ سە -

ۋىبى ۋە ئەھمىيىتى

سۇيدۇكنىڭ ئىچىدە لەيلەپ كېيىن ئاستىغا چۈ- كىرىدىغان پاختا، لاي ياكى شور تۈزدەك نەرسىلەر چۈك- مە (رۇسۇپ) دەپ ئاتىلىدۇ. سۇيدۇكتىكى بۇ خىل رۇ- سۇپلار كېسەل ئەھۋالىغا قاراپ ھەر خىل بولىدۇ. تە- بابەتتە چوكمە سۇيۇقلۇق ئىچىدە ئۇنىڭ تەركىبىدىن ئاجرىلىپ تۇرغان بىر خىل جەۋھەرى جىسىم دەپ تۇ- نۇلىدۇ. ئۇ تەرەۋەندىكىچە 3 تۈرلۈك بولىدۇ:

(1) چوككەن چوكمە (رۇسۇبى راتىپ): سۇيدۇك- نىڭ تېگىگە چوكىدىغان چوكمە.

(2) لەيلەپ يۈرگەن چوكمە (رۇسۇبى مۇتەئەللەق): سۇيدۇكنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا لەيلەپ تۇرىدىغان چوكمە.

(3) ئۇزۇپ يۈرگەن چوكمە (رۇسۇبى غۇمام): سۇي- دۇك ئۈستىدە بۇلۇتتەك ئۇزۇپ يۈرىدىغان چوكمە.

سۇيدۇكتىكى چوكمە تەبىئەتنىڭ كۈچى بىلەن ماددىنىڭ پىشقان ياكى پىشمىغانلىقىنى، بەدەندىكى

كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشى ھەم بەدەننىڭ كېسەللىككە قارشى كۈچ - قۇۋۋىتىنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئاغرىق پاكىزە قاچىغا سېسىپ تەخمىنەن بىر سائەتتىن كېيىن تىۋىپقا كورسەتتىشى لازىم. تىۋىپ سۈيى - دۈكنى كورگەندە تىۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش كېرەك:

(1) چۈكمە پىشقان ياكى پىشمىغانلىقى، (2) تەك - شى ياكى تەكشى ئەمەسلىكى، (3) چۈكمىنىڭ ئاز - كۆپ - لىكى، (4) قويۇق - سۇيۇق ياكى كالىلەكلىكى، (5) رەڭگى، (6) چۈكمىنىڭ سۇيىدۇك تېگىدە ياكى ئۈستىدە ئىكەنلىكى، (7) چۈكمىنىڭ سىيگەندىن كېيىن تېز ياكى ئاستا ھال - سىل بولۇشى، (8) چۈكمىنىڭ سۇيىدۇك بىلەن بىرىككەن ياكى ئايرىم ھالدا ئىكەنلىكى قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەپسىلى كۆزىتىش لازىم.

2. چۈكمە ھاسىل بولۇشى

سۇيىدۇك ھاسىل بولىدىغان ئەزالاردا ياكى سۈيى - دۈك يوللىرىدا ياللۇغلىنىش (ۋەرەم) پەيدا بولغاندا سۇيىدۇكتە چۈكمە كورىنىدۇ. مەسىلەن، جىگەر، بورەك، ماسانە (دوساق) قاتارلىق ئەزالاردىكى ئاددى ۋە يە - رىڭلىق ۋەرەملەردە بولىدۇ. ۋەرەم خىلىتلارنىڭ بۇزۇ - لىشى ۋە تاشقى تەرەپتىن بەدەنگە كىرگەن ئۇفۇنەت ماددىلىرى ۋە جەراسىملارنىڭ مەھسۇلىدۇر. ئۇفۇنەت ماددىلىرى قانغا قوشۇلغاندىن كېيىن قاننىڭ كەيپىيا -

تىنى بۇزۇپ چىرىش پەيدا قىلىدۇ. بەدەندىن ئۇنى يىراقلاشتۇرۇش ئۈچۈن تەبىئەت ماددىنى پىشۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇفۇنەت ماددىلىرى (ھازىرقى تىببى تىلدا ئېيتقاندا مىكروپىلار) ۋە بۇزۇلغان خىلىتلار قاندىن ئاجراشقا باشلايدۇ. بۇ تىبابەتتە ماددىنىڭ پىشقانلىقى ① دەپ ئاتىلىدۇ. ماددا پىشقاندا كېسەللىك تەرەققى قىلىش دەۋرىدە داۋاملىشىۋاتقان بولۇپ، شۇ كۈنلەردە سۇيىدۈكتە چوكمىنىڭ يۈز بېرىشى ئۇفۇنەت ماددىلىرىدىن نىڭ قاندىن ئايرىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ. كېرەكسىز ۋە بۇزۇق ماددىلار چوكمە بىلەن قوشۇلۇپ سۇيىدۈك يولى ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ. بۇ تەبىئەتنىڭ كۈچى بىلەن بارلىققا كېلىدۇ. كۈچ - قۇۋۋەتنىڭ ھالى ئوزۇق - لىنىشقا باغلىق. يەنى ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرلىك - يېتەرسىز - لىكى، ئوزۇق كەيپىياتىنىڭ ئىسسىق - سوغاقلىقى قاتار - لىق ئەھۋاللار تەبىئەتنىڭ ماددىنى يېڭىش ياكى پىشۇ - رۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئىشتىھاسى تۇتۇلۇپ تاماقنى ئاز يىگەندە تىۋىپ بۇنىڭغا دىققەت قىلىشى ۋە مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىشقا چارە قىلىپ، تەبىئەتنىڭ ماددى - نى پىشۇرۇشىغا ياردەم بېرىشى كېرەك.

ساغلام كىشىلەر سۇيىدۈگىدە چوكمە بولمايدۇ. لې - كىن سېمىز كىشىلەر سۇيىدۈگىدە كۆپ يەپ ئەمگەك

① بۇخىل پىشقان ماددا تىبابەتتە "نەزجى" ماددا دەپ

ئاتىلىدۇ - تەھرىر.

قىلمايدىغان (رىيازەت چەكمەيدىغان) ئادەملەر سۇيىدۇك -
دە چوكمە بولىدۇ.

3. تەبىئى ۋە غەيرى تەبىئى چوكمىلەر

(1) تەبىئى (مۇۋاپىق) چوكمە: سۇيىدۇك تېگىدە
ئاق رەڭلىك تەكشى ھالدا بولىدۇ. ئەگەر چالغۇتۇلسا،
چېچىلىپ تۇرىدۇ. چېچىلغاندىن تېز جەملىشىپ كالا-
لەكلىشىپ تۇرغىنى ناھايىتى ياخشى. چوكمە ئادەتتە
سۇيىدۇك رەڭگىدە بولىدۇ. سۇيىدۇك رەڭگىدە بولغىنى،
ئۇنىدىن قالسا سېرىق رەڭلىك ۋە تورۇغى رەڭلىك
رۇسۇپ ياخشى.

(2) غەيرى تەبىئى (مۇۋاپىق بولمىغان) چوكمە:

(1) شىلىمىش چوكمە (مۇخاتى) — ئاق، قويۇق،
ماڭقىدەك شىلىملىق بولىدۇ. بۇ غەيرى تەبىئى چوكمىنىڭ
پىشقانلىغىنى، مىزاجىنىڭ سوغاقلىغىنى كۆرسىتىدۇ. سۇي-
دۇك يىوالىرى كېسەللىگىدە، قويۇمچاق ئەسەبىنىڭ يال-
لۇغى (ئەر قۇنىمىسا كېسەللىگى) ۋە تاياغ قان تومۇر-
لىرى ئەگرى كېڭىيىپ كېتىش كېسىلى (داۋالى كېسىلى)
دە بوھران يۈز بەرگەنلىگىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

(2) دۇغلاشقان (ئەلقىي) چوكمە: مەزى ① سۇيۇق -

① مەزى سۇيۇقلۇغى مەنىنىڭ سۇيۇق قىسمى بولۇپ،
سۇيۇق، سۈزۈك، ئازراق شىلىمىش سۇيۇقلۇقتىن ئىبارەت.
ئەرلەرنىڭ ئارىلىقتىكى پىيازغا ئوخشاش مەزى بېزىدا ئىشلەپ-
چىقىرىلىدۇ — تەھرىر.

لۇغىدەك چۈكەمە بولۇپ، بورەك ياكى دوساقنىڭ يە-
رىڭلىق ۋە رەملىرىدە ئۇچرايدۇ. بۇنى يىرىڭلىق سۇيىدۇك-
تىن پەرقلىش كېرەك. يىرىڭلىق سۇيىدۇك چالغۇتۇلسا
پۈتۈن سۇيىدۇك ئاقىرىپ كېتىدۇ ۋە سېسىق پۇرايدۇ.
(3) چالپاق-چالپاق (خىراتى) چۈكەمە: سۇيىدۇك
ئىچىدە بىر پارچە ئاق ياكى قىزىل رەڭلىك لاتىغا
ئوخشاش ياپىلاق چۈكەمە تۇرىدۇ. سەۋىبى دوساقتا يارا-
پەيدا بولىشىدۇ. بۇ خىلدىكى چۈكەمە قارا، توپا رەڭ-
دە ياكى قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. بەزىدە بېلىق تېرىسىگە
ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ خىلدىكى چۈكەمە خەتەرلىكتۇر.
ئاق ياكى قىزىل بولغىنى دوساقنىڭ ئۇفۇنەت، جەرا-
سىملاردىن تازىلىنىۋاتقانلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

(4) دانلىق (نەخالى) چۈكەمە: خىراتىدىن كىچىك،
قۇرۇق، ئاق رەڭلىك دانە-دانە بولۇپ، خۇددى كىپەك-
تەك تۇرىدۇ. بۇ دوساقتا قاپارتمىلىق ئۈزگىرىشلەرنىڭ
بارلىغىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر يىرىڭلىق بولسا سېسىق
پۇرايدۇ.

(5) پۇرچاقسىمان (كۇرسىنە) چۈكەمە: نەخالىدىن
چوڭراق، رەڭگى قارا تۇل ئاق ياكى توپا رەڭلىك
بولۇپ، پۇرچاققا ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ، بورەك جىگەرگە
ئوخشاش نازۇك ئەزالارنىڭ ئىچكى قىسمىدا يىمىرىلىش
بارلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەگەر بۇ خىلدىكى چۈكەمە
تالقاندەك پارچىلانغان كورۇنۇشتە بولسا خەتەرلىكتۇر.

(6) گوشسيمان (لههمى) چوكمه: چوكمىنىڭ رەڭگى
گوش رەڭگىگە ئوخشايدۇ. بۇنىڭ سەۋىبىمۇ پۇرچاقسىمان
چوكمه بىلەن ئوخشاش.

(7) ياغسىمان (رەسمى) چوكمه: بۇ كوپىنچە سۇي-
دۇك ئۇستىدە ياغدەك بەزىدە سېرىق سۇدەك لەيلەپ
يۇرىدۇ. بۇ بەدەندىكى ياغ بولۇپمۇ چاۋا ياغلار ئېرى-
گەنلىگىنى كورسىتىدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى گوش ۋە چاۋد-
لارنى ئېرىتكۈچى پاقىراپ تۇرىدىغان سەپرا (سەپرايى
دەرخەشان) بولۇپ، رەڭگى بەزىدە ئاق، بەزىدە قىزىل
كېلىدۇ.

(8) يۇڭسىمان (شەئرى) چوكمه: سۇيدۇك بەك
سۇيۇق بولۇشى تۈپەيلىدىن چوكمه ئۇزۇن تالا- تالا
بولۇپ چىقىدۇ. رەڭگى قىزىل بولۇپ، بورەك كېسىلىدىن
خەۋەر بېرىدۇ.

(9) قۇمسىمان (رەملى رۇسۇپ) چوكمه: چوكمىنىڭ
قۇمدەك بولۇشى دوساق ياكى بورەكتە قۇم ياكى تاش
بارلىغىدىندۇر. شېغىل تاش ۋە قۇمدەك قىزىل رەڭلىك
چوكمىنىڭ بولۇشى تاش بورەكتە ئىكەنلىگىنى، ئاق
رەڭلىك بولسا دوساقتا ئىكەنلىگىنى كورسىتىدۇ.

(10) قاندىك چوكمه (دەمەۋى رۇسۇپ): چوكمه
قاندىك بولۇپ، سۇيدۇك بىلەن ئارىلىشىپ كەلسە جى-
گەرنىڭ ناچارلىغى، ئەگەر ئايرىم تۇرسا بورەكتە تاش
كوپلىگىنى كورسىتىدۇ. ئەگەر پارچە- پارچە ئۇيۇپ قالغان
قاندىك تۇرسا تال كېسەللىگىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ.

(11) خېمىرسىمان چوكمە (ئەسنى رۇسۇپ): سۈي-
دۇك ئىچىدە بىر پارچە خېمىر باردەك كورىنىدۇ. بۇ
مەئدە ئاجىزلىغىنىڭ ۋە تاماق ھەزىم بولۇش ناچارلى-
غىنىڭ ئالامىتىدۇر. بۇزۇلغان تاماق، قېتىق دوغنى
كوپ ئىچكەندىمۇ شۇنداق بولىدۇ.

(12) كۈلىسىمان چوكمە (رەمەدى رۇسۇپ) چوك-
مىنىڭ كۈلرەڭدە بولۇشى بەلغەمدىن دېرەك بېرىدۇ.
ياكى يىرىڭ ئۇزۇن تۇرۇپ قېلىپ رەڭگى ئۆزگىرىپ
كەتكەنلىك نەتىجىسىدىن ئىبارەت.

4. چوكمە رەڭگىنىڭ بوھران كۈنلىرى بىلەن

مۇناسىۋىتى

(1) قارا چوكمە كېسەل ئەھۋالىنىڭ يامانلىغىنى
كورسىتىدۇ. ئەگەر قارا رۇسۇپ بۇلۇتتەك سۇيدۇك ئۇس-
تىدە تۇرسا ئىستىسقانىڭ بەلگىسى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.
بۇ سەۋدا كېسەللىكلەردە بوھران بولۇشتىن دېرەك بېرىدۇ.
(2) توق قىزىل چوكمە ھارارىتى غەرىزەنىڭ
2 تەرەپكە يەنى ئىچكى تەرەپنى قىزىتىپ، تاشقى تە-
رەپنى سوۋۇتۇشقا سەرپ بولۇۋاتقانلىغىنى ئىپادىلەيدۇ.
(3) ھاۋارەڭ چوكمە مىزاجنىڭ سوغاقلغىنى
ئىپادىلەيدۇ.

(4) قىزىل چوكمە قان ئارتۇق ئىكەنلىگىنى ۋە
خام ماددا ئازلىغىنى كورسىتىدۇ. كوپىنچە سالامەتلىكنىڭ
بەلگىسى بولۇپ قالىدۇ.

(5) زەيتۇنە چۈكمە: سىل كېسەللىكنىڭ بەلگىسىدۇر. قىزىل رەڭلىك بۇلۇتتەك چۈكمە سۇيىدۇك ئۈستىدە تۇرسا ئاغرىق 7 - كۈنى تەرلەيدۇ. توۋەنرەك تۇرسا 14 ياكى 21 نچى كۈنى تەرلەيدۇ (بوھران بولىدۇ). كېسەللىكنىڭ 4 - كۈنى چۈكمە ھاسىل بولسا تەرلىمەي ساقىيىدۇ. چۈكمىنىڭ 6 - كۈنى كورۇلگىنى ياخشى. بۇنداق ئاغرىقلار 8 - كۈنى تەرلەيدۇ. قىزىل چۈكمە سۇيىدۇك ئىچىدە لەيلەپ تۇرسا ۋە رەم پەيدا بولۇپ يىرىڭغا ئايلانغانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

4 - پەسىل: سۇيىدۇكتىكى پۇراق ۋە ئەر - ئاياللارنىڭ سۇيىدۇگىنى پەرقلەش

(1) سۇيىدۇكلەر سەسكەندۈرمەيدىغان، سەسكەندۈردىغان پۇراقلىق سۇيىدۇك ۋە پۇراقسىز سۇيىدۇك دەپ 3 خىلغا بۆلىنىدۇ.

(1) سەسكەندۈرىدىغان يامان پۇراقنىڭ بولۇشى ھارارەت ئۈستۈن بولۇش بىلەن خىلىتلەر بۇزۇلۇش ۋە ئۇفۇنەت ھاسىل بولۇش نەتىجىسىدۇر. سۇيىدۇك ئۆزى ئاق بولۇپ، ئادەم سەسكىنىدىغان پۇراق چىقىرىپ تۇرسا يۇقۇرى ئىستىما ۋە كېسەل ئەھۋالى ئېغىرلىشىدىغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولۇپ تەپ كېسەللىكلىرىدە كورلىنىدۇ. ئاياللارنىڭ سۇيىدۇگى ئەرلەرنىڭكىگە قارىغاندا قويۇغراق بولۇپ رەڭسىز كېلىدۇ. چۈنكى ئاياللار بەدە -

ئىندە ھارارەت ئەرلەرگە نىسبەتەن توۋەن بولىدۇ. ئاياللارنىڭ مىزاجىمۇ ئانچە ئىسسىق بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاياللار سۇيىدۇكى رەڭسىز بولغىنى ياخشى؛ سېرىق ياكى قىزىل بولغىنى ئانچە ياخشى ئەمەس. ھامىلدار ① ئاياللارنىڭ سۇيىدۇكى سۈزۈك كېلىدۇ. سېرىق بولسا كۆكۈش رەڭ كۆرىنىدۇ ۋە چۆكە سۇيىدۇك تېگىدە بولىدۇ. ھامىلدارلىقنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا قىزىل بولۇپ رۇپىتا ئۇششاق دانە-دانە نەرسىلەر ئاستىن-ئۈستۈن بولۇپ تۇرىدۇ.

ھامىلدارلىقنىڭ 2 - 3 - ئايلىرىدا سۇيىدۇك سۇيۇق بولۇپ، 2 - 3 قوشۇمچە كېلىدۇ. رەڭگى كېيىنچە قىزىل سېرىق رەڭگە ئۆزگىرىپ ئۈستىدە ئازغىنە كۆپۈك ۋە ياغلىق دانلار بولىدۇ. 4 - 5 - ئايلاردىن كېيىن قىزىل رەڭگە كىرىدۇ. چالغۇتسا دۇغ بولۇپ سۇيىدۇك تېگىگە چۆكىدۇ. بۇ ھامىلىنىڭ سالامەتلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر دۇغ كۆپ بولۇپ مىدىرلاتقاندا چۆكمەي سۇيىدۇك ئۈستىدە تۇرسا بالىنىڭ سالامەت ئەمەسلىكىنى ۋە خەتەر ئىچىدە ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

① تەبائىيەتنىڭ قەدىمقى كىتاپلىرىدا سۇيىدۇك ئۈستىدىكى بۇلۇتقا ئوخشاش چۆكە پۇتۇن سۇيىدۇك يۈزىنى قاپلاپ تۇرسا قوساقنىكى بالا ئوغۇل؛ ئەگەر يېرىمىنى قاپلاپ تۇرسا تورەلەمە قىز بولىدۇ. ئەگەر مەزكۇر چۆكە دانە-دانە ئايرىلىپ تۇرسا ئايال ھامىلدار ئەمەس، بەلكى ئايالنىڭ بەدىنىدە يەل كۆپلىگەن. دىن دېرەك بېرىدۇ-دېگەن كۆز قاراش بار.

XI ماقالا. چوڭ تەرەت (بەۋل) نى تەكشۈرۈش

1 - پەسىل: چوڭ تەرەتتىكى ئارىلاشمىلار

چوڭ تەرەتنى كۆرگەندە، ئۇنىڭدىكى ئۆزگىرىش ئەھۋاللىرىغا قاراپ قايسى ماددىنىڭ تەرەتكە قوشۇلغان - لىغىنى بىلىپ بەدەندە قايسى ماددىنىڭ كۆپ ياكى غالىپ ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. مەسىلەن، سەپرا قوشۇلغان بولسا مەئىدە سەپرانىڭ كۆپلىگىنى، بەلغەم قوشۇلغان بولسا بەلغەمنىڭ كۆپلىگىنى بىلىمىز. سەپرانىڭ تەرەتكە قوشۇلۇپ چىقىشى ئوتنىڭ ئاجىز - لىغىنى ۋە جىگەرنىڭ تارتىش قۇۋۋىتى كۈچسىز بولۇپ سەپرانى تارتىپ ئالالمىغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. سەۋدا قوشۇلغان بولمىشى تالنىڭ ئاجىزلىغىنى ياكى قوشۇلۇپ كەلگەن ماددىنىڭ خام قالغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. سەۋدا - لىق كېسەللەردە تەرەت قارا ۋە سۇيۇق كەلسە كېسەل - نىڭ ياخشىلانغانلىغىنى؛ گۆش چايقىغان سۇدەك كەلسە جىگەرنىڭ ناچارلىغىنى؛ قاراقان قوشۇلۇپ كەلسە تومۇر يوللىرىنىڭ توسالغانلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. شىلىملىق نەر -

سېلەرنىڭ قوشۇلۇپ كېلىشى ئۆتكۈر تاماقلارنى ئىستېمال قىلغانلىق ۋە خىلىتلار ئۆتكۈر بولغانلىق نەتىجىسىدىن ئىبارەتتۇر. چوڭ تەرەت ئاز بولۇشى تۈۋەندىكى بىر قانچە سەۋەپلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

(1) ئوت يوللىرىنىڭ تۈسلىشى بىلەن سەپرا ئۈچەيگە يېتەرلىك چۈشەلمەسلىك.

(2) ئوزۇقلۇققا باي بولغان يېمەكلىكلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش بىلەن تاماقنىڭ كۆپ قىسمى ھەزىم بولۇپ قالغا ئۆتۈپ كېتىپ، كېرەكسىز قىسمى ئاز قېلىش.

(3) جىگەرنىڭ قۇۋۋىتى ياخشى بولۇپ، كەيلىنى پۈتۈنلەي ھەزىم قىلىپ كېرەكسىز قىسمى ئاز چىقىش-تىنىمۇ تەرىتنىڭ مىقدارى ئاز بولىدۇ. لېكىن مەئدەنىڭ كۈچى ۋە ئۈچەيلەرنىڭ ھەيدەپ چىقىرىش كۈچى (قۇۋۋەيى داپئەسى) ناچارلىشىپ تەرەتنىڭ قولۇن (چەمبەر) ئۈچەيدە تۇرۇپ قېلىشى نەتىجىسىدە چوڭ تەرەتنىڭ ئاز كېلىشى كېسەللىك ئەھۋالىدۇر. چوڭ تەرەتنىڭ سۇ-يۇق ياكى قۇرۇق كېلىشىنى بىلىش ئالاھىدە ئەھمىيەت-كە ئىگە.

2 - پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ سۇيۇق ياكى

قويۇق كېلىشى

كەيلىنى جىگەر تەرەپكە بارماستىن ئۈچەيگە چۈشۈپ كېتىشى بىلەن تەرەت سۇيۇق ماڭىدۇ. بۇنىڭ

3 خىل سەۋىيى بار: (1) جىگەرنىڭ كۈچى ئاجىز بولۇپ، كەيلىنى ئۆزىگە تارتىشنىڭ ناچارلىقى؛ (2) ماسارىقا تومۇرنىڭ ئاجىزلىقى ياكى ئۇنىڭ ئىچكى يوللىرىغا توسالغۇ پەيدا بولۇپ، كەيلىنىڭ جىگەرگە ئۆتۈشىگە توسالغۇلۇق قىلىشى؛ (3) مەئىدە تاماق ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلىقى. بۇنى تەرەت رەڭگىنىڭ ئىستىمال قىلغان تاماق رەڭگى بىلەن ئوخشاش بولغانلىقىدىن بىلىمىز. بۇنىڭ سەۋىيى تاماقنى كۆپ يېيىش بىلەن مەئدە ئۇنى ياخشى ھەزىم قىلالماي كەيلىنىڭ تەرەتكە قوشۇلۇپ كېتىشىدىن؛ مەئىدە بار بولغان ناچار خىللىقلار تاماقنى ياخشى ھەزىم قىلدۇرماستىن ئۆچەيگە ھەيدىشىدىن ئىبارەتتۇر. چوڭ تەرەت قۇرۇق كېلىشنىڭ سەۋەپلىرى.

ئېغىر ئەمگەكتىن كېيىن بەدەندىكى سۇيۇقلۇقنىڭ تارقاپ كېتىشى، كۆپ سىيىش، كۆپ تەرلەش، مىزاجنىڭ قۇرۇقلۇققا ئۆزگىرىشى ياكى قۇرۇق نەرسىلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن تەرەت قۇرۇق كېلىپ ئىچ قاتىدۇ.

تەرەتنىڭ بىر قويۇق بىر سۇيۇق كېلىشى ھەزىم-نىڭ ناچارلىقىدۇر. چوڭ تەرەتنىڭ قويۇق-سۇيۇقلۇقتا مۆتىدىل، سۆڭ (مەقئەد) نى ئېچىشتۇرمايدىغان، كۆۋۈك-سىز سېرىق رەڭدىكىسى بەدەن ۋە ئۆچەي يولىنىڭ ساقلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

3. پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ رەڭگى

(1) تەرەتتە سېرىقلىقنىڭ توقراق بولۇشى بەدەندە سەپرا ماددىسىنىڭ كۆپلىگىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئەگەر كېسەللىكنىڭ ئاخىرىدا تەرەت سېرىق كەلسە ئاغرىقنىڭ ساقىيىش دەۋرىگە ئۆتكەنلىگىدۇر.

(2) تەرەتنىڭ كۆپ بولۇشى: ئىچكى ئەزالاردىن جىگەر، تال ۋە مەئدەلەرنىڭ سوۋۇپ قالغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

(3) تەرەتتە قان بولۇشى: ئاشقازان، ئۈچەيدە جاراھەت بارلىقى، تاماق ھەزىم بولمىغانلىقى، ماسارىقا تومۇرىغا توسالغۇ پەيدا بولۇش ياكى يەرقان (سېرىق كېسەل) نىڭ ئالامىتىدۇر.

(4) تەرەتنىڭ قارا بولۇشى سۇيۇكنىڭ قارا بولۇشى بىلەن ئوخشاش. جىگەردە خىلىتلەرنىڭ بۇزۇلغانلىقى، مەئىدە سەۋدانىڭ بولۇشى بىلەنمۇ تەرەت قارا كېلىدۇ. ياكى مەئدە يارىسىدىن چىققان يوشۇرۇن قان قوشۇلۇپ كەلگەن تەرەت قارا كېلىدۇ. سەۋدا قوشۇلغان تەرەت توپىغا چۈشكەندە قاينىغانغا ئوخشاش كۆۋۈكلىشىش يۈز بېرىدۇ. شۇنىڭدىن تەرەتتە سەۋدا بارلىقىنى بىلىمىز. سەۋدادىن بولغان ئاغرىقلاردا تەرەت قارا بولۇشى ماددىنىڭ پىشقانلىقى، كېسەلنىڭ ساقىيىش دەۋرىگە كىرگەنلىگىدۇر.

5) تەرەتنىڭ كالا تىزىگىدەك بولۇشى: بەدەندە يەل بارلىغىنى، ئەگەر مەزكۇر تەرەتنى سۇغا سالسا چوكمەي تۇرۇشى ئۈچەي توسىلىش (قۇلىنج كېسىلى) بارلىغىنى كورسىتىدۇ.

6) تەرەت پۇرۇغى سېسىق بولغىنى — بەدەندە ئۇفۇنەت — جەراسىملارنىڭ كۆپلىگىنى، ئاچچىق پۇرۇشى مىزاجنىڭ سوغاق ئىكەنلىگىنى كورسىتىدۇ.

X ماقالا. بەلغەم ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش

1- پەسىل: بەلغەمنىڭ مىقدارى

بەلغەمنىڭ چىقىش - چىقماسلىقى بەدەندىكى خام رۇتوبەت (ھوللىك) نىڭ پىشقان - پىشمىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. يوتەل بار ئاغرىقلاردا بەلغەمنىڭ ئاجراپ چىقىشى ماددىنىڭ پىشقانلىقى، يوتەلگەندە بەلغەم چىقمىسا ماددىنىڭ خاملىغىدۇر. بەلغەم قويۇقمۇ ئەمەس، سۇيۇقمۇ ئەمەس، ئوتتۇراھال بولۇشى كۆپىنچە ماددىنىڭ پىشقانلىقى ھىساپلىنىدۇ. يوتەلى بار ئاغرىقلار يوتەلگەندە بەلغەم چىقىشى بىلەن ئارام تاپسا بەدەندە ماددىنىڭ كۆپلىگى بولۇپ بۇ چاغدا بەلغەمنى تازىلاش (تەنقە قىلىش) كېرەك (كېيىنكى باپلاردا تولۇق سۆزلىنىدۇ).

2- پەسىل بەلغەمنىڭ رەڭگى

بەلغەم ئاق رەڭدە بولسا ماددىنىڭ خاملىقى ھە - ساپلىنىدۇ. سېرىق بولسا سەپرا ئارىلاشقان دىيىلىدۇ.

يېشىل دۇغ بولسا ماددىنىڭ كويگەنلىگى ياكى
ھارارىتى غەرىزەنىڭ يوقالغانلىقىدىن ئىبارەت، قارا بول-
سىمۇ شۇنداق. بەلغەم قىزىل بولسا قاننىڭ كوپلىگى
ياكى نەپەس يوللىرىدىكى قان تومۇرلارنىڭ تېشىلىگەن-
لىكىدىن بولىدۇ. ئەگەر ئاق بەلغەم قان بىلەن قوشۇپ-
لۇپ كەلسە ئۆپكە سىلىنىڭ ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ.

XI ماقالا. كېسەل ئاقىۋىتى ياخشى - يامان بولۇش ئالامەتلىرى

1 - پەسىل: كېسەل ئاقىۋىتى ياخشى بولۇشتىن دېرەك بېرىدىغان ئالامەتلەر

(1) تومۇر كۈچىنىڭ تەبىئەت كۈچى بىلەن تەڭ
بولۇشى؛

(2) نەپەس ئېلىشى، ئۇخلىشىنىڭ ئېتىدالدا بولۇشى، كېسەل كىشىنىڭ ئورنىدىن تۇرۇش ھەركەتلىرى ئوڭاي بولۇپ، ئولتۇرغاندا ئارقىسىغا ئورۇلۇپ كەتمەسلىكى، ياتقاندا پۇتىنى يىغىپ يېتىشى (ئەگەر كېسەل بەك ئاجىزلاپ كەتكەن بولسا، ساقىيىشى ئارقىغا تارتىلغاندەك ھامان ساقىيىپ كېتىدۇ).

(3) مىڭە ھالىتى جايىدا بولۇپ، يېقىن كىشىلىرى، دوستلىرىنى توغرا تونۇشى، ئومۇمى ئەھۋالدا با- راملىق، قاتتىق باش ئاغرىقى بولماسلىقى، قىزىتمىلىق كېسەللەرنىڭ چۈشكۈرۈشى؛

(4) قىزىتمىسى بىر خىل بولۇپ جىگەر، يۈرەك، ۋە مەئىدىدىن باشقا جايىلار قىزىقلىقنىڭ بولماسلىقى،

ئۇقۇنەتنىڭ بولماسلىقى ھەمدە قىزىتمىلىق كېسەللەردە
بوھران كۈنلىرىدە كالىپۇكقا قوقاق چىقىشى؛

(5) قىياپىتى: يۈزى ئورۇق، كۆزلىرى ئولتۇرۇشۇپ
قاياقلىرىنى تەسلىك بىلەن ئېچىشى (مۇنداق ئەھۋاللار
ئۇيقۇسىزلىق ۋە ئورۇنسز خىياللارنى كۆپ قىلىش كۆپ
ئىچى سۆرۈش ياكى كۆپ خۇن كېتىش نەتىجىسى
بولۇپ، خەتەرلىك بولمىسىمۇ، ئەمما ياخشى ئەمەس)؛

(6) بوھران (كرىزىس) كۈنلىرى بورۇن قاناش،
سۇ ئېقىش، ئىچ سۆرۈش، قۇسۇش ئەھۋاللىرىنىڭ بولۇشى
(بۇ، مىڭە ئاغرىقلىرىدا ياخشىلىقنىڭ بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ)
ۋە ئۆپكە ياللۇغى (زاتىلىرىيە)دە بەلغەمنىڭ پىشىپ
چىقىشى؛

(7) بەلغەم ئەھۋالى: بەلغەم رەڭگىنىڭ بىر خىل
قويۇق - سۇيۇقلۇقتا ئوتتۇراھال بولۇپ ئاسان چىقىشى،
يېرىك سېسىق پۇراقلىرىنىڭ بولماسلىقى،

(8) كېسەلنىڭ ئىشتىھاسى ياخشى بولۇپ، يىگەن
تاماقلار ھەزىم بولۇپ تۇرۇشى؛

(9) سۇيدۇك ئاپلىسىن (تۇرۇنجى) رەڭگىدە بولۇپ،
چۈكمە ئوتتۇرىدا ياكى تېگىدە تۇرۇشى ھارارەتلىك
ئاغرىقلاردا ۋە مىڭە كېسەللىرىدە ياخشىلىقتىن دېرەك
بېرىدۇ. سۇيدۇك تېگىدە ئاق پاختىدەك چۈكمە تۇرسا
نەزجىنىڭ يەتكەنلىكىگە دالالەت قىلىدۇ.

2- پەسىل: كېسەل ئاقەۋىتى يامان بولۇشنىڭ ئالامەتلىرى

قېدىمقى ھوكىمالار توۋەندىكى بەلگىلەر ئادەم ئۈچۈن تەھلىكلىك ئالامەت بولۇپ قالىدۇ - دەپ ئېيتىدۇ.

(1) كېسەلنىڭ قىياپىتى - كوزى چوڭقۇر، بۇرنى ئۇچلۇق - ئىنچىكە، قۇلىغى سوغاق، پىشانىسى تارتىشاڭغۇ، رەڭگى كۆك ياكى سېرىق توپا - چاڭ باسقاندەك بولۇشى ئولۇم ئالدىدىكى ئالامەتلەر ھىساپلىنىدۇ.

(2) باش ئاغرىغى - قىزىتمىلىق كېسەللەردە قاتتىق باش ئاغرىش خەتەرلىك. ئەگەر بېشى ئېغىر ئەمەس ۋە كېسەل ئوزى ياش بولسا بىر ئاز ئۈمىت بار.

(3) ئەس - ھۇشى - ئاغرىقنىڭ ئەس - ھۇشى جايىدا بولماسلىق مەسىلەن، ئەتراپقا قىزىقماسلىق، ئاغرىق سەزمەسلىك قاتارلىق ئەھۋاللار قۇۋۋەيى نەفسانى (ھاياتلىق كۈچى) نىڭ ئاجىزلىغىنى كۆرسىتىدۇ. كېسەل يۈزىدىن چىۋىن تۇتقاندەك، كۆرپىسىدىن نان ئۇۋاقلارنى تەر - گەندەك ھەركەتلەرنى قىلسا ياكى يېنىدىكى تامنى تاتلاپ كولاپ تۇرسا بۇ كېسەلنىڭ ئولۇمى يېقىنلىشىپ قالغانلىق بەلگىسىدىن ئىبارەت. قانداقتۇر بىر نەرسىدىن قورقۇش، ئالاقزادە بولۇش ئەھۋاللىرى مىڭگە سەۋدا خىلىتى تەسىر قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇمۇ تېز ئولۇپ كېتىش -

نىڭ بەلگىسى. ھارارەتلىك كېسەللەر ئۆزىنى قان ئاساسىدا قالغاندەك ھىس قىلسا ماددىنىڭ خام ۋە كوپلىمىگىنى بىلدۈرىدۇ. كېسەل كۆزنى يۇمۇپ ئاچالمىسا ئۇنى قاپاقنىڭ تارتىشىپ قېلىشى (تەشەننۇجى) دىيىلىدۇ. كۆز نۇرسىزلانغان بولسا كۆزنىڭ كۆرمەس بولۇپ قالغانلىقىنى، ئالغايلىشىپ قالسا ياكى كۆز ئالمىسى ھەركەتسىز بولسا تارتىشىش كۆز گۆشىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بىرلا كۆزدىن ياش ئاقسا بۇ مىڭنىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلاشقانلىقىدۇر. كۆز چاچراپ چىققاندا بولۇپ تۇرغان ھاللاردا بۇرۇندىن قان ئاقىسا بۇ نەزلە ① كۆپلىگەن بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ. ياكى مىڭدە ماددىنىڭ كۆپلىگى ۋە مىڭدە ۋەرمە بارلىقىنىڭ ئالامىتى بولىدۇ. كۆزى چاچلىشىپ قۇرۇپ ئومچۇك توردەك نەرسىلەر كۆرۈنسە ئۆلۈمنىڭ بەلگىسىدۇر. كۆزگە قارا نەرسىلەر كۆرۈنسە قۇسۇشنىڭ ئالامىتى، قىزىل نەرسە كۆرۈنسە بۇرۇن قاناشنىڭ بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ.

(4) بۇرنى پۇتۇپ قالغان ۋە نەپەس ئېلىشى تېزلىشىپ كېسەللەر خەتەر ئىچىدە ھىساپلىنىدۇ. بۇرۇندىن ئىپار، قىزىل گۈل ياكى كالا يېغى پۇرىغى كەلسە يامان ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسى بولىدۇ. چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى پۇراتقاندىمۇ چۈشكۈرمەسلىك ئۆلۈم ئالدىدىكى بەلگىدۇر.

(5) ئاڭلاشنىڭ ئاجىزلىغى ياكى پۇتۇنلەي يوقى-

① نەزلە: مىڭدىكى ئۇفۇنەتلىك سۇيۇقلۇق — تەھرىر.

لىشى يامان بەلگىلەردىن بولۇپ، قېرىلاردا ياشلارغا نىسبەتەن ئاقىۋىتى ناچارراق.

(6) چىشلارنىڭ ئىختىيارسىز بىر - بىرىگە ئۇرۇلىشى ياكى غىچىرىلىشى ناچار بەلگىلەردىن بولۇپ ئىگەك گۆشى تاتىشۋالغانلىقىدۇر. ھارارەتلىك كېسەللەردە - چىشنىڭ كۆكرىپ قېلىشى يامان بەلگىلەردىن ھىساپلىنىدۇ.

(7) ئىستىملىق كېسەللەردە ئېغىز قۇرۇشى، تىلىنىڭ قېلىن ۋە قارامتۇل گەزلىك بولۇشى يامان ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسى. ئېغىز ئىچىنىڭ سېسىق پۇرشى تازىلىققا رىايە قىلىنغانلىق نەتىجىسى بولۇپ، كېسەل ئۇچۇن ھەر تەرەپ - تىن زىيانلىق.

(8) سۈرگە بەرگەندىن كېيىن كېسەللەردە ھىق تۇتسا بۇ مەئىدە ئاغزى ۋە قىزىل ئوڭگەچ توشۇگىنىڭ تارتىشىپ قالغانلىقى بولۇپ، يامان بەلگىدۇر ياكى كېسەلدە خەنناق (بوغما) پەيدا بولسا ياكى يۇتۇش قىيىن - لاشسا خەتەرلىك ھىساپلىنىدۇ.

(9) كۈندۈزى ئۇخلاپ كېچىسى ئۇخلىماسلىق، ئۇخلاغاندا ساق چاغدىكىدەك ياتماستىن، ئەكسىچە پۇت - قوللىرىنى سوزۇپ ئوڭدا ياكى دۇم يېتىپ ئۇخلاش، بېشىنى ياستۇقتىن چۈشۈرۈپ ئۇخلاشتەك ئەھۋاللار كېسەل - نىڭ ئېغىرلىقى ۋە مىگە خىزمىتىنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

(10) قوساق گۆشلىرى ئورۇقلاپ قېلىشى، قوساق - نىڭ ئىچىگە چۆكۈپ كېتىشى يامان ئالامەت

11) قول - پۇتلارنىڭ مۇزلاپ كېتىشى ھارارىتى غەرىزىنىڭ ئاجىزلىغى ياكى جىگەر، مەئدەلەردە ۋە رەم بارلىغىدىن بولۇپ ئولۇم ئالدىدىكى ھالەتتۇر. تىر - ئاقلارنىڭ كوكىرىپ كېتىشىمۇ خەتەرلىك ئالامەت. ئەگەر يېشىل بولسا، بەدەندە ئوفۇنەتلەرنىڭ كوپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ. قول - پۇتلارنىڭ تارتىشىپ قېلىشى، گەدەز - نىڭ قېتىپ قېلىشى ئولۇم يېقىنلاشقانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ.

12) جويلۇش، ۋاقىراپ سوزلەش مىڭنىڭ ئېغىر ناچار ھالەتتە ئىكەنلىگىنى، ئالدىراپ سوزلەش ھارا - رەتنىڭ يۇقۇرىلىغىنى بىلدۈرىدۇ. كېسەللەرنىڭ بىردىنلا سوزلىمەس بولۇپ قېلىشى يامان ئاقىۋەتنىڭ ئالامىتىدۇر. 13) چوڭ يارىلار ئاغرىشنىڭ بىردىنلا توختاپ قېلىشى ناچار ئالامەت ھىساپلىنىدۇ.

14) كېسەل كىشى بۇرنىنى تولا كولاش ۋە بى - شىنى تولا مىدىرلىتىشلار مىڭنىڭ ئېغىر زەرەرلەنگەنلىگى بولۇپ تۇيۇقسىز ئولۇم بېرىشى مۇمكىن.

XII ماقالالا. كېسەللىكنى تونۇش ۋە توغرا تەشخىس قىلىش^①

1- پەسىل: كېسەلنى تونۇش

ئاغرىقنى تەكشۈرگەندە كېسەل قانداق باشلىنىپ قانداق تەرەققى قىلغانلىغىنى، سەۋەبچى ماددىسى قايسى خىلىت ئىكەنلىگىنى ۋە ئۇنىڭ پېشقان-پېشىمغانلىغىنى توغرا تونۇش لازىم. ئاغرىقنىڭ قانداق كېسەل بىلەن ئاغرىغانلىغىنى بەلگىلەشتە كېسەلنىڭ بەدىنىنى تەكشۈرۈش، تومۇرنى تۇتۇش، ئوزى ۋە ئەتراپىدىكى كىشىلەردىن ئەھۋالنى سوراپ بىلىش؛ شۇنىڭدەك جىنسى، يېشى، مىل-لىتى، كەسپى، تۇراقلىق جايىنىڭ شارائىتى ۋە ھاۋا كىلىماتى، ئوزۇقلىنىش ئەھۋالى، مىزاجى قاتارلىقلارنى ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈپ بىلىش ئاغرىققا باھا بېرىش (تەشخىس قىلىش) ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە. كېسەل-نىڭ ئومۇمى ئەھۋالى (نەۋئى ئام) نى بىر قەدەر تونۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئايرىم (خاس) قىسمىلىرىنى ئىزلەش لازىم. مەسىلەن، مىڭە كېسىلى دىگەن سۆز بىر

① تەشخىس — دىئاگنوز

خىل ئومۇمىي ئاتالغۇ بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىگە 46 خىل كېسەللەك كىرىدۇ. ئۇنىڭ بىرى بولغان باش ئاغرىغى 26 تۈرگە بولىنىدۇ. قىزىتما (ھارارەت) بىر خىل ئومۇمىي چۈشەنچە بولۇپ، ھارارەتلىك كېسەللەرنىڭ بىر قىسمى بولغان تەپلەرنىڭ ئوزىلا تەپى يەۋمى (كۈنلۈك بەزگەك) ۋە تەپى موهرىقە (كېزىك) قاتارلىق بىر قانچە تۈرلەرگە بولىنىدۇ. كېسەلنى تونىغاندىن كېيىن ئىلاجىغا (داۋالاش - قا) كىرىشىش كېرەك.

قىزىتمىلىق ئاغرىقلارغا چارە كۆرگەندە، ئالدى بىلەن قىزىتمىنى پەسەيتىشكە تىرىشىلىدۇ. ئەگەر خىلىت ماددىلىرىدىن بولغان قىزىتما بولسا، سۈرۈپ چىقىرىش (ئىستىفراغ^①) دىن كېيىن قىزىتمىنى چۈشۈرۈشكە كىرىشىش كېرەك. يۇقۇملۇق ئاغرىقلاردا ئاغرىقنىڭ بەدىنى، ئورۇن - كورپىسى ۋە ئەتراپ مۇھىتىنى پاكىز تۇتۇشقا دىققەت قىلىش لازىم.

2-پەسىل: ماددىنىڭ پىششى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

كېسەلگە سەۋەپچى بولغان ماددىنىڭ پىششى ئەزجى دەپ ئاتىلىدۇ. ھەقىقىي (تولۇق) پىشقان ماددىنى ① ئىستىفراغ - تەبائەتتە بەدەندە پىشىپ يېتىلگەن ماددىلار - نىڭ بەدەندىن سۈرۈپ چىقىرىلىشىنى ئىستىفراغ" دەپ ئاتىلىدۇ. ئىچىنى سۈرگۈزۈش، سۈيىدۈك راۋان قىلىش، بەلغەم بوشتىش، قۇستۇرۇش، تەرلىتىش قاتارلىق چارىلارنى ئوز ئىچىگە ئالىدۇ.

“نەزجى ھەقىقى” ۋە پىشمىغان، يامان ماددا نەزجىي بەد دىيىلىدۇ. بۇلار بەدەندىكى ماددىنىڭ (خىلىتلارنىڭ) پىشقان - پىشمىغانلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. مەسىلەن، ماددا پىشقاندا، بەدەندىكى ئۆزگەرتكۈچى قۇۋۋەت (قۇۋۋەيى مۇ - غەيىرە) كېسەللىك ماددىسىدىن ئۈستۈن كېلىپ كېسەللىكنى يېڭىدۇ. ماددا پىشمىغاندا ئۆزگەرتكۈچى قۇۋۋەت تولۇق كۈچەپ كېتەلمەي (ئاجىز كېلىپ) ماددا تېخىمۇ بۇزۇلۇپ ئۇفۇنەتكە ئايلىنىپ ساقىيىش ۋاقتى ئارقىغا تارتىلىدۇ. مەسىلەن، ئوپىكە ياللۇغى (زاتلىرىيە) كېسىلىدە بەلغەم ئاسانلىق بىلەن چىقسا ۋە ئاق ياكى ئازراق سېرىق رەڭدە، ئوتتۇراھال قويۇقلۇقتا بولۇپ، يىرىڭ ياكى سېسىق پۇرىغى بولمىسا، بۇ ماددىنىڭ تولۇق پىشقانلىغى (نەزجىي ھەقىقى) ھىساپلىنىپ، كېسەل ئەھۋالى ۋە ئاقىۋىتىنىڭ ياخشىلىغىنى بىلدۈرىدۇ. ئەكسىچە، بەلغەم قويۇق، قارا ياكى كۆك، سېسىق پۇراقلىق بولسا يامان ماددا (نەزجىي بەد) بولۇپ كېسەلنىڭ ئەھۋالى يامان - لىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەگەر بۇ كېسەلدە بەلغەم چىق - مىسا ماددا تېخى پىشمىغان (خام) ھالدا ئىكەنلىكىدىن ئىبارەتتۇر.

ماددىنىڭ پىشقانلىغى داغرىقنىڭ خەتەرلىك باس - قۇچتىن ئوتۇپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنداقتىمۇ داغرىقنى دىققەت بىلەن پەرۋىش قىلىش لازىم. لېكىن كېسەلنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن ماددىنىڭ پىشقان بولۇشى

شەرتىمۇ ئەمەس. چۈنكى بەزى كېسەللەردە نەزجى بولمايمۇ ئۇزۇن ۋاقىت يېتىپ ساقىيىدۇ.

ۋەرەم (ياللۇغلىنىش) لىق ئاغرىقلار بىردىنلا قىزىپ ياللۇغلىنىش بار ئەزا قاتتىق ئاغرىپ كەتسە شۇ ۋەرەم ماددىسىنىڭ پېشقانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇندىن كېيىنكى ھارارىتى يەڭگىلەپ بولىدۇ. ئېغىر ئۆتكەن كېسەللەردە ماددىنىڭ تولۇپ پېشىشى ياخشى ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسى.

1- ماددىنىڭ پېشقانلىغى (نەزجى) نى

ئىزلەش ئۇسۇلى

كېسەل ماددىسىنىڭ پېشىش مەنبەسى ئەسلى كېسەل ئەزادا بولىدۇ. مەسىلەن، ئۆپكە، كۆكرەك كېسەللىكلىرىدە نەزجىنى بەلغەمدىن ئىزلەش كېرەك. ئۇچەي كېسەللىكلىرىدە چوڭ تەرەتتىن، جىگەر كېسەللىكىدە سۇيۇكتىن، مىڭە كېسەللىكلىرىدە بۇرۇندىن ئاققان سۇدىن؛ ھارارەت ۋە ۋەرەملىك ئاغرىقتىمۇ سۇيۇك ھەم ۋەرەمنىڭ ئۆزدىن ئىزلەش لازىم.

2- مىڭىنىڭ سالامەتلىكى بىلەن مۇنا.

سەۋەتلىك بەزى بەلگىلەر

(1) سوزلەشتە كېسەل ئېنىق سوز قىلالمىسا مىڭە زەرەرلەنگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

(2) كۆزنىڭ روشەن ياكى تۇتۇقلىغى مىڭىنىڭ ياخشى-يامانلىغىغا باغلىق.

- (3) ئېقىلنىڭ كەملىكى ۋە ئۇنۇتقا قلىق مىڭىگە قۇرۇقلۇق يەتكەنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ،
- (4) كوز گەپاشا - كۆمۈتمىدەك نەرسىلەرنىڭ كورمىدە - شى، قۇلاققا ھەر خىل غەيرى ئاۋازلار ئاڭلىنىشى مىڭىدە سۇيۇقلۇقنىڭ كوپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ،
- (5) ئاڭلاشنىڭ ناچارلىغى، قۇلاق شاقىراش ياكى شامالدىك گۆكسەش ئاۋازلىرىنىڭ بولۇشى مىڭىگە ۋە قۇلاق ئەسەپلىرىنىڭ كېسەللىنىشىگە باغلىق،
- (6) بۇرۇننىڭ پۇراق سېزەلمەسلىكى ئەسەپلەرنىڭ دەخلىگە ئۇچرىغانلىغىدىندۇر،
- (7) خام خىياللارنى تولا قىلىش روھى كېسەللىك - نىڭ ئالامىتى بولۇپ، مىڭىدە كېسەللىك ئوزگىرىشلىرى يۈز بەرگەنلىك بەلگىسىدۇر.

3- مىڭىگە يېقىن ئەزالار ياكى مىڭىگە

ئالاقىدار ئەزالاردىكى بەلگىلەر

- (1) كوز ئىچى قۇرغاق بولسا مىڭىنىڭ قۇرۇقلۇغى، كوپ ياش ئېقىپ تۇرسا مىڭىگە ئالدىنقى بوشلۇغىدا سۇيۇقلۇق كوپلىگىنى كورسىتىدۇ. ئەگەر كوز تومۇرلىرى قىزىل ياكى سېرىق بولۇپ، ياش ئېقىپ تۇرسا قىزىت - مىلىق كېسەللەردە مىڭىدە ۋەرەم بارلىغى، ياش بىر كوزدىنلا ئاقسا مىڭىگە ھارارىتىنىڭ يۇقۇرىلىغىنى بىلدۈرىدۇ. كېسەل كوزنى پات - پات يۇمۇشۇپلىش مىڭىنىڭ ئىسسىقلىغى ياكى ساراڭلىقنىڭ بەلگىسى. كوز چاچراپ

چىققۇدەك بولۇپ تۇرسا مىڭە ئىششىغانلىغىنى، چوڭقۇر بولسا ئاغرىقنىڭ بەدەنگە تارقالغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر كېسەل كوزىنى يۇمۇپ ئاچالمىسا يامان ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسىدۇر.

(2) بويۇندا ھەرخىل ۋەرەملەرنىڭ كۆپ بولۇشى ۋە چىش گۆشلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى مەئىدىنىڭ ئاجىزلىغىنى، ئوزۇقلۇقلارنىڭ ناچارلىغىنى بىلدۈرىدۇ.

(3) مىڭە زەرەرلەنگەندە پۇتۇن بەدەندىكى ئەزالار - غا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە تەسىر قىلىدۇ. مەسىلەن، چوڭ - كىچىك تەرەتلەرنىڭ توختاپ قېلىشى مىڭە، يۇلۇن ياللۇغىدا ئۇچرايدۇ. قىزىل ئوڭگەچ ۋە يۇتقۇچ بوش - شىپ كېتىپ تاماق ھەتتا چايمۇ ئۆتمەيدۇ.

(4) مەئىدە ۋە جىگەر دە ئاغرىش بولغاندا باشنىڭ يېرىمى ئاغرىپ، كېيىنچە تاغاق قىسمىغا بارىدۇ. بولۇپمۇ تاماق ھەزىم بولىدىغان ۋاقىتلاردا باشنىڭ قاتتىق ئاغ - رىشى مەئىدىنىڭ ناچارلىغىدىن بولىدۇ.

(5) باشنىڭ ئوڭ تەرىپى ئاغرىسا جىگەرنىڭ سول تەرىپى ئاغرىسا تالنىڭ مۇناسىۋىتى بار. ئاياللاردا بىر تەرەپ باشنىڭ يېرىمى ئاغرىشى ۋە پۇت - قوللارنىڭ ئاغرىشى بالىياتقۇ زەرەرلەنگەنلىگىدۇر. باشنىڭ چوقا ۋە گەڭگە قىسمى ئاغرىسا يۈرەكنىڭ سەۋىبىدىن بولىدۇ.

XIII ماقالا. كېسەلنى داۋالاش ئۇسۇللىرى

كېسەلنى داۋالاش ئۇسۇللىرى ئاساسەن ئاغرىق كىشى ئاسان قوبۇل قىلالايدىغان ۋە قوللىنىشقا ئەپلىك بولىشى كېرەك. مەسلەن،

(1) مۇۋاپىق دورىلارنى ئىچكۈزۈش.

(2) نەپەس يوللىرى ئارقىلىق تەسىرلىك دورىلارنى پۇرۇتۇش.

(3) ھوقنە (ھەمەل) قىلىش، شامچە شەكىلدە ياسالغان (شياق) دورىلارنى ئارقا يول ۋە جىنىسى يوللارغا كىرگۈزۈپ تەسىر كۆرسىتىش.

(4) مۇناسىپ دورىلارنى ماي ياكى باشقىلار بىلەن بەدەنگە سۇرتۇپ تەسىر قىلدۇرۇش.

(5) ماددىنى پىشۇرۇشى (مۇنزىج) چارۋىلىرىنى كورۇش.

(6) پىشقان ماددىنى بەدەندىن سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغ قىلىش).

ماددىلارنى بەدەندىن سۇرۇپ چىقىرىشنى ئومۇمىي سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغى كۈللى) ۋە قىسمەن سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغى جۇزئى) دەپ ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ.

ئومۇمى سۇرۇپ چىقىرىش ئاساسەن قان ئېلىشقا قارىتىلغان. قىسمەن سۇرۇپ چىقىرىش دەپ تۈرلۈك دورىلار بىلەن قۇستۇرۇش، سۈرگە دورىلار ياكى ھەمەل ئارقىلىق ئىچىنى بوشىتىش، سۇيدۇك ماڭدۇرۇش، بەل-غەمنى بوشىتىش، تەرلىتىش، بۇرۇن، تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

1 - پەسىل: سۇرۇپ چىقىرىش

(1) قان ئېلىش (1) قان ئېلىشتىكى مەقسەت: قان ئېلىش فەسەد دەپ ئاتىلىدۇ. قەدىمقى زامان ھو-كۇمالىرى قان ئىنسان ھاياتى ئۇچۇن بىردىن-بىر ئامىل دەپ تونۇپ قان ئېلىشنى توغرا كورمىگەن. كې-يىنكى زامانلاردا قان ئېلىشنىڭ كېسەللەرنى داۋالاشتا مەلۇم رولى بارلىغىنى بىلىپ تىبابەت ئەھلى قان ئې-لىشنى داۋالاش ئۇسۇللىرى قاتارىغا كىرگۈزۈپ ئومۇمى سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستېفراغى كۈالى) دەپ بېكىتىپ قوللانماقتا. بولۇپمۇ ئىچكى ئەزالارنىڭ ۋەزەملىك كې-سەللىرىدە قان بۇزۇلغاندا، قان كوپ بولغاندا قان ئېلىنسا يۈرەكنىڭ ئەركىن ھەركەت قىلىشىغا ۋە بۇزۇق ماددە-لارنىڭ بەدەندىن چىقىپ كېتىشكە زور پايدىلىقتۇر.

(2) قان ئېلىشنىڭ ئەھمىيەتى: (1) قاننىڭ تەركە-ۋىدە يەنە باشقا 3 خىل خىلىت بولغانلىغى ئۇچۇن قان چىقىرىش بىلەن باشقا خىلىتلارمۇ سۇرۇپ چىقىرىلغان

بولىدۇ. لېكىن قان ھەممىسىدىن كۆپرەك چىقىپ كېتىدۇ. (2) قان ئېلىش ئىختىيارى ئىستېفراغ بولىدۇ، يەنى سىز قانچىلىك سۇرۇپ چىقىرىشنى خالىسىڭىز شۇنچىلىك قان چىقىرىشقا بولىدۇ. لېكىن باشقا ئىستېفراغلاردا مەسىلەن، سۈرگە بەزگەن چاغلاردا ئىچى كۆپ سۇرۇپ كەتسە توختىتىش قىيىن، ئەگەر كۆچ بىلەن توختىتىلسا بەدەنگە زەرەرلىك. (3) قان ئالغاندا ماددىنى پىشۇرۇش شەرت ئەمەس، باشقا سۇرۇپ چىقىرىشلاردا ئالدى بىلەن ماددا پىشۇرىلىدۇ، ئاندىن كېيىن سۇرۇپ چىقىرىلىدۇ.

(3) قان ئېلىشتا مەنى قىلىدىغان ئەھۋاللار: توۋەن-دىكى ئەھۋاللاردا قان ئېلىشقا بولمايدۇ.

(1) قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا يەنە قايتىدىن ھارارەت كۆتىرىلسە قان ئالماسلىق كېرەك.

(2) ئېغىر ھالەتتىكى ئاغرىقلاردىن قان ئېلىشقا بولمايدۇ. ئەھۋالى ياخشىلانغاندا ئېلىش لازىم.

(3) ئىچ سۈرگەندىن، ئەمگەكتىن، جىنسى ئالاقىدىن كېيىنلا قان ئالماسلىق كېرەك.

(4) مۇگىدەپ تۇرغان كېسەللەردىن قان ئالماسلىق لازىم.

(5) 12 ياشتىن توۋەن بالىلار ۋە ھامىلدار ئاياللاردىن قان ئالماسلىق لازىم.

(6) ئاياللاردىن ھېمىز كۈنلىرى قان ئالماسلىق كېرەك.

(4) قان ئېلىشتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك نىسئالار:

(1) قان ئېلىش گەرچە ياخشى سۇرۇپ چىقىرىش ئۇسۇلى بولسىمۇ كۆپ ئېھتىيات قىلىش لازىم. بىلمەستىن ياكى بىلىپ تۇرۇپ شىريان تومۇر (قىزىلتومۇر) دىن قەتئى قان ئالماسلىق كېرەك. ئەگەر تەسادىپى شىر- ياندىن قان ئېقىۋاتقانلىغى بىلىنسە دەرھال توختىتىش زورۇر. شىريان تومۇردىن قان ئاققانلىق بەلگىسى شۇكى قان سۇزۇك بولۇپ ئېتىلىپ چىقىدۇ. كېسەلنىڭ يۈرەك ھەرىكىتى بارغانسېرى ئاجىزلايدۇ، ئېغىر ھاللاردا ھۇشىدىن كېتىدۇ. بۇ چاغدا تومۇر ئېغىزىنى دەرھال تېگىپ كېسەلنىڭ ياستۇغىنى ئىگىز قويۇپ ياتقۇزۇش بىلەن بىر قانچە كۈنگىچە ھەركەتلىنىدۇرمەسلىك لازىم.

(2) قان ئالغۇچى ئۆزى بىلەن دائىم ئىپار ۋە مەجۇ- نى داۋائۇلمىشكى (ئىپار مەجۇنى) ئېلىپ يۈرۈشى لازىم. كېسەل ھۇشىدىن كەتسە ياكى باشقا غەيرى ئەھۋاللار كورۇلسە ئىپارنى پۇرۇتۇش، داۋائۇلمىشكىنى يىگۈزۈش كېرەك.

(3) قان ئېلىشتىن بۇرۇن كېسەلگە لىمون شەر- ۋىتى، ئانار سۈيى گۈلاپ ۋە ئالما شەرۋىتى قاتارلىق- لارنى مۇۋاپىق ھالدا ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلسە قان ئېلىش- تىكى مۇرەككەپ ئەھۋاللار (ئايلىنىپ كېتىش، كۆڭلى ئايىنىش، باش قېپىش) دىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

(4) كېسەل قان ئېلىش جەريانىدا يېقەمسىزلىق

ھىس قىلسا ھۇشىدىن كېتىش بەلگىلىرى كورۇلسە دەر -
ھال گالغا توخۇپپى سېلىپ قەي قىلدۇرۇش بىلەن
تۈزۈلۈپ كېتىدۇ.

(5) قان ئالغاندىن كېيىن كېسەلگە ئاسان ھەزىم
بولمىغان يېنىك تاماقلارنى بېرىش لازىم.

(6) نەشتە ① نىڭ پاكىز بولۇشىغا ئالاھىدە دىق -
قەت قىلىش لازىم. ئەگەر تومۇر زەخمىلەنگەن بولسا،
توۋەندىكى دورىنى چېپىپ ئۈستىدىن پاكىزە نەرسە بىلەن
چىڭ تېڭىپ قويۇپ كۈندە بىر قېتىم يۈتكەپ تېڭىش
كېرەك. دورىنىڭ نۇسخىسى توۋەندىكىچە:

خونسىياۋشان، ئەنزۇرۇت، زەمچە، زاك، ئاقاقىيا،
ئانار گۈلى، سەبرە ۋە كۈندۈر ھەر بىرى 1 مىسقالدىن
سەمغى ئەرەبى 2 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ تۇخۇمنىڭ ئېقى بىلەن يۇمشاق خېمىردەك
تەييارلىنىدۇ. زەخمىلەنگەن ئورۇنغا مۇۋاپىق مىقداردا
قويۇپ ئۈستى تېڭىپ قويۇلىدۇ.

(5) قان ئالدىغان تومۇرلار:

(1) قىپال: مىڭە ۋە باش تەرەپ ئاغرىقلىرىدا
مەسىلەن، باش، كوز، بۇرۇن، قۇلاق، ماڭغاي، چىش
ۋە لەۋ ئاغرىقلىرىدا قان ئېلىش توغرا كەلسە موشۇ
تومۇردىن ئېلىنىدۇ.

① نەشتە: قان چىقىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان تىخ.

ئورنى: باشبارماق بىلەن بىر سىزىقتا بىلەكنىڭ سىرتقى قىسمىدا.

(2) ئوگھەل يەنە بىر ئىسمى ھەپتى ئەندام: بۇ قىپال بىلەن باسلىق تومۇرنىڭ قوشۇلۇشىدىن ھاسىل بولغان تومۇر پۇتۇن بەدەن كېسەللىكلىرىدە ۋە مۇرەككەپ ئەزا كېسەللىكلىرىدە ئوكھەلدىن قان ئېلىنىدۇ. بۇ ئومۇمى ئىستىفراغ ئۇچۇن ياخشى تومۇردۇر.

ئورنى: سابابە (كورسەتكۈچ بارماق) بىلەن بىر سىزىقتا بولۇپ، جەينەكنىڭ ئىچكى تەرەپكە ئىگىلىدىغان ئويمانلىغىدا.

(3) باسلىق:

ئىچكى ئەزالاردىن ئوپكە ۋە كوكرەك پەردە يال-لۇغلىرى (زاتلىرىيە، زاتلىجەنىي، زاتلىسەدرى لەردە) جىگەر ياللۇغلىرى، تال ئاغرىقلىرىدا بۇ تومۇردىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى: ئوتتۇرا بارماق (ۋۇستار) بىلەن بىر سىزىقتا بولۇپ، قولتۇق ئاستىدىن چىقىپ ئەگىپ جەينەك ئويمانلىغىدا تېرىگە يېقىن چىقىدۇ. باسلىق تومۇرىدىن قان ئالغاندا بەك ئېھتىيات قىلىش كېرەك. چۈنكى شىريانغا يانداش كىلىدۇ.

(4) مابىز: تىز بوغۇم ئىچكى ئويمانلىغىدا بولۇپ، ئومۇرتقا، ئۇچەي، مەقئەد، بالياتقۇ ۋە بوۋاسىر كېسەللىكلىرىدە بۇنىڭدىن قان ئېلىنىدۇ.

(5) ئۆسەلەم: جىگەر ۋە تال كېسەللىكلىرىدە،
قوتۇر كېسىلىدە ئۆسەلەم تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى — نامسىز بارماق بىلەن چىمچىلاق ئوتتۇردا —
سىدا بولۇپ، ئاغرىقنىڭ قولىنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ
تۇرۇپ ئېلىنىدۇ. جىگەر كېسىلىدە ئوڭ تەرەپتىن، تال
كېسىلىدە سول تەرەپ قولىدىن ئېلىنىدۇ.

سافىن: ئاياللارنىڭ ھېيىز كېسەللىكلىرىدە، ئەرلەر
جىنىسى ئەزا ۋە تۇخۇم كېسەللىكلىرىدە سافىن تومۇردا —
دىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى — ئىچكى ئوشۇق ئۈستىدە. تىزدىن يۇقۇرى
قىسمىنى بوغۇپ قويغاندا بۇ تومۇرنى ئاسان كۆرگىلى
بولىدۇ. بەل ئاغرىقلىرى ۋە مەئدە كېسەللىرىدە سافىن —
دىن قان ئېلىنىدۇ.

(7) ئىرقۇننىسا: ئىرقۇننىسا كېسىلى (ئولتۇرغۇچ
نېرۋا يالۋۇغى) دە بۇ تومۇردىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى — بۇ خىل گىرەلەشكەن ئەگرى — بۇگرى
تومۇر بولۇپ، پاقالچەكنى بوغۇپ قويۇپ، تومۇر كويۇپ
كۆرۈنگەندە نەشتەر سېلىنىدۇ. بەزى كىشىلەردە بۇ
ئۇسۇل بىلەنمۇ تاپقىلى بولمايدۇ. ئۇ چاغدا پۇتنىڭ نام —
سىز ۋە چىمچىلاق بارماق ئارىلىغىدىن قان ئالسا بولىدۇ.
يۇقۇرقلار قان ئېلىشقا بولىدىغان تومۇرلارنىڭ
مۇھىملىرىدۇر. قان ئېلىشتا قاندىكى دۇغلىق سۈزۈلگەن —
گە قەدەر قان چىقىرىلىدۇ. قان ئالمىسىمۇ بولىدىغان

كېسەللەردىن قان ئالماسلىق، دورا بىلەن بىر تەرەپ قىلىش لازىم. ئالدى بىلەن قان ئالىدىغان ئورۇننى بوغۇپ تومۇر ئېنىق كورۇلگەندە ئەڭ ياخشى نەشتە ھىجامەت (لوڭقا) قويغاندىكىدەك سېلىش؛ ئەگەر كېسەل كىشىدە سۇسلىشىش سېزىلسە قاننى دەرھال توختىتىش لازىم.

2. ھىجامەت (شەخەك) قويۇش

تېرىنى تېپىز قىلىپ لوڭقا قويۇش ئۇسۇلى ھىجامەت (شەخەك) قويۇش دەپ ئاتىلىدۇ. قان ئېلىش مەنىنى قىلىنغان ھاللاردا ۋە يەرلىك ئورۇندىكى بۇزۇق قان، زەرداپلارنى چىقىرىش مەقسىدىدە ھىجامەت قويىلىدۇ. ئىشلەش — تەرتىمى خۇددى لوڭقا قويۇشقا ئوخشايدۇ، قان ئالغان — نىڭ ئورنىدا ياكى زەرداپ بۇزۇق قانلارنى چىقىرىش مەقسىدىدە ھىجامەت قويغاندا تېرىنى گۇلاپ ياكى پاكىزە سۇدا تازىلاپ تىغ بىلەن بىر قانچە يەرنىڭ تېرە پۈتۈنلىكى بۇزۇلۇپ (قان چىقارماسلىق كېرەك)، ئۈستىگە لوڭقا قويۇش ئۇسۇلى بويىچە لوڭقا ياكى ئاغزى تار تۈۋى كەڭ شىشە قۇتقا قويۇلىدۇ. لوڭقىنىڭ تۇرۇش ۋاقتى كېسەلنىڭ ئەھمىيىتى ھۆلەمغا قاراپ 1 - 2 سائەت بولىشى مۇمكىن.

ھىجامەت قويىدىغان ئورۇنلار:

(1) بويۇن ئومۇرتقىسى بىلەن باش سوڭىكىسى — رىككەن جاي (گەژگە). بۇ جايغا ھىجامەت قويۇش ئۆكەل تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن تەڭ. ئۇنىڭ

تەسىرى بىلەن بەزىدە ئۇنۇتقاقلىق كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن توۋەنرەك يەرگە قويۇش لازىم.

(2) ئارقا تەرەپ ئىككى غول (تاغاق سوڭەك) ئارىلىغىغا سەل يۇقۇرى تەرەپكە ھىجامەت قويۇش باس-لىق تومۇردىن قان ئالغان بىلەن تەڭ.

(3) پاقالچەك (بېلىق گوش قىسمى) غا ھىجامەت قويۇش ساقىن تومۇردىن قان ئېلىش بىلەن باراۋەر بولۇپ، مەزكۇر جاي ھىجامەت ئۈچۈن خەۋپسىز جاي-دۇر.

دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار

(1) 60 ياشتىن يۇقۇرى قېرىلار ۋە 2 ياشتىن توۋەن بالىلارغا ھىجامەت قويۇشقا بولمايدۇ.

(2) يۈرەك ۋە مەئىدىسى ئاجىزلارنىڭ غولىغا ھىجامەت قويۇش زىيانلىق. مىڭسى ئاجىز (ئۇنۇتقاق) كىشىلەرنىڭ گەڭگىسىگە ھىجامەت قويۇش خەتەرلىك.

(3) مونچىدىن چىقىپلا ھىجامەت قويدۇرۇشقا بولمايدۇ.

(4) قان ئېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھىجامەت قويۇشقا بولمايدۇ.

زۇلۇك قۇرۇتى تىبابەتتە قان شورىتىش مەقسە-دىدە كەڭ قوللىنىلىدۇ. زۇلۇك (ئەلەق) بۇزۇق قاننىلا شوراپ ساپ قاننى شورىمايدۇ. دېگەن كوز قاراشلار بار. زۇلۇك قويۇش ئۈچۈن ھىچبىر مەنى ئىشلىتىدىغان ھال ۋە

ئالاھىدە كورستىلىگەن ئورۇنمۇ يوق خەتەرسىز ئۇسۇلدۇر. لېكىن ئۇنىڭ تۇرۇش ۋاقتىغا ھەمدە ئىچكى ئەزاغا كەرىپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىش لازىم.

3- قۇستۇرۇش (قەي قىلدۇرۇش)

قەدىمقى زامان تىبابەت ئالىملىرى دورىلار بىلەن قۇستۇرۇشنى ئومۇمى ھەيدەپ چىقىرىش دەپ ئاتاشقان ئىدى. قۇستۇرۇش پەقەت مەئدە ئىچىدىكى ماددىلارنى سىرتقا چىقىرىشلا ئەمەس، بەلكى ئومۇمى بەدەندىكى ماددىلارنى چالغۇتۇشتىن ئىبارەتتۇر. ئەمما غەيرى تەبىئى قۇسۇشلار مەسىلەن، ۋابا، ھەزىم بۇزۇلۇش، مەئدەنىڭ توۋەن چۇشىشى، تولغاق قاتارلىق كېسەللەردىكى قۇسۇش ئەك-سىچە، بەدەننى ئاجىزلاشتۇرىدۇ، بۇنى توختىتىش شەرت. دورىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇش ئاساسەن توۋەندىكىچە مەنپەئەتلەرگە ئىگە:

- (1) باشنىڭ ئېغىرلىقى يېنىكلەيدۇ. (2) كوز روشەنلىشىدۇ. (3) كىكرىگىنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. (4) ئوتنىڭ تېشىپ كېتىشىنى توسىدۇ. (5) ئىشتەينى قوز-غايىدۇ. (6) بەدەن سۇسلىغىنى يوقىتىدۇ. (7) مالخۇ-لىيا ۋە مەئدە سەۋىيىدىن بولىدىغان مىڭە كېسەللەكلەرگە (سەرئى قاتارلىقلارغا) مەنپەئەت قىلىدۇ. (8) ھەر خىل بوغۇم ئاغرىقلىرىنى قەي بىلەن داۋالاشقا بولىدۇ. (9) دوساق جاراھەتلىرىنى داۋالاشتا ئۇنۇم بېرىدۇ. (10) بەدەن رەڭگىنىڭ ئوزگىرىپ قېلىشىنى توسىدۇ.

(11) سېرىق كېسەل ۋە قوتۇر (جەرەپ) كېسەلنى ۋە ئىستىسقانى داۋالاشقا ۋە ئالدىنى ئېلىشقا مەنپەئەتى خېلى ياخشى.

قەي قىلدۇرۇشتىن بۇرۇن كېسەلنىڭ خىلىت ماد-
دىلىرىدىن بولغان (يەنى ماددى) ياكى باشقا سەۋەپلەر-
دىن بولغان (يەنى سازەج) كېسەللىك ئىكەنلىكىنى ئېنىق-
لاش شەرت. سازەج كېسەللەرنى دورىلار بىلەن قەي
قىلدۇرۇپ داۋالىغىلى بولمايدۇ. ماددا بولسا قايسى ماد-
دىدىن ئىكەنلىكىنى بىلىش لازىم ۋە ئالدى بىلەن
ماددىنى پۇشۇرۇش (مۇنزىج قىلىش) ئاندىن كېيىن
كورىستىلىگەن دورىلار (ھەر خىل ماددىغا ئايرىم دورا
كورىستىلىدۇ) بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىككى خىل ماددىنىڭ
بىرىكىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا، قايسى ماددا كۈچ-
لۇك بولسا شۇنىڭغا خاس قەي دورىسى بېرىلىدۇ.
ئادەتتە قان ۋە سەۋدادىن بولغان كېسەللەرگە قەي بى-
لەن داۋالاش چارىسى قوللىنىلمايدۇ، ئەزالارنىڭ ئىس-
تىراغى قان ئېلىش ياكى سۈرگە بېرىش بىلەن بول-
غىنى ياخشى.

دورىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇشتا دىققەت قىلىشقا

تېگىشلىك ئىشلار

(1) قۇرۇق مىزاجلىق كىشىلەر قەي قىلدۇرۇشتىن
بىر كۈن بۇرۇن سۇيۇق تاماقلار بىلەن كۆپرەك ئوزۇق-
لاندۇرۇلىدۇ. كۆپرەك سۇ ئىچكۈزىلىدۇ. مونچىغا چۈشۈپ

كەلسە تېخىمۇ ياخشى. ھول مىزاجلىق كىشىلەرگە ئۇنداق قىلىش ھاجەت ئەمەس.

(2) ھاۋا سوغاق بولسا ئىسسىق جايدا قەي قىلدۇرۇش لازىم.

(3) قۇستۇرىدىغان دورىنى ئىچكۈزۈپ بولغاندىن كېيىنلا كېسەل كىشىنىڭ قاۋىغى ئۈستىگە ئاق پاختا ياكى داكىدەك بىر نەرسە قويۇپ تېگىپ قويىلىدۇ. ئەگەر ياردەمچى كىشى كېسەلنىڭ قوساق ۋە بەل قىسمىنى يۇمشاق مۇجۇپ بەرسە تېخىمۇ ياخشى.

(4) قەي قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئېغىز ئىچىنى ئىسسىق سۇ ئارىلاشقان سىركە بىلەن چايقاش لازىم.

(5) قەيدىن كېيىن مىسقال ئۇد ھىندى ياكى مەستكىنى يۇمشاق سوقۇپ شېكەر قوشۇپ ياكى ئالما سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ. ئەگەر بۇ دورىلار بولمىسا گۈلقەن بەرسىمۇ بولىدۇ.

قەي قىلدۇرۇشقا بولمايدىغان ھاللار

(1) بەدىنى بەك ئاجىز كىشىلەرگە دورا بىلەن قۇستۇرۇش چارىسى قوللىنىشقا بولمايدۇ. (2) نەپەس قىيىنلىشىۋاتقان، قان تۈكۈرگەن، قان قۇسقان، بويۇن قىسمىدا ئىششىق، مىڭە كېسىلى، مەئدىسىدە يارىلىق كېسىلى، سەپرا ياكى قاندىن بولغان قۇلاق ۋە كوز ئاغرىغى، كۆكرەك ئەزالىرىدا كۆكرەك پەردىسى ۋە گىر - گىت گۆش پەردىسىدە ياللۇغلىنىش بارلارغا قەي دورىسى بېرىشكە بولمايدۇ.

قەيدىن كېيىن يۇز بېرىدىغان ئەھۋاللارغا چارە كورۇش

(1) قەي قىلىپ بولغاندىن كېيىن بەزىدە ھىق تۇتۇش ئەھۋاللىرى يۇز بېرىدۇ. مۇنداق چاغلاردا قاي-ناقسۇ ئىچكۈزۈش ياكى چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى بۇرۇنغا تارتقۇزۇش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

(2) بېقىنغا سانجىق تۇرۇپ قېلىش ھاللىرىدا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش لازىم.

(3) مەئدە ھەرىكىتى تېزلىشىش بىلەن مەئىدە تۈرلۈك ئاۋازلار پەيدا بولسا مەستەكىنى يۇمشاق سوقۇپ گۈلقەن بىلەن يىيىشكە بېرىلىدۇ. زەھەرلەنگەندە قەيدىن كېيىن يېڭى سۇت بېرىلىدۇ.

قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنىڭ نۇسخىلىرى

(1) سەپرادىن بولغان كېسەللەردە قۇستۇرغۇچى

دورىلار:

پالەك سۈيى 4 سەر، ئارپا سۈيى، ھەمشىۋا سۈيى ھەربىرى 7 مىسقالدىن قەن بىلەن تەييارلانغان ئىسكەندەرجىبىن 1 سەر. بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىلمان قىلىپ ئىچىشكە بېرىلسە قەي قىلىدۇ.

(2) بەلغەمدىن بولغان كېسەللەردە:

تۇرۇپ (لوبۇ) ئۇرۇغى 2 سەر، سېرىق چىچەك

ئۇرۇغى 1 سەر، ئاقترۇز $\frac{1}{2}$ سەر، بۇلارنى سوقۇپ

يېتەرلىك مىقداردىكى ھەسەل سۈيى بىلەن ئىچىدۇ. ئەگەر

قەي يانمىسا ئارقىدىن كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ ئىچ-
كۆزۈلسە قۇسىدۇ.

(3) سەپرا ۋە بەلغەم بېرىكىشى بىلەن بولغان
كېسەللەردە: (+) ھەسەل بىلەن تەييارلانغان سىركەنەجىبىن
1 سەر، ئاق تۆز $\frac{1}{2}$ سەر، تۇرۇپ سۈيى 4 سەر

بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىلمان قىلىپ ئىچىدۇ.
(ب) چۈچۈك بۇيا يىلتىزى، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى

$\frac{1}{2}$ سەردىن، ئارپا سۈيى، ھەمىشۋا ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن،

بۇلارنى بىر چوڭ چىنە سۇ قۇيۇپ بېرىمى قالغىچە قاينىتىپ
بىر سەر مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخىغا قاراڭ) قوشۇپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ياكى سىركە قوشۇپ ئىچىسىمۇ بولىدۇ.

4 - سۈرگە بېرىش

سۈرگە (مۇسھىل) بېرىش تىبابەتتە كۆپ قوللىنىلىدۇ.
دىغان سۇرۇپ چىقىرىش چارىلىرىدىن بىرىدۇر. سۈرگە
بېرىش بىلەن تومۇرلار ئىچىدىكى، ئەزالاردىكى ۋە مەئدە
ئۈچەيلەردىكى ماددىلار (كېسەللىك سەۋەپلىرى) نى چىقىرىش
مەخسەدىگە يېتىلىدۇ. ئادەتتە تەرەتنى يۇمشىتىش
(مۇلەيمىن قىلىش) سۈرۈشنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. ئەمما
قېرى، ئاجىز كىشىلەر، بۇۋاقلار ۋە ئېغىر ئاياق ئاياللارغا
يۇمشاتقۇچى دورىلار (مۇلەيمىنات) بېرىلسە مەلۇم نەتىجە
بېرىشى مۇمكىن. سۈرگە بېرىشتىن بۇرۇن ماددىنى پىشۇرۇش
شەرت. ماددىلارغا قاراپ سۈرگە دورىلىرى تۈرلۈك

تەركىپلەرگە ئىگە بولىدۇ. ئەمما سۇرگە بېرىش جىددى زورۇر بولغان ھاللاردا ماددىنى پىشۇرمىەن دەپ ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈپ قويۇشقىمۇ بولمايدۇ.

سۇرگە بېرىشكە بولمايدىغان ئەھۋاللار

قان ئالدۇرغانلارغا، بەدىنى ئاجىز، ئوزۇقلىنىشى ناچار بولغان كىشىلەرگە، ھامىلدار ۋە ھېيىز مەزگىلىدەكى ئاياللارغا، ئۇچىمى توشۇلغان ۋە ئالماشقانلارغا، كونا ئىچسۈرۈش كېسىلى بارلارغا سۇرگە بېرىشكە بولمايدۇ.

سۇرگە بەرگەندىن كېيىن، دىققەت قىلىشقا

تېگىشلىك ئەمىاللار

(1) بېرىلگەن سۇرگە دورىسى مەيلى پىلاپ تەمى چىقىرىلغان (نۇقۇۋە) ياكى قاينىتىپ تەمى چىقىرىلغان (مەتبۇخ) بولسۇن ئۇستىدىن سۇ ئىچمەسلىك كېرەك. چۈنكى سۇ ئىچىلسە سۇرۇشكە تەسىر قىلىدۇ. ئەگەر سۇرگە ئىچكەندىن كېيىن قوساق تولغاپ ئاغرىپ كەتسە قايناقسۇ بېرىشكە بولىدۇ.

(2) بېرىلگەن سۇيۇق سۇرگە ئۆز كۈچىنى كور-ستەلمىسە بىر قېتىم سۇرگۈچى ھەپ دورىلارنى بېرىش لازىم. ئەگەر بۇنىڭ بىلەنمۇ سۇرمىسە قايتىلاپ سۇرگە دورىسى بەرمەستىن سەۋىيىنى مۇلاھىزە قىلىش ۋە ھوقنە قىلىشنى ئويلاپ كورۇش لازىم.

(3) سۇرگە دورىسى سۇرۇپ بولغاندىن كېيىن

سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ، ئانارشەروۋىتى (47 - نۇسخە) بې -
رىش كېرەك.

(4) تەركىۋىدە ھەببۇلمۇلۇك (ئىنەك پىشتى)،
توربۇت ۋە تۇزلۇق دورىلار كۆپ بولغان (ئاساسى ئۇرۇن -
دا بولغان) سۇرگە دورىلىرىنى بەرگەندە ئۈستىدىن سۇ
بېرىشكە بولىدۇ①.

(5) ئەگەر سۇرگە دورىلار سۇرمەستىن غەيرى
ھاللار - (يۈرەك سېلىش، مەئدە، قوساق كۆپۈش، باش
قېيىش ۋە كۆڭۈل ئايدىش قاتارلىقلار) يۈز بەرسە دەرھال
قەي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇ چاغدا كۆپرەك ئىلمان سۇ
(بىر ئاز تۇز قوشۇپ) ئىچكۈزۈپ گالغا پاكىزە توخۇ
پېيى ياكى بارماقنى تىقىپ ياندۇرۇش كېرەك.

(6) سۇرگە سۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۈچەي،
مەئدىلەردە قىزىش، كۈيۈشتەك ئەھۋاللار يۈز بەرسە،
ئىسپۇغۇل شىلىمىش قىزىش ۋە بىيە ئۇرۇغىنىڭ شىر -
سىنى چىقىرىپ بېرىش كېرەك. بۇنىڭغا بىر ئاز رەيھان
ئۇرۇغى، قەن، گۈلاپ قوشۇپ بەرسەمۇ بولىدۇ.

(7) ئىچى بەك سۇرۇپ كېتىپ توختىتىشقا توغرا
كەلسە، ھارارەت بولمىغان ھاللاردا قېتىق بىلەن زىرىق
ئىچكۈزۈش كېرەك. ئەگەر قىزىتما بولسا، رەيھان ئۇرۇغى،
سېمىز ئوت ئۇرۇغى، قىمۇقۇ ئۇرۇقلىرىنى باراۋەر مىق -

① بۇ يەردە سۇ بېرىش دېگەن سۆز - كۆپ مىقداردا
سۇ بېرىشنى كۆزدە تۇتىدۇ.

داردا ئېلىپ قورۇپ سۇقۇپ تالقان ھالىتىدە بىر ئاز سۇ بىلەن ئىچكۈزۈش لازىم. (باشقا چارىلار ئىچ سۇرۇش كېسەللىكلىرى بابىدا سۆزلىنىدۇ).

(8) سۈرگە دورىلارنى بېرىشتە كېسەلدە ماددىنىڭ غالىپلىق ئەھۋالىغا قاراپ شۇ ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. مەسىلەن، سەپرا غالىپ بولسا، سەپرا سۈرگىسى، بەلغەم غالىپ بولسا بەلغەم سۈرگىسى قاتارلىقلارنى قوللىنىش كېرەك. قان ماددىسى غالىپ بولغان كېسەللەرگە سۈرگە بېرىشتە ئادەتتە سەپرا سۈرگىسى ئاساس قىلىنىدۇ. چۈنكى قاننىڭ ئىستىفراغى قان ئېلىش بىلەن بولىدۇ.

سۈرگە دورىلار

كېسەلگە سۈرگە بېرىشتە ئەڭ ياخشى يالغۇز (يەككە) ھالدىكى سۈرگىلىك تەسىرگە ئىگە دورىلارنى بەرمەسلىك، بەلكى مۇرەككەپ نۇسخىلار بېرىلىشى كېرەك. بۇ خىل نۇسخىلار كېسەللىك بابىدا تەپسىلى سۆزلىنىدۇ. مىسال ئۈچۈن تۆۋەندە بىر قانچىلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:

(1) سەپرا سۈرگىسى ئۈچۈن مەتبۇخى ھەللى (38 - نۇسخە)، ھەببى سەبىرە (4 - نۇسخە) مۇرەككەپ نۇسخىلار - دىن بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.

(2) بەلغەم سۈرگىسى ئۈچۈن - شەھمى ھەنزەل، قەنتەرىون (ياپچان)، ماھى زەھەرەج، غارقۇن، ھەشقى پىچەك ئۇرۇغى، ئادراسمان ئۇرۇغى، بېسىنتىپايەج، سىيادان، قامغاق (شۇكائى) قاتارلىقلار يەككە (مۇفرەد) سۈرگە دورى -

لار ھىساپلىنىدۇ. مۇرەككەپ دورىلار ئۈچۈن، ھەبىي قوقىيا، ھەبىي ئايارەج، ئايارەنجى پەيقارا (7 - 16 - 17 - نۇسخىلار) ياكى توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: توربۇد 3 مىسقال، زەنجىۋىل 1 مىسقال،

مەستىكى، ئاق تۇز جەۋھىرى $\frac{1}{2}$ مىسقال، شېكەر $\frac{1}{2}$ سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلاپ شىشە قاچىلاردا

ساقلىنىدۇ. كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن

سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ بىلەن ئىچىدۇ.

(3) سەۋدا سۇرگىسى ئۈچۈن يەككە دورىلار، كابۇل ھىلىلىسى (سېرىق ھىلىلىنىڭ چوڭراغى)، قارا ھىلىلە، بالەنگو، سېرىق ئوت، ئۆستۈخۇددۇس، سوقمۇنيا، ھەجەرى لاجىۋەرد، ھەجەرى ئەرمىنى، ئاقلىنىغان ئامىلە، سانا قاتارلىقلار.

مۇرەككەپ سەۋدا سۇرگىسى ئۈچۈن ئادەتتە توۋەندىكى

نۇسخىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ:

نۇسخە: ئايارەنج پەيقارا 5 مىسقال، تازىلانغان لاجىۋەرد 7 مىسقال، سوقمۇنيا، خەربەق سىيا 2 مىسقال - دىن، رۇمىدىيان (ئەنسۇن) 1 مىسقال، ئەپتىمۇن 1 سەر، ھەجەرى ئەرمىنى 7 مىسقال، شەھىمى ھەنزەل 2 مىسقال، سۇمبۇلتىپ 1 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ يېتەرلىك مىقداردىكى چىڭسەي

(كەسرەپشى) سۇيى بىلەن خېمىر قىلىپ گۈل يېغى بىلەن كۈمۈلەچ ياساپ سايىدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: كۈنىگە 1 مىسقالدىن 2 مىس- قالغىچە كەچ ۋاقتىدا قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

سۈرگە دورىلارنى تەييارلاشتا دىققەت قىلىشقا

تېگىشلىك بىر قانچە مەسىلىلەر

(1) بىر خىل خىلىت سۈرگىسى بېرىلگەندە ئەگەر ئۇ بىر ئاز كۈچلۈكرەك (مىقدارى كۆپرەك) قىلىپ بېرىلسە مەۋجۇت بولغان باشقا خىلىتىنىمۇ چىقىرىدۇ. مەسىلەن، بەلغەم سۈرگىسى سەپرانىمۇ سۇرۇشى مۇمكىن.

(2) ھەر قانداق بىر سۈرگە كار قىلغاندىن كېيىن ئومۇمى بەدەندە سوۋۇش كەيپىياتىنى پەيدا قىلىدۇ. بىر قانچە قېتىم سۈرگە بېرىشكە توغرا كەلگەندە ئارىلاپ بەدەننى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى تەدبىرلەرنى قوللىنىش لازىم.

(3) يېڭى باشلانغان قىزىتمىلىق كېسەللەرگە بىر ھەپتىگىچە سۈرگە دورىلارغا ھىلىلە قوشۇپ بېرىشكە بولمايدۇ. ئەگەر ھاجەت بولغاندا ھىلىلىنى بادام يېغى بىلەن ياغلاپ ياكى باشقا شىلىمىشقىلىق دورىلارنى (بالەنگو، سەرىپىستاننى) قوشۇپ بېرىش لازىم. ئۇنداق قىلىمىغاندا ھىلىلە جىگەرنى زەھەرلەپ قويۇشى مۇمكىن.

(4) پۇنۇس، خىيار شەنبەر قوشۇلغان سۈرگىلەرگە بادام يېغى، بىنەفشە يېغى قوشمىغاندا بەدەنگە قۇرۇق- لۇق يەتكۈزۈشى، كوڭۇلنى ئاينىتىشى مۇمكىن.

5) غارىقۇنى دورىلار بىلەن قوشۇپ سوققاندا ئۇنىڭ تاش پوستى ئارىلىشىپ قېلىپ زەھەرلىك تەسىر قىلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن غارىقۇنى سىم تور ئەلگەك تىن سۇرۇپ ئۆتكۈزۈلسىلا بولىدۇ، سوقماسلىق كېرەك.

6) ئەپتىمۇنى قايناتقاندا باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ سوقماستىن ئايرىم لاتا خالىغا سېلىپ قاينىتىپ تەمى چىققاندا تىرىپى ئېلىپ تاشلىنىدۇ.

7) مەتبۇخ ۋە نوقۇە (چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچىدىغان دورا تۇرى) ئوز ۋاقتىدا بىر قېتىم ياكى بىر كۈنلۈك تەييارلىنىدۇ.

5. ھوقنە — شامچە

ھوقنە ۋە شامچىلەر سۇرگە دورىسى بېرىش مەنىنى قىلىنغان ھاللاردا ئىچىنى سۇرۇش تەسىرىگە ئىگە بىو-لۇپلا قالماستىن بەلكى ئۇچەي ئارقىلىق دورىلارنى ئو-مۇمى بەدەنگە تەسىر قىلدۇرۇش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ. بولۇپمۇ مەئىدىسى ئاجىز بولغان كىشىلەرگە بولغان مەد-پەئەتى بەكمۇ ياخشى. تىبابەتتە ئىچكى ئەزالار ۋە رەم-لىرىدە ھوقنە ۋە شامچە (شياق) شەكلىدىكى دورىلارنى ئىشلىتىش ئاساسى داۋالاش ئۇسۇلى سۈپىتىدە قوللىنىدۇ. ھوقنەنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى:

1) بەدەندە بولۇپمۇ مەئىدە ۋە ئۇچەيلەردە پەيدا بولغان غەيرى تەبىئى بۇخارات ۋە ئۇفۇنەت ماددىلارنى تۈۋەن چۈشۈرۈپ مىڭىنى ساغلاملاشتۇرىدۇ.

2) ھوقنە ھەرخىل دورىلاردىن تەركىپ تاپقان-
لىقتىن ئىنچىكە ئۇچەي ۋە 12 بارماق ئۇچەي ۋە
مەئىدىلەرگىچە تەسىر قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ھۇقنە كۆپ
ۋە سۈرئەت تېز بولماسلىقى لازىم.

3) ئۇچەي يوللىرىنى سىلىقلاشتۇرۇپ ئۇچەي
خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.

ھوقنە دورىسى — 5 سەرمىقداردا بولۇش بىلەن دورا
تۇرلىرىنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تاللاش، لېكىن
قۇرۇق خۇسۇسىيەتلىك دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك لازىم.
مەئىدە، تال ۋە ئۇچەيلەردە توسالغۇ بولغان ھاللاردا
توۋەندىكى نۇسخە ئىشلىتىلىدۇ.

ئاق لەيلى گۈلى ۋە ئورۇغى، ھەمىشۋا گۈلى، بە-
نەفشە گۈلى، شۈمىشە، زاراڭزا ئورۇغى، سانا 5 مىسقال-
دىن، ياپچان، زىغىر، سوزاپ، ئىسپۇغۇل، بىيە ئورۇغى،
ھەزەر ئەسەندە، مۇقىل، جاۋشىر ھەربىرى 2 مىسقالدىن،
گۈل يىغى 5 مىسقال، كۈنجۈت يىغى 15 مىسقال، ئە-
نەك پىتى يىغى 5 مىسقال، تەرەنجىۋىل 2 سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلار چوڭكىدەك مىقدار-
دىكى سۇغا سېلىپ قايىنىتىلىدۇ، ئۇزاق قايىنىتىش
كېرەك ئەمەس. دورىنىڭ تىرىپلىرىنى سۇزۇپ بولغاندىن
كېيىن ياغلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ئاستىلىق بىلەن ئۇچەيگە
ماڭدۇرۇش (ھەمەل قىلىش) لازىم.

ئىچ قېتىپ قالغانلاردا سېرىق ياغ، ئەنجۈر قېقى،

چىلان سەرپىستاننى يېتەرلىك مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ. ئە-
گەر ئىچى قاتقان كېسەللەرگە سۈرگە ياكى ھوقىنە قە-
لىشقا بولمىسا توۋەندىكى دورىلارنى قوساق سىرتىدىن
چىپىش كېرەك. سېرىق موم، ئىنەك پىتى يېغى، سۇت،
مەھمۇدە (سوقمۇنىيا)، كالا ئوتى، شەھمە ھەنزەل.

تەييارلاش ئۇسۇلى: مومنى ئېرىتىپ، باشقا دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ئۈستىگە سۇت بىلەن كالا
ئوتىنى ئارىلاشتۇرۇپ قوساق ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

شامچە (شېاق)

شامچە شەكلىدە ياسالغان دورا ئاساسەن سۈرگە
دورىلاردىن تەركىپ تاپىدۇ. ۋە ھوقىنە قىلىشقا بولماي-
دىغان (ئۈچەي ئالىمىشىپ قېلىش قاتارلىق) ھالىلاردا
سۈرگە ئوز ئەمىلىنى كورستەلمىگەندە ئارقا يولغا
كىرگۈزۈشكە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇندىن باشقا شامچە ئارقا
يولنىڭ باشقا كېسەللىرى، ئۈچەي توسىلىش ۋە ئايال-
لار جىنسى يولغا بىۋاسىتە تەسىر كورستىشكىمۇ
ئىشلىتىلىدۇ.

شامچىلارنى تولىمۇ كۆپ ئىشلەتمەسلىك كېرەك.
چۈنكى مەقئەتكە كىرىپ قالغان يات جىسىم بولۇپ،
باشقا ئوزگىرىشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شام-
چىلار تەركىبىدىكى دورىلار كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ
بەلگىلىنىدۇ. ئادەتتە كۆپ قوللىنىدىغان نۇسخىلار
تۆۋەندىكىچە:

1- نۇسخە: ئۈچەي يوللىرىدىكى توسالغۇلارنى ئېچىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. گۈلبىنەفشە 2 مىسقال، سانا 5 مىسقال، خىيارشەبنەر شىرىسى 1 سەر، ئاق لەيلى گۈلى 3 مىسقال، ھىند تۈزى 1 مىسقال، قارا شې-كەر 1 سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، شېكەر بىلەن خىيار شەنبەر شىرىسىنى ئېرىتىپ يۇغۇرۇپ، ئۈچ ئىلىك ئۇزۇنلۇقتا شامچە تەييارلاپ سايىدا قۇرۇ-تۇپ ئىشلىتىش چېغىدا گۈل يېغى ياكى سېرىق ماي بىلەن مايلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

2- نۇسخە: كىچىك بالىلار ۋە بەدىنى ئاجىز كە-شلىر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئاق موم 4 مىسقال، ئاش تۈزى، بورە ئەرمىنى 1 مىسقالدىن، ئالدى بىلەن مومنى ئېرىتىپ قالغانلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ ئىلەشتۈ-رۇپ لايىق چوڭلۇقتا شامچە تەييارلىنىدۇ. ئەگەر تېز ياردەم بېرىش زورۇر بولغاندا ئادەتتىكى يۇز سوپۇنلىرىنى قە-رىپ چىلان ئۇرۇغىدەك قىلىپ ئارقا يۈلىدىن ئۈچەيگە كىرگۈزۈلسە تېز ئۇنۇم بېرىدۇ.

6. تەرلىتىش

تەرلەش بىلەن بەدەندىكى ئارتۇقچە ھوللۇك (رۇ-تۇبىتى فۇزۇلى) تېرىدىكى تەر بەز توشۇكىلىرى (مىسام) ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. تىبابەتتە تەرلىتىش چارىسى مونچىغا كىرىش، قىزىق سۇ ئىچىپ چۈمكۈنۈپ

يېتىش ياكى ئادەتتىكى قىزىتما چۈشۈرگۈچى دورىلارنى ئىچكىۈزۈش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. ساق كىشىلەرگە تەرىلىتىش دورىسى بەرمەسلىك كېرەك. ئۇلار ئۈچۈن ئەمگەك ئەڭ ياخشى تەرلەش چارىسىدۇر. كېسەللەرگە تەرلەش ھارارەتنى چۈشۈرگۈچى ۋە بەدىننى يېنىكلەش-تۇرگۈچى تەسىر كۆرسىتىدۇ. يۇقۇرى قىزىتمىلىق ئاغ-رىقلاردا تەرلەش بۇھرانىڭ بەلگىلىرىدىن بىرى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ (بۇھرانغا قاراڭ).

7. بۇرۇن ۋە تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش

تىبابەتتە باش ساھەسىدىكى ئاغرىقلاردا بۇرۇندىن سۇ ئاققۇزۇش بىلەن مىڭدىكى ماددىلارنى چىقىرىش مەقسىدىگە ئېرىشىلىدۇ. ئادەتتە زۇكام ۋە باش ئاغرىقىدەك كېسەللەردە بۇرۇندىن قويۇق شىلىملىق سۇيۇقلۇقلارنىڭ ئېقىشى بىلەن كېسەلنىڭ يېنىكلىشىپ قالغانلىقىنى كۆرىمىز. مىڭگە كېسەللىكلەردە مەسىلەن: تۇتقاق كېسىلىدە بۇرۇنغا دورا تاتقۇزۇپ سۇ ئېقىتىش كېسەلنى ھۇشىغا كەلتۈرۈش ۋە كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يېنىكلەشتۈرۈش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىلدىكى دورىلار ئاساسەن قارىمۇچ، قۇندۇز قەرى، خولىنجان، زەدىچىۋىل بولۇپ، سوقۇپ بۇرۇنغا تارتىدۇ. مىقدارى ۋە تۈرى كېسەل ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

مەئدە، قۇلاق ۋە كۆز، بۇرۇن كېسەللىكلىرىدە ئېغىزدىن (تىل ئاستىدىن) شولگەي ئاققۇزۇش پايدىلىق

تەسىرگە ئىگە. بۇ ئۇسۇل كوپىنچە قىش كۈنلىرى بە-
دەندە ئادەتتە سۇيۇقلۇق كوپ بولغان چاغلاردا قوللى-
نىدۇ. ئاقىرقەرھە، تۇخۇمەك مەۋسى، سىركە، يالپۇز ۋە
قىچىلارنى ئىلەشتۈرۈپ تىل ئاستىدا تۇتۇش ياكى ئېغىز
چايقاش بىلەن بۇ مەقسەتكە يېتىلىدۇ.

8. سۇيىدۇك ھەيدەش

تىبابەتتە سۇيىدۇك ھەيدۇگۈچى دورىلار (مۇدىراتلار)
بىلەن سۇيىدۇك توسىلىشىلا داۋالاپ قالماستىن بەلكى
قانتومۇر، سۇيىدۇك ئەزالىرى ۋە جىگەر ئەتراپىدىكى
غەيرى تەبىئى خىلىتلار — كېسەل سەۋەپچىلىرىنى چىقىرىپ
تاشلاش ئۈچۈنمۇ قوللىنىلىدۇ. سۇيىدۇك ھەيدەشتە تو-
ۋەندىكى بىر قانچە ئىشلارغا دىققەت قىلىش لازىم:

(1) قويۇق خىلىتلار سەۋىبىدىن بولغان كېسەل-
لەردە ئالدى بىلەن سۈرگە بەرمەي تۇرۇپ سۇيىدۇك
ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. چۈنكى سۇي-
دۇك ھەيدەش بىلەن بەدەندە سۇيۇقلۇق مىقدارى ئازد-
ىپ كېتىپ ماددا تېخىمۇ قويۇقلىشىپ كېتىدۇ ۋە
ھەيدىگۈچى چىقىرىش قىيىنلىشىدۇ.

(2) قان ئېلىش، قەي قىلدۇرۇش ۋە سۈرگە بې-
رىش بىلەن داۋالاشقا توغرا كەلگەنلەردە سۇيىدۇك ھەي-
دەش چارىسىنى كېيىنگە قالدۇرۇش كېرەك.

(3) جىگەر ياللۇغلىرىدا — ياللۇغلىنىش جىگەرنىڭ
ئاستىنقى قىرىدا بولسا (جىگەر كېسىملى بابىغا قاراڭ)

ئالدى بىلەن سۈرگە بېرىش ۋە ئاندىن كېيىن سۇيدۇك ھەيدەش تەدبىرىنى قوللىنىش كېرەك. ئەگەر ۋەرەم يوق قۇرقى يېرىم ئايىسىمان قىسمىدا بولسا، ئالدى بىلەن سۇيدۇك ھەيدەش لازىم.

(4) سۇيدۇك كۆپ مېڭىپ كەتكەندە تەرلەش ۋە ئارقا تەرەت توختاپ قېلىشى مۇمكىن. شۇڭا ئارقا تەرەت كۆپلىگى ۋە تەرلەش ئاساسى ئورۇندا تۇرىدىغان كېسەللەرگە سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى ئوبدان ئويلاپ ئىشلىتىش لازىم.

(5) بەدەندە قۇرۇقلۇق ئالامەتلىرى بار ياكى ماددىسى تېخى خام كېسەللەرگە سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىشكە ئالدىرىماسلىق لازىم. چۈنكى ماددىنىڭ پىششىق ئۇچۇن بەدەندىكى سۇيۇقلۇق ئۆتتۈرۈپچە مىقداردا بولىشى كېرەك. چۈنكى كۆپ سۇيدۇك چىقىرىش بىلەن بەدەندە قۇرۇقلۇق كۈچىيىپ كېتىپ ماددىنىڭ پىششىقلىقى ئارقىغا سوزۇپ كېسەلنى ئۇزۇنغا سوزۇپ قويۇشى مۇمكىن.

(6) سۇلۇق ئىششىق، پالەچ ۋە مۇپاسىللەر (بوغۇم ئاغرىقلىرى) دە سۇيدۇك ھەيدەش ئۇسۇلى ئاساسى ئورۇنغا قويۇلىدۇ.

سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار:

سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار ئىسسىق (سوغاقتىن بولغان ئاغرىقلار ئۈچۈن) سوغاق (ئىسسىقتىن بولغان كېسەللەر ئۈچۈن) كەيپىياتتىكى سۇيدۇك ھەيدىگۈچى

دورلار ۋە موتىدىل كەيپىياتتىكى سۇيدۇك ھەيدىگۈچىلەر دەپ 3 تۈرگە ئايرىلىدۇ. بۇلار تۆۋەندىكىچە:

(1) ئىسسىق كەيپىياتتىكى دورىلار:

چىڭگەي ئۇرۇغى، كاۋاۋىچىن، ئارپا بېدىيان، جۇۋىنا، رۇمبېدىيان، سۇزاپ ئۇرۇغى، زۇفا، زەدەك (سەۋزە) ئۇرۇغى قاتارلىقلار مۇۋاپىق مىقداردا (كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ) ئېلىنىپ سوقۇپ قاينىتىپ تەمى چىققان سۇ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(2) سوغاقلىق كەيپىياتتىكى دورىلار:

كاسىن ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، ئەگرى ۋە تۈز خاڭگا ئۇرۇغى، ئوغرى تىكەن، ئىسكەنجىۋىن، كاكا-نەج، قاپاق سۈيى، تاۋۇز سۈيى.

(3) موتىدىل كەيپىياتتىكى دورىلار:

ئوپكە، جىگەر، بىرەك كېسەللىكلىرىدە پىرسىياۋ-شان بىلەن قوغۇن ئۇرۇغى بېرىلىدۇ، ئەگەر جىگەر مىس-زاجى بۇزۇلغان بولسا، ئارپا بېدىيان بىلەن كاسىن ئۇرۇغى بېرىلىدۇ. ئۇفۇنەتلىك (مىكروپىلۇق) كېسەللەردە ۋە يەللىك ئاغرىقلاردا سېمىز ئوت ئۇرۇغىغا چىڭگەي ئۇرۇغى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان موتىدىل سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار نۇسخىسىدىن تۆۋەندە بىر مىسال كۆرسىتىمىز:

نۇسخە: بېدىيان، رۇمبېدىيان ھەر بىرى 2 مىس-قالدىن، قوغۇن ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئارپا بېدىيان بىلەن رۇمبېددە-
 ياننى چالا سوقۇپ بىر پىيالىە سۇدا قاينىتىپ سۇزۇلىدۇ.
 قوغۇن ئۇرۇغى بىلەن تۇز ۋە ئەگرى خاڭگا مېغىزنى
 چېقىپ يانچىپ بېدىيان سۈيى بىلەن ئىلەشتۈرۈپ 7
 مىسقال قەن ياكى شېكەر قوشۇپ 2 گە بولۇپ بىر كۈن-
 دە ئىچىدۇ.

2 - پەسىل: ماددىلارنى پىشۇرۇش (مۇنزىج) چارىلىرى

كېسەلگە سەۋەپچى بولغان ماددىلار (نەزجىلەر) نىڭ
 بەدەندىن ئاسانلىقچە تولۇق چېقىپ كېتىشى ئۇچۇن،
 بەدەننىڭ ماددىلارنى پىشۇرۇشىغا دورىلار بىلەن ياردەم
 بېرىش ئۇسۇلىنى مۇنزىج چارىسى دەپ ئاتىلىدۇ.
 بۇنىڭ ئۇچۇن تىبابەتتە ھەر بىر ماددىنىڭ ئالا-
 ھىدىلىگى ۋە شۇ ۋاقىتتىكى (مۇنزىج دورىلارنى بېرىش
 ۋاقتىدىكى) ھالىتىگە قاراپ پىشۇرغۇچى دورىلار (مۇن-
 زىجاتلار) بېرىلىدۇ. مەسىلەن، بىردىن ئارتۇق ماددىلار-
 نىڭ زىيادىلىگىدىن بولغان مۇرەككەپ ئەھۋاللار بولسا،
 بېرىلىدىغان پىشۇرغۇچى دورىلارمۇ مۇرەككەپ بولۇشى،
 ماددا قويۇق (غەلىز) بولسا سۇيۇقلاشتۇرغۇچى ۋە سۇيۇق
 بولسا ئېتىداللاشتۇرغۇچى تەركىپلىك بولۇشى لازىم. بۇن-
 داق بولغاندىلا ماددىلارنى ئوڭاي پىشۇرغىلى بولىدۇ.
 ۋە باشقا غەيرى ئۆزگىرىشلەر يۈز بەرمەيدۇ. مەسىلەن،

قويۇق بەلغەم بىلەن سەۋدا ماددىسىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن سۇيۇلدۇرغۇچى دورىلارنى، سۇيۇق ماددىلارنى قويۇلدۇر - غۇچى دورىلار ئاساس قىلىش لازىم. قاننىڭ غەيرى تەبىئى ھالەتلىرىنى پىشۇرۇش ھاجەت ئەمەس. بەلكى قانغا ئارىلاشقان باشقا ماددىلارنىڭ ئالامەتلىرىگە قاراپ شۇلار ئۈچۈن پىشۇرغۇچى دورىلار بېرىپ بولغاندىن كېيىن قان ئېلىش لازىم. شۇنداق قىلغاندىلا قانغا ئا- رىلاشقان ماددا چىقىپ كېتىدۇ. بولۇپمۇ سەۋدا قانغا ئارىلىشىپ قالغان ھالەتلەردە بولسا ئالدى بىلەن سەۋ- دانى سۈرگۈچى دورا بەرمەي تۇرۇپ قان ئېلىنسا داۋا- لاشنى خاتالاشتۇرۇپ قويىدۇ. بۇ نۇقتىغا تەۋپ ياخشى دىققەت قىلىش لازىم. تەۋەندە ماددىلار ئۈچۈن پىشۇر- غۇچى بولغان دورا نۇسخىلىرىدىن مىساللار كۆرسىتىلىدۇ. (تەپسىلاتى كېسەللەر بايانىدا سۆزلىنىدۇ).

1) سەپرا ماددىسى ئۈچۈن بېرىلىدىغان پىشۇر - غۇچى (مۇنزىج) دورىلار:

نۇسخە: گۈلبىنەفشە، نىلۇفەر، شاتەرە، چالا سو - قۇلغان كاسىن يىلتىزى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، چە - لان 7 دانە، چالا سوقۇلغان كاسىن ئورۇغى 3 مىس - قال، تەرەنجىۋىل 1 سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى 16 سەر قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ 8 سائەتتىن كېيىن ماتادىن ئۆتكۈزۈپ تازا سىقىپ تەمىنى چىقىرىلىدۇ. بۇنىڭغا تەرەنجىۋىلنى سېلىپ

سۇس ئوت بىلەن بىرلا قاينىتىپ قايتا سۇزۇپ تەييار-
لىنىدۇ، 2 سەردىن كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ،
بۇ نۇسخە قىزىتمىلىق سەپراۋى ئاغرىقلاردا ئۈنۈمى
ياخشى. ئەگەر يالغۇز سەپرا ماددىسىلا بولسا بۇ نۇسخە-
خىدىكى دورىلار 3 كۈندىن 5 كۈنگىچە بېرىلسە ماددا
پىشقانلىق ئالامەتلىرى كورۇلىدۇ.

(2) بەلغەم ماددىسى ئۈچۈن بېرىلىدىغان پىشۇر-
غۇچى دورىلار.

(1) نۇسخە: ئۇرۇغى ئېلىنغان قۇرۇق ئۇزۇم $\frac{1}{2}$

سەر. بېدىيان، قامغاقلار (چالا سوقۇپ) ھەر بىرى 2 مىسقال-
دىن. پىرسياۋشان 4 مىسقال. پىشقان ئەنجۈر قېقى 5 دانە.
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلار 2 چوڭ چىنە مىق-
دارىدا قايناقسۇغا 8 سائەت چىلاپ قويۇلغاندىن كېيىن
1 ئاز قاينىتىپ ماتادىن ئوتكۈزۈپ، تازا سىقىپ
سۇزۇپ سۈيىگە 1 سەر ھەسەل بىلەن تەييارلانغان
گۈلەن ئېلىشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
بىر سەردىن ئىچىدۇ. ئەگەر بۇ نۇسخىغا 7 مىسقال
سىركە قوشۇلسا تەسسىرى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئەمما
كېسەلدە يۈتەل بولسا، سىركە قوشماسلىق كېرەك. سىركە
يۈتەلنى كۈچلەندۈرۈپ قويىدۇ.

(2) بەلغەم شور (تۈزلۈك) بولسا دورىلار تەركىبىگە
سەپرانىڭ پىشۇرغۇچىلىرىنى قوشۇش كېرەك.

(3) خاس نوقۇت سۈيى (قاينىتىپ تەمى چىقىرىلغان سۈيى) ئىچىشكە بېرىلسە بەلغەم ۋە سەۋدا ئۇچۇن پىشۇرغۇچى بولىدۇ. ئەمما كېسەلدە قىزىتما بولسا بېرىشكە بولمايدۇ. بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرۇپ چىقىرىش ۋاقتى ئۇنىڭ تۈرىگە ۋە بېرىلگەن دورىلارغا قاراپ 5-15 كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ.

(3) سەرىپىستان 20 دانە، چىلان 10 دانە، گازىۋان، بادىرەنجى بۇيا، ئوستۇخوددۇس، پىرسىياۋشان، بېدىيان، شاتەرە ھەر بىرى 6 مىسقالدىن، چۇچۇكبۇيا يىلتىزى 3 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: سەرىپىستان چالا سۇقۇلىدۇ. چۇچۇكبۇيا يىلتىزىنىڭ تاشقى پوستىنى سۇيۇپ پارچىلاپ ھەممە دورىلارنىڭ ۋەزىنىدىن 5 ھەسسە ئارتۇق قايناق-سۇغا 8 سائەت چىلاپ يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ ماتا-دىن ئۆتكۈزۈپ سىقىپ سۇزىلىدۇ. قەلەيلەنگەن مىس قازانغا ئالدى بىلەن 1 دانە تۇخۇم ئېقىنى تاشلاپ تازا قوچۇپ ئۈستىگە سۇزۇلگەن دورىنى قۇيۇپ 5 سەرتەرەنجىۋىل، 10 سەرقەن قوشۇپ يۇمشاق ئوت بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. بىرىنچى قېتىم قايناش ئالدىدا يۇزىگە چىققان كوپۇكلەرنى ئېلىپ تاشلاپ ئوبدان قىيام بولغاندا ئېلىپ قۇرۇق قاچىلاردا ساقلاپ، قىيام قويۇق بولسا 1 سەرگە 1 سەرقايناقسۇ قوشۇپ قىزىتىپ كۈنىگە 3 ۋاق ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر قىيام سۇيۇق

بولسا سۇ قوشماستىن بېرىلىدۇ. ئەگەر باشقا ماددىلار ئارىلاشقاندا شۇلارنىڭ دورىلىرىنى قوشۇش كېرەك. خاس سەپرانىڭ مۇنزىجلىق ۋاقتى 3 كۈن ھىساپلىنىدۇ.

مۇنزىجلىرىنى بېرىشتە شۇنىڭغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەككى: ئالدى بىلەن كېسەلنىڭ ماددىدىن بولمىغان (سازەج) ياكى ماددىدىن بولغان ئىكەنلىگىنى ئوبدان ئايرىش كېرەك. ئۇنداق قىلمىغاندا، ماددى كېسەللەر سازەج دەپ تونۇلۇپ، مۇنزىج بېرىلمەي قېلىپ ماددا كۈچىپ كېتىپ كېسەل ئەھۋالى ئېغىرلىشىپلا قالماستىن، بەلكى كېيىنكى داۋالاشقا زور تەسىر بېرىدۇ. ئەكسىچە سازەج كېسەللەر ماددى دەپ تونۇلۇپ قېلىپ مۇنزىج تەدبىر - لىرى قوللىنىلسا ئاغرىقنىڭ بەدەن قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاش - تۇرۇپ قويدۇ. تەبىئىكى بۇ ئەھۋال مۇ كېسەلنى ئېغىر - لاشتۇرىدۇ. ئۇندىن باشقا يۇقۇرقى ماقالىلاردا كورسىتىپ ئوتۇلگەندەك پىشۇرغۇچى دورىلار مۇ ئاغرىقلارنىڭ تەن قۇۋۋىتى، يېشى، تۇرمۇش ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق مىقدار ۋە لايىق تەركىپلەردە بېرىلىشى كېرەك. تىبابەتتىكى داۋالاش ئۇسۇلى - كېسەلنى تونۇپ چىقىش (تەشخىس) ماددىنى (مۇنزىج) پىشۇرۇش، ھەيدەپ چىقىرىش (ئىستىفراغ) تەدبىرلىرىنى قوللىنىشتىن ئىبارەت بولۇپ، مۇشۇ تەرتىپ بويىچە چارە كورۇشنى تەۋىپ ياخشى ئىگەللىشى كېرەك.

3 - پەسىل: دورا ئىچكۈزۈش

1. تىبابەتتە ئېغىز ئارقىلىق بېرىلىدىغان دورى

لارنىڭ تۇرلىرى ①

تىبابەتتە ئېغىزدىن بېرىلىدىغان دورا تۇرلىرى — كېسەلنىڭ قوبۇل قىلىشىغا ئوڭاي بولىشى ۋە دورىلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ھەرخىل شەكىللەر بىلەن تەييارلىنىشى لازىم. تەييارلاشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن دورىلارنىڭ يېڭى - كۈنىلىشى ۋە ئىشلىتىشكە بولۇش - بولماسلىق قاتارلىق ئۆلچەملەر ئاساسىدا تەكشۈرۈلىدۇ (بۇلار دورىگەرلىك ئەسەرلەردە تەپسىلى سۆزلىنىدۇ). ئۇندىن كېيىن دورىلاردىكى توپا - چاڭ قاتارلىق يات ماددىلار تازىلىنىپ نۇسخىدا كۆرسىتىلگەن ئۆلچەم بويىچە ئۆلچەپ ئېلىپ بەلگىلەنگەن دورا تۈرى تەييارلىنىدۇ. تۆۋەندە دورا تۈرلىرىنىڭ ئادەتتە كۆپ قوللىنىلىدىغانلىرىدىن بىر قانچىسىنى تونۇشتۇرىمىز.

1) مەئجۇنات (مەجۇنلەر):

ئۇيغۇر تىبابىتىدە ئەڭ كۆپ قوللىنىلىدىغان دورا تۈرى بولۇپ ئاساسىي تەسىر قىلغۇچى دورا ئىسمى بىلەن ئاتىلىدىغان قويۇق ھالەتتىكى مۇرەككەپ بىرىكمە دورا تۈرىدىن ئىبارەت. مەسىلەن، مەجۇنى كومۇنى (زىرە ① دورىلار ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات دورىگەرلىككە ئائىد ئەسەرلەردە يېزىلغان. بۇ باپتا دورا تۈرلىرى ئۈستىدىلا سۆزلىنىدۇ.

مەجۇنى) دە ئاساسىي تەسىر قىلغۇچى دورا زىرە، مەجۇنى پودىنە (پىننە مەجۇنى) دە ئاساسىي تەسىر قىلغۇچى دورىسى پىننە بولىدۇ.

مەجۇناتلارنى تەييارلاش: مەجۇناتلارنى تەييارلاشتا تەركىبىدىكى دورىلار ئومۇمەن توۋەندىكىچە بىر قانچە باسقۇچتىن ئۆتۈشى كېرەك.

(1) سوقۇش - ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈش: ئادەتتە مەجۇننىڭ تەركىبىدىكى دورىلارنىڭ ھەممىسى سوقۇلىدۇ. ۋە ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئەمما ئالدى بىلەن قاتتىق لىرىنى سوقۇش ئاندىن كېيىن ئاسانراق يۇمشايدىغانلىرىنى سوقۇش كېرەك. ھەر خىل دورىنى ئالاھىدە سو-قۇش ياخشىراق. مېغىز دورىلار ئايرىم يانچىلىپ قىيام-غا ئېلەشتۈرۈلىدۇ. مەستىكىگە ئوخشاش يىلىم دورىلار بولسا ئايرىم - ئايرىم سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئاخىرىدا ئومۇمى تالقاغا بىرلەشتۈرىلىدۇ. تاش (مەدەن) جىنىسلىق دورىلار مەخسۇس ئۇسۇللار بويىچە كويدۇرۇلىدۇ ۋە كۈشتە ① قىلىنىدۇ. مەسىلەن ياقۇت، ھېقىق زۇمرەت، قاش تېشى، سىماپ، سەنگىيا قاتارلىقلار ۋە دېڭىز ئاستى مەھسۇلاتلىرىدىن مەرۋايىت، سەدەپ، مار-جانلار كۈشتە قىلىنىدۇ ياكى كويدۇرۇلىدۇ.

(2) يەنجىش (سالايە): ئىپار، ئەنبەر، كۈشتە، ياكى كويدۇرۇلگەن دورىلارنىڭ ھەممىسىنى ئايرىم - ئايرىم -

① قوشۇمچە كۈشتە قىلىش "ئۇسۇللىرىغا قاراڭ.

دىن توزاڭدەك (قولغا يۇقۇپ يېرىكلىك سىزلىمىگەندەك
ھالدا) يانچىلىدۇ. بۇ سالاھىيە دەپ ئاتىلىدۇ.

(3) يۇغۇرۇش: مەجۇناتلار ئاساسەن موھسىز (تازى-
لانغان) ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇلىدۇ. ئەھۋالغا قاراپ
قەن ياكى شېكەر قىيامى ۋە ھەسەل بىلەن يۇغۇرسىمۇ
بولىدۇ. (مەسىلەن ئىتىرىپىللەرنى) ھەسەلنىڭ مىقدارى
ياز كۈنلىرى تەييارلانغان مەجۇناتلار ئومۇمى دورا
مىقدارى (سوقۇپ تالقانلانغان ھالدىكى ئېغىرلىقى)دىن
2 ھەسسە، قىش كۈنلىرى بولسا 3 ھەسسە ئارتۇق بو-
لىشى كېرەك. ئالدى بىلەن ھەسەل بىۋاستە ئوتتا قوي-
ماستىن بەلكى قايناپ تۇرغان سۇ ئۈستىگە ھاسەلنى
قاچا بىلەن قويۇپ ئېرىتىلىدۇ. ئەگەر شېكەر قىيامى قو-
شۇشقا توغرا كەلسە ھەسەل ئۈستىگە قىزىق قىيامنى
قۇيسىلا بولىدۇ. ھەسەلنى بىۋاستە ئوت ئۈستىگە قوي-
غاندا ھەسەلنىڭ شىپالىق تەسىرى بۇزۇلۇپ كېتىدۇ.
ھەسەل سوۋۇپ ئىلىمان بولغاندا، ئەگەر شۇ مەجۇن
تەركىبىدە زەپەر، ئىپار، ئەنبەر بولسا ئالدى بىلەن
ئۇلارنى سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن
باشقا دورىلار قوشۇلىدۇ. سىرلانغان كوزا ياكى چىنە
قاچىلاردا يېرىمراق ئېلىپ ساقلىنىدۇ (چۈنكى مەجۇنات-
لار تەييارلاپ بولغاندىن كېيىن خېمىرغا ئوخشاش كو-
پۇپ كېتىدۇ). مەدەن جىنىسلىق ۋە تاش جىنىسلىق
دورىلار سېلىنغان مەجۇناتلار 6 - 3 ئايدىن كېيىن ئىس-

تىمال قىلىنىدۇ. باشقا خىل مەجۇنلەر، بولۇپمۇ مېغىز دورىلار كوپرەك سېلىنغان مەجۇناتلارنى 3 - 6 ئاي ئىچىدىلا ئىشلىتىپ بولۇش كېرەك. مەجۇن ئادەتتە بىر كىشىنى بىر قارار داۋالاشقا يېتەرلىك مىقداردىلا تەييارلىنىدۇ. لېكىن داۋالاش ئورۇنلىرى چوڭ بولسا مەلۇم نىسبەت بويىچە كوپلەپ تەييارلاشمۇ مۇمكىن.

(2) ھەپ - كۇملاچ دورىلار: تېز تەسىرلىك ھەپ لەر ماش چوڭلۇغىدا، ئادەتتىكىلىرى پۇرچاق چوڭلۇغىدا ياسىلىشى كېرەك. ياساس چېغىدا نۇسخىدا كورسەتىلگەن دورىلارنى سوقۇپ تالقانلاپ ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇپ، سۇ بىلەن قاتتىقراق يۇغۇرۇپ گۈل يېغى ياكى كۈنجۈت يېغى بىلەن قولىنى مايلاپ تۇرۇپ يومۇلاقلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ. ھەپلەر نۇسخىدا ئادەتتە تاق ساندا (1 - 3 - 5 - 7) يېزىلىدۇ.

(3) قۇرس (تابىلىت دورىلار): چوڭراق تۈگمە شەكىللىك دورا ياسالمىسى بولۇپ، تەييارلاش ئۇسۇلى ھەپ بىلەن ئوخشاش. يىلىم دورىلار ئېرىتمىسى بىلەن يۇغۇرۇپ تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

(4) تالقان (سۇيۇپ): يۇمشاق سوقۇلغان تالقان دورا. نۇسخىدىكى تەركىبىگە قاراپ ئومۇمى دورا ئېغىرلىغىغا نىسبەتەن 2 ھەسسە مىقداردا قەن ياكى ناۋات قوشۇلىدۇ.

(5) شەرۋەت: قەن بىلەن قىيام قىلىنغان سۇيۇق

دورا. تەركىۋىدىكى دورىلارنىڭ تاتقىنى ئەرەق تارتىش، چىلاش ۋە قاينىتىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن چىقىرىپ 5-7 باراۋەر قەن ياكى ناۋات قوشۇپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. دورىلار تەركىۋىگە ۋە قىيامنىڭ قويۇق-سۇيۇقلۇغىغا قاراپ قايناقسۇ بىلەن تەڭشەپ (3 ھەسسە قايناقسۇ قوشۇپ) ئىچىشكە بېرىلىدۇ. قۇرۇق قاچىلاردا ئاغزى مەھكەم ساقلانمىسا بۇزۇلىدۇ. ئەگەر پاختىلاشقانلىغى مەلۇم بولسا بىر ئاز قەن قوشۇپ قايتا قاينىتىلسا بولىدۇ. شەرۋەت سۇزۇك تەييارلىنىشى ئۈچۈن 1 دانە تۇخۇم ئېقى قوشۇلىدۇ. دەسلەپ يۈزىگە ئورلەپ چىققان كوپىگى سۇزۇپ تاشلىنىدۇ.

(6) قايناتما (مەتبۇخ): قاينىتىپ تەمى چىقىرىلغان دورا تۇرى. قايناتىملار تەركىۋىدىكى يىلتىز دورىلار چالا سوقۇلىدۇ. ئۇرۇق ۋە مېغىز دورىلار يۇمشاق سوقۇلىدۇ. مېۋە تۇرىدىكىلىرى (ئەينۇلا، قارا ئورۇك، ئەنجۇر قاتارلىقلار) بىر قانچىغا پارچىلاپ تاشلانسا بولىدۇ. دورىلار پۈتۈن ئېغىرلىغىنىڭ 5-7 باراۋىرىدە قايناقسۇغا 6-8 سائەت چىلاپ (ئۇستى يېپىق ھالدا) قاينىتىپ

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ قىسمى قالغاندا ماتا بىلەن سۇزۇپ سىقىپ تەييارلىنىدۇ.

ئادەتتە قايناتىملار بىر قېتىملىق ياكى بىر كۈنلۈك تەييارلىنىدۇ.

(7) چىلانما (نۇقۇ): قايناقسۇغا چىلاپ تەمى چىقىرىلىدۇ.

قىرىلغان دورا تۇرى. قاينىتىشقا بولمايدىغان ياكى سوغاق دورىلارنى مەسىلەن، خىيارشەمبەر، تەمىرى ھىندى قاتار-لىقلارنى يېتەرلىك مىقداردا (دورا چوڭكىدەك قايناقسۇغا چىلاپ ئۇستىنى يېپىپ) 4 سائەتتىن كېيىن، پاكىزە قوشۇق بىلەن مىجىپ تەمىنى تولۇق چىقىرىپ مائا ئارقىلىق سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ. ئادەتتە بىر قېتىملىق مىقداردا تەييارلىنىدۇ.

(8) ئەرەق: پار سۈيى شەكلىدە تەييارلانغان دورا تۇرى. بۇلارنىڭ ئوزۇنى يالغۇز ھالدا ياكى باشقا دورا تۇرلىرى بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەك، مىڭە ۋە جىگەرگە تەسىر قىلغۇچى ۋە پۇراقلىق دورىلار ئۇسخىلاردا كۆرسىتىلگەن مىقداردىكى سۇ بىلەن پار قازانغا سېلىنىپ، بەلگىلىك مىقداردا چىقىرىلىدۇ. بەزى كىتاپلاردا ئەرەقنى گۈلاپ دىگەن ئاتالغۇ بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. ئەمما بىزنىڭ بۇ كىتاپىمىزدىكى گۈلاپ دىگەن ئاتالغۇ قىزىل گۈلنىڭ ئەرەقىدىن ئىبارەتتۇر.

ئەرەقلەرنى تەييارلاشتا ئەرەق تارتىلىدىغان دورىنىڭ گۈللەش، چېچەكلەش پەسلى ئەڭ ياخشى ۋاقىت ھېسابلىنىدۇ. مەسىلەن، بىدەمىشكى ئەرەقى، كاسىن ئەرەقى، قىزىل گۈل ئەرەقى ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە تەييارلاپ ساقلىنىدۇ. يېڭى، ياش، غولى بولمىغاندا قۇرۇق گۈللىرىنى 6 - 8 سائەت قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ ئەرەق تارتىلىپ سىمۇ بولىدۇ.

9) مۇراببا ۋە گۈلقەنلەر: قەن قىيامى بىلەن تەييارلانغان دورا تۇرى: مۇراببالار دورىلارنىڭ ئورتا ھالدا پىشقان ياكى ياخشى پىشقان پەسىللىرىدە تەييارلىنىدۇ. قۇرۇق دورىلاردىن تەييارلانغان مۇراببانىڭ داۋالىق ئۇنۇمى تۈۋەن بولىدۇ. ساقلاش ۋاقتى ئۇزۇنراق بولىدىغان مۇراببالار (ھىلىلە مۇرابباسى، زەنجىۋىل مۇرابباسى) نىڭ قىيامىنى ناھايىتى ئۇستۇن ئېلىپ قاتۇرۇلىدۇ. ئۇزۇن ساقلىمايدىغانلىرىنىڭ قىيامى ھەسەلدە قىلىنىدۇ. مەسىلەن، ئەينۇلا، ئەنجۈر ۋە مۇراببالار. مۇراببالار قۇرۇق قاچىلارغا ئېلىپ سوغاق جايدا ساقلىنىدۇ. ئالغاندا قۇرۇق قوشۇقلار بىلەن ئېلىنىدۇ، ئۇنداق قىلىنغاندا ئاساسلا بۇزۇلۇپ كېتىدۇ. ئەگەر كۆكرىپ قېلىش ۋە غەيرى پۇراق ۋە تەم پەيدا قىلسا بىر ئاز قەن بىلەن قايتا قىيام قىلىنىدۇ.

گۈلقەنلەرمۇ دورا گۈل چىچەكلىرى ئېچىلغاندا تەييارلىنىدۇ. گۈل ياپراقلىرىنى تازىلاپ، ئاق قىسمىنى كېسىپ تاشلاپ يانچىپ 4 سەر يانچىلغان گۈلگە 1 جىڭ شېكەر ھىساپلاپ قىيام قىلىپ ياكى شۇنداقلا سوقۇلغان قەن ياكى شېكەرنى ئېلەشتۈرۈپ تەييارلىنىدۇ. سىرلانغان ساپال كوزا ياكى چىنە كورىلارغا ئېلىپ تۇمۇز ئاپتۇندا ئەڭ ئاز بولغاندا 2 ئاي مىقدارى قويۇپ پىشۇرىلىدۇ. قىزىلگۈل گۈلقېنى ھەسەل بىلەنمۇ تەييارلىنىدۇ. بۇ ھەسەلى گۈلقەن دەپ ئاتىلىدۇ. باش-

قا گۈلچەنلەر (پىننە، بىنەپشە ۋە ئانار گۈلى گۈلچەنلىرى) قەن بىلەنلا قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. شېكەرنى قىيام قىلماي ئارىلاشتۇرۇپ ياسىغان گۈلچەنلەر ئاپتايى گۈلچەن دەپ ئاتىلىپ، داۋالاش ئۇنۇمى جەھەتتىن قىيام قىلىپ تەييارلىغان (ئاتەشى گۈلچەن) لەردىن ئۇستۇن تۇرىدۇ. گۈلچەن تەييارلاشتا توۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىلارغا دىققەت قىلىنمىسا دورا ئاسانلا بۇزۇلۇپ كېتىدۇ ۋە داۋالاش ئۇنۇمىگە تەسىر يېتىدۇ. گۈلچەن تۇرىدىكى دورىلار تىبابەتتە كۆپ قوللىنىلىدىغان ھەم داۋا ھەم غىزالىق تەسىرگە ئىگە دورا تۈرلىرىدىن ئىبارەتتۇر:

(1) قىزىلگۈلنىڭ غوزىسىغا تىگىپ تۇرغان سېرىق قىسمى قىرىقپ تاشلىنىشى ھەم گۈل ئۇتتۇرىسىدىكى ئۇ-رۇغىدەك سېرىق نەرسىلەر قوشۇلۇپ قالماستىن كېرەك. (2) ئانار گۈلىنى تەرگەندە قول بىلەن ئالماستىن، ياغاچ تىكەنلەرگە سانجىپ يىغىۋېلىش كېرەك (يەرگە توكۇلگەنلىرىنى).

(3) گۈلچەنلەر ئاپتاپتا تۇرغاندا بىرىنچى قېتىم بىر ھەپتىدىن كېيىن، كېيىنچە 2 - 3 كۈندە بىر قېتىم ياغاچ قوشۇق بىلەن ئاستىن-ئۇستۇن ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇش لازىم. ئەمما تومۇر نەرسىلەر بىلەن قوچۇشقا بولمايدۇ (سىرلانغان مەدەن تاياقچە بولسا بولىدۇ) گۈل-قەننى بۇزۇپ قويىدۇ. ساقلىغاندىمۇ تومۇر قاچىلارغا ئالماستىق لازىم.

(4) تەييار بولغان گۈلچەنلەر ئۆز رەڭگىدە بولسا

بۇ تەلەپكە لايىق تەييار بولغانلىغىدۇر. مەسىلەن قىزىلگۈل گۈلچىسى سۈزۈك قىزىل رەڭدە، بىنەپشە گۈلچىسى مايسا رەڭدە بولىدۇ.

10) دەملەنمە (كاشكاپ): ئاز مىقداردىكى بىر قېتىملىق دورىنى چەينەككە نەرسىلەردە دەملەپ بىر ئاز قەن، شېكەر بىلەن تەم كىرگۈزۈپ بېرىلىدىغان دورا تۇرى. يۇقۇرقلاردىن باشقا، يەنە ئۇيغۇر تىبابىتىدە ھەرخىل مەدەنلەر مەخسۇس ئۇسۇللار بىلەن كۈشتە قىلىنىپ دو-رىغا ئىشلىتىلىدۇ (قوشۇمچە كۈشتىلەر ماۋزۇسىغا قاراڭ). ھايۋانلار (ئىشت، كالا ۋە ئىشەك) نىڭ ئوت خالىتىسى ئۈچەي ۋە مەئىدىسى قاتارلىقلارنىڭ ئىچكى ئەزالىرىدا پەيدا بولىدىغان تاشقا ئوخشاش بىرخىل ماددا يەنى فادزەھەر ھايۋان-يىلارنى تېز قۇتقۇزىدىغان ۋە زەھەر قايتۇرىدىغان دورا سۈپىتىدە قوللىنىدۇ.

2. باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرى

تىبابەتتە ماددىنى پىشۇرۇش، ھەيدەپ چىقىرىش ۋە ئېغىزدىن دورا بېرىشتىن باشقا يەنە تۆۋەندىكى بىر-قانچە چارىلەر بار. بۇلارنى كۆرسىتىپ ئوتۇلگەن تەد-بىرلەر بىلەن تەشۋىپ ياكى مۇستەقىل قوللىنىش مۇمكىن. 1) پۇراتقۇچى دورىلار (شەمۇم) — ئۆتكۈر پۇراق چىقىرىپ تۇرىدىغان دورا تۈرلىرىنى پۇرۇتۇش بىلەن تەسىر كۆرسىتىش، ئۇسۇلى بولۇپ، سۇيۇقلۇق دورا تۈر-لىرىنى پۇرۇتۇشنى "لەخلەخە"، قۇرۇق (تالغاندەك سوقۇل

خان) دورىلارنى بۇرۇن ئىچىگە تارتقۇزۇپ مىڭدە غىدىق
لىنىش — چۈشكۈرۈش پەيدا قىلىش ئۇسۇلى “سۇتۇت”
دەپ ئېيتىلىدۇ.

(2) نۇپۇخ: يۇمشاق سوقۇلغان دورىلارنى بوشلۇق
ئەزالارغا (بۇرۇن، تاماق، ئېغىزلارغا) پۇركۇش ئۇسۇلى
بولۇپ، چىش تۇۋىگە دورا بېسىشنى “سۇنۇن”، جاراھەت
(يارا) ئۈستىگە دورا سېپىشنى “زورۇر” دەپ ئاتايدۇ.

(3) ئىنكباب: دورىلارنىڭ قاينىتىپ چىقىرىلغان
ھورغا پۇتۇن بەدەننى ياكى بىرەر ئەزانى (مەسىلەن،
قۇلاقنى) ئوراپ تۇرۇپ تۇتۇش ئارقىلىق ھورلاندۇرۇپ
تەراپىتىش ئۇسۇلى.

(4) كەاد: ئىسسىق ئۆتكۈزۈش (قۇرۇق ئىسسىق
ئۆتكۈزۈش).

(5) تەمىرخ: نەم دورا تۈرلىرىنى بەدەنگە قويۇپ
تەسىر كۆرسىتىش. ياغلارنى سۈركەپ تەسىر كۆرسىتىش
بولسا “تەرەين” دەپ ئاتىلىدۇ.

(6) پىلتە: قۇرۇق تالقان، مەلەم، ياغ ياكى سۇ-
يۇق دورىلارنى پىلتىدەك بىر نەرسىگە يۇقتۇرۇپ بوشلۇق
ئەزالار (بۇرۇن، قۇلاق، سوڭ، سۇيدۇك يولى) جاراھەتنىڭ
ئېچىلىپ قالغان توشۇگىگە سېلىش.

(7) ھومۇل: چوڭراق ھەجىمدىكى پىلتە ياكى لاتى-
دەك نەرسىلەرنى نەم دورىلارغا مىلاپ بالىياتقۇ ئاغزىغا،
چوڭ يارا ئىچىگە تىقىپ قويۇش (ئاياللار جىنسى يولى-
غا قويىلىدىغىنى — فەرزىجە دىيىلىدۇ).

(8) مەلەم: قويۇق ھالدىكى ماي دورا شەكلى. سۇيۇق ياغدەك بولغىنى رەۋغەن دىيىلىدۇ.

(9) زىماد: ھەرخىل مۇرەككەپ دورا تۇرلىرىنى بەدەنگە بىر مەزگىل قويۇپ تەسىر كۆرسىتىش.

(10) تىلا: قاتتىق دورا تۇرلىرىنى (مەسىلەن بوزۇغا، جويوز، موزا قاتارلىقلارنى) سۇيۇق دورا ياكى سۇ بىلەن تاشقا سۇرۇپ ئەزاغا (بەدەنگە) چېپىش بىلەن تەسىر كۆرسىتىش.

(11) پاشۇيە: مۇرەككەپ دورىلارنىڭ تەمىنى چىم قىرىپ ئىلماق ھالدا تېزدىن ئاستىنقى قىسمىنى چايقاش (تېزدىن توۋەنگە قاراپ قويۇش). بۇنىڭدا كۆپىنچە بەك قىزىتمىلىق تەپلەردە ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە باش ئاغرىشىنى توختىتىش تەدبىرى سۈپىتىدە قوللىنىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى قوللانغاندا كېسەلنىڭ ئالدىغا يەردە تارتىپ قويمۇش، باشنى ئۇستۇنرەك قويۇپ ئىشلەش كېرەك. بۇنداق قىلىنغاندا باش بىردىنلا قېيىپ كۆڭلى ئاينىشلار پەيدا بولىشى مۇمكىن.

(12) ئابىزەن: تەمى چىقىرىلغان دورا سۈيىدە بەلدىن ئاستىنقى قىسمىنى چىلاپ ئولتۇرغۇزۇش.

(13) بوخۇر: دورىلارنى كويدۇرۇپ ئىسنى بۇرۇنغا ماڭدۇرۇش ياكى مەلۇم بىر ئەزانى ئىسلاش (بۇۋاسىر كېسىلىدە بۇۋاسىر ئۆسۈكچىسىگە ئىس بىلەن تەسىر كۆرسىتىلىدۇ).

14) مىڭىنىڭ زەربىگە ئۇچرىشى (ئۇرۇلۇش، يىقىد-لىش) سەۋەپلىك كېسەل ھۇشسىزلانغاندا ياكى تۇتقاق كېسەل ۋە ئېغىر كوڭۇل ئېلىشىش كېسەللىكلىرىدە قۇلاق ئارقىسى، گەجگە ۋە بۇرۇن تۈكلىرىنى يۇلۇش (موچىنىلاش) بىلەن كېسەلنى ھۇشىغا كەلتۈرىلىدۇ.

3. دورا بىلەن زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى چارىلار

كورگەنلا دورىنى ئېغىزغا سېلىپ كورمەسلىك، گۇمانلىق دوللارنى ئىستىمال قىلماسلىق لازىم. زەھەرلىك نەرسىلەر (مەيلى تاماق ياكى دورا بولمىسۇن) كوپ دۇرۇش، ئېچىشتۇرۇش ۋە باشنى ئايلاندۇرۇش قاتارلىق بەلگىلەرنى بېرىدۇ (زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى چارىلار ماۋزۇسىغا قارالسۇن). زەھەرلىك دورىلارنىڭ ئۆزىگە خاس ئالامەتلىرىمۇ بولىدۇ. زەھەرلەنگۈچى ئېغىر ھالدا قۇسۇپ ياتسا ۋە ئاغزىدىن پۇراق چىقىپ تۇرسا دەرھال تەدبىر قوللىنىش كېرەك. ئۇيغۇر تىبابىتىدە كوپ ئىشلىتىدىغان دورىلار ئىچىدە تىۋەندىكىلىرى زەھەرلىك دورىلاردۇر.

فەرىپيۇن، ئەپپيۇن، زەڭگەر، ئاق پارپى، بېلىق ئۆتى، كىلە ئۆتى، قاپلان ئۆتى، ئاق-قارا خەربەق، زەرنىخ ۋە باشقىلار.

چارە: زەھەرلەنگەنلىكى ئېنىقلانغاندىن كېيىن دەرھال قەي قىلدۇرۇلىدۇ.

قەي قىلدۇرۇش ئۇسۇلى: توخۇ پېيىنى گالغا تىقىپ ئۈزلىگىدىن قەي قىلدۇرۇش ياكى كۈنجۇت يېغى بىلەن كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئەگەر كۈنجۇت يېغى ئورنىدا زەيتۇن يېغى بولسا ناھايىتى ياخشى. ئەنجۈر ئۇرۇغىنى كالا يېغى بىلەن قاينىتىپ ئىچىرىلسە دەرھال قۇسىدۇ. ئەگەر زەھەرلىك ماددا قەي بىلەن چىقىپ كەتمەسە تەرياك ۋە مەسرو دېتوسىدەك زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىش لازىم. زەھەرلەنگۈچىگە كۆپلەپ سۇت بېرىش كېرەك، ياكى كالا سۈتى مەسكە مېيى بەرسىمۇ بولىدۇ. تىنچ ياتقۇزۇپ كىيىملىرىگە خۇشپۇراق نەرسىلەرنى چېچىش ۋە مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى پۇرۇتۇش لازىم. ئايلىنىپ كېتىدىغان ئەھۋاللار كورۇلسە قول-پۇتلارنى ئۆگىلاش بىلەن ئالامەتلىرىگە قاراپ چارە قىلىش كېرەك.

4 - پەسىل: بوۋاقلارنى داۋالاش

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار كېسىلىنىڭ سەۋەپلىرى ئۇلارنىڭ تەن ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسەن ئومۇمەن سەپ-را، بەلغەم ۋە سەۋدانىڭ پارلىرىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بوۋاقلار ئاغرىپ قالغاندا كورۇلىدىغان بەلگىلەر تۆۋەندىكى بىرقانچە تۈردىن يىراقلاشمايدۇ.

1) گەجگە (بويۇن) قىسمى قاتىدۇ، چىرايى سارغى-يىپ ۋاقىراپ يىغلايدۇ.

چارىسى: ئانىسى يەللىك نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىشى لازىم. سەبەب، قۇندۇزقەرى، زىرىلەرنى قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ ئانا سۈتىدە ئېزىپ ئىچكۈزۈش كېرەك.

(2) ئايلىنىپ كېتىپ كوز قارىچۇقلىرى ئارقىغا تارتىلىپ كېتىپ، ھۇشسىزلىنىدۇ.

چارىسى: مارجانى بىر ئاز قىزىتىپ ئىككى قاش ئوتتۇرىسىغا يېقىش بىلەن بالا ھۇشىغا كېلىدۇ. ئاندىن كېيىن كېسىلىگە قاراپ چارە قىلىش لازىم.

(3) چوچۇيدۇ. بۇ مىڭدە ياللۇغلىنىش يۈز بەرگەنلىك نەتىجىسى بولۇپ، مەسائىلە، زەپەر ۋە قەنتلەرنى قوشۇپ كوندۇرۇپ چىققان ئىسنى بۇرۇنغا تۇتۇش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

(4) بالىنىڭ چىرايى سارغىيىپ ئۇسسۇزلۇق كۆپ بولسا، ھول قاپاقنىڭ پوستى، پەتەنگان ئۇرۇغى، سېمىز ئوت كۆكىنى سوقۇپ باشقا چېپىش لازىم. ياكى يۇمىلاق سۈتنىڭ سۈيىنى گۈل يېغىغا قوشۇپ پىشانىسىغا چېپىش كېرەك.

بالىنىڭ كوزى ئاغرىپ قالسا ياڭاق ۋە زىرىنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ بىر ئاز نەم قىلىپ قىزىتسا، مۇۋاپىق ئايالىنىڭ سۈتى بىلەن يۇغۇرۇپ پاختىغا سۇۋاپ كوز ئۈستىگە قويۇش لازىم.

بوۋاقلارنىڭ قۇلغى ئاغرىپ قالسا دائىم قۇلغىنى ياستۇققا سۈركەيدۇ، تولا يىغلايدۇ، مۇنداق ۋاقىتلاردا

ھەسەل بىلەن بادام يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ پىلتە ياساپ
قۇلاق ئىچىگە تىقىپ قويۇش لازىم.
بالىلارنىڭ چىشى چىقىش ۋاقىتلىرىدا ئېغىز ئىچىنى
بادام يېغى، توخۇ يېغى، ئىلىكلەر بىلەن ياغلاپ تۇ-
رۇش لازىم.

5 - پەسىل: كېسەللەر تامىغى

كېسەللەرگە بېرىلىدىغان غىزا ئاغرىق ئۇچۇن ئوزۇق
بولۇشتىن تاشقىرى مەلۇم داۋالىق (شېپالىق) ئۇنۇمگە
ئىگە بولۇشى، كېسەللىك سەۋەپچىسى بولغان ماددىنى
كۆپەيتىدىغان ياكى قوزغىتىدىغان بولماسلىقى كېرەك
(بۇ ھەقتە مۇناسىۋەتلىك كېسەللەر بابىدا ئايرىم توختى-
لىمىز). تۆۋەندە تىبابەتتە كۆپرەك قوللىنىدىغان تاماق
تۈرلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:

1) قىيما شورپا:

كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ياش مال گۆشىنى
ئۇششاق توغراپ سۇ ۋە تەم كىرگۈزۈش ئۇچۇن تۈز
سېلىپ ئوبدان پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. كۆكتاتلاردىن
يېتەرلىك مىقداردا پالەك قوشۇلسۇمۇ بولىدۇ. سەپرا
ئارتۇق بولغان چاغلاردا ۋە قىزىتمىلىق چاغلاردا شورپا
بېرىشكە بولمايدۇ. شورپا بەدىنى ئاجىز كىشىلەرگە ۋە
ماغدۇرسىزلىقتىن بولغان كېسەللەر ئۇچۇن ياخشى.

(2) ئارپا سۈيى (مائۇشېئىر)

قىزىتمىلىق كېسەللەر ئۈچۈن ئۇزۇق بولىدىغان
ۋە شىپالىق ئۇنۇمى بار تاماقدۇر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن ئارپىنى شاكىلىدىن
ئايرىش (مۇقەششەر قىلىش) كېرەك. يەنى يېتەرلىك سۇ
بىلەن بىر ئاز قايناتسا ئارپا شاكىلىدىن ئاجرايدۇ. بۇ
خىل ئارپىنىڭ ئېغىرلىقى بىلەن 4 باراۋەر سۇ قويۇپ كىچىك
ئاش پىشۇرغاندەك پىشۇرۇپ سۇزۇپ سۈيى بېرىلىدۇ.
ئەگەر كېسەلدە ئىچ سۇرۇش ھادىسىسى بولسا ئالدى
بىلەن ئاقلاغان ئارپىنى تومۇر قازاندا بىر ئاز قورۇۋې-
تىپ پىشۇرۇش لازىم.

كېسەلدە يۈتەل، زۇكام ياكى قۇرۇقلۇق ئالامەتلى-
رى بولسا، ئارپىغا چىلان، سەرپىستان قوشۇپ قاينىتىم-
لىدۇ. سۇزۇپ بىر ئاز شېكەر سېلىپ بېرىلىدۇ. ئارپا
سۈيى بىلەن ئىسكەنجىبىن قوشۇپ بەرمەسلىك لازىم.
چۈنكى سىركە بىلەن ئارپا بىرلەشسە مەيدىنىڭ ھەزىم
قىلىش قۇۋۋىتىنى بۇزۇپ قويىدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردىن
كېيىن ئارپا سۈيىگە گۆش سېلىپ پىشۇرۇپ بې-
رىلسە كېسەلنىڭ ئاسان ماغدۇرغا كېلىشىگە ياردەم بېرىدۇ.
ئەمما قىزىتمىلىق ھاللاردا گۆش بېرىشكە بولمايدۇ.

(3) ھەرسە: كىچىك قۇشلارنىڭ مەسىلەن، قۇشقاچ،
تۇرۇلغا قاتارلىقلارنىڭ گۆشىنى پۇرچاق قوشۇپ سۇدا
پىشۇرۇپ سۈيىگە سىركە، يۇمىلاقسۇت قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.

تاماق. ھەر قانداق كېسەللەرگە مۇۋاپىق غىزا ھىساپلىنىدۇ.

(4) زىرباج: قىيما شورپىغا ئۇزۇم، ئۇرۇك، چىلان، ئەينۇلا قاتارلىق قۇرۇق مېۋىلەر ۋە شاپتۇل قېقى قوشۇپ (بىر ئاز زەپەر ۋە يېتەرلىك مىقداردا زىرە قوشۇش لازىم) قاينىتىپ سىركە قۇيۇپ سۇيىنى ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(5) گوش سۇيى (مائۇللەھمى) ئېغىر كېسەللەر ئۈچۈن ئەڭ مۇۋاپىق ئوزۇق بولۇپ پۈتۈنلەي بەدەنگە سىڭىپ كېتىشى مۇمكىن. تەييارلاش ئۇسۇلى "ئوپكە سىلى" ۋە "جۈدەتكۈچى قىزىتما" بايانىدا تەپسىلى سۆزلىنىدۇ.

XIV ماقالا. ساقلىقنى ساقلاش ۋە كې- سەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش

بەدەن سالامەتلىكىنى ساقلاش ۋە كېسەلدىن ساق-
لىنىش چارە تەدبىرلىرى زورۇر سەۋەپلەر دىگەن ماقا-
لىدا تەپسىلى سۆزلەنگەن. تۆۋەندە بۇنىڭ يەنە ئايرىم
قىسىملىرى سۆزلىنىدۇ.

1 - پەسىل: جىسمانى ھەركەت

ھەركەت — جىسمانى ۋە روھى (نەفسانى) بولىدۇ.
جىسمانى ھەركەت ئادەم سالامەتلىكى، جۈملىدىن كېسەل-
دىن ساقلىنىش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم. چۈنكى جىسمانى
ھەركەت جۈملىدىن ئەمگەك بەدەنگە ئىسسىقلىق بېرىدۇ،
نەپەسنى تېزلەشتۈرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تەبىئى ئىسسىقلىق
نى قوزغايدۇ. بەدەندىكى ئوزۇقلۇقلارنى تەنگە تارقىتىپ،
يىغىلغان كېرەكسىز ماددىلارنى نەپەس، تەر ئارقىلىق
بەدەن سىرتىغا ھەيدەيدۇ. ئۇندىن باشقا مۇۋاپىق بول-
غان جىسمانى ھەركەت گۆش، پەي ۋە بوغۇملارنى
چىڭىتىپ بەدەننىڭ تاشقى سەۋەپلەر (تەسىراتلار) بىلەن

كېسەللىنىشنى توسىدۇ. ئەگەر جىسمانى ھەركەت مۇۋاپىق بولمىغاندا (ھەددىدىن ئارتۇق بولۇپ كەتكەندە) ياكى پەقەت ھەركەت قىلمىغاندا ئەكسىچە بەدەن ئاجىزلىشىپ ھەرخىل كېسەللىكلەر بىلەن ئاسانلا ئاغرىپ قالىدۇ.

2 - پەسىل: روھى ھەركەت

بۇ روھى پائالىيەتتىن ئىبارەت بولۇپ، ساقلىقنى ساقلاش جەھەتتە ئوزۇقلىنىش ۋە جىسمانى ھەركەتتىنمۇ يۇقۇرى تۇرىدۇ. مەسىلەن،

(1) خوشلۇق: خوشلۇق يۈرەك ھەركىتىنى تېزلەش-تۇرۇپ تومۇرلاردىكى قاننى ھەركەتلەندۈرۈپ، ئوزۇقلۇقنىڭ بەدەنگە ياخشى سىڭىشىنى كۈچلەندۈرۈپ، كىشىلەر-نىڭ رەڭگى-روپىنى قىزىل ۋە بەدەننى ساغلام قىلىدۇ. ئەكسىچە خاپىچىلىق سالامەتلىككە، جۈملىدىن ئوزۇقلۇقنىڭ سىڭىشىگە ناچار تەسىر كۆرسىتىدۇ. خوشلۇقنىڭ ئوزۇق-ئىدالدا بولغىنى ياخشى. ھەددىدىن ئارتۇق خوشلۇق يۈرەك ھەركىتىنى بىردىنلا توختىتىپ قويۇش بىلەن ئۆلۈمگە ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن.

(2) غەزەپلىنىش: غەزەپ سەپرا خىلىتىنى قوزغايدۇ. تەبىئى قۇۋۋەتنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ بەدەننى ئاجىزلىتىدۇ. قورقۇنچ بىلەن تەبىئى كۈچ بەدەننىڭ سىرتقى قاتلىمىدىن ئىچىگە يۆتكىلىپ، يۈرەك ئاجىزلىشىپ كې-سەلگە قارشى كۈچ تۈۋەنلەيدۇ.

3- پەسەل: ھامىلدار ئاياللار ۋە قېرى كىشىلەرنىڭ ساقلىقنى ساقلاش تەدبىرلىرى

ھامىلدار ئاياللار قان ئالدۇرۇش، ھىجامەت قوي-دۇرۇش، سۇرگە دورىسى ئىچىش، قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى ئىچىشتىن ساقلىنىش لازىم. تىۋىپ ھامىلدار ئايالغا دورا بېرىشتە كۆپ ئېھتىيات قىلىشى كېرەك. ئېغىر نەرسە كۈتەرمەسلىك، قاتتىق ۋاقىراش، خاپا بولۇشلار-دىن ساقلىنىشى، ئارىلاپ ئىسكەنجىيىن، گۈلقەن، ھەسەل ئىستىمال قىلىپ تۇرۇشى كېرەك.

قېرى كىشىلەرنىڭ مىزاجى ئادەتتە قۇرۇق سوغاق بولىدۇ. شۇڭا بۇلارغا كۆرىلىدىغان تەدبىرلەردە ئۇنىڭغا دىققەت قىلىش (ھول ئىسسىقلىق قىلىش) لازىم. ھول ئىسسىق مايىلار بىلەن ياغلىنىپ تۇرۇش، مۈنچىغا چۇشۇپ تۇرۇش كېرەك. تاماقلارمۇ ھول ئىسسىق بولۇپ، ئاز-ئازدىن كۈنىگە بىر قانچە قېتىم بېرىلىشى لازىم. ئىمما بەك ئىسسىقلىق قىلماسلىق لازىم. ھەزىم قىلىنىشى ناچار، سەۋدا ماددىسىنى تۇغدۇرىدىغان غىزالاردىن پەرھىز قىلىش ۋە يېتەرلىك دەم ئېلىش كېرەك. توپا-چاڭ بەك ئىسسىق ۋە سوغاق ھاۋادىن ساقلىنىش لازىم. ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەن يەپ تۇرۇش، قېرىلاردا ھەرخىل كېسەللەرگە قارشى قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ.

ئىككىنچى قىسىم كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارنى داۋالاش

I ماقالا. باش ۋە مىڭە كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: باش ئاغرىغى (سەدائى)

ئاددى باش ئاغرىغى (سەدائى ساددە)

ئاددى باش ئاغرىغى مىڭنىڭ ئوز جىسمىدىكى كېسەللىك بولماي بەلكى ھارارەتلىك كېسەللەر مەسىلەن، كېزىكلەر، قىزىل، چېچەك، نۇقرىس (كىچىك بۇغۇملار ئاغرىغى) ۋە بورەكتىكى زەرەلىنىشلەرنىڭ باشلىنىشىدا باش ئاغرىيدۇ. ياكى شاراپ (ھاراق)، كاۋاپلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن ۋە كۆپ جىنىسى ئالاقىدىنمۇ باش ئاغرىغى كېلىپ چىقىدۇ. قاتتىق غەزەپلىنىش چاڭ-توزاڭلىق جايلاردا ۋە گۈڭگۈرت كانلىرىدا ئىشلەشمۇ باش ئاغرىغىغا سەۋەپچى بولىدۇ.

داۋاسى: سەۋەپلىرىنى يوقىتىش بىلەن ئالامەتلىرىگە قاراپ تەدبىر قوللىنىش لازىم.

ئەسەبى (نېرۋىلىك) باش ئاغرىغى (سەدائى ئەسەبى)

سەۋەبى: ئەسەپلەرنىڭ مىزاجى سۇۋۇپ كەتكەنلىك
تىن، شۇنىڭدەك بەدەننىڭ ئومۇمى مىزاجىمۇ سوغاقلق
تەرىپىدە بولغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىدە بىردىنلا
كۆپ مىقداردا مۇزدەك سوغاقسۇ ئىچىش، سوغاقسۇغا چۆ-
شۇش ياكى سوغاق ھاۋادا باش ئوچۇق قېلىش بۇ خىل
باش ئاغرىشقا سەۋەبچى بولىدۇ. ئاتىشەك (سېغىلىس)
كېسىلى قاننى بۇزۇش بىلەن ئەسەپلەرگە تەسىر يېتىپ
ئەسەبى باش ئاغرىشقا دۇچار قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: باش ئاغرىغى قاش ۋە پىشانە
تېرىسىنى ھەركەتلەندۈرگەندە كۈچىيىدۇ. باشنىڭ تېرە
ۋە چاچلىرىنى باسقاندىمۇ ئاغرىق سېزىلىدۇ. پىشانىنى
تۇتۇپ كورگەندە ئىسسىق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: 1 قارا چاي ياكى ئاق چاي 1
مىسقال، قوزاق داچىن 1 مىسقال، ئوستۇخوددۇس 1
مىسقال لاچىن دانە 1 مىسقال، قەھۋە (كافى) 3
مىسقال، ئۇلارنى سۇقۇپ قايىنتىپ ناۋات سېلىپ ئى-
چىشكە بېرىلىدۇ. ھىلىلە مۇرابباسىدىن 2 دانىنى گازىۋان
ئەرەقىدىن 4 مىسقال بىلەن بېرىلىدۇ. يېمىشكە
ئىتىرىپىل كەبىرى (1 - نۇسخە) نى ئەرەقى گازىۋان بىلەن
بىللە يېمىشكە بېرىلىدۇ.

2 خەمىرى گازىۋان (2 3 - نۇسخە) دىن 3 مىسقال
نى ئەرەقى گازىۋان بىلەن بېرىلىدۇ.

3) ئاق سەندەلنى گولاپتا تاشقا سۇرۇپ پىشا-
نىسىغا چاپىدۇ. ئەگەر ئىسسىقلىقتىن بولسا، پىشانىسىگە
سىركە چاپىدۇ (قىزىتمىسى بولۇپ يۈز-كۈزلىرى قىزار-
غان بولسا).

قاندىن بولغان باش ئاغرىغى (سەدائى دەمەۋى)

سەۋىبى: باشنىڭ كۆكتۇمۇرلىرىدىكى قاننىڭ كۆپ-
يىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق باش ئاغرىغى سەدائى
دەمەۋى ۋەرىد دىيىلىدۇ. شۇنىڭدەك باشنىڭ قىزىلتۇمۇر-
لىرىدىكى قاننىڭ كۆپىيىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداق
باش ئاغرىغى سەدائى دەمەۋى شىريانى دىيىلىدۇ.

يەنە يۈرەكتىكى قان مىقدارىنىڭ زىيادە بولۇشى
تۈپەيلىدىن قاننىڭ يۇقۇرقىدەك قانتۇمۇرلاردا تولىپ
كېتىشى بىلەن قاندا خىلىتلارنىڭ مىقدارى ئېشىپ، مىڭە
ساھەسىگە توپلىشىپ مىڭنى سىقىپ قويۇش بىلەن باش
ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. ئاياللاردا ھېيىزنىڭ ۋاقتىتىن
بۇرۇن توختاپ قېلىشى، راھەتپەرەسلىك ۋە قۇۋۋەتلىك
تاماكلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىپ ھەركەت، ئەمگەك قىل-
ماسلىق بىلەن قاندىن بولغان باش ئاغرىغى كېلىپ
چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: باش ئىسسىق، ئېغىر بولىدۇ. پىشانە
قىسمىنى تۇتۇپ كۆرگەندە قىزىق سېزىلىدۇ. يۈزى ۋە
كۈزىنىڭ ئىچىمۇ قىزارغان بولىدۇ. تومۇر تېز ۋە كېچ-

ككەن، سۇيدۇك قىزىل قان رەڭگىدە كېلىدۇ. ئېغىز ئىچى تاتلىق، ئاۋازى پۈتكەن بولۇپ، تەشئالىق ئانچە كۆپ بولمايدۇ.

داۋاسى: (1) شەرۋەت بىنەپشە (2 - نۇسخە) كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 10 مىسقالدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. (2) توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بىلەن پاشۇيە قىلىنىدۇ:

نۇسخە: بۇغداي كىپىگى، ئارپا ئۇنى، 9 مىسقال دىن، تۇز 1 سەر 10 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ، يىل مان ھالەتكە كەلگەندە تاكى كېسەلنىڭ كۆڭلى ئاينىغانغا قەدەر پۇتىنىڭ تىز ئاستى قىسمى يۇيىلىدۇ. (3) ئىترىپىل كەبىرى (1 - نۇسخە) 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(4) تامىغىغا چۈجە شورپىسى بېرىلىدۇ. **سەپرادىن بولغان باش ئاغرىغى (سەدائى سەپراۋى)** **سەۋىيى:** (1) جىگەرنىڭ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى ناچارلىغىدىن كەيمۇسنىڭ ھاسىل بولىشى غەيرى تەبىئى بولۇپ، مەيدە ئىچىدە غەيرى تەبىئى سەپرا توپلىشىپ قالىدۇ. بۇ باشنىڭ قاتتىق ئاغرىشىنى كەلتۈرىدۇ. (2) جىگەرنىڭ ئوز ئاغرىقلىرىدا ئومۇمى ھەزىم قىلىش خىزمىتى ناچارلىشىپ باش ئاغرىغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: رەڭگى ۋە كۆز ئىچى سېرىق، تەشئالىق كۆپ بولۇپ، بېشى تۇتقاقلىق ئاغرىيدۇ. سوغاق

نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغاندا ياكى سوغاق ھاۋاغا چىققاندا ئاغرىق پەسىيىپ قالىدۇ. قەي قىلسا ئاچچىق سېرىق سەپرا قۇسىدۇ. ئىچى سۇرسىمۇ سەپرا بىللە كېلىدۇ. بۇ خىل سەپرالق خىلىتلارنىڭ سىرتقا چىقىشى بىلەن باش ئاغرىشى ساقىيىپ قالىدۇ.

داۋالاش: (1) باشنىڭ ھارارىتىنى تۈۋەنلەشتۈر-گۈچى تۈۋەندىكى تەدبىرلەرنىڭ بىرى قوللىنىلىدۇ:

(1) سوغاق سۇ قويىلىدۇ. قاپاق، خاڭگالارنىڭ ھول تىرىپلىرى باشقا قويىلىدۇ. (2) ئاق سەندەلى گۈ-لاپتا تاشقا سۇرۇپ پىشانە ۋە باشقا سۈركىلىدۇ. (3) كاپورنى گولاپتا ئېرىتىپ باشقا سۈركەيدۇ. (4) يۇم-خاقسۇتنى سوقۇپ نەم ھالىتىدە باشقا چېپىلىدۇ. (5) ئۈزۈم سىركىسى بىلەن باش نەملىنىدۇ. (6) قاپاق مېغىزىنىڭ يېغىنى پىشانىغا سۈركەيدۇ.

(2) ئۇسۇلۇقىغا لىمون شەرۋىتى، ئەينۇلا شەرۋىتى ياكى ئانار شەرۋىتىدىن بىرى بېرىلىدۇ.

(3) مەئدە زەئىپ بولسا جەۋارىش ئامبىلە (3) - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى پاشۇيە قىلىنىدۇ.

نۇسخە: گۈل بىنەپشە، نىلۇفەر، ھەمشىۋا گۈلى 3 مىسقالدىن، تۇز 3 مىسقال، بۇغداي كىپىگى، قاپاق پۈستى 15 مىسقالدىن يىتەرلىك مىقداردا سۇ بىلەن قاينىتىپ داسقا قويۇپ قۇل - پۇتلارنى چېلاپ يۇيىدۇ.

5) مۇنۇ نۇسخىدىكى كاشكاپ چاي ئورنىدا دەم-
لەپ بېرىلىدۇ.

نۇسخە: گۈل بىنەپشە، نىلۇفەر، ئۇسۇڭ ئۇرۇغى،
يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئەينۇلا
5 دانە، چىلان 7 دانە، كاسىن ئۇرۇغى 2 مىسقال.

باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش (شەقىمە)

سەۋىبى: 1) ئاياللاردا ۋاقتىدىن بۇرۇن ھېيىزنىڭ
توختاپ قېلىشى، 2) مىڭگە قۇرۇقلۇق يېتىپ قېلىش،
3) بورەكنىڭ سۇسلىشىپ قېلىشى، 4) مەئىدىنىڭ ھەزىم
قېلىشى بۇزۇلۇپ، بۇخاراتلارنىڭ مىڭە تەرەپكە كۆتۈرۈل-
مىشى، 5) جىنىسى ئالاقىنىڭ كۆپ بولۇشى.

ئالامەتلىرى: باشنىڭ يېرىمى ئاغرىيدۇ. ئاغرىش
كۈن چىقىش بىلەن باشلىنىپ، كۈن ئولتۇرۇشى بىلەن
توختايدۇ. كۈنگە قارىسا ئاغرىق كۈچىيىدۇ. قۇۋۋەت
ئاجىزلاشقان تەرەپ باش ۋە ماڭلاي قىسمى قاتتىق
ئاغرىپ، بەزىدە تۇتقاقلىق خۇسۇسىيەتلىك بولىدۇ.
ئاغرىق تەرەپ قىزىل تومۇرى (شېرىيان) قاتتىق
ئۇرۇپ تۇرغانلىقى بىلىنىدۇ. شۇ تەرەپ بىلەك شېرىيان
تومۇرى باغلاپ قويۇلسا ئاغرىق دەرھال توختايدۇ.

داۋاسى: 1) قاتتىق ئاغرىشنى توختىتىش ئۈچۈن

سەمىغى ئەرەبىدىن 1 مىسقال، ئەپپيۇندىن $\frac{1}{2}$ مىسقال،

زەپەردىن $1\frac{1}{2}$ پۇڭ، خۇنسىياۋشانىدىن 1 مىسقال

ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ (ئەپپيۇننى ئېرتىپ) 2 دانە تۇخۇمنىڭ ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ قەغەز ئۈستىگە بىر ئاز سۇۋاپ ئاغرىق تەرەپ قۇلاق ئارقىسىغا ياكى دولقۇنلاپ تۇرغان تومۇر ئۈستىگە چاپلاپ قويۇلسا ئاغرىقنى دەر- ھال توختىتىدۇ. (2) سەپرادىن بولغان باش ئاغرىغىدا يېزىلغان نۇسخە بويىچە پاشۇيە قىلىنىدۇ. (3) ماددا پىشۇرۇش ئۈچۈن توۋەندىكى پىشۇرغۇچى دورا بېرىلىدۇ. گۈل، بىنەپشە، گازىۋان، ئىشت ئۇزۇمى، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى (زىغىر ئارىلاش بولغىنى ياخشى). شاتەرە، ئەپسەنتىن ھەربىرى $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ئەينۇلا، چىلان ھەربىرى 9 دانىدىن، تەمرى ھىندى 6 مىسقال، تۇرپۇت 2 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: چوڭ سېرىق يۈگەي ئۇرۇغىدىن باشقىلىرىنى چالا سوقۇپ 2 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ سۇزۇۋېلىپ كۈنىگە 2 قېتىم 3 ئاش قوشۇغى ئىچىدۇ. (4) مىڭىنى تازىلاش ئۈچۈن — ھەبىي سەبرە (4 - نۇسخە) ياكى ئىتتىپىل سەغىر (5 - نۇسخە) دىن 3 - 5 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

باش قېيىش (دەۋۋار)

سەۋىيى: (1) بەدەن قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز بولۇشى؛
(2) قاننىڭ غەيرى تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرى؛ (3) ناچار

ھەزىم بولىدىغان تاماقلارنى كۆپ يېيىش؛ (4) تاماكنى كۆپ چېكىش؛ (5) يېقىلىش، ئۇرۇلۇش نەتىجىسىدە ئە - سەبلەرنىڭ زەخمىلىنىشى؛ (6) يۈرەك ۋە جىگەر كېسەل - لىكلىرى؛ (7) جىنىسى ئالاقىنىڭ كۆپ بولۇشى قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن مىڭە قانتومۇرلىرىدا قاتتىق خىلىتلەر توختاپ قالىدۇ. بۇنىڭ بىلەن مىڭىگە بارىدىغان ھا - ياتلىق قۇۋۋىتى (روھى نەفسانى) نىڭ ئوتۇش يوللىرى (قانتومۇرلار) دا توسىلىش كېلىپ چىقىدۇ. شۇنداق ئەھۋال ئاستىدا ئاپتاپقا قاقلىنىش ياكى ئىسسىق جايغا كىرىش بىلەنلا قاتتىق خىلىتلەر ئېرىپ مىڭىدە جىددى ئەھۋال كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نەتىجىدە باش قايدۇ.

ئالامەتلىرى: تۇيۇقسىزلا باش قايدۇ، كۆز قاراڭغۇلىشىدۇ، دەلدەڭلەپ كېتىدۇ ياكى يېقىلىپ چۈ - شىدۇ. باش ئېغىر بولۇپ، قۇلاققا بوران چىق - قاندىك ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. بەزىلەر ھۇشسىزلىنىپ قالىدۇ. بۇ كېسەل تەدرىجى تۇتقاق كېسەلگە سەۋەپچى بولىدۇ. باشنىڭ ئېغىر بولۇشى، مىڭىدە قويۇق ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى، باشنىڭ يېنىك بولۇشى سۇيۇق ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى بىلدۈرىدۇ.

داۋاسى: (1) مىڭىدە قاننىڭ كۆپلىگى سېزىلسە قاننى سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. خىلىتلارنى سۈرۈش ئۈچۈن توۋەندىكى ھوقنە قىلىنىدۇ.

بىستىپايەج، بىنەپشە، شەھىمى ھەنزىل بىر ھەس -

سىدىن، سانا، قەنتەرىن، سېرىق چېچەك، پىرساۋشان،
بادىرەنجىبىيا، گازىۋان، زاراڭزا ۋە ئۇرۇقسىز ئۇزۇم،
فۇنۇس 2 ھەسسىدىن، سېرىق ياغ مۇۋاپىق مىقداردا.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يۇقۇرقى دورىلارنى 3 چىنە
سۇدا قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ ئۈستىگە سېرىق
ياغنى سېلىپ 3 كۈنگىچە ھەر قېتىمدا بىر جىڭدىن
جەمى 3 قېتىم ھوقنە قىلىنىدۇ، (2) بەلغەم ماددىسىنى
تازىلاش مەقسىدىدە توۋەندىكى دورىلار بېرىلىدۇ،
ئۇرۇغىدىن ئايرىلغان ئۇزۇم 15 مىسقال، شاتەرە 5
مىسقال، چىلان 10 دانە، رۇم بېدىيان، مەستىكى 1
مىسقالدىن، تۇربۇت 3 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يۇقۇرقىلارنى چالراق سوقۇپ،
2 چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ، تەمى چىققاندىن كېيىن
سۇزۇپ ھەركۈنى 5 سەر مىقدارىدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.
سەپرا بىلەن بەلغەم بىرىككەن بولسا بۇنىڭغا 30 دانە
قارا ئۇرۇك، 5 مىسقال تەمىرى ھىندى قوشۇلىدۇ.

(3) ئىترىپىل كەشنىز (6 - نۇسخە) ياكى ئىترىپىل
سەغىر (5 - نۇسخە) دىن 3 مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىم
بېرىلىدۇ.

(4) بەلغەم ماددىسى غالىپ بولۇپ، رەڭگى ئاق
ئوزى ئىزىلەڭگۈ بولسا، ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە)دىن
3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ ۋە مىڭىنى كۈچلەندۈرۈش

ئۇچۇن بۇرنىغا ئىپار، ئەنەبەر پۇرۇتۇش بىلەن مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى (9 - نۇسخە) دىن $1\frac{1}{2}$ مىسقال، ئالما مۇرابباسىدىن 5 مىسقال، ئامىلە مۇرابباسىدىن بىردانە ئېلىپ كۇمۇش ۋە رەق بىلەن بېرىلىدۇ. (5) ئەگەر مەئدە ئاجىز بولسا، جەۋارىش جالىنۇس (3 - نۇسخە) دىن $2\frac{1}{2}$ مىسقال، نۇش دارى ئەلىۋى (8 - نۇسخە) دىن $2\frac{1}{2}$ مىسقال بېرىلىدۇ.

زۇكام ۋە نەزلە

زۇكام كېسىلى خەلق ئىچىدە مەشھۇر بىر كېسەل بولۇپ بۇرۇندىن سۇ ئېقىش بىلەن ئوتىدۇ. مىگە ئال - دىنقى بوشلۇغىدا توپلاشقان سۇيۇقلۇق (رۇتۇبەت) بۇرۇن - دىن ئېقىپ چىقسا زۇكام، سۇيۇقلۇق گالدىن ئىچكى ئەزالارغا چۈشسە نەزلە دىيىلىدۇ. بۇ سۇيۇقلۇق ئوپكە يولىغا چۈشكەندە ئوپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)، كوكرەك پەردە ياللۇغى (زاتلىجەنبە) ھاسىل قىلىدۇ. مەئدە يول - لىرىغا چۈشكەندە مەئدە ۋە ئۇچەيلەردە ياللۇغلىنىش، ھەتتا يارا ھاسىل قىلىدۇ. ئىچ سۇرۇش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا بوغۇم ئاغرىقلىرىنىمۇ كەلتۈرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن زۇكام تىبابەتتە كېسەللىكلەر ئانىسى (ئۇممۇل ئەمراز) دىيىلىدۇ. ئەتىياز، باھار ۋە قىش پەسىللىرىدە ھاۋا كۆپ ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ۋاقىتلاردا ئۇچرايدۇ.

زۇكامنىڭ سەۋەپلىرى كۆپ ۋە مۇرەككەپ بولۇپ، ئومۇمەن مىڭە بوشلۇغىدا سۇيۇقلۇقلارنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ ناچارلىشىشى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. زۇكام ھا-سىل بولۇش سەۋەپلىرىگە قاراپ ماددى سەۋىيىسى بولمى-غان (سازەج) ياكى ماددى سەۋىيىسى بولغان زۇكام دەپ 2 خىلغا بۆلىنىدۇ. تۆۋەندە بۇلار تەپسىلىي سۆزلىنىدۇ.

1. سازەج زۇكامنىڭ سەۋىيىسى: بۇ ئىسسىقلىقتىن بولغان، سوغاقتىن بولغان ياكى مىڭە ۋە ھەزىم قىلىش-نىڭ ناچارلىغىدىن بولغان دەپ 3 تۈرگە ئايرىلىدۇ.

1. ئىسسىقلىقتىن بولغان زۇكام:

سەۋىيىسى: مىڭىدە ھارارەت يۇقۇرى بولۇپ مە-ئىدىكى سۇيۇقلۇقنى بۇرۇن يولى بىلەن سىرتقا قوغلايدۇ. ئالامەتلىرى: بۇرۇندىن ئاققان سۇ ئىسسىق ۋە سۇيۇق بولىدۇ. بۇرۇن ۋە كۆز ئېچىشىدۇ، كۆز ئىچى قىزىل، ئۇسسۇزلۇق زىيادە، ھارارەت ئۈستۈن بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تومۇرىدىن يېرىم سەر مىقداردا قان ئېلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن سۈرگە دو-رىلار يېرىلىدۇ. ئىلمان سۇغا چۈشۈرىلىدۇ. بۇرۇندىن كەلگەن سۇنى توختىتىش ئۈچۈن كاپۇرنى كويدۇرۇپ بۇرۇنغا پۇرتىش كېرەك.

نۇسخە: گۈل بىنەپشە 5 مىسقال، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، گازىۋان 2 مىسقالدىن، چىلان 7 دانە، بىيە

ئۇرۇغى، ئەرەپ يىلىمى ھەربىرى 1 مىسقالدىن، بۇلارنى كاشكاپ قىلىپ دەملەپ بېرىلىدۇ.

2. سوغاقتىن بولغان زۇكام:

سەۋىبى: مىڭگە سوغاق ئوتۇش ئاساسى سەۋەپ بولىدۇ. مەسىلەن، سوغاق سۇ بىلەن باش يۇيۇش، ئىسسىق ئويىدىن سوغاق ھاۋاغا يالاڭپاش چىقىش ۋە باشقىلار.

ئالامەتلىرى: باش ۋە بەدەن ئېغىر، بۇرۇندىن كەلگەن سۇ ئاق ياكى كۆك بولىدۇ. ئاغرىق كىشى قىزىيدۇ، يوتىلىدۇ.

داۋاسى: سەندەل، قۇستە، سىيادانلارنى باراۋەر مىقداردا سىركىگە چىلاپ نەم قىلىپ كويدۇرۇپ بۇرۇنغا پۇرۇتۇلىدۇ. ياكى سىياداننى قورۇپ بۇرۇنغا تۇتىدۇ. 2. ماددى ياكى مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان زۇكام:

سەۋىبى: 4 خىلىت بەدەندە ئۆزگەرگەن سەۋەپتىن بۇس ھاسىل بولۇپ، مىڭگە ئورلەپ زۇكام ۋە نەزلە پەيدا قىلىدۇ. ئۇ سەپرادىن، قاندىن، بەلغەمدىن ۋە سەۋدادىن بولغان نەزلە دەپ تۈرتكە بولىنىدۇ.

(ئا) سەپرادىن بولغان نەزلە: سەپرا خىلىتى ئار- تۇق بولۇش تۈپەيلىدىن بولىدىغان زۇكام بولۇپ، ئالامەتلىرى باش ئاغرىش، باش، كۆزلەر چىڭقىلىش، كۆزدىن ياش ئېقىش، گالدا ئاچچىق سېزىلىشلەردىن

ئىبارەت. تەشئالىق كوپ، بۇرۇندىن ئاققان سۇ سېرىق بولۇپ، خۇددى ئوتتا كويگەندەك بۇرۇننى ئېچىشتۇرىدۇ.

داۋاسى: سەپرانى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن —

بىنەپشە 5 مىسقال ئاق لەيلى 2 مىسقال، ئەينۇلا 7 دانە، پۇنۇس، تەمرى ھىندى ھەربىرى 15 مىسقالدىن، ئىت ئۇزۇمى 3 مىسقال، چىلان 11 دانە، تەرەنجىبۇل بىر سەر ئېلىپ كاشكاپ ئۇسۇلى بىلەن دەملەپ بىر كۈندە ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن — بىنەپشە، بابونە، ئاق لەيلى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، ئۇسۇك ئۇرۇ — غەدىن $2\frac{1}{2}$ مىسقال ئېلىپ قاينىتىپ بىر ئاز سوۋۇتۇپ

باشنى يۇيۇدۇ.

(ب) قاندىن بولغان نەزلە، قاننىڭ ئارتۇقلۇغىدىن بولىدىغان زۇكام بولۇپ، ئۇنىڭ ئالامىتى: كوز ئىچى ۋە يۈزى قىزارغان، باش ئېغىر بولۇپ، كوپ ئۇخلايدۇ. گال ۋە قۇلاق قىچىشىدۇ، كېسەلنىڭ ئوزىگە ئاغزى تاتلىق تېتىيدۇ، سېسىق پۇرايدۇ، بۇرۇندىن كەلگەن سۇ قىزىلگۈل رەڭگىدە ئىسسىق كېلىدۇ.

داۋاسى: ئاۋال قىپال تومۇرىدىن 5 مىسقال

مىقدارى قان ئېلىش بىلەن قاننى پەسەيتكۈچى چارلار قىلىنىدۇ. بۇنىڭغا ئارپا سۈيى ئىچكۈزۈش، چىلان شەرى — ۋىتى بېرىشلەر كىرىدۇ. سۈنبۇل، سۇندۇرۇس پۇرىتىلىدۇ. باشقا چارلار ئىسسىق زۇكام بىلەن ئوخشاش.

(س) بەلغەمدىن بولغان نەزلە: بۇ خىلدىكى زۇكام باشقىلارغا قارىغاندا ياخشىراق. چۈنكى بەلغەم خىلىتى ئوزى يۇمشاق بولۇپ، مىڭنىڭ مىزاجى بىلەن ئوخشاشراق كېلىدۇ، خەتىرى ئاز.

ئالامەتلىرى: بېشى ئېغىر ۋە سېزىمى تىۋەن بولىدۇ. ئېغىزدىن سۇ ئاقىدۇ، بۇرۇندىن كەلگەن سۇ قويۇق، ئېغىزى تەمسىز بولىدۇ. ئاۋازى غاراڭ - غۇرۇڭ چىقىدۇ.

داۋاسى: زۇپا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 3 مىسقال، ئەنجۈر قېقى 3 دانە، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 11 دانە. بۇ - لارنى بىر چەينەككە سېلىپ چايدەك دەملەپ ئۈستىگە بىر سەر تەرەنجىۋىل سېلىپ بىرلا ئىچىدۇ. تامىغىغا بادام مېغىزى ئارىلاشتۇرۇلغان بۇغداي كېپىگىدە ياسالغان بۇلماق (ھەرىسە) نى بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ بېرىلىدۇ.

بۇرۇن يوللىرى توسىلىپ ماددىنى پۇشۇرۇش كېرەك بولسا سېرىق چىچەك، بابۇنە، بادارەن - جىبۇيا، سۇتتەر، قۇشقاچ تىرىنغى (ئەككىل مىلىك) لەرنىڭ ھەر - بىرىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۇدا قاينىتىپ ئىلمان ھالەتتە باشقا قويىلىدۇ. يوتەل بولسا شەرۋىتى زۇفا (10 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2) سەۋدادىن بولغان نەزلە: سەۋدانىڭ كۆپ بولىشىدىن بولىدىغان زۇكام ئاز ئۇچرايدۇ. ئاقىۋىتى ناچار، ساقىيىشى ئۇزۇن.

ئالامەتلىرى: كوزى قۇرۇق بولىدۇ، ئاغرىق كىشى كوزىدە ئېغىرلىق ھىس قىلىدۇ. پۇتۇن بەدىنى ئېغىر، بېشى سوغاق، ئېغىز ئىچى تېتىقسىز بولۇپ، ئىس پۇرايدۇ.

داۋاسى: بىنەپشە، ئاق لەيلى، ئۇسۇڭ ۋە قا-پاقنىڭ ياپراقلىرىنى قاينىتىپ باشنىڭ ئالدى قىسمىغا قويۇش بىلەن ئالامەتلىرىگە قاراپ ئىلاج قىلىش مۇۋاپىق كاشكاپ بېرىش لازىم.

زۇكامنىڭ ماددىسى ئىسسىق ۋە سۇيۇق بولغان-لىقتىن بەدەننىڭ ھەرقانداق يېرىگە چۈشكەندە ئەگەر شۇ ئورۇننىڭ قارشىلىق كۈچى ئاجىز بولسا، شۇ ئورۇندا كېسەل پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا يۇقۇملۇق كېسەللىك-لەرنىڭ كۆپىنچىسى، زۇكام — نەزلەنىڭ ئاقىۋىتى بولۇپ كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن زۇكامغا سەل قارىماسلىق ۋە بەدەننى چېنىقتۇرۇش، جۈملىدىن مىڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋ-ۋەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئېلىپ بېرىش لازىم.

2 - پەسل: مىڭە كېسەللىكلىرى.

ھۇشسىز ئۇيقا (سۇبات)

بۇ كېسەلدە ئاغرىق ھېچنەرسە سەزمەستىن قاتتىق ئۇخلايدۇ. خۇددى ئولۇكتەك ھالەتتە بولۇپ، ئۇيغىتىش ناھايىتى قىيىن.

سەۋەبى: مىزاننىڭ قاتتىق سوغاق بولۇشى، مە-
ئىدە سۇيۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى ياكى تاشقى زەربە،
ئۇرۇلۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: سەۋەپلىرىگە قاراپ ھەرخىل بولىدۇ.
(1) مىزاننىڭ سوغاق بولۇشى — سوغاقلىق نەرسە-
لەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش ياكى سوغاقلىق تەرەپتىكى
ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى كۆپرەك بېرىش بىلەن
كېلىپ چىقىپ، چىرايى كۆكۈش، تومۇرى قاتتىق ۋە
پەرقلىق سالىدۇ. باش قىسمىنى سوغاقتىن قاچۇرىدۇ.

داۋاسى: مىزاننى ئۈزگەرتىش ئۈچۈن خۇشپۇ-
راقلىق دورىلاردىن جۈملىدىن قۇندۇز قەرى، ئاقىر قە-
ھانى، پۇرىتىلىدۇ يىيىشكە داۋا ئۆلمەشكى بېرىلىدۇ.
مىكيان توخۇ گۆشى داۋاپ قىلىپ بېرىلىدۇ.

(2) مىڭدىكى سۇيۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى —
باشنىڭ ئالدى قىسمى ناھايىتى ئېغىرلىشىدۇ، كۆز ئالە-
سىمۇ ئېغىر تۇيۇلىدۇ. بەزىدە بۇرۇندىن سۇ ئاقىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مىڭنى تازىلاش لازىم.
بۇنىڭ ئۈچۈن ھەبىي ئوستوخۇددۇس ياكى ھەبىي
ئىستەمىخۇن (11 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن
12 - نۇسخىدىكى دورا ھوقنە قىلىنىدۇ.

(3) تاشقى زەربە ياكى ئۇرۇلۇش نەتىجىسىدە مە-
ئىگە زەرەر يەتسىمۇ بۇخىل ھۇشسىز ئۇيقا كېسىلى
پەيدا بولىدۇ (ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالىنىدۇ).

تۇيۇقسىزلىق (سەھىرى)

سەۋىبى: ئۇخلىيالماسلىق كېسىلى مىڭدە قۇرۇغلۇق زورراق بولغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: كېچىسى ئۇيقا كەلمەيدۇ. باش ئېغىر، ئېغىز ئىچى ۋە بۇرۇن ئىچى قۇرۇق بولىدۇ.

داۋاسى: ئوزۇقلۇق جەھەتتىن ھول تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى بېرىش لازىم. مەسىلەن، ئېمىپ تۇرغان ئوغلاقنىڭ باش ۋە پۇت گۆشلىرى، چۈجە گۆشى بېرىش، قاپاق ۋە پالەكنى كۆپ ئىستىمال قىلىش كېرەك. قىز بالا تۇغۇپ ئېمىتىۋاتقان ئايالنىڭ سۈتىگە قاپاق ئۇرۇغ-نىڭ مېغىزىنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ باشقا چېپىش كېرەك. مىڭىگە ھوللۇك يەتكۈزۈش ئۈچۈن مۇنۇ نۇسخە بېرىلىدۇ. نۇسخە: گۈل بىنەپشە، نىلۈپەر، ئۇسۇڭنىڭ ھول يوپۇرمىغى (ياكى ئۇرۇغى)، يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى ياكى چوپى بىر ھەسسەدىن، كۆكنار شاكىلى يېرىم ھەسسە ئېلىپ چالا سوقۇپ بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ ئەتىسى بىرلا قاينىتىپ سۇزۇپ ئىلماق ھالدا باشقا قويۇشقا بۇيرۇلىدۇ.

سەكتە

قوزغىلىشنىڭ مىڭدىن بەدەنگە تۇيۇقسىز كېلىشى بىلەن بەدەندە سېزىم ۋە ھەركەت يوقىلىپ كېسەل كىشى بىخۇتلىنىپ - يەقىلىدۇ. كېسەل ئوڭدىسىغا يىقىلىپ نەپەس ئېلىشى، يۈرەك ھەركىتىنى بىلگىلى بولمايدىغان

ھالدا خۇددى ئولۇكتەك يېتىپ قالىدۇ. رەڭگى تاتارغان بولۇپ، ئېغىر بولغاندا ئاغزىدىن كوپۇك كېلىپ تۇرىدۇ. بۇ ھال سەكتە دىيىلىدۇ. كېسەل كوپىنچە ئولۇپ كېتىدۇ. جالىنۇس "كېسەلنىڭ مىزاجى سوغاقلىقتىن ئىسسىق-

لىققا تەدرىجى ئوزگىرىشى" دىن كېلىپ چىقىدۇ، دىگەن. زەخىرە خارىزىسى دىگەن كىتاپتا جالىنۇسنىڭ پىكىرىگە قوشۇلىدۇ. ئەمما ئەبۇ ئەلى سىنا بۇ پىكىرگە قوشۇلمايدۇ. ئەبۇ ئەلى سىنا: "بۇ كېسەلنىڭ سەۋىبى مىڭدە قۇرۇغ-لىقنىڭ تەدرىجى ھالدا پەيدا بولۇشى بىلەن مىڭنىڭ

مىراجىدە قۇرۇقلۇق غەلىبە قىلىپ نەتىجىدە ئادەمنىڭ ئورە تۇرۇش قابىلىيىتى يوقۇلۇپ يىقىلىدۇ" دەيدۇ. بەزىلەر بۇ كېسەلنى يۈرەك بوغمىسى (خەنناق قەلىبى) دەپمۇ ئاتايدۇ. سەۋىبى: (1) ئومۇمەن سەكتەنىڭ سەۋىبى مىڭنىڭ

ھەممە بوشلۇقلىرىدىكى ئوتۇش يوللىرىدا توسالغۇ پەيدا بولۇشتۇر. بەلغەم، سەۋدا ۋە سەپرا سەۋىبى بىلەن مىڭ بوشلۇقلىرىنىڭ ئوتۇش يوللىرىدا كېلىپ چىققان توسىلىش نەتىجىسىدە روھنىڭ مىڭگە ئوتۇشى توسىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن سەكتە پەيدا بولىدۇ.

(2) بۇقرا: "سەكتە كۈچلۈك بولسا، ئۇنىڭغا دۇچار بولغان كىشى ساقايمايدۇ، كۈچسىز بولسا ئۇنى ساقايتىش ئاسان ئەمەس" دىگەن.

(3) جاراھەتلىنىش تۈپەيلىدىن مىڭ بوشلۇقىغا قويۇلغان ماددا (قان) نىڭ ئۇيۇپ قېلىشى ھىس ۋە

ھەركەت يوللىرىنى توساپ قويىدۇ. بۇنىڭ بىلەن سەكتە ھاسىل بولىدۇ.

داۋاسى: داۋالاشنى ھۇشسىزلىقتا ھەم ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن دەپ 2 باسقۇچقا بولۇپ ئېلىپ بېرىلىدۇ. (1) ھۇشسىز ھالىتىدىكى داۋالاش تەدبىرلىرى:

ئالدى بىلەن ئاغرىقنىڭ چاشلىرى چۈشۈرۈلۈپ توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بېشىغا قويۇلىدۇ. نۇسخە: پەرپىيون، قۇندۇز قەرى، قارىمۇچ، زەنجىۋىل، سىيادانلار باراۋەر مىقداردا ئېلىنىپ، سوقۇپ باش ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

(2) ھوقنە ئارقىلىق بەدەندىكى ماددىلارنى تارقىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن 12 نۇسخىدىكى ھوقنە ئىشلىتىلىدۇ.

(3) ئىپار، سوزاپ، قەلەمپۇرلارنى بىرلىكتە پۇرۇتۇلىدۇ. ياكى پىلىپىل، قۇندۇز قەرى، كوندۇشلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ئاغرىقنىڭ بۇرنى ئىچىگە پۇركۇلىدۇ. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن دەرھال قەي قىلدۇرۇش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن توخۇ پېيىگە بىر ئاز ئايارەج پەيقارا سۇرتۇپ ئاغرىقنىڭ گېلىگە سالسا كېسەل دەرھال قۇسىدۇ. رۇمبېدىيان، ئارپابېدىيان، گازىۋاندىن 3 مىسقالدىن ئېلىپ چايغا ئوخشاش دەملەپ بىر سەر گۈلقەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ (كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا بىر قانچە كۈنگىچە)؛ ئىچىش ئۈچۈن

چاي ئورنىغا ئارپا بېدىيان يىلتىزى، رۇمېدىيان، زىرىدىن
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ؛

13 - نۇسخىدىكى ما ئىلئۇسۇل ۋە 25 ھەم 186 -
نۇسخىلاردىكى دورىلار داۋاملىق بېرىلىدۇ.

ھۇشىغا تولۇق كەلگىچە ئىچىدىغان دورا بېرىشكە
قەتئى بولمايدۇ، ھوقنە، باش ئۇستىگە دورا قويۇش،
پۇرۇتۇش بىلەن چەكلىنىش كېرەك.

سەكتە تۇتقاندا كېسەل خۇددى ئولۇكتەك ياتىدۇ.
ئېغىر ھاللاردا ئولۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن. سەكتە بولۇپ
ئولگەن ئاغرىقنى ئالدىراپ دەپنە قىلماسلىق لازىم.
ئاغرىقنىڭ راست ئولگەنلىكىنى بىلىش ئۇچۇن كوز
قارىچۇغىغا قاراش لازىم. ئەگەر كوز قارىچۇغى سۈزۈك
بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە قارشى تەرەپنىڭ سورىتى ئەكس
ئەتسە تىرىك، ئەكس ئەتمىسە ئولۇك ھىساپلىنىدۇ. ياكى
ئاغرىقنىڭ ئاغزى ئالدىغا ئەينەك تۇتۇپ تۇرۇش لازىم.
ئەينەك ھورلانسا نەپەس بارلىغىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنداق
بولسىمۇ ئاغرىقنىڭ رەڭگى كوكۇرۇش ياكى قوساقلىرى
ئېسىلىپ قالمىغىچە دەپنە قىلماسلىق لازىم. چۈنكى گايى
سەكتە ئاغرىقلار بىر-ئىككى كۈندىن كېيىن ھۇشىغا
كېلىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن.

مىنگە پەردىسىنىڭ ياللۇغى (سەرسام)

مىڭنى ئوراپ تۇرغۇچى ۋە چاناق سوڭىكىگە
چاپلىشىپ تۇرغۇچى پەردىلەرنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى)
سەرسام دىيىلىدۇ.

سەۋەبى: قان، بەلغەم، سەۋدا ۋە سەپرانىڭ ئوزگىرىشلىرى سەۋەپ بولىدۇ. قاندىن بولغان سەرسام قارانتۇس، بەلغەمدىن بولغىنى لىسەرغۇس، سەۋدادىن بولغىنى قارانتۇس سەپراۋى، سەۋدادىن بولغىنى قارانە-تۇس خالىس دىيىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: سەۋەپلىرى ھەرخىل بولىدۇ:

(1) قاندىن بولغان سەرسام-قاتتىق ھارارەت بىلەن باشلىنىپ ئاغرىق جويلۇيدۇ، كوزىدىن ياش ئاقىدۇ. باش ئاغرىيدۇ، سەۋەپسىز كۆلىدۇ، ئەس-ھۇشىنى يوقىتىپ ناھايىتى بىئارام بولىدۇ. سۇيدۇكى قىزىل رەڭدە بولۇپ، نەپەس ئېلىشى تېز ۋە خاقىراپ چىقىدۇ، ھۇشىدىن كېتىدۇ. تومۇر يوغان-مۇتەۋاتىر بولىدۇ.

داۋاسى: كېچىكتۇرمەستىن دەرھال قىپالدىن قان ئېلىش لازىم. باش كېسەللىكلىرىدە سوزلەنگەن پاشۇيە قىلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن 15-نۇسخىدىكى مەۋە شەرۋىتى (شەرۋىتى فەۋاكە) بېرىلىدۇ.

(2) سەپرادىن بولغان سەرسامنىڭ ئالامەتلىرى: تەبىئى سەپرانىڭ ئېتىدالدىن ئېشىپ كېتىشىدىن بولۇپ، كورلىدىغان ئالامەتلەر: قىزىتما، ئۇيىقسىزلىق بۇرۇن ۋە ئېغىزنىڭ قۇرۇق بولۇشى، رەڭگى سېرىق، تومۇرنىڭ يېنىك بولۇشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەتتۇر. كېسەل جويلۇيدۇ، ئاچچىغى يامان، قوزغىلىشچان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: (1) كېرەكلىك مىقداردا نوقۇت ئېلىپ پىشۇرۇپ تەمى چىقىرىلىدۇ، بۇنىڭغا تەمىرى ھىندى،

ئەينۇلا، قارا ئۇرۇك، سرخش، تەرەنجىۋىللەردىن باراۋەر مىقداردا قوشۇپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. (2) باش كېسەللىكلىرىدە يېزىلغان چاپىدىغان دورىنىڭ قايسى بىرى بولسۇن بېشىغا چاپسا بولىدۇ. (3) ئۇيىقا كەلمىسە ئوسۇڭ يوپۇرمىغى، كۆكنار گۈلى ياكى يوپۇر- مىغى، بابۇنەلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ باشقا قويۇش كېرەك.

(3) سەۋدادىن بولغان سەرسامنىڭ ئالامەتلىرى: — بۇ تۈردىكى سەرسامدا ھارارەت ئاز بولىدۇ ياكى بولماس- لىغى مۇمكىن. جويلىۇش ۋە قورقۇنچىسى كۈچلۈك بولۇپ، ئاغرىق كۆپ يىغلايدۇ، ئەندىشە قىلىدۇ. نەپەس ئېلىشى تېز، تەمۈرى ئىنچىكە، بەزىدە قاتتىق بولۇپ، ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مۇنۇ ئۇسۇلغا بېرىلىدۇ: گازىۋان، بادىرەنجىبۇيا، بىستىپايەج، سەرىپىستانلارنى چەينەككە دەملەپ تاكى ماددا پىشقىچە چاي ئورنىدا ئىچكىزۈپ بېرىلىدۇ. تاتلىق ئىسكەنجىبىن بۇيرىلىدۇ. (ئىسكەنجىبىن باراۋەر مىقداردىكى ئۇزۇم سىركىسى بىلەن قەنتنى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ).

(2) قاپاق ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، نىلۇفەر بىنەپشەلەرنى كېرەكلىك مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ قىز بالا ئېمىتەۋاتقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن يۇغۇرۇپ باشقا قويۇلىدۇ.

(3) ھەبىي ئەپتىمۇن (14 - نۇسخە) ھەر كۈنى ئاخشامدا بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(4) بەلغەمدىن بولغان سەرسامنىڭ ئالامەتلىرى — ھارارەت يېنىك، تىلى ئاق رەڭدە بولۇپ كۆپ ئەسنەيدۇ. ئەس - ھۇشى، ھەركىتى ھەتتا كۆزىنى يۇمۇپ ئېچىشمۇ ناھايىتى سۇس بولىدۇ. سوزلەش توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. تىلى كەمتۈك بولۇپ، ئۇخلىغاندا خۇددى ئويغاقتەك كۆزىنى ئېچىپ ياتىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىنى پىشۇرۇس ئۈچۈن — بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، ئۇزۇم، ئىزخىز، ئۈستۈخۇددۇس (يۈرەك ئوتى) لاردىن باراۋەر مىقدارىدا ئېلىپ قايىنىتىپ يېتەرلىك مىقداردا گۈلقەن ياكى ھەسەل قوشۇپ بېرىلىدۇ.

ماددا پىشىپ بولغاندىن كېيىن مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن ھەبىي ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. زاتىل كېسىلى، مەئدە ۋە بالىياتقۇ (رەھىم) كېسەل - لىكىلىرىمۇ سەرسامغا سەۋەبچى بولىشى مۇمكىن. سەرسامنى داۋالاش ئاساسەن ھوللۇك تەرەپتە بولىشى لازىم. چۈنكى قۇرۇغلۇق تارتىشىش (تەشەننۇج) كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. سەرسامغا تەشەننۇجنىڭ قوشۇلۇپ قېلىشى ئولۇم بىلەن ئاياغلىشىدۇ.

مىڭنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى دىماغ)

سەۋەبى: بۇ مىڭنىڭ ئوز جىسمىنىڭ ياللۇغلىنىشى بولۇپ قاننى سۈپەت جەھەتتىن ئوزگەرتىدىغان ئوقۇنەت -

لەر مىڭدە ناھايىتى يامان ۋەرەم ھاسىل قىلدۇ. ۋەرەم
تومۇرلارنى بېكىتىپ قويۇشى بىلەن مىڭگە تەبىئى ئىس-
سىقلىقنىڭ يۇرۇشى توسۇلىدۇ. بۇ مىڭدە ھاياتلىقنىڭ
توختاپ قېلىشىغا سەۋەپ بولۇشى مۇمكىن. بەزىلەر بۇ
كېسەلنى ۋەرەملەرنىڭ ئەڭ يامانراغىدۇر دەپ 3 كۈنگىچە
داۋالاشقا كىرىشمەسلىكنى تەۋسىيە قىلغان. 3 كۈندىن
ئوتتە ساقىيىشىدىن ئۈمىت قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارايدۇ.
ئالامەتلىرى: — ئاغرىق كىشى بېشىدا ئوت كويۇ-
ۋاتقاندا ھىس قىلىدۇ. قاتتىق بىئارام بولىدۇ، يۈزى
سېرىق بولۇپ تۇتۇپ كورگەندە سوغاق سېزىلىدۇ، ئاغ-
رىق پات-پات ھۇشىدىن كېتىدۇ.

دۋاسى: قىپال تومۇرى، پىشانە تومۇرى، بۇرۇن
ئۇچى، تىل ئاستى تومۇرىنىڭ بىرىدىن قان ئېلىش
كېرەك. سەرسامدا كورسىتىلگەن دورىلار بېرىلىدۇ. غىزاسى
ئۇچۇن پەقەت ئارپا، قاينىتىلغان سۇ بېرىش كۇپايە
قىلىدۇ.

تۇتقاق كېسەل (سەرئى)

ئاغرىق كىشى تۇيۇقسىز يىقىلىپ چۈشىدۇ، پۇت-
قوللىرى تارتىشىپ قالىدۇ. ئاغزىدىن كويۇك كېلىپ
يۈزلىرى كۆكرىپ كېتىدۇ. كىچىك بالىلار چوڭ-كىچىك
تەرەت قىلىپ تاشلايدۇ. مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن ھۇشقا
كېلىدۇ.

سەۋىبى: — تۇتقاق كېسەلنىڭ سەۋىبى توغرىلۇق

ئىختىلاپ كوپ. "قازۇن" كىتاۋىدا مىڭگە سۇيۇقلۇغىنىڭ كوپ بولۇشى ۋە بەدەننىڭ ئاجىز بولۇشىنى كۆرسەتكەن. جالىنۇس "قويۇق كەيموسىنىڭ سۇددەسىدىن تۇغىلىدۇ" دەيدۇ. ئەبۇ ئەلى سىنا: "مىڭىدىكى يەككە ھوللۇك (رۇتۇ بەتى خالىس) نىڭ كوپلىگى ۋە ئۇنى مىڭگە سىڭدۇرەلمەيگەنلىك سەۋەپچى بولىدۇ" دەپ ئېيتقان. بەزىلەر بەدەندىكى ماددىلارنىڭ بۇخاراتى (بۇسى) مىڭگە كۆتىرىلىپ توسىلىش ھاسىل قىلغانلىقتىن بولىدۇ، دىيىشىدۇ. بۇ خىل پىكىردىكىلەر كوپچىلىكتۇر. ھەرخىل زەھەرلىك تەسىرلەر ھەمىيەن، غالىجىر ئىت چىشلەش، يىلان چېقە-شىمۇ سەرتىگە سەۋەپچى بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تۇتقاقلققا خاس بولغان تارتىشىپ ھۇشىدىن كېتىشلەردىن باشقا، كېسەلدە يەنە توت خىلىتىنىڭ بىرى كوپ بولغانلىق ئالامەتلىرىمۇ كۆرىلىدۇ:

(2) بەلغەمدىن بولسا — ھەركەتتە سۇسلۇق بولۇپ، باش ئېغىر، زېھنى توۋەن، ھورۇن بولىدۇ. كېسەل تۇتقاندا ئاغزىدىن بۇزۇلداپ كۆپۈك كېلىدۇ.

(1) سەپرادىن بولسا ئەزالاردا ئېچىشىش سېزىلىدۇ، رەڭگى سېرىق بولىدۇ.

(3) قاندىن بولغاندا يۈزى قىزىل، بەدەنلىرى ئېغىر بولۇپ دائىم بېشى قايىدۇ.

(4) سەۋدادىن بولغاندا دائىم يۈرىگى سالىدۇ، ئاغزى ئاچچىق بولۇپ ئېغىزدىن كەلگەن سۇ تۇپراققا چۈشسە بۇزۇلداپ تۇرىدۇ. ئوزى ئورۇق بولۇپ تاماقنى

كوپ يەيدۇ. ھەرخىل خام خىماللارنى قىلىدۇ. كىچىك بالىلاردا تىل ئاستى زەخمىلەنگەن بولىدۇ.

داۋالاش: ئالدى بىلەن كېسەلگە سەۋەپچى بولغان ماددىسىغا قاراپ، شۇ ماددىنى پىشۇرىدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. ئاندىن كېيىن توۋەندىكى دورىلار بىلەن ماددا تازىلىنىدۇ. (1) ھەببى ئەپتىمۇن (17- نۇسخە)دىن ھەركۈنى ئاخشامدا

$2\frac{1}{2}$ مىسقالدىن بېرىلىدۇ، ياكى ھەببى سەبرە، ھەببى

ئايارەج (4- ۋە 6- نۇسخە) بېرىلسىمۇ بولىدۇ.

(2) قارىمۇچ بىلەن قۇندۇز قەرىنى سوقۇپ بۇ- رۇنغا ناس ئورنىدا تارتتۇرۇش لازىم.

(3) كېسەل تۇتقاندا، ئاغرىق كىشىنىڭ تىلىنى چىشلىۋېلىشىدىن ۋە باشقا ئەزالىرىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئاغزىغا قولياغلىقنى پۈكلەپ تىقىپ قويۇش كېرەك. ھىڭنى ھەسەلدە قاينىتىپ گالغا تامغۇزۇلسا كېسەل كىشى دەرھال ھۇشىغا كېلىدۇ. پىشۇرغان تۇخۇم، سۇت، قېتىق، سۇيۇق ئاشتىن پەرھىز قىلىشى كېرەك.

كىچىك بالىلاردا (10 ياشتىن توۋەن بالىلاردا) بولىدىغان تۇتقاق كېسەل ئادەتتە ئۇمى سەبىيان دەپ ئاتىلىدۇ.

ئەمچەكتىكى بالىلاردا تۇتقاق كېسەل بولسا، ئانىسىغا يۇقۇرىدىكى دورىلارنى بېرىش؛ ئۇدسەلىبىنى

سۇ ياكى قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن تاشقا سۈرۈپ بالىنىڭ پەيلىرىگە چېپىش كېرەك.

بالا قەۋزىيەت بولۇپ قالسا بالىلارغا ئىشلىتىلمىدىغان شامچە قويىلىدۇ. بالىلاردىكى تۇتقاق كېسەلنىڭ خەتىرى ئانچە چوڭ ئەمەس، ئەمما 10 ياشتىن چوڭ بولغانلارنىڭ ئاقىۋىتى چوڭلارنىڭكى بىلەن ئوخشاش. ئۇدەلىنى سۈرۈپ چېپىش بۇلار ئۈچۈنمۇ پايدىلىق.

قېتىپ قېلىش (جۇمۇد)

جۇمۇد ئەرەپچە قېتىپ قېلىش دېگەنلىك بولۇپ بۇ كېسەلنى يەنە شىغۇسىمۇ دىيىلىدۇ. ئاغرىق كىشى كېسەل تۇتۇشتىن بۇرۇن قايسى ھالەتتە بولسا شۇ پېتىلا قېتىپ قالىدۇ.

سەۋىيى: ئارقامىڭىگە ئورناشقان سەۋدا ماددىسى بولۇپ، ئەسەب يوللىرىنى توسۇپ ھەركەت، ھىس، نەپەس ئېلىشلارنى توختىتىپ قويىدۇ. نەپەسلىنىش پۇتۇنلەي ئۈزۈلگەندە ئولۇم يۈز بېرىدۇ. ھۇشسىز ئۇيىقا (سۇبات) بىلەن قېتىپ قېلىشنىڭ پەرقى شۇكى ھۇشسىز ئۇيىقىدا كۆز يۇمۇلغان بولسا، قېتىپ قېلىشتا ئوچۇق تۇرىدۇ ياكى ئالغاي بولىدۇ. ھۇشسىز ئۇيىقىدا تومۇر يۇمشاق، قېتىپ قېلىشتا تومۇر بوش سالىدۇ. سەكتە بىلەن قېتىپ قېلىشنىڭ¹ پەرقى مۇنداق: سەكتە بولغان ئاغرىقنىڭ ئاغزىغا سۇ قۇيغاندا گالدىن ئۆتمەيدۇ. قېتىپ قالغاندا سۇ ئوتىشى مۇمكىن ئەمەس. سەرسام بىلەن قېتىپ قېلىش -

نىڭ پەرقى بولسا، سەرسامدا ھارارەت ناھايىتى ئۈستۈن بولىدۇ. قېتىپ قىلىشتا ھارارەت بولمايدۇ.

داۋاسى: سەۋدانى ھەيدىگۈچى دورىلار بىلەن مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن ئاغرىق قېتىپ قالغان ھالىتىدە توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ. ئېپ-تىمۇن، بېسىتپايەج، ھىلىلە كابىلى، غارىقۇن، تۇربۇت، گازد-ۋان، پىرسىياۋشان، بۇغداي كىپىگى، كۈنجۈت يېغى، قارا توغرىغا، شەھى ھەنزىل باراۋەردىن ئېلىپ ھوقنە قىلىش ئۇسۇلى بويىچە بېرىلىدۇ. ھۇشىغا كەلگەندىن كېيىن ھەببى ئايارەج (7- نۇسخە) يېمىشكە بېرىلىدۇ. مىڭسىگە قۇندۇز قەرىنى گۈل يېغى بىلەن سۇرۇپ چېپىش كېرەك.

تەدرەش كېسىلى (رەئىشە)

ھەركەت ئەزالىرى — قول — پۇتلارنىڭ ئىختىيارسىز ھالدا تەتربىشى بولۇپ، بەزىدە يۈز ۋە كالىپۇكلاردىمۇ ئۇچرايدۇ.

سەۋىيى: مىڭ ۋە يۇلۇننىڭ ھەركەتنى باشقۇرۇش قۇۋۋىتىنىڭ ناچار بولۇشى؛ ھەركەت ئەزالىرى ۋە ئەسەبلەرنىڭ يېتەرسىزلىگى؛ ياكى ھەرخىل ئەھۋالنىڭ بىللە كېلىشىدۇر. بۇلار توۋەندە تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ.

(1) مىڭ يۇلۇننىڭ ھەركەت قۇۋۋىتى ناچار بولۇش ئەھۋالى ھەرخىل يامان كېسەللەردىن كېيىن قاتتىق غەزەپلىنىش، قورقۇش، ھاياجانلىنىش، مىڭسىگە سىرتتىن بولغان زەربە، تۇرمۇشتىكى تەسادىپى ئۈزگە-

رىشلەر تۇپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنە جىنسى ئالاقە بىلەن بەك زىيادە شۇغۇللىنىشمۇ ھەركەتلىنىش قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مىگە يۇلۇننىڭ ھەركىتىنى باشقۇرۇش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشى رەئىشەنى پەيدا قىلىدۇ.

(2) ھەركەت ئەزالىرى ۋە ئەسەبلەرنىڭ بوشاپ كېتىشى مىزاجنىڭ سوغاق بولۇشىدىن كېلىپ چىقىپ ئەسەبلەر بوشاپ، پۇت-قول يېرىم پالەچلىك ھالغا كېلىپ قالىدۇ. بۇ ھالدا ھەركەت قىلدۇرغۇچ كۈچ ئەزانى تارتىپ تۇرۇشقا قادىر بولسىمۇ، ئەمما زەئىپلىك سەۋىيىدىن تىترەپ تۇرىدۇ. بۇخىلدىكى رەئىشە قېرى كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: قۇل-پۇتلار دائىم تىترەپ تۇرىدۇ، يۈز ۋە كالىپۇكلىرىمۇ تىترەيدۇ. تىترىگەن ئەزا يېرىم پالەچلىك ھالىتىدە بولىدۇ. باشقا كېسەللەردىن پەرقى شۇكى ئۇخلىغاندا تىترەش بولمايدۇ.

داۋالاش: بۇنداق ئاغرىقلاردا بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغانلىقتىن، ئالدى بىلەن مىڭىنى بەلغەمدىن تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئايارەج (7- نۇسخە) ۋە مائىل ئۇسۇل (13- نۇسخە)لارغا 3 مىسقال ئۇستۇخۇددۇس قوشۇپ كۈندە بىر قېتىمدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئاغرىق ياش بولسا بۇ چارىدىن كېيىن ئۇشدارى ساددە (21- نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) زەيتۇن يېغى: ئاقىرقەرھە، قۇندۇز قەرلەرنى بەراۋەر مىقداردا ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تىترەپ تۇرغان ئەزاغا سۇرتىلىدۇ.

ساراڭلىق (جۇنۇن)

سەۋىيى: ماددىلارنىڭ كويگەنلىكىدىن پەيدا بولىدۇ. ماددىلارنىڭ كويۇش بىلەن مىڭىگە ھەرخىل بۇخاراتلار توپلىشىپ، تۇرلۇك ئالامەتلەرنى بېرىدۇ، ساراڭلىق كېسىلى بۇخىل ئالامەتلەرگە قاراپ 14 تۈرگە بۆلىنىدۇ. ئۇلاردىن ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى دائىم تېرىكىپ تۇرىدىغان، ئۇرۇشقاق بولغىنى "مانيا" دەپ ئاتىلىدۇ. ئادەم ئولتۇرۇشكە قەست قىلغۇدەك دەرىجىدىكىلىرى "جۇنۇنى قاتىل"، ئۆزىنىڭ يېقىن كىشىلىرى، يولدىشى، ئاتا-ئانىلىرىدىن قاچىدىغانلىرى "جۇنۇنى نەپسا"، ئاشىق بولۇپ قېلىپ ساراڭ بولغانلار "جۇنۇنى ئىشقى" دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن روھى ھالەتتىن تاشقىرى، قايىسى خىلىتتىن كېلىپ چىققان بولسا شۇ خىلىتنىڭ ئالامەتلىرى بولىدۇ. مەسىلەن، سەپرانىڭ كويۇشىدىن بولغان جۇنۇندا ئاغرىقنىڭ ئوزى ئورۇق، رەڭگى قارا كېلىدۇ. قاننىڭ كويۇشى ۋە ئىسسىقلىقتىن بولغان جۇنۇندا كېسەلنىڭ يۈزى ۋە كۆزىنىڭ ئىچى قىزىل بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىسىغا قاراپ ئاۋال شۇ ماددىنى

پېشۇرىدىغان، ئاندىن ئۇنى سۇرۇپ تازىلايدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن يۈرەك ۋە مىڭنى كۈچلەندۈر-گۈچى دورىلار ياكى مۇفەررىھى ياقۇتى (9-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مالخوليا

بەھۇدە كۆپ ئويلاش، ئورۇنسىز خىيال ۋە گۇ-مانلارنى قىلىش، سەۋەپسىز غەم-ئەندىشە ئىچىدە ياشاپ توغرا پىكىردىن يىراقلىشىشتەك كېسەللىك ئالامەتلىرى بىلەن ئوتىدىغان بىرخىل روھى كېسەللىك. **سەۋەبى:** غەيرى تەبىئى سەۋدا (كويگەن سەۋدا) نىڭ بۇخاراتلىرى مىڭگە ئۆرلەپ چىقىش، ياكى تەبىئى سەۋدانىڭ ئېتىدالدىن (نورمىدىن) ئېشىپ كېتىشى ۋە بەلغەم ماددىسىنىڭ غەيرى تەبىئى ھالدا سەۋدا بىلەن بىرىكىشىدىن پەيدا بولىدىغان بۇخاراتلارنىڭ مىڭگە ئۆرلەپ چىقىشى بۇ كېسەلگە سەۋەپچى بولىدۇ. يەنە سەۋدانى كۆپەيتىدىغان يىمەكلىكلەر مەسىلەن، تۈزلىغان بېلىق، جەيزىلەرنى كۆپ يىيىش؛ قۇرۇق مىزاجنىڭ ئېشىپ كېتىشى؛ ئاياللاردا ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى ۋە باشقىلارمۇ بۇ كېسەلگە سەۋەپچى بولىشى مۇمكىن. **ئالامەتلىرى:** كۆرسىتىلگەن روھى ئالامەتلىرىدىن باشقا، خىلىتلارنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ توۋەندىكى بىر قانچە ئالامەتلەرمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

(1) ئومۇمەن تومۇر ھەركىتى قاتتىق ۋە مۇختە-

لىپ بولىدۇ، سۇيىدۇك قارامتۇل بولۇپ، قايسى خىلىت
كوپ بولسا شۇنىڭ رەڭگىگە مايىل كېلىدۇ. مەسىلەن، قان-
دىن بولسا قىزىلغا مايىل قارا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ.
داۋاسى: (1) ئالدى بىلەن مەيلى قايسى ماددە-
نىڭ كويىگە نىلگى سەۋەپ بولسا قان ئېلىش كېرەك.
قان ئوكھەل ياكى باسلىق تومۇرىدىن ئېلىنىدۇ. ئايال-
لاردا ھېمىزنىڭ توختاپ قالغانلىقى بىلىنسىە ساقىن
تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم.

(2) ماددىنى پىشۇرغۇچى دورىلار — بىنەپشە، نىلۇ-
فەر، گازىۋان ھەربىرى 3 مىسقالدىن، چىلان، سەرىپس-
تان 7 دانىدىن، ناۋات بىرسەر ئېلىپ ئۇلارنى دەملەپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر ماددا مۇرەككەپ بولسا مەۋجۇت
ماددىلارنى پىشۇرغۇچىسى بېرىلىدۇ.

(3) مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن
بەدەن تازىلىنىدۇ.

(4) داۋائىلىمۇشكى (22 - نۇسخە) ياكى نۇش-
دارى لۇئىلەۋى (8 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(5) سەۋدا ئالامەتلىرى ئېغىرراق بولسا خېمىرى
ئەبىرىشم (23 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

**ئاياللارنىڭ تۇتقاقلىق كېسىلى (ئېھتىناقى رەھىم -
ھىستېرىيە)**

ئاياللاردا تارتىشىش ۋە بەھۇشلۇق ئالامەتلىرى
بىلەن ئوتىدىغان تۇتقاقلىق كېسەل بولۇپ، دوختۇرلار

ھىستېرىيە دەپ ئاتايدۇ. بالىياتقۇدىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ مىڭە ۋە يۈرەككە تەسىر بېرىشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. **سەۋىيى:** بالىياتقۇدا ئوفۇنەت توپلىشىپ زەھەرلىك كەيپىياتقا ئايلىنىپ مىڭە ۋە يۈرەككە ئورلەيدۇ. (2) ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى، بالىياتقۇنىڭ بوغۇلۇپ قېلىشى تۈپەيلىدىن بۇ كېسەل كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەل تۇتۇش ۋاقتى يېقىنلاشقاندا كېسەل قوساق ساھەسىنى دوۋىسۇندىن تارتىپ يۈرەك تەرىپىگە قاراپ ئىختىيارسىز ئۇۋىلاشقا باشلايدۇ، زېھنى ئېلىشىدۇ، بۇزۇق خىياللارنى قىلىدۇ، بېشى ئاغرىپ كوزى قاراڭغۇلىشىدۇ، رەڭگى توپىرەڭ بولۇپ پۇتۇن بەدەنلىرى بوشىشىپ كېتىدۇ، كوزى ياشاڭغۇرايدۇ. شۇنىڭ بىلەن يېقىلىپ ھۇشسىزلىق پەيدا بولىدۇ. ھەركەت ۋە ئاۋاز توختايدۇ. ئادەتتىكى تۇتقاق كېسەلدىن پەرقى شۇكى بۇ كېسەلدە ھىس پۇتۇنلەي يوقالمايدۇ. تۇتقاق كېسىلىدە پۇتۇنلەي يوقىلىدۇ. ئاغ-زىدىن كۆپۈك كېلىدۇ. ئېھتىناقى رەھىمدە ئېغىزىدىن كۆپۈك كەلمەيدۇ.

داۋالاش: كېسەل تۇتۇشنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن ھامان قول-پۇتلىرىنى باغلاپ راسا ئۆگۈلەش لازىم. قىچا، نەمەكى ھىندىنى ئىسسىق سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قول-پۇتلىرىنى يۇيۇش لازىم. (2) بۇرۇنغا سېسىق پۇراقلىق دورىلار مەسىلەن،

جاۋشەر، ھىڭ، يۇڭلارنى كويدۇرۇپ پۇرۇتۇش، كىندىك ئاستىغا، يوتىغا لوڭقا قويۇش كېرەك.

(3) خۇشپۇراقلىق دورىلارنى مەسىلەن، ئىپار، ئەنپەر، ئادراسمانلارنى كويدۇرۇپ جىنسى يولغا دۇت بېرىش ياكى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ جىنسى يوچۇق ئىچىگە سۈركەش لازىم.

(4) ھېيز توختاپ قېلىش سەۋەبىدىن بولسا پەر- پىمون، پىلىپىللەرنى جىنسى يولغا كىرگۈزۈش دەرھال نەتىجە بېرىدۇ.

(5) ھۇشىغا كەلگەندىن كېيىن ھەببى ئىستەم- خىقون (11- نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (16- نۇسخە) بىلەن بەدەننى تازىلاپ بولۇپ مەجۇنى مەش- دىرتۇس (23- نۇسخە) بېرىلىدۇ. داۋاملىق تۈردە ھەپتىدە بىر قېتىم ھەببى ئايارەج، بىركۈندىن كېيىن مەجۇنى نۇجاھ (19- نۇسخە) بېرىپ تۇرۇش كېرەك. ئەگەر مىزاجى ئىسسىق تەرەپتە بولسا (قىزىتمىسى بار)، يۈزى قىزىل، بېشى ئېغىر بولسا يۇقۇرقىدەك ئىسسىقلىق دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەل ھۇشىغا كەل- گەندىن كېيىن باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20- نۇسخە) بېرىلىشى شەرت. جىنسى تەلەپنى پەسەيتىدىغان دورىلارنى مەسىلەن، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى، نىلۇفەر شەرۋىتى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ھېمىز توختاپ قالغان بولسا ئىلاجىنى قىلىش كې- رەك. كېسەل تۇتۇش ئالدىدا كافۇر، سەندەل پۇرۇتۇش لازىم.

مالخۇلىيالىق مەراقى

ئىسسىق تەبىئەتلىك كويگەن خىلىتلارنىڭ مەئىدە، تال ۋە چاۋا قان تومۇرلىرى (ماسارىقا) قاتارلىق ئىچكى ئەزالاردا بۇس-بۇخارات ھاسىل قىلىپ مېڭە ۋە يۈرەككە تەسىر بېرىشى نەتىجىسىدە پەيدا بولىدىغان كېسەل بولۇپ، مالخۇلىيانىڭ بىر خىلىدۇر.

سەۋەبى: خىلىتلارنىڭ كويگەن قىسمى مەئىدە ئاستىغا چۆكۈپ مەئىدە ياللۇغلىنىش (ۋە رەم) پەيدا قىلىدۇ؛ ماسارىقا يوللىرىغا چۆكۈپ توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ؛ كويۇك خىلىت تالدا ياللۇغلىنىش بېرىدۇ؛ قوساق پەردەسىگە چۈشۈپ بۇنىڭدىمۇ ياللۇغلىنىش پەيدا قىلىدۇ. بۇ ياللۇغلىنىشلاردا ھاسىل بولغان بۇس-بۇخاراتلار مېڭە ۋە يۈرەككە ئورلىيدۇ.

ئالامەتلىرى: مالخۇلىيادىكى روھى ئالامەتلەر بولغاندىن تاشقىرى، يەنە توۋەندىكى ئالامەتدە بەلگىلىرى بولىدۇ: (1) مەئىدە ۋە قوساق ئاغرىيدۇ، قاتتىق ئېچىشىدۇ. ئېغىزدىن كۆپۈك كېلىپ ئاچچىق كىكىرىدۇ، كىكىرىك خۇددى ئىسقا ئوخشاش پۇرايدۇ. يالغان ئىشتەي پەيدا بولىدۇ، كۆپ يېمىمۇ ئورۇق بولىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئۆزىگە قوساقتىن مېڭە تەرەپكە قانداقتۇ بىر سېسىق بۇس ئورلەپ كېتىۋاتقانلىقى سېزىلىپ، كارىيلىرى ئېچىشىپ بىر نەرسە تاتىلغاندەك بولىدۇ. تال چوڭ بولۇپ، تەرتىپ سۇيۇق كېلىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر شەرت ھازىر بولسا 40 كۈندە بىر

قېتىم قان ئېلىش، ئاغرىقنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ قان ئېلىش
مقدارىنى بەلگىلەش كېرەك. قان باسلىق تومۇرىدىن ئېلىندۇ.
دۇ، گازېۋان، ئىلۇفەر، كاسىن ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، تەرەزە-
جىۋىللەرنى ناۋات بىلەن قوشۇپ بېرىدۇ. شەرۋىتى بىنەپشە
(2-نۇسخە) بېرىلىدۇ. باشقا دورىلار مالىخۇلىياغا ئوخشاش.

قارا بېسىش (كابۇس)

كېسەل كىشى ئۇخلاۋېتىپ دائىم قورقۇپ ئويغىنىپ
كېتىدۇ. چۈشىدە ئاغرىقنى ئېغىر بىر نەرسە
بېسىۋالغاندەك تۇيۇلىدۇ، نەپەس قىسىلىدۇ، مىدىرلاشقا
قانچە ھەركەت قىلىسمۇ مۇمكىن بولمايدۇ. ۋاقىرىسا
ئاۋازى چىقماي بوغۇلۇپ قالىدۇ. كېسەل ئاران ئويغىنىدۇ.
خېلى ۋاقىتقىچە ئۆزىگە كەلمەي تۇرىدۇ. قارا بېسىش
تەرەققى قىلسا تۇتقاق كېسەلگە ئۆزگىرىشى مۇمكىن.

سەۋەبى: قان يوللىرىدا پەيدا بولغان نامۇۋاپىق
خىلىتلارنىڭ بۇخاراتى مىڭىگە ئورلەيدۇ. كېسەل
ئۇخلىغاندا بۇ بۇخاراتلار مىڭىگە ئالدىنقى قىسمىغا
توپلىشىپ مىڭىنى قورشىۋالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ھاياتلىق
كۈچى سىقىلىپ پۈتۈن بەدەندە غەيرى بىر ئەھۋال
ھىس قىلدۇرىدۇ. بۇخاراتلارنىڭ خاراكىتىگە قاراپ
قارا بېسىش قاندىن، بەلغەمدىن ۋە سەۋدادىن بولغان
دەپ 3 كە بولىنىدۇ.

(1) بۇخارات قاندىن كەلگەن بولسا بەدىنى ۋە
كوزى قىزارغان ھالدا بولىدۇ. ئاغرىق چۈشىدىمۇ

كوز ئالدىدا بىر خىل قىزىللىق كورگەندەك بولىدۇ.

(2) بەلغەمدىن بولسا چىرايى ئاق، روھى توۋەن، بېشى ئېغىر بولىدۇ. ئاغزىدىن كوپۇك كېلىدۇ.

(3) سەۋدادىن بولغان بولسا ئادەتتىكى چاغلاردا

روھى بەلگىلەر كورلىدۇ. مەسىلەن، ئاچچىغى يامان،

تولا ئويلايدىغان بولۇپ، بەدىنى قارا، ئوزى ئورۇق بولىدۇ.

داۋاسى: كېسەلنىڭ ماددىسىغا قاراپ تەدبىر

قىلىش كېرەك؛ مەسىلەن، قاندىن بولغان كېسەللەرگە

قاننى تازىلايدىغان دورىلارنى بېرىش ئاياق تەرەپلىرىگە

ھىجامەت قويۇش لازىم.

بەلغەمدىن بولغانلارغا ئالدى بىلەن قەي قىلدۇ.

رۇپ ۋە بۇرۇنغا چۈشكۈرتكۈچى دورىلار تارتتۇرىلىدۇ.

قەي قىلدۇرۇش ئۈچۈن سېرىق چىچەك، تۇرۇپ ئۇرۇ.

غىنى قاينىتىپ ھەسەل بىلەن قوشۇپ بېرىلسە قۇسىدۇ.

سەۋدادىن بولغانلارغا مەتبۇخى ئىپتىمۇن (20-

نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ چارىلاردىن كېيىن ئاغرىقلارغا

ئايارەج پەيقارا ياكى ھەبىي قوقىيا بېرىلىدۇ (17- 16-

نۇسخىلارغا قاراڭ).

پالەچ ۋە ئىستىرخا

بەدەندىكى مەلۇم ئەزانىڭ ھەركىتى ۋە سېزىش

قابىلىيىتى چەكلىنىپ قالغان ياكى پۇتۇنلىرى دەخلىگە

ئۇچرىغان كېسەللىكنى پالەچ ۋە ئىستىرخا دەپ ئېيتىلە.

دۇ. بەزى كىشىلەر پالەچ بىلەن ئىستىرخانى ئايرىمايدۇ.

ئەمما يېقىنقى زامان تىۋىپلىرى گەۋدىنىڭ يېرىمى
باشتىن ئاخىرىغىچە ھەركەتلىنەلمەس بولۇپ قېلىشنى
”پالەچ“، ئومۇمىي بەدەننىڭ پۈتۈنلەي پالەچ بولۇپ
قېلىشنى ئىستىرخا دەپ قارايدۇ.

كېسەللىك باشلانغاندىن كېيىن، بەزى كىشىلەردە
سېزىم مەۋجۇت بولۇپ، ھەركەت دەخلىگە ئۇچرىشى
مۇمكىن. بەزىلەردە ھەرىكەتسىز بىردەك دەخلىگە ئۇچ-
رىشى ئېھتىمال. ئالدىنقىسى مىڭىگە چۈشكەن قان سەزگۈ
مەركىزىنى بېسىپ قالماي، ھەركەت مەركىزىنى بېسىپ
قالغانلىق نەتىجىسى، كېيىنكىسى بولسا ھەر ئىككى
مەركەز بىردەك بېسىلىپ قالغانلىق نەتىجىسىدۇر.

سەۋەبى: پالەچلىك ئاساسەن مىڭە بوشلۇقلىرىغا قان
چۇشۇپ، مەلۇم سېزىم مەركىزى ۋە ھەركەت مەركىزىنى
بېسىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. چۈشكەن قاننىڭ ئاز-
كۆپلىكى، بېسىلغان دائىرىدىكى مەركەزلەرنىڭ ئاز-
كۆپلىكى، ئاغرىقنىڭ ئەسلىدىكى سالامەتلىك ۋە چېنىقىش
ئەھۋاللىرى كېسەللىكنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى، ساقىيىش
ئاقىۋىتى قاتارلىقلارغا زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

مىڭىگە قان چۇشۇپ ئەسەپلەرنىڭ سېزىم ۋە
ھەركەتنى باشقۇرۇش قابىلىيىتىنى توسۇپ قويىشىدىن
تاشقىرى، يۇلۇننىڭ زەخمىگە ئۇچرىشى، ھەر خىل
ۋەزەم، ئىششىقلارنىڭ يۇلۇننى قىستاپ بېسىپ قويىشى،
مەلۇم ئەزالارنى باشقۇرىدىغان ئەسەپلەرنىڭ مەلۇم

تەسىراتقا ئۇچرىشىمۇ بەلگىلىك ئەزا دا پالەچلىك كەلتۈر-
رۇپ چىقىرىدۇ (مەسىلەن، يۇتقۇنچاق، تىل، ئىنچىكە
ئۇچەي، قول بارماقلىرىنىڭ چەكلىك دائىرىلىك
پالەچلىنىشلىرىغا ئوخشاش).

ئالامەتلىرى: پالەچ ھوللۇكتىن بولغاندا ئاستا
باشلىنىدۇ. تومۇر ئاستا سۇس ياكى مۇتەفەۋۋەتلىك
بولىدۇ. ئېغىر تۇرلىرىدە تومۇر تېز، ئىنچىكە ۋە
مۇتەۋاتىر بولىدۇ. سۇيىدۇك قايسى ماددىنىڭ — بەلغەم
ۋە قاننىڭ غالىپلىغىغا قاراپ ئاق ياكى قىزىل كېلىدۇ.
بەدەننىڭ پالەچلەنگەن قىسمى ئۆز رەڭگىنى
يوقاتىمىسا ۋە “ئورۇقلاپ” (يىگىدەپ) كەتمىسە داۋالاش
ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

سەۋەپلىرىگە قاراپ پالەچلىك ۋە ئىستىرخا
توۋەندىكى تۈرلەرگە بولىنىدۇ.

(1) ئومۇمى پالەچلىك (ئىستىرخا) — پۇتۇن
بەدەننىڭ ھەركەت ۋە ھىسسىنىڭ بولماسلىقى.

(2) يېرىم پالەچ — بەدەننىڭ يېرىمى يەنى بىر
تەرەپ يۈز، ئېغىز، قول-پۇنلارنىڭ پالەچ بولۇپ قې-
لىشى.

(3) لەقۇا — پالەچلىككە پەي ۋە گۆشنىڭ تارتىش-
ۋېلىشى قوشۇلۇپ كېلىش نەتىجىسىدە يۈز گۆشنىڭ
پالەچلىنىپ قېلىشى. بۇنداقتا توۋەندىكىدەك ئالامەتلەر
كورۇلىدۇ: يۈز بىر تەرەپكە مايماقلىشىپ قالىدۇ؛ ئەس -

ھۇشى جايىدا بولىدۇ. ئاغزى تەم سېزەلمەيدۇ، توۋەنكى قاپاقلىرى ساڭگىلاپ قالىدۇ، پىشانە تېرىسى قورۇقلىشىدۇ، ئېغىز سۈيى قۇرۇپ قالىدۇ. يۈز گۈشلىرىنىڭ تارتىشىۋېلىشى تەشەننۇجنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالغان. لىقلىرى پالەچلىك ئالامىتىدۇر.

(4) بەل ئاستىنىقى قىسمىنىڭ پالچى — مىڭە ۋە يۇلۇنغا زەرەر يەتكەندە ياكى ئاتىشەك (سېفىلىس) كېسىلىدە ۋە جىنىسى ئالاقە بىلەن زىيادە شۇغۇللانغۇچى كىشىلەردە يۈز بېرىشى مۇمكىن. دەسلەپتە بەل ئاغرىش، ئاياقلار ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىق باشلامچى بەلگىلەر بولۇپ، تۇيۇقسىزلا ياكى تەدرىجى ھالدا سېزىم ۋە ھەركەت يوقىلىدۇ. دوۋساق پالەچلەنگەنلىكتىن سۇيىدۇكىنى تۇتالماي دائىم تامچىلاپ ئېقىپ تۇرىدۇ.

(5) تىترەپ تۇرىدىغان پالەچلىك (پالچى رەئەشى). پالەچلەنگەن ئەزا (بولۇپمۇ قول) تىترەپ تۇرىدۇ. ئاياللاردا خۇسۇسەن ھاراقنى كۆپ ئىچكۈچىلەردە كۆرۈلىدۇ، كېسەللىك ئاستا باشلىنىدۇ، دەسلەپ تىترەش كېلىپ چىقىپ، كېيىن سەزمەس بولۇپ قالىدۇ، ھەتتا مۇنداق تىترەش ئۇخلاۋاتقاندىمۇ داۋاملىشىدۇ.

(6) بالىلار پالچى (پالچى ئەتغال) — بالىلاردا ھەرخىل ياشتا ئۇچرىشى مۇمكىن، ئەمما بىرۋاقلاردا كۆپرەك يۈز بېرىدۇ. ئاغرىق باشلىنىشتىن بۇرۇن زۇكام

بەلگىلىرى ئاشقازان بۇزۇلغانلىق ئالامەتلىرى كورۇلۇپ، بەدەنگە تاشىملار چىقىشى مۇمكىن. بەزىدە قىزىل، چېم-چەك كېسەللىرىدىن كېيىنلا يۈز بېرىدۇ. كېسەللىك تۇ-يۇقسىز باشلىنىپ بالا ماڭالماي قالىدۇ، ئومۇمى بەدەن-لىك بولغاندا ھەتتا بالا بويىنىنى تىكلىيەلمەي قالىدۇ.

داۋاسى: پالەچ ۋە ئىستىرخانى داۋالاشتا ئالدى-راپلا تېز تەسىر قىلغۇچى تەدبىرلەرنى قوللانغىلى بول-مايدۇ. ئالدى بىلەن سەۋەپچى ماددا قان ۋە بەلغەمنى پىشۇرۇشقا كىرىشىش كېرەك.

(1) مائىل ئۇسول (24 - نۇسخە) ماددا پىشۇرۇشقا بېرىلىدۇ.

(2) ماددا پىشقاندا تازىلاش ئۈچۈن ئاي-ارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىش كېرەك.

(3) مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن مەجۇنى فىلاسپە (18 - نۇسخە)، ھەببى ئاي-ارەج (7 - نۇسخە)، مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە)، ھەببى جەدۋار (26 - نۇسخە)، ھەببى پەرىپىيۇن (28 - نۇسخە)، ھەببى مەنتىن (27 - نۇسخە) قاتارلىق دورىلارنىڭ بىرىنى تاللاپ بېرىشكە بول-لىدۇ. ئەڭ ياخشىسى 25 ۋە 29 - نۇسخىلاردىكى دورى-لارنى بېرىش كېرەك.

(4) پىشقەدەم تىۋىپلار مەشدىرتۇسنى ھەر كۈن-دە بىر مىسقالدىن بېرىپ تۇرۇش، ئاي-ارەج پەيقارانى 5 كۈنگىچە بېرىش كېرەك دەپ كۆرسەتكەن. بەزىلەر

ھەر كۈنى بىر مىسقال ئايارەج پەيقاراغا قارىمۇچ، قۇندۇز قەرى قوشۇپ بېرىشنى كورسىتىدۇ. بەزىلەر ھەپتىدە بىر قېتىم ھەببى قوقيا بىلەن سۈرگە بېرىش كېرەك دەيدۇ. كېسەلنىڭ ئەمىلىي ئەھۋالىغا قاراپ بەل-گىلەش مۇۋاپىقدۇر.

(5) سامساق، ئۇزۇم، ياڭاق جويۇز، پىلىپىل، قار-مۇچلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ. تۇخۇمغا بىر ئاز بوز بوغا ئارىلاشتۇرۇپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. قۇشقاچ گوشى كاۋاپ قىلىپ بېرىلىدۇ. (6) ئەگەر كېسەلنىڭ ئەھۋالى مەنئى قىلمىسا قان ئېلىشنى ئويلاپ بېقىش كېرەك.

(7) پالەچلەنگەن ئەزاغا ئازىراق تاتلىق شىرىلىك سۇيۇقلۇقنى يۇقتۇرۇپ ھەرگە چاقتۇرۇلسا، ھەرە زەھىرىنىڭ تەسىرى بىلەن ھەركەتكە كېلىشى مۇمكىن. شۇنىڭدەك قۇستە يېغى (30 - نۇسخە) بىلەن ياغلاش ۋە ئىسسىق ئوت-كۈزۈپ ياغنى سىڭدۇرۇپ بېرىش كېرەك.

ئەسەپ (نېرۋا) ئاجىزلىغى (زەئىپىل ئەسەپ)

ئۇزاق مۇددەت ئەسەپلەرنى غىدىغلايدىغان، ھالسىز-لاندۇرىدىغان سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدىغان كېسەللىك بولۇپ، بەزىلەر ئۇنى مالىخۇلىيا كېسەللىكىنىڭ بىر تۈرى دەپ ھىساپلايدۇ.

سەۋىيى: ئەسەپ ئاجىزلىغىنىڭ سەۋەپلىرى كۆپ ۋە خىلمۇ-خىلدۇر. ئۇلاردىن مۇھىمىرەكلىرى تۆۋەندى-

كېلەردىن ئىبارەت: (1) ئەجدادى زەئىپرەك بولغان كە-
 شىلەرنىڭ ئەۋلاتلىرى بۇ كېسەلگە ئوڭايلا دۇچار بولە-
 دۇ. شۇنىڭدەك نازۇك تەبىئەتلىك (ئىككىنچىكە مىزاجلىق)
 ۋە تېنى ئاجىز كىشىلەرمۇ بۇنىڭغا مايىل كېلىدۇ. (2)
 جەۋرى - جاپا، روھى غىمىدىغىلىنىشلارغا كۆپ ئۇچراش؛
 (3) ئەقلى ئەمگەكلەر بىلەن ئۇزاق شۇغۇللىنىش؛ (4)
 مىڭىنى ئارتۇقچە ئىشلىتىش؛ (5) ھاراق ۋە زەھەرلىك
 چېكىملىكلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش؛ (6) قەھۋە (كافى)
 نى زىيادە ئىچىپ يۈرۈش؛ (7) خەتەرلىك ئورۇنلاردا
 (كان ئىچى، قۇدۇق ئىچى ۋە يۇقۇرى ئىسمارەت قۇرۇ-
 لۇشىدا) دائىملىق ئەندىشە ئىچىدە ئىشلەش؛ (8) يۇقۇرى
 قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر ۋە ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئاغرىق-
 لار بىلەن ئۇزاق ئاغرىش؛ (9) مەندە، جىگەر، ئۈچەي
 ئاغرىقلىرى نەتىجىسىدە مىڭە ئاجىزلىشىش؛ (10) جىن-
 سى ئالاقە بىلەن ھەددىدىن زىيادە شۇغۇللىنىش؛
 ياكى ئۇزاققىچە جىنسى ئالاقىنى تەلەپ قانماسلىق.

ئالامەتلىرى: ئاغرىق كىشى روھسىز، خەپالچان،
 چىرايى سېرىق بولىدۇ، ئۇخلىمايدۇ، ئۇخلىسىمۇ
 كۆپ چۈش كۆرۈپ ھارغىن ھالەتتە ئۇيغىنىدۇ، ئادەم
 كۆپ جايلاردا تۇرۇشتىن قاچىدۇ، ياغۇزلۇقنى خالايدۇ،
 كۆڭلى ئېلىشىدۇ، ئىشتىي تۇتۇلۇپ ئورۇقلايدۇ. پىكىر
 قىلىش، ئەستە قالدۇرۇش قابىلىيەتلىرى تۈۋەنلەيدۇ. ئەزلەردە
 باھنىڭ ئاجىزلىشىشى، سۇيۇقلۇققا ئوخشاش ئەھۋاللارمۇ
 قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋالاش: سەۋەپچى بولغان ئامىللارنى يوقتىشقا ھەركەت قىلىش، ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىش، مۇۋاپىق جىسمانى ئەمگەك، تەنتەربىيە بىلەن چېنىقىش كېرەك. شۇنىڭدەك توۋەندىكى دورىلارنى بېرىش، ئىمكانىيەت بولسا دورىلارنىڭ بىرقانچىسىنى بىرلىكتە بېرىش لازىم. چۈنكى مۇنداقلا ئۇنۇمى تېزىرەك كورۇنىدۇ.

دورىلار: خەمىرى گازېۋان (2 - 3 - نۇسخە)، خەمىرى ئەۋرىشم (23 - نۇسخە)، داۋائىلىمۇشكى (22 - نۇسخە)، لۇبۇبى كەبىر (2 - نۇسخە)، بۇلاردىن ئەڭ ياخشى تەسىر قىلىدىغىنى 32 - نۇسخىدىكى خەمىرى گازېۋاندۇر.

تارتىشىپ قېلىش (تەشەننۇج)

مەلۇم بىر ئەزا ياكى پۇتۇن بەدەن پەيلىرىنىڭ تارتىۋېلىشى ۋە گۈشلەرنىڭ تارتىشىپ يىغىلىپ قېلىشىنى تارتىشىش (تەشەننۇج) دېيىلىدۇ.

سەۋىيى: 1. بەدەندە نەملىكنىڭ ئارتۇق بولىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، بەلغەم، سەۋدا ماددىلىرىنىڭ كەڭ تارتمۇش، پەيلەرگە توپلىشىپ ئۇلارنىڭ ئۇزىراپ - قىسقىرىش قابىلىيىتىنى چەكلەپ قويدۇ. ئەگەر ماددا قويۇق بولسا تارتىشىش بىلەن ئىستىرخا (پەلەچلىك) بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. قان ۋە سەپرالارمۇ تارتمۇشلاردا يۇقۇر - قىدەك ئوزگىرىشلەرنى كەلتۈرۈشى مۇمكىن.

2. قىزىتما ھارارىتى بىلەن پەيلەردىكى ماددىلار كويىدۇ. نەتىجىدە پەيلەر قىسقىرايدۇ. ياكى ھارارەتنىڭ

زىيادە بولۇشى بىلەن بەدەن قۇرۇپ كېتىپ تارتىشىپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنى قۇرۇق تارتىشىش دىيىلىدۇ.

3. سۈرگە دورىلارنى كوپ ئىچىپ ھەددىدىن زىيادە ئىچ سۇرۇپ كەتكەندە ياكى كوپ قان ئالغاندىمۇ تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

4. مىڭگە زەرەر يەتكەندە ياكى تارمۇشلارغا بىۋاستە زەرەر يەتكەندىمۇ تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇ تۈۋەندىكى بىر نەچچە خىلغا بولىنىدۇ:

(1) ھەر خىل زەھەرلىك نەرسىلەر ياكى دورىلار مەسىلەن، ئۇيۇن، زاڭگار قاتارلىقلار بىلەن زەھەرلىنىش مىڭگە تەسىر بېرىپ پۈتۈن بەدەن تارتىشىپ قالىدۇ.

(2) پەيلەرگە سىرتتىن سوغاق تېگىش ياكى ئىچكى تەرەپتىن بولغان سوغاقلىقنىڭ پەيلەرگە تەسىر قىلىشىدىن بولىدۇ.

(3) زەھەرلىك ھاشارەتلەر (مەسىلەن، چاپان قاتارلىقلار) نىڭ چېقىشى بىلەن بەدەندە تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

(4) قوساقنىڭ مەدە قۇرۇتلارمۇ تارتىشىشقا سەۋەپ بولىدۇ.

(5) ئوت سەپراسى مەئىدە غەيرى تەبىئى ئۈزگە-رپ قاتتىق ئېچىشىش پەيدا قىلىدۇ. نەتىجىدە مەئىدىنىڭ ئۈزىدە تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ. ئېغىر ھاللاردا بەدەندىمۇ تارتىشىش پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن، ۋابا كېسىلىدە پاقالچەك ۋە بىلەك گۈشلىرى تارتىشىپ قالىدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەلنىڭ باشلىنىشى ئادەتتە تېز بولىدۇ. ئالدى بىلەن ئەسەك تۇتىدۇ. پىشقەدەم تىۋىپلار "ئەسەش گەجگە گۈشلىرىنىڭ تارتىشىش ئالامەتلىرىدۇر." دەپ كورسىتىدۇ. كېسەل بۇ ۋاقىتتا بىئاراملىشىپ، قايسى خىلىت كۆپ بولسا شۇ خىلىتنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى كۆرۈنىدۇ. مەسىلەن، بەلغەمدىن بولسا رەڭگى ئاق، ھورۇن، ئېغىر تەبىئەتلىك بولۇپ تومۇرى تېغرىسىغا سالىدۇ. سۇيۇق ئاق قويۇق بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاغرىق تۇيۇقسىزدىن تارتىشىپ قالىدۇ. ئېغىر ھالەتتە ھۇشىدىن كېتىدۇ. كىچىك بالىلار ۋە قېرى كىشىلەرنىڭ ساقىيىشى قىيىن.

نەملىك سۇيۇقلۇق يوقىلىش بىلەن بولغان تارتىشىشتا بەدەنلىرى قۇرۇق، رەڭگى تاتارغان ھالدا بولىدۇ. كۆپ سۇيۇقلۇق يوقىتىشتىن تارتىشىپ قالغان ئاغرىقنىڭ تارتىشقان قىسمىغا ياغ ياكى سۇت سۈركەپ قويۇلسا دەرھال قۇرۇپ كېتىدۇ. ئەمما باشقا تۈردىكىلەردە ئۇنداق بولمايدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋەپلەرگە قارىتا چارە قىلىش، ماددىلارنى پىشمۇرۇش ۋە تازىلاش تەرتىپلىرىگە ئاساسەن داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

(1) بەلغەمدىن بولغان تارتىشىشتا مائىل ئۇسۇلنى كۆلگەن بىلەن بېرىپ، تازىلاش ئۈچۈن ئايپارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) ياكى ھەببى قوقىيا (17 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

تازىلىغاندىن كېيىن قۇست يېغى (30 - نۇسخە) بىلەن ئەزالارنى ياغلاش كېرەك. سەۋدادىن بولغانلارغا تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) ياكى 14 - نۇسخە بېرىلىدۇ.

(2) سۈرگىدىن كېيىنكى تارتىشىشتا، ئالدى بىلەن بەدەنگە ھوللىك يەتكۈزۈش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىشەك سۈتى، ئۈچكە سۈتى، ئارپا سۈتى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇ-ئابىنى ئارىلاشتۇرۇپ بەدەنگە سۈركەش بىلەن، ئىچىشكە شەرۋىتى بىنەپشە (2 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاماققا ئوغلاق گوشى، پالەك قاتارلىق كوكتاتلارنى بادام يېغى بىلەن سىلە بېرىلىدۇ ۋە كۆپ مىقداردا سۇ بېرىلىدۇ.

(3) مىڭ ۋە ئەسەپلەرنىڭ زەرەلەنگەنلىگىدىن بولغانلارغا تۇتقاق كېسەل بابىدا كورسىتىلگەنلەر بويىچە چارە قىلىنىدۇ.

(4) زەھەرلىك ماددىلار ۋە مەئدە سەۋەبىدىن بولسا مەئدىنى تازىلاش (قەي قىلدۇرۇپ)، مەدە قۇرۇت-لار بولسا چۈشۈرۈشكە تەدبىر قىلىش لازىم.

گەردەن قېتىپ قېلىش (كۇزاز - تەمەددۇد)

بويۇن، گەردەن گوش ۋە پەيلەرنىڭ تارتىشىپ قېلىشى. سەۋىيى: (1) سوغاقللىقنىڭ پەيلەر ئارسىدىكى سۇيۇقلۇققا تەسىر قىلىشى بىلەن پەيلەر (تارمۇچلار)دا تارتىلىش ھادىسىسى ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. سوغاقللىقنىڭ تەسىرى تۈۋەندىكىچە بولىدۇ:

(ئا) سوغاقسۇ، قار، مۇزنىڭ بىۋاستە تەسىر قىلىشى ياكى سىرتتىن سوغاق تەبىئەتلىك دورىلارنى مەسىلەن، ئۇپيۇن، لۇپاھ يىلتىزى (بىللادۇننا يىلتىزى)، بەگگى دىۋانە قاتارلىقلارنى تېگىش، سوغاق (مۇزدەك) سۇ ئىچىش ياكى ئۇپيۇن يىمىش.

(2) سەرسام كېسىلى قاتارلىق يۇقۇملۇق كېسەللەردە ياكى باشقا كېسەللەردە قاتتىق ئاغرىش نەتىجىسىدە بويۇن پەيلىرى تارتىشىپ قالىدۇ. بۇ ھال كۆپىنچە قاتتىق قۇسۇستىن كېيىن ياكى ھايۋانلارنىڭ چىشلەشى بىلەن يۈز بېرىدۇ.

(3) قۇرۇقلۇقتىن بولىدۇ (قۇرۇقتىن بولغان تارتىشىشقا ئوخشاش).

ئالامەتلىرى: گەردەن قېتىپ قېلىشنىڭ ئوقىرەك ئالدى ۋە ئارقا تەرىپىدىن باشلىنىشى تەمەددۇد دىيىلىپ ئاغرىق پۇتۇن يېرىم گەۋدىسىنى ئالدىغا ياكى ئارقىسىغا مىدىرلىتىلمايدۇ. كۆزادە تارتىشىش بويۇن ۋە گال قىسمىدا بولۇپ ئاغرىق بويۇن قىسمىنى پەقەت ھەركەتلەندۈرەلمەيدۇ، ھەتتا تىلىنى مىدىرلىتىشمۇ قىيىن بولۇپ، گالدىن سۇمۇ ئوتىمەيدۇ. كۆزنىڭ باشلىنىشىدىن بۇرۇن پۇتۇن بەدەن قىچىشىدۇ. ھەرقانچە تاتىلغان بىلەنمۇ پەسەيمەيدۇ. كۆزى قىزىل بولۇپ كۆزنى بىر ئېچىپ بىر يۇمۇپ تۇرىدۇ. چېكە ۋە ماڭلاي تىزمۇرلىرى كۆپىيىپ بولىدۇ.

چىرايى قارا رەڭگە كىرىپ قالىدۇ. تەمەددۇد بولغاندا يۈز گۈشلىرىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى نەتىجىسىدە ئاغرىقنىڭ يۈزى ھىجايغاندەك قىياپەتكە كىرىپ قالىدۇ. تەمەددۇد سۇيدۇك خالىتىسى، ئۇچەي قاتارلىق ئەزالاردا يۈز بەرگەندە سۇيدۇك توختىماسلىق ھەتتا تومۇرلار ئۇ-زۇلۇپ كېتىشى بىلەن سۇيدۇكتە قان كېلىدۇ. ئۇچەيدە يۈز بەرسە قوللىنىجى يەنى ئۇچەي توسىلىش كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىنى پىشۇرۇش ئۇچۇن گۈل بە-
ئەپشە 1 مىسقال، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 9 دانە، ئارپا بېدد-
يان 3 مىسقال، گازىۋان، رۇمبېدىيان $\frac{1}{2}$ مىسقال، كا-
سىن يىلتىزى، سورۇنجان 2 مىسقالدىن ئېلىپ كاشكاپ
تەرىقىسىدە دەملەپ بېرىلىدۇ.

(2) تازىلاش ئۇچۇن — تۇربۇت $\frac{1}{2}$ مىسقال،
سانا 7 مىسقال، فۇنۇس، خىيارشەنبە رەبىرى 2
سەردىن، بادام مېغىزى 5 دانە ئېلىنىدۇ. توربۇت بە-
لەن بادام مېغىزى بىرئاز سوقىلىدۇ. قالغان دورىلارنى
سوقماستىن ئاخشىمى بىرچىنە قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ
ئەتىسى سىقىپ، سۇزۇپ بىراقلا ئىچىدۇ.

قوۋۇرغا ئارىلىق ئەسەپلىرىنىڭ ئاغرىشى
(ۋەجىئىل خاسرە)

سەۋەبى: ئاياللاردا ھېيىز توختاپ قېلىشى ياكى
بالياتقۇنىڭ بوغىلىشى سەۋەپ بولىدۇ. تۇتقاق كېسەلنىڭ

بىر ئالامىتى بولۇپمۇ كېلىدۇ. ئاساسەن قوۋۇرغا تەرەپكە بارغۇچى يۇلۇن ئەسەبلىرىنىڭ ياللۇغلىنىشى سەۋەپ بولىدۇ. **ئالامىتى:** ئاغرىش بەل ساھەسىدە كۆپ بولۇپ قوۋۇرغىلارغا تارىلىدۇ. بېسىپ تۇرسا ئارام بېرىدۇ. **داۋاسى:** مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (24 - نۇسخە)، ياغلاش ئۈچۈن قۇست يېغى (30 - نۇسخە)، يېپىشكە سەنجانىنا (33 - نۇسخە) ياكى 25 - نۇسخىدىكى دورا بېرىلىدۇ.

بەل ئاغرىغى (ۋەجىمىل قەتەن)

سەۋەبى: بەدەننىڭ زەئىپلىگى، ئېغىر ئەمگەك، سوغاق تېگىش، كۆپرەك ھۆللۈكتىن بولىدۇ. مۇپاسىلىنىڭ بەل ئۇمۇرتقىلىرىنى زەرەرلىشى بىلەنمۇ بەل ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەل تېز باشلىنىدۇ. بەلنىڭ ئاغرىشى بىلەن ئاغرىق ئورە تۇرالمايدۇ. ھەتتا ئولتارغاندىمۇ ئاغرىدۇ.

داۋاسى: (1) بەل ساھىسىنى ياغلاش ئۈچۈن قۇست يېغى ياكى قىچا يېغى بېرىلىدۇ. لوپان، مەستىكى 1 مىسقالدىن، ھەسەل، شېكەر 7 مىسقالدىن ئېلىپ، ئالدى بىلەن ھەسەلنى بىر ئاز قىزىتىپ باشقىلارنى ئېزىپ ئارىلاشتۇرۇپ بەلگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ ياكى لوپان، مەسەستىكى ۋە گۈل يېغىنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ ياغ تەييارلاپ ئاغرىق جايىنى ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

(2) يېيىشكە مەجۇن فىلاسپە (18 - نۇسخە) 3
مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەم زىيادە بولسا زىماد قىلىش ئۈچۈن
ئاق مومدىن 2 مىسقالنى 8 مىسقال گۈل يېغى بىلەن
ئېرىتىپ ياغلاشقا بېرىلىدۇ. بۇندىن كېيىن ئاق لەيلى
گۈلى، بابۇنە گۈلى، ئەكىلىل مىلىك، شۇمشا ئۇرۇغى،
زىغىر، ئارپا ئۇنىنىڭ ھەر بىرىدىن باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ سوقۇپ ئىنەك پىتى يېغى قوشۇپ بىر ئاز ئىسسىتىپ
ئاغرىق جايغا تېگىش لازىم.

(4) تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە)
بېرىلىپ، ئارقىدىن جاۋارش جالنىۋىس (3 - نۇسخە)
ياكى مەجۇنى فىلاسپە (18 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇلارنى
بىر سەر بېدىيان ئەرەقى بىلەن بېرىش لازىم. تازىلە -
غاندىن كېيىن ئىتتىرىپىل سەغىر (5 - نۇسخە) ۋە مەجۇنى
سورۇنجان (34 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

يانپاش ئاغرىقى (ئەرقۇنىنىسا)

ئەرقۇنىنىسا يانپاش بوغۇمىدىن باشلىنىپ پۈتۈن
پۇت ئەتراپىغا شاخلايدىغان كۆك تومۇرنىڭ ئىسمى
بولۇپ، ئەرقۇنىنىسا كېسىلى شۇ تومۇر ئەتراپىدىكى پەي
ۋە ئەسەپلەرنىڭ ئاغرىغىدۇر. ئاغرىش بەك قاتتىق بولۇپ
يانپاشتىن باشلىنىپ ئۇشۇق ۋە پۇت بارماقلىرىغىچە
تارقىلىدۇ.

سەۋىيى: (1) ھەركەت قىلماسلىق نەتىجىسىدە

بوغۇملارغا كېرەكسىز سۇيۇقلۇقلار يىغىلىدۇ. (2) مەئدە -
 نىڭ ھەزىم قىلىشى ناچار بولغاندا خىلىتلار خام قېلىپ
 بوغۇملارغا يىغىلىپ قالىدۇ. (3) تاماق يىيىش ۋە تۇر -
 مۇشتىكى تەرتىپسىزلىكلەر، مەسىلەن ھەرخىل ئىسسىق -
 سوغاق تاماقلارنى قالايمىقان يىيىش، قوساق بەك توق
 چاغدا جىنسى ئالاقە قىلىش، مونچىغا چۇشۇش، ھەركەت
 قىلىشلار. (4) زۇكام ماددىلىق بولغاندا ماددىنىڭ بو -
 غۇملارغا توكۇلۇشى. (5) ئادەتتە بولۇپ تۇرىدىغان ھەيدەپ
 چىقىرىشنىڭ توختاپ قېلىشى، مەسىلەن سۇرگە ئىچىپ
 كونۇپ كەتكەن كىشىلەر بىر مەزگىل سۇرگە ئىچمەي
 قويۇش، قان ئالدۇرۇپ ئادەتلەنگەن كىشى قان ئالدۇر -
 ماي قويۇش، ئاياللاردا ھېيىز توختاپ قېلىشقا ئوخشاش
 سەۋەپلەر بىلەن بەدەندە ئارتۇقچە ماددا كوپۇيۇپ ئۇلار -
 نىڭ بوغۇملارغىمۇ يىغىلىشى. (6) بەلغەم، قان ماددى -
 لىرىنىڭ غەيرى تەبئىي ئۆزگىرىشى، ياكى مەزكۇر ئىككى
 خىلىتنىڭ بىرلىكتە تەسىر قىلىشىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ.
 يەلدىن كامراق يۈز بېرىدۇ، سەپرا ۋە سەۋدادىن بولمايدۇ.
داۋاسى: باشقا بوغۇم ئاغرىقلىرى بىلەن ئوخشاپ
 كەتسىمۇ لېكىن داۋالاش جەھەتتە پەرقلىنىدۇ. بۇ ئاغرىقتا
 قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. ئۇلارنى
 بەرگەندە ئاغرىقنى كۈچلەندۈرۈپ قويىدۇ. چۈنكى بۇ
 كېسەلدە ماددا بەدەننىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدا بولىدۇ.

داۋاسى: (1) ھېيىز ياكى بوۋاسىر قېنى توختاپ

قېلىشى نەتىجىسىدە بولسا باسلىق ۋە ئەرقۇننىسا تومۇ -
رىدىن قان ئېلىش كېرەك. جالىنۇس سابىز ۋە سافىن
تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك دىگەن. قايسى تومۇردىن قان
ئېلىش مەسىلىسىنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ
بەلگىلەش لازىم. قاننى كۆپ ئالماسلىق كېرەك. بۇ
كېسەلنى داۋالاشتا تېزىرەك چارە قىلىش لازىم. بولمىسا
ئاغرىق يامانلىشىپ كېتىدۇ. ھەر قېتىم قان ئالغاندىن
كېيىن بىر مەزگىل دەم ئېلىش لازىم. ئەمما ئارىلىق
بەك ئۇزۇن بولماسلىقى كېرەك.

(2) ئاغرىق توختىتىش ئۇچۇن — سېرىق چىچەك
بىلەن كۈنجۇت چىچىگىنى سوقۇپ قويۇش ياكى مەرزە -
جۇش، بابۇنە، يانتاق ياپرىقى، ئەكىلىل مىلىك ھەر بىرى
10 مىسقالدىن، سىپەندان ئۇرۇغى 5 مىسقال سوقۇپ بىر
ئاز سۇ بىلەن نەم قىلىپ ئاغرىق ئورۇنغا چاپلاپ قو -
يۇلىدۇ.

(3) داغلاش — ئەرقۇننىسا تومۇرىنى ئىزلەپ* تېپىپ
داغلاش بىلەن ساقايتىش مۇمكىن. داغلاش ئۇسۇلى تو -
مۇرنى قىزىتىپ پاقالچەكنىڭ ھوشۇقتىن 8 سانتىمېتىر
يۇقۇرى ئورنىدىن ئەرقۇننىسانى ئىزلەپ تومۇر ئۈستىنى
داغلاش لازىم. باشقا ئۇسۇللار بىلەن نەتىجە ھاسىل
بولمىغاندا داغلاش چارىسى قوللىنىلىدۇ.

* ئەر قۇننىسا تومۇرىنى ئىزلەش ئۇسۇلى ھەققىدە “ئان
ئېلىش” بابىغا قاراڭ.

(4) بابۇنە، ئەككىلىلىك، قەنىرىون، چىڭسەي يىلتىزى، ھاشا، سېرىق چىچەك، سۇتتەر ھەربىرىدىن 10 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇلارنى قاينىتىپ ئىسسىقراق ھالدا ئاغرىق تەرەپنى يۇيۇشقا بېرىلىدۇ.

(5) ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن — گۈل بىنەپشە، قەسپى زەررە، ئىت ئۇزۇمى، بېدىيان يىلتىزى، شاتەرە، سورۇنجان ھەر بىرىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ، بىر دانە قۇرۇتۇلغان مۇناقى ئۇزۇم بىلەن بىللە قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ 12 مىسقال تەرەنجىۋىل قوشۇپ سەھەردە بىراقلا ئىچىدۇ.

(6) سۇرۇش ئۈچۈن — گۈل بىنەپشە، كاسىن يىلتىزى، بېدىيان يىلتىزى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 9 دانە، گازىۋان گۈلى بىر مىسقال، ئەگرى تەرەخمەك ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، گازىۋان ياپرىغى، پىرسىياۋشان، ئىت ئۇزۇمى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، چىلان،

سەرپىستان 5 دانىدىن، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ھەمشىۋا گۈلى، ئاق لەيلى گۈلى، قىزىل گۈل، سانائە ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، فۇنۇس، گۈلچەن، خەمىرى بىنەپشە، تەرەنجىۋىل، قارا شېكەر ھەر بىرى 7 مىسقالدىن، بادام مېغىزى 5 دانە.

تەييارلاش: پۇنۇس، تەرەنجىۋىل ۋە سانادىن باشقا

دورلارنى چالا سوقۇپ 2 چىنە سۇدا قاينىتىپ سۇزۇپ بولۇپ سانا، پۇلۇس، تەرەلجىۋىلىنى تاشلاپ بىر قاينىتىپ ئۇستىگە گۈلقەن ۋە خەمىرى بىنەپشىنى ئارىلاشتۇرۇپ بىراقلا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(7) يىيىش ئۇچۇن ھەببى سورۇنجان (37 - نۇسخە) 2 مىسقال ئىتىرىپىل سەغىر بىر مىسقال بېرىپ، ئارقىسىدىن ئەگرى تەرخەمەك ۋە قوغۇن ئۇرۇغىنىڭ ھەمدە ئوغرى تىكەنلەرنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ بېرىلىدۇ. ياكى سۇپوپى سورۇنجان (35 - ياكى 36 - نۇسخە)، نىلۇفەر شەرۋىتى ياكى ئىت ئۇزۇمى شەرۋىتى بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.

قاش ئارىسى ئاغرىش (ئۇسابە)

ئىككى قاش ئوتتۇرىسىدىكى جاينىڭ ئاغرىغى ئۇسابە دىيىلىدۇ.

سەۋىبى: خاس ئىسسىقلىقتىن بولىدۇ. يەنى مىڭگە ئىسسىق ئوتۇش (ئاپتاپتا ئۇخلاش)، بەدەندىن ئورلىگەن بۇخاراتلارنىڭ مىڭە ئالدىنقى قىسمىغا تەسىر قىلىشى سەۋەپ بولىدۇ. ئاغرىش كۈن چىقىش بىلەن باشلىنىپ كەچ كىرگەندە پەسىيىپ قالىدۇ.

داۋاسى: كافۇرنى گۈل يېغى بىلەن ئېرىتىپ بۇرۇندىغا تامغۇزۇلىدۇ. ئەگەر بۇرۇندىن قان ئېلىنسا پايدىسى كۆپ بولىدۇ. بۇرۇندىن قان ئېلىش مۇمكىن بولمىغاندا قىپال تومۇردىن قان ئېلىش لازىم.

بەدەن بولجۇڭ گۇشلىرىنىڭ تارتىشى (ئىختىلاج)

قاپاق ۋە بەدەن گۇشلىرىنىڭ لىكىلىداپ تارتىشى ئىختىلاج دەپ ئاتىلىدۇ. تارتىش يۈز، كوز، قاپاقلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى: بەلغەم ياكى قان ماددىسى سەۋەپ بولىدۇ. **ئالامەتلىرى:** يۈز، قاپاق ياكى باشقا ئەزالار ئىختىيارسىز ھالدا تارتىدۇ. ئەگەر تارتىش يۈز، كوز ياكى قاپاقلاردا ئۇزۇنراق داۋام قىلسا، بۇ لەقۋانىڭ ئالامىتى. قوساق ئەتراپلىرىدا بولسا تۇتقاق كېسەلنىڭ باشلىنىشى؛ قولتۇق ۋە قوۋۇرغا ئەتراپلىرىدا بولسا شۇ جايلاردا ياللۇغلىنىش بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. پۈتۈن بەدەندە بولسا سەكتەنىڭ باشلىنىشى بولىدۇ.

داۋالاش: يېنىك بولسا تاش تۇزنى قىزىتىپ قويۇپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ. ئېغىر بولسا بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرىدىغان ۋە سۇرىدىغان دورىلارنى بېرىش لازىم. ئاياللاردا ئەگەر ھېمىز نوختاپ قالغان بولسا قان ئېلىش كېرەك.

II ماقالا. كوز كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: كوز كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبى ۋە داۋالاش چارىلىرى.

1. كوز مىزاجلىرى ۋە ئۇنى بىلىش.

كوزنىڭ مىزاجى ھول ئىسسىقدۇر. كوز ھەرىكىتىنىڭ تېزلىكى، قاپاق ئېچىلىش ۋە يېپىلىشنىڭ تېزلىكى، كوز ئىچىنىڭ ئىسسىق ۋە نەم بولۇشىمۇ بۇنىڭغا دالالەت قىلىدۇ.

كوك كوزنىڭ ھول ئىسسىقلىقى كامراق، قارا كوزنىڭ ئىسسىقلىقى باشقا رەڭدىكى كوزلەردىن كۆپرەك بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كوزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇما) قاتارلىق كېسەللەر كۆپ ئۇچرايدۇ. قىزىلغا مايىل كەلگەن كوز مۆتىدىل مىزاجدىكى كوز بولىدۇ.

كوز كېسەللىكى كوزنىڭ تۇزۇلۇشىگە ئاساسەن تۆت تۈرگە بۆلۈنگەن. مەسىلەن، (1) كوز مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان كوز كېسەللىرى، (2) ماددىلار سەۋەبىدىن بولغان كوز كېسەللىرى، (3) ھەرخىل ۋەرەم ۋە جاراھەتلەر تۈپەيلىدىن بولغان كوز كېسەللىرى؛ (4) كوز قىسىملىرىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن پەيدا بولغان كوز

كېسەللىرى. مەسىلەن، كوزگە بىر نەرسىنىڭ 2 كورنىشى،
كوز قارىچۇغىنىنىڭ سىرتىغا چىقىپ تۇرۇشى قاتارلىقلار.

2. كوز كېسەللىكلىرىنى داۋالاش چارىلىرى.

كوز ئاغرىقلىرىنىڭ سەۋەپلىرى توت خىل بولغىنىدەك ئۇنى داۋالاشتىمۇ توۋەندىكى توت خىل تەدبىرنى قوللىنىش لازىم.

(1) مىزاجنى ئۆزگەرتىش: ئىسسىق بۇزۇق مىزاج بولسا ئىت ئۇزۇمى سۈيى، كاسىن، ئوسۇڭ سۈيى، قىزىل-گۈل ئەرەقى، تۇخۇم ئېقى ياكى بىنەپشە گۈلىنىڭ يېغى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش كېرەك. ئەگەر سوغاق مىزاج بولسا ئىپار، مامرانچىن، ئىگىر، پىلىپىلىلەرنى قوللىنىش لازىم. نەملىك ئارتۇق بولغاندا توتىيا، ئىقلىمىياغا ئوخشاش سۇيۇقلۇقنى قىزارتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. قۇرۇق بولسا بادام مېغىزى، تۇخۇم ئېقى، قىزىلگۈل گۈلابى، ئادەم سۈتى ئىشلىتىلىدۇ. مىزاجنى ئۆزگەرتىشتە يىمەك — ئىچمەكلەرگىمۇ دىققەت قىلىش لازىم.

(2) ماددىنى چىقىرىپ تازىلاش: ماددا كوز ياكى مىڭدە بولسا تازىلىغۇچى دورىلارنى بىرىش ياكى ھىجا-مەت قويۇش، كوز كېسەللىرىدە قان ئېلىشقا بەلگىلەنگەن تومۇرلاردىن قان ئېلىش كېرەك. چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى بۇرۇنغا تارتىش ياكى كوزدىن ياش ئاققۇزۇش چارىلىرى ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. ئەمما ئالدى بىلەن بەدەننى تازىلاش لازىم. ئۇنداق قىلمىغاندا ماددا يەنە كوزگە يىغىلىپ قالىدۇ.

3) كوز جاراھەتلەنگەندە سۇيۇق دورىلارنى كۆپ ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ھەم بەكمۇ قۇرۇق بولماسلىقى لازىم. كوزنى كويدۇرگۇچى، قاتتىق ئېچىشتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ، كوزگە ئىشلىتىدىغان دورىلار دائىم كوزنىڭ مىزاجى بىلەن قارىمۇ-قارشى بولۇشى كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا كوزگە زەرەرلىك. مەسىلەن، كوزنىڭ مىزاجى ھول ئىسسىق بولسا بېرىلگەن دورىمۇ ھول ئىسسىق بولسا بولمايدۇ.

4) كوزدىكى زەرەرلىنىشنىڭ قايسى خىلىتىن كەلگەنلىكىنى ئالدى بىلەن ئېنىقلاش لازىم. ھەم ماددا ئومۇمىي بەدەندىمۇ ياكى باشتىمۇ بۇنى كورۇش كېرەك. ئەگەر پۇتۇن بەدەندە بولسا ئومۇمىي بەدەنلىك سۈرگە بېرىش، خاس باشتا بولسا مىڭىنى تازىلاش چارىسىنى قىلىش، ئاندىن كېيىن كوزنى تازىلاش بىلەن شۇغۇللىنىش كېرەك. ماددىنى سۇرۇپ چىقارماي تۇرۇپ ھەرگىز داۋالاشقا قول تىقماسلىق. كوز ئاغرىغى بىلەن باش ئاغرىش بىللە كەلسە تارقاتقۇچى (مۇھەللىل) دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك لازىم. چۈنكى ئۇنداق قىلغاندا ئاغرىقنى كۈچلەندۈرۈپ قويۇش بىلەن خەتەرلىك يەتكۈزۈشى مۇمكىن.

ئومۇمىي بەدەننى تازىلاش ئۈچۈن ئەينۇلا، بىنەپشە، سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە، سانا، نىلۇفەر، گازىۋان، بېدىيان، ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇس، بىستىپايەج قاتارلىق دورىلار ياكى ھەببى سەبرە بېرىلىدۇ (4 - نۇسخە).

يەرلىك تازىلاش ئۈچۈن كوزگە مۇناسىپ دورىلار -
نى تامغۇزۇش، شۇمىشە قايناتقان سۇ ياكى تازا سۇت
بىلەن كوزنى چايقاش، چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى ئىش-
لىتىش كېرەك.

(5) ئەگەر كوزدىكى ماددا سۇيۇق بولۇپ قان
ياكى سەپرادىن بولسا ياكى بىرىكىپ كەلگەن بولسا
قىپال تومۇردىن قان ئېلىش لازىم. قان ئالغاندىن كې-
يىن سۇرگە دورىلار بېرىلىدۇ. ئەگەر يەلدىن بولسا موز-
چىغا كىرىش ۋە يەلنى تارتقۇچى دورىلارنى كوزگە تې-
گىش كېرەك. كوزنىڭ ھەر خىل ئاغرىقلىرىدىن ساقلى-
نىش ئۈچۈن كوزگە ئوتكۇر تەسىر قىلىدىغان يىمەك -
ئىچمەكلەردىن پەرھىز قىلىش، چاڭ - توزاڭ ۋە تۇتۇندە
ئۇرۇن تۇرماسلىق، كوپ يىغىلماسلىق، يورۇق تارقاققۇچى
نەرسىلەرگە (مەسىلەن ئاپتاپقا) ئۇزۇن قارىماسلىق لازىم.
كوزنىڭ مىزاجىنى بېلىش، كوز كېسەللىگىنى داۋالاشتا
زور ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇلار تۈۋەندىكىچە ئىپادىلىنىدۇ.
كوزنىڭ ئىسسىقلىقى ئاشقانلىق بەلگىسى - كوز
قىزىل، ھەرىكىتى تېز بولۇشتۇر. تومۇرلار قىزارغان بولۇپ
تۇتۇپ كورگەندە قىزىق سېزىلىدۇ. كوزنىڭ سوغاقلىغى
بۇنىڭ ئەكسىنچە - كوز يوغان، رەڭگى ئاق بولۇپ كوز -
نىڭ ھەرىكىتى سۇس بولىدۇ. قۇرۇقلۇقنىڭ بەلگە -
سى كوز كىچىكلىشىپ قالغان بولىدۇ. چاپاق ۋە ياش
بولمايدۇ.

2 - پەسىل: كۆز مۇڭگۈز پەردىسى (تەبىقە - سەلبىيە) كېسەللىكلىرى.

كۆزنىڭ ئەڭ ئالدىنقى قەۋىتى تەبىقىي سەلبىيە يەنى قاتتىق قەۋەت دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ پەردىنىڭ كېسەللىكلىرى ئاساسەن مۇڭگۈز پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشى ۋە ئۇنىڭ قۇرۇپ قېلىشىدىن ئىبارەتتۇر.

1. مۇڭگۈز پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشى

باشقا قەۋەتلەرنىڭ ياللۇغى بىلەن بىللە كېلىشمۇ بۇمكىن، ئاساسەن كۆرىلىدىغان ئالامەتلەر كۆزنىڭ سىرتقا چىقىپ كېتىۋاتقاندا كىچىك سېزىلىشى، كۆز گۆھرىنىڭ چوققۇرى ئاغرىشىدۇر. ئەگەر قان ماددىسى غالىپ بولسا كۆز ئىچى قادىلىدۇ، قىچىشىدۇ. قان ۋە قويۇلغان سەپىدىن بولغان ياللۇغلىنىشتا كۆز ئىچىدە قىزىش ۋە قىزدىرىش يۈز بېرىدۇ. ئەگەر بەلغەمدىن بولسا، كۆز ئېغىر ۋە ھەرىكىتى سۇس بولىدۇ. مەيلى قايسى خىللىتىن بولسا، سۇن مۇڭگۈز پەردىنىڭ ياللۇغى كۆزنىڭ سىرتقا بۇلا تىيىپ چىقىشى (ھوجۇز) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر قاندىن بولسا، بىنەپشە، نىلۇفەر، ئاق لەيلى، ئاقلىغان ئارپا، كۈنجۈت يېغى، شېكەرلەرنى ئېھتىياجغا لايىق بېرىلىدۇ. ۋە توۋەندىكى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ. چىلان، سەرپىستان، ئەينۇلا،

نىلۇفەر، ئاق لەيلى، يۇمغاقسۇت، كۈنجۇت يېغىنى يېتەر -
لىك مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ تەرەنجىۋىل قوشۇپ
ھۇقنە قىلىش لازىم. بەدەن كېرەكسىز ماددىلاردىن تازى -
لانغاندىن كېيىن كۈزگە توۋەندىكى شامچىلار قويۇلىدۇ.
نىشاشتە، سەمىغى ئەرەبى، كەتىرا ھەر بىرى 2 مىسقال -

دىن، قەلەي كۈشتىسى 6 مىسقال، ئەپيۇن $\frac{1}{3}$ مىسقال،
بۇلارنى يۇمشاق (توزاڭدەك) سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
تۇخۇم ئېقى بىلەن خېمىر قىلىپ جىگدە ئۇرۇغى
چوڭلىغىدا شامچە تەييارلىنىدۇ. ئەگەر ماددا سەپرادىن
بولسا مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئارقە -
دىن بىسپە ئۇرۇغى، ئاقلاڭغان ئارپا، تۇخۇمەك ئۇزۇمى ۋە
ئەنزۇرۇتلەرنى ھاجەت مىقدارى ئېلىپ بىر ئاز قايناقسۇ
بىلەن تەمىنى چىقىرىپ كۈزگە تېمىتىلىدۇ.

(2) مۇڭگۈز پەردىنىڭ قۇرۇپ قېلىشى - ئاغرىق
كۈزىنىڭ ئارقىغا تارتىشىپ قالغانلىغىدىن زارلىنىدۇ. كۈز -
نىڭ ئېقى نۇرسىزلىنىدۇ.

داۋاسى: مىڭە ۋە بەدەننى ھوللۇك تەرىپىگە مايىل
قىلىدىغان دورا ۋە غىزالارنى بۇيرۇش كېرەك. ھول
قاچاقتا ئاش قىلىپ بېرىش، بادام مېغىزى، ئوسۇك،
كۈدە، پالەك، يۇمغاقسۇت، توخۇ گۆشى، پاقلان گۆشى
قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. بۇرۇنغا قوي سۈتى، بىنەپشە يېغى
تامغۇزۇش، باشقا قوي سۈتى قويۇش بىلەن كۈزگە
قوي كۈزىنى تېڭىپ قويۇش لازىم.

3 - پەسەل: قاپاق كېسەللىكلىرى.

قاپاق قىرلىرىنىڭ قېلىنلىشىپ قېلىشى (سۇلاق)

كوز سۇيۇقلىغىنىڭ تەبىئىتى شور بولۇشى بىلەن قاپاق قىرلىرى قىزىرىپ قېلىنلىشىپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال تەرەققى قىلسا كىرىپكەلەر توكۇلۇپ كېتىپ، قايتا چىققاندا لىرى تەتۇر چىقىپ كوز قارىچۇغىغا قادىلىپ ئۇنى زەرەر-لەيدۇ. ھەر ئىككىلا كوزدە بولىدۇ.

داۋاسى: ساق سۈيى تېمىتىلىدۇ. ياكى ئاچچىق

ئانارنىڭ دانىسىنى قاپلاپ تۇرغان نېپىز پەردە، قىزىل-گۈل، ئاقلىغان سىماقلارنى ئېھتىياجلىق مىقداردا ئېلىپ پىشۇرۇپ كوزگە قويۇلىدۇ. كاسىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى (ياكى كوكىنى) سوقۇپ بىر ئاز گۈل يېغى بىلەن كوزگە قويسا ئۇنۇمى ياخشى. ھەر كۈنى ئەتىگەندە مۇنچىغا كىرىشنى بۇيرۇش لازىم.

بۇلار ئۇنۇم بەرمىگەندە پاقالچەك ئەتراپىغا ھىجا-مەت قويۇش، پىشانە تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن قىزىل شامچە (شىياق ئەھمەر) بېرىلىدۇ.

كوزدە گۆش ئۆسۈپ قېلىش (شەرقاق)

زۇكام نەزلە سەۋەبى بولىدۇ. كوزنى ئىپچىش قىيىن بولۇپ، قاپاق ئاستىنى قول بىلەن قايرىپ كور-گەندە كېرگىتكە ئوخشاش نەرسە ئۆسۈپ قالغانلىقى كورنىدۇ. كوز ئىچى دائىم ھوللىنىپ تۇرغان بولۇپ، يۇرۇقلۇقتىن قاچىدۇ، كۈنگە قارىيالمايدۇ.

داۋاسى: كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ قان ئېلىنىدۇ. ھەزىم قىلىش قىيىن بولغان يىمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىدۇ. مونچىغا كىرىپ تەرلىنىش، ياشاڭغىراتقۇچى دو-رىلار تارتقۇزۇش ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. سەبرە، ئاقاقىيا، ھۇزۇز (روسۇت)، مامىشا شىيافى، زەپەرلەرنى تېگىشلىك مىقداردا ئېلىپ ئەرمدۇن سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ شامچە قىلىپ قۇرۇتۇپ ساقلاپ، كېرەك بولغاندا بىر ئاز نەم قىلىپ كوزگە سۈرمە تاتقاندا تارتىش كېرەك.

كوز قوتۇرى (جەرە بۇلئەيمىن) ①

قاياقنىڭ ئىچى تەرىپىدە مۇدۇر تۇگۇنچىلەر ھاسىل بولۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، قاتتىق قىچىشىش بىلەن قوتۇرغا ئوخشايدۇ. سەۋىيى: شور بەلغەم بولۇپ ئىسسىقتىن بولغان كوزنىڭ ياللۇغلىنىشىدىن كېيىن پەيدا بولىدۇ. چاڭ-توزاڭلارنىڭ كوزگە كىرىپ كېتىشى، ئۇزۇن مۇددەت تۇتۇنلىك جايدا تۇرۇشمۇ بۇنىڭغا سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كوز قوتۇرى تىۋەندىكىچە 4 خىل بولىدۇ. 1) قاياق تېگىدە ئازراق قىچىشىش ۋە ئىچى-شىش بىلەن قاياق ئىچكى يۈزىگە ئۇششاق مۇدۇرلار پەيدا بولىدۇ. كوز بىر ئاز قادىلىدۇ، ياشاڭغۇرايدۇ.

داۋاسى: ئەپتىمۇن قايناتمىسى (20 - نۇسخە)

① جەرەپ دىگەن قوتۇر مەناسىدا بولۇپ، دوختۇرلار "تراخوما" دەپ ئاتايدىغان كېسەلدىن ئىبارەتتۇر.

بېرىپ بەدەننى تازىلاش بىلەن قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش ياكى ھىجامەت قويۇش، قاپاقنى ئورۇپ تۇرۇپ زەرەرلەنگەن جايغا شىپا ئىھەمەر سۈركەش كېرەك. (دورا قىسمىدا 4 - نۇسخىغا قاراڭ) ياكى قاپاقنى ئوبدان ئورۇپ تۇرۇپ موزانى سۇرۇپ زەرەرلەنگەن جايغا سۈركەش لازىم. كوز قوتۇرىنىڭ بۇ خىلى ئەگەر ماددىلار ياكى تاشقى سەۋەپلەر (ئۇفۇنەتلەر) تەسىرىگە ئۇچرىمىسا ئاقىۋىتى ياخشى بولىدۇ. ئەكسىچە بولغاندا ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ.

(2) قاپاق تېگىدىكى مۇدۇرلەر بىر بىرىگە قوشۇلۇپ جاراهەت ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئۇفۇنەتلىك سەۋەپ ياكى ماددىلارنىڭ بۇخاراتى بىلەن پەيدا بولىدۇ. ئېچىشىش، قادىلىش ۋە ئاغرىش يۇقۇرىدىكىگە نىسبەتەن ئېغىر بولۇپ كوز دائىم ياشاڭغىراپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: (1) مەتبۇخى ئەپتىمۇن بېرىش، قان

ئېلىش، ئاغرىق پەسەيتكۈچى شىپالارنى قويۇش لازىم.

(2) ئاندىن كېيىن مودۇرلەرنى قىرىش، تاتىلاش

لازم. بەزىلەر شادىنەج بىلەن قىرىشنى كورسىتىدۇ. بەزدە

لەر تومۇر ئەسۋاپلار بىلەن، بەزىلەر بولسا ئەنجىر

ياغىچى ياكى ئەنجىر يوپۇرمىغى بىلەن قىرىشنى كورسەت

تىدۇ. كۆپىگى دەريا بىلەن قىرىشنىڭ ئۇنۇمى ياخشى.

(3) كوز قوتۇرىنىڭ بۇ خىلى ھەممىدىن يامانراق

بولۇپ، قاپاقنى ئورۇپ قارىسا زەخمىلەنگەن جاي خۇددى

ئەنجىرنىڭ پوستىدەك توشۇك كورىنىدۇ. يۇقۇرقى ئالا

مەتلەر تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ.

داۋاسى: ئىككىنچى خىلغا ئوخشاش بولۇپ، قان ئېلىش، مەتبۇخ بېرىش بىلەن بىللە قاپاقنى كور-سىتىلگەن ئۇسۇللار بىلەن قىرىپ قاپاقنى ئېپىزلىتىش كېرەك. كۆپىنچە دەريا ياكى ناۋات بىلەن قىرىسىمۇ بولىدۇ. تۇخۇم سېرىغىنى گۈل يېغى بىلەن قاپاق ئۈس-تىگە قويۇش لازىم.

(4) قاپاق تېگىدىكى زەخمىلىنىش قارامتۇل كوك ئىششىققا ئايلانغان بولۇپ، بۇ خىلدىكى كوز قوتۇرىنىڭ ئاقىۋىتى ناچار.

داۋاسى: قان ئېلىش ۋە ھىجامەتتىن كېيىن ئايارەج پەيقارا (16-ئۇسخە) بېرىلىدۇ. قاپاقنى يۇ-قۇرقى ئۇسۇللار بىلەن قىرىلىدۇ. مونچىغا كىرىش بىلەن مۇنۇ دورىلارنى بۇرۇنغا تارتقۇزۇپ چۈشكۈرتۈش كېرەك: سەبە، جاۋشەر، ئەنزۇرۇت، ھاشا، زەپە، رۇسۇت، ناۋات، ئاچچىق يېسىمۇق 1 مىسقال، كوندۇش 5 مىسقال، بۇ دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ مەرزە-جۇش سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ قارىمۇچتەك ھەب قىلىپ قۇرۇتۇپ كېرەك بولغاندا بۇرۇنغا تارتىلىدۇ. ھەم كوز ئىچىدىكى يامان سۈپەتلىك سۇيۇقلۇقنى چىقىرىشنى مەق-سەت قىلىپ ياش كەلتۈرگۈچى سۇرمىلەر تارتقۇزىلىدۇ. كوناىراپ كەتكەنلىرىگە نىسبەتەن دەستكارە (ئوپېراتسىيە) چارىسى قوللىنىلىدۇ.

قاچاقتمەكى ئۆزۈمەسىمان ئۆسۈمە (تۆتەتۇل ئەجفان)

قاچاقنىڭ ئىچكى تەرىپىدە ئۆزۈمە شەكلىدە بەزگە

ئوخشاش گۆش پەيدا بولۇشتىن ئىبارەتتۇر. بۇ خۇددى ساڭگىلاپ تۇرغان ئۆزىنى ئەسلىتىدۇ. بۇزۇلغان قاندىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قان ئېلىش، ئاندىن كېيىن سۈرگە بېرىش، يۇمىغاقسۇتنى سوقۇپ قاپاق ئۈستىگە قويۇش لازىم. بۇلار نەتىجە بەرمىسە كېسىپ ئېلىۋېتىش كېرەك.

قاپاق قىرلىرىغا سوگەل چىقىش (سۇلۇلى پۇلۇك)

قاپاق قىرلىرىغا ھەرخىل چوڭلۇقتا سوگەل چىقىدۇ. سەۋىبى سوغاق خىلىتلاردىن ياكى سەۋدادىن بولىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخ ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن سەۋدانى سۈرگەندىن كېيىن ياغلاش ئۈچۈن زەيتۇن يېغى بېرىلىدۇ. ياكى سىياداننى سىركە بىلەن ئېزىپ بىرئاز تۇز قوشۇپ سوگەل ئۈستىگە چېپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. ئەگەر نەتىجە بەرمىسە قىسقۇچ بىلەن قىسىپ تۇرۇپ تۆۋەندىن كېسىلىدۇ (بىرئاز قان ئېقىشقا يول قويۇش لازىم)، قان توختىغاندىن كېيىن جاراھەت ئۈستىگە زاك سېپىلىدۇ.

قاپاقنىڭ قىزىرىپ ئىششىشى (شىرايى پۇلۇك)

قاپاقنىڭ سەۋەپسىزلا قىچىشىپ، ھەرە چاققاندا ك قىزىرىپ، ئىششىش بىلەن ئىششىشى يانماي توختاپ قېلىشقا شىرايى پۇلۇك دەپ ئېيتىلىدۇ. سەۋىبى — كۆپىنچە قان ياكى سەپرادىن بولىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش ياكى

مەتبۇخ ھېلىلە (38 - نۇسخە) قاتارلىق سۇرگۇچى دورىلار بېرىلىپ، شادىنەج، ئەدەسى مەغسۇلدىن سۇرمە تارتىش كېرەك. شەرۋىتى شاتەرە (39 - نۇسخە) بۇ كېسەلگە ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

يەڭنە ئاسقۇ (شەئىرە)

كوزنىڭ قاپاق قىرى ياكى بۇرجەكلىرىدە ئارپا چوڭلۇغىدا مۇدۇر پەيدا بولۇپ، يىرىڭلاپ قىزىپ ئىش-شىدۇ. قاپاق ھەركىتىگە تەسىر بېرىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ، سەۋىبى بۇزۇلغان قاندىن ئىبارەتتۇر.

داۋاسى: سۇرگە بېرىش بىلەن كاسىن، سەبرە، روسۇت، گىلى ئەرمىنىلەرنى ئىپتىياجغا لايىق ئېلىپ يەڭنە ئاسقۇ ئۈستىگە چېپىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن قىزىتىلغان دۈمبە ياغنى قويۇش لازىم. بۇلارمۇ نەتىجە بەرمىگەندە يەڭنە ئاسقۇ قېپى بىلەن كېسىلىدۇ. قان بىر ئاز ئېقىپ توختىغاندىن كېيىن ئۈستىگە زورۇ ئەسفەر سېپىلىدۇ.

ياش خالتىسىنىڭ يىرىڭلىق ئاقىمىسى (غەرەپ،

ناسۇرى چەشم)

كوزنىڭ بۇرۇن تەرەپتىكى بۇرجىكىدە پەيدا بولدىغان خالتىسىمان يىرىڭلىق ئاقما غەرەپ دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئاقما دائىم يىرىڭ قېپىغا ئىگە بولىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. سۇرگە

بېرىلىدۇ. ئەگەر قان ئېلىش مۇمكىن بولمىسا، يىرىڭنى تازىلاپ توۋەندىكى نۇسخىدىكى شامچە خالتا ئىچىگە تارتىشقا بېرىلىدۇ. تەركىۋى: سەبرە، كۇندۇر، ئەنزۇرۇت، خۇنسىياۋشان، ئانار گۈلى، كۈھلى، زەمچىلەرنىڭ ھەربىرى 4 مىسقالدىن، زاڭگار 1 مىسقال ئېلىنىپ سوقۇپ شامچە تەييارلاش ئۇسۇلى بويىچە تەييارلىنىدۇ. ئەگەر ئاقىمىنىڭ ئېغىزى ئېتىلىپ قالسا يىرنىڭ توپلىشىپ ئىششىق يوغىناپ كېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مىرۇ ئۇرۇغىنى سوقۇپ ئايال سۈتى ياكى ئىشەك سۈتى بىلەن يۇغۇرۇپ ئازراق زەپەر قوشۇپ ناسۇر ئۈستىگە قويۇلسا يىرىڭنى ئاققۇزىدۇ.

(2) يەنە بىر چارسى كەپتەر مايىغى، ئېرىتىلگەن زاك، سەكبىنەجلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ياش خالتا ئاقىمىغا سۈرتۈشكە بېرىلىدۇ. ئاقما ئىچىدىكى يىرىڭنى چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن ياڭاق مېغىزىنى قورۇپ، ئالما قېقى ۋە سىماپ تۇزىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئاقما ئىچىگە كىرگۈزۈلسە نەتىجىسى ياخشى.

كوزگە قۇم تىقىلغاندەك ئاغرىش (جەشائىل ئەجفان)

بۇ كېسەلدە ئويقىدىن كېيىن كوزنى ئاچقاندا كوز ئىچىگە قۇم تىقىلغاندەك سېزىلىدۇ. كوزنى بىرقانچە قېتىم ئېچىپ-يۇمۇش بىلەن ئۈزلىگىدىن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ. كوز ئىچى قىزارغان ۋە چاپاقلاشقان ھالدا بولىدۇ. سەۋەبى: قويۇق ماددىنىڭ كۆپلىگىدىن پەيدا بولىدۇ. داۋاسى: مونچىغا كىرىش، قايناقسۇ ھورىغا كوزنى

تۇتۇپ تۇرۇش قاتارلىق يۇمشاتقۇچى چارىلارنى قىلىش لازىم. بەلغەمنى تازىلاش سۈرگىسى (42 - نۇسخە) بېرىش بىلەن شىياق ئەھمەر (40 - نۇسخە) شامچىسى كوز ئىچىگە قويۇلىدۇ.

كىرىپىكىنىڭ توكۇلىشى

(ئىنتىشارۇل ئەھداپ، رەزىدەئى موژگان)

سەۋىبى: بەلغەم ياكى سەۋدا خىلىتلىرى ياكى قۇرۇقلۇقنىڭ غالىپ بولۇشى؛ قاپاق قىرلىرىنىڭ زەرەرلەشمىشى؛ تەپ ئاغرىقلىرىدىن كېيىن دائىل سۇئىلەپ^① كېسىلى بىلەن ئاغرىش.

داۋالاش: ئالدى بىلەن سەۋىبىگە قاراپ سۈرگە بېرىلىدۇ. ئەگەر قىچىشىش بولسا، ھەجرى ئەرمىنىنى سۈرۈپ چېپىش لازىم. دائىل سۇئىلەبتىن بولسا، كىرىپىك ئۈستىگە سۈرمە روشنايى سۈرتۈش كېرەك. ياكى تۆۋەندىكى چارە قىلىنىدۇ.

خورما ئۇرۇغىنى كويدۇرۇپ سۇمبۇل، لاجىۋەرد، كۈندۈر، كۈندۈر تۇتۇنى^②نى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ كىرىپىك ئۈستىگە سۈركەش لازىم. قۇرۇق-

① دائىل سۇئىلەپ: تۈلكە كېسىلى دېگەن مەنادا بولۇپ، بەدەن تۈلكىلىرىنىڭ توكۇلۇشىدۇر.

② كۈندۈر تۇتۇنىنى ئېلىش ئۇسولى: كۈندۈرنى ئوتقا سېلىپ چىقىۋاتقان ئىسقا بىر دانە چىنىنى دۇم قىلىپ تۇتقاندا چىنە ئىچى ئىسلىشىدۇ. سوۋىغاندا ئىس قىرىپ ئېلىنىدۇ.

لۇقتىن بولغان بولسا ھوللەندۇرگۇچى تەدبىرلەرنى قىلىش بىلەن ئىسپھان سۇرمىسى سۇرتۇش كېرەك.

كىرپىكنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى

ياشلاردا كىرپىكنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى بەلغەم خام قىسمىنىڭ تەسىرىدىن بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەم سۇرگىسى بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن شۇمشە ۋە ئاق لەيلىنىڭ يوپۇرمىغىنى سوقۇپ چېپىش لازىم. ياكى توغۇغىنى كويدۇرۇپ چاۋا ياغ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كىرپىك ئۈستىگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

كوز ياشاڭغۇراش (دەمەئە)

بۇ كېسەلدە كوز دائىم نەملىشىپ تۇرىدۇ ۋە ياش ئاقىدۇ.

سەۋىبى: تۇغما بولىدۇ؛ تۇتۇش قۇۋۋىتى ياكى ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز بولۇشى؛ ئۆتكۈر دورىلارنى ئىشلىتىش؛ كوز بۇرجىگىدىكى گوشنىڭ كەم بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر. يەنە ناخۇنىنى كەسكەندىن كېيىن كوز ياشاڭ-غۇرايدىغان بولۇپ قالىدۇ. بەزىدە قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا كوز ياشاڭغۇرايدىغان بولىدۇ. ئەمما سەۋەپنىڭ يوقىتىلىشى بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ. تۇغما كوز ياشاڭغۇراش بىلەن كوز گوشلىرىنىڭ يېتەرسىزلىكى سەۋەبىدىن بولغان كوز ياشاڭغۇراشلار ساقايمايدۇ.

داۋاسى: شىياۋ مامىشا، زەپەر 4 ئارپا مىقدارىدا،

سەبەرە $\frac{1}{2}$ مىسقال، شەبى يەمانى، كوك تاش 1

مىسقالدىن، بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
كونا ھاراققا چىلاپ سايىدا قۇرۇتۇپ ئېلىپ كوزگە
سۈرمە قىلىپ تارتىلىدۇ. ياكى 41 - نۇسخىدىكى سۈرمە
بېرىلىدۇ.

4 - پەسىل: كوزنىڭ ھەرخىل ئاغرىقلىرى

كوز ۋە قاپاق قىرلىرىنىڭ ياللۇغى (رەھەد)

كوز نېپىز پەردىسى ۋە قاپاق قىرلىرى ياللۇغىنىڭ
بەزىلىرى ھەقىقى بولىدۇ. بەزىلىرى قىسقا مۇددەتلىك
بولۇشىمۇ مۇمكىن. بۇلارنىڭ سەۋىبى كۈن نۇرى ياكى
باشقا نۇرلار كوزگە تەسىر قىلىش، ئاپتاپ ئوتۇپ
كېتىشتىن بولغان باش ئاغرىغى، بىر كۈنلۈك بەزىگە،
چاڭ - توپا، سوغاق، كوزگە ئۇرۇلغان قاتتىق شامال ۋە
سىرتقى زەربىلەردىن ئىبارەتتۇر. كوزدە قىزىرىش، ئېچى -
شش، ئاغرىش ۋە ياشاڭغۇراشقا ئوخشاش ئالامەتلەر
بولۇپ ئۇلارنى داۋالىشىمۇ سەۋەپلەرنىڭ يوقىلىشى
بىلەن ساقىيىپمۇ كېتىدۇ.

كوز قوتۇرى (تراخوما) بىلەنمۇ كوز نېپىز پەر -
دىسىنىڭ ياللۇغى بىللە كېلىشى مۇمكىن. ئۇنىڭ سەۋىبى
كوزنىڭ مۇدۇرلەر بىلەن سۈركۈلىشىدۇر، بۇ ئەھۋال كوز
قوتۇرىنى داۋالاش بىلەن يوقاپ كېتىدۇ.

كوز نېپىز پەردىسىنىڭ ھەقىقىي ياللۇغى (رەمەدى ھەقىقىي) كوز نېپىز پەردىسىنىڭ قان، سەپرا، بەلغەم، سەۋدا ۋە يەلدىن بىرىنىڭ سەۋبى بىلەن پەيدا بولغان ياللۇغىدىن ئىبارەتتۇر. ياللۇغلىنىش پەيدا قىلغۇچى بۇ خىلىتلار كوزنىڭ ئىچىدە پەيدا بولۇشى ياكى ئەزلە بولۇپ كوزگە چۈشۈشى مۇمكىن. بەزىدە قىزىل تومۇرلار- دىكى ئارتۇقچە ماددىلار كوزگە قويۇلىدۇ. بەزى ھاللاردا كوزگە چۈشىدىغان بۇ خىلىتلار باش ياكى مىڭدىن كەلمەستىن، باشقا ئەزالاردىن كېلىدۇ. چۈنكى كوزنىڭ مىزاجى بۇزۇلۇپ كوز ئاجىزلاشقاندا ۋە كېسەلگە مايىل بولۇپ قالغاندا باشقا ئەزالاردىن ئارتۇقچە ماددىلار كېلىپ قۇيۇلىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) قاندىن بولسا، كوز ئىچى ئۆتكۈر قىزىرىدۇ ۋە كوز تومۇرلىرى كۆپۈشىدۇ، ئاغرىد- مايدۇ، ئەمما قانداقلىرىدۇ. چاپاقلىشىش ئېغىر بولۇپ قاپاقلاردا دائىم چاپلىشىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن گۈل بىنەپشە، نىلۇفەر، ئىت ئۇزۇمى، ئەينۇلا، ئاق لەيلى، ئاقلانغان ئارپا، چىلان، سەرپىستان، تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىللىرىنى ئېھتىياجغا لايىق كاشكاپ قىلىپ دەملەپ ئىچىشكە بېرىد- لىدۇ. ھېلىلە سۈيىگە بىنەۋشە ئېزىپ كوز ئۇستىگە چېپىش لازىم. مامىشا، ئەنزۇرۇتتىن 8 مىسقالدىن، زەپەر

كەترادىن 1 مىسقالدىن، ئەپيۇندىن $\frac{1}{2}$ مىسقال

ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ يامغۇر سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ شامچە تەييارلاپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن مايلاپ قۇرۇ- تۇپ، قويۇپ، كوزگە كۈندە 2 - 3 قېتىم سۈركەش كېرەك.

(2) سەپرادىن بولسا، قاتتىق قادىلىپ ئېچىشىپ ئاغرىدۇ. سېرىق چاپاق كۆپ چىقىدۇ. كۆز ئىچىگە قۇم تىقىلغاندەك بولۇپ قىزىرىپ تۇرىدۇ. كۆپ ياش ئاقىدۇ، بەزىدە ياش كەلمەيدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مەتبۇخ ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن كاسىن شىرىسى، ئىت ئۇزۇمى، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئىسپىغۇل، بىيە ئۇرۇقلىرىنى سوقۇپ قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ كوزگە تېمىتىلىدۇ. ئاغرىقنى پەسەي تىتىش ئۈچۈن كافۇر شامچىسى ياكى ئەپيۇن شامچىسىنى كوزگە سۈرتىلىدۇ. تۇخۇم ئېقىنى كوزگە چېپىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. يېمىش ئۈچۈن ئاقلا نىغان ئارپا، ئەينۇلا، پالەك ۋە كىپەك شىرىسى بېرىلىدۇ. ئوبدان ئوخلاش، ياخشى دەم ئېلىش كېرەك.

(3) بەلغەمدىن بولسا، ۋەزەم ئېغىر بولۇپ كۆپ ياشاڭغۇرايدۇ. ئاغرىدۇ، چاپاق ئاق رەڭدە بولۇپ، كوز- نى ئېچىش قىيىنلىشىدۇ. قادىلىش بىلەن ئېچىشىش ئانچە

بولماسلىغى مۇمكىن. باش ئاغرىيدۇ، كوز ئېغىرلاشقاندا ك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ئاۋال پىشۇر-
غۇچى دورىلارنى بېرىش بىلەن بىللە ھەببى ئايارەج
(7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كوزگە سۇرتۇش ئۈچۈن توۋەن-
دىكى شامچە بېرىلىدۇ. سەمغى ئەرەبى، سەبرە، زەپەر،
مامىشا، رۇسۇتلاردىن ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، يۇمشاق
سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ شام-
چە تەييارلىنىدۇ ياكى سېمىز ئوتنىڭ سىقىپ چىقىرىپ
قۇرۇتۇلغان سۈيى، ئارپا تالقىنى، ئىسپىغۇل، ئىت ئۈزۈمى
سۈيى، قۇندۇز قەرى، زەپەرلەرنى تۇخۇم ئېقى بىلەن
قوشۇپ كوزگە چېپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

(4) سەۋدادىن بولسا، كوز ئىچى قۇرۇق بولۇپ
قادىلىدۇ، كوز ئىچى كوكۇش تۇرسىمۇ لېكىن قاپاق قىر-
لىرى قىزارغان بولىدۇ.

كوز نېپىز پەردىسى ياللۇغنىڭ بۇ خىلى ئۇزۇنغا
سوزۇلىدۇ. كوپىنچە باش ئاغرىغى قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋاسى: مىڭگە ھوللۇك يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى
قىلىش لازىم. يىمەك - ئىچمەك جەھەتتە ئوزۇققا باي
بولغان سۇيۇق تاماقلارنى بېرىش كېرەك. بىنەپشە، نىلۇ-
فەر، ئارپا تالقىنى، ئاق لەيلى، قاپاق گۆشى قاتارلىقلار-
نى ئازراق سوقۇپ يۇمشىتىپ باشقا قويۇش ياكى قاينى-
تىپ سۈيىنى باشقا قويۇش كېرەك. بۇرۇن ئىچىگە بىنەپ-

شە يېغى، يېڭى سۇت تامغۇزۇش بىلەن بىللە بىيە ئۇرۇغ-
نىڭ لۇئابىنى كوزگە چېپىش لازىم. توۋەندە كورسىتىل-
گەن شىپا دىنارىنى كوزگە سۇرتۇش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.
سۈرگە بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك، بەزى تىۋىپلەر دائىم
سۈرگە قوللىنىدۇ، بۇ خاتا. كوز ئاغرىغىنىڭ بۇ خىلىدا
پەقەت ھوللەندۈرۈش بىلەن چەكلىنىش لازىم.

شىپا دىنارىنىڭ نۇسخىسى:

قەلەي كۈشتىسى، ئىقلىمىيا 1 سەردىن، ئەپيۇن

1 مىسقال، كەترا $1\frac{1}{2}$ مىسقال، نىشاستە بىر مىسقال

بۇلارنى سوقۇپ سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ شامچە تەييارلاپ
قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

كوز ئاغرىغىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە ئەكىلىل مىلىك
2 سەر، زەپە 4 مىسقال، يۇمىغاقسۇت تالقىنى 1 سەر،
تۇخۇم سېرىغى 3 دانە، سوقۇلغان قۇررق نان 1 سەر
بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ تۇخۇم سېرىغى بىلەن مەلھەم
شەكلىدە تەييارلاپ كوز ئۈستىگە چېپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

كوز ئىچىدىكى قىزىل چىكىت (تۇرفە)

كوزنىڭ ئېقىدا قىزىل ياكى كۆكۈشەرەڭلىك چىكىت
لەرنىڭ پەيدا بولىشى تۇرفە دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: كوزنىڭ زەخمىلىنىشى، شامال، توپا -
چاڭلارنىڭ كوزگە قاتتىق تېگىشى ياكى كۈچ بىلەن قەي
قىلىشتىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن كوزگە ئايال سۈتى تامغۇزۇش كېرەك. تۇخۇم ئېقىنى كوزگە چېپىش ۋە كەپتەر ياكى ئودەكنىڭ قانتىنى يۇلۇپ قانات ئۇچىدىكى قاننى كوزگە تېمىتىش كېرەك. شىياڭ ئەھمەر (40 - نۇسخە) نى كوز ئىچىگە سۇرتۇش لازىم. بەدەننى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلە بېرىلىدۇ (38 - نۇسخە).

كوزگە قانات گۆش ئۇنۇپ قېلىش (زەپەر ياكى ناخۇنە)

ناخۇنە پارسچە تىرناق دىگەنلىك بولۇپ، كوز - نىڭ ئاق قەۋىتى ئۈستىگە تىرناققا ئوخشاش گۆشنىڭ ئوسۇپ قېلىشىدىن ئىبارەتتۇر. بۇ - دائىم كوز بۇرچىگە - نىڭ بۇرۇن تەرىپىدىن باشلىنىپ كوز قارچۇغى تەرىپى - گە قاراپ ئوسىدۇ. ھەتتا قارچۇغىنى يېپىۋالىدۇ. قانات گۆشنىڭ بەزىلىرى قىزىل ياكى سېرىق رەڭدە بولۇپ قاتتىق ياكى يۇمشاق كېلىدۇ.

داۋاسى: جالىنۇس ھېكىم "چۈچۈكبويىا يىلتىزى ناخۇنە ئۈچۈن ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ" دەپ كورسىتىدۇ. كۈندۈرنى بەسەينىڭ سىقىپ چىقىرىلغان سۈيىدە ئىزىپ بىر سائەت تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن كوزگە تامغۇزۇش لازىم. ئۆشكە سۈتىنى ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كوزگە تام - غۇزۇشقا بېرىلىدۇ. زاڭگار شامچىسى ۋە سۈرمەرۇشنايىلارنى كوزگە تارتىشقا بېرىلىدۇ. قانات گۆشنىڭ كونىراپ

كەتكەنلىرى ياكى قاتتىق بولغانلىرى كېسىپ ئېلىپ تاشلىنىدۇ. سۈرگە ئۈچۈن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

كوز ئېقىنىڭ يەللىك ئىششىغى (ئىنتىفاخى مۇلتەھەمە)

كوز ئىچى پۇۋلىگەندەك كۆپكەن سېزىلىدۇ. كوز بۇرجىگىدە قىچىشىش ۋە ئېچىشىش بولىدۇ. بەلغەم ياكى يەلدىن پەيدا بولۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: بەلغەمدىن بولسا كوز نېپىز پەردىسىنىڭ بەلغەمدىن بولغان ياللۇغىغا ئوخشاش چارە قىلىنىدۇ. بەلدىن بولسا يەللىك تاماقلاردىن (مەسلەن. قازان نېنى، قىيمىلىق تاماقلاردىن) پەرھىز قىلىش، بابۇنەنى قاينىتىپ ھورىغا كوزنى تۇتۇش لازىم. ھەم بابۇنە، بىنەپشە، سەبرەلەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ سوقۇپ بىر ئاز سۇ بىلەن نەم قىلىپ قاپاق ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

كوز ئېقىنىڭ قىچىشىشى (ھىككە مۇلتەھەمە)

قاپاق تېگىدىن باشلاپ كوز ئىچى سەۋەپسىز قاتتىق قىچىشىدۇ. ئۆگىلاش ۋە تاتىلاش نەتىجىسىدە قاپاق ئۈستى ۋە كىرىپك قىرلىرى قىزىرىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: سەۋەپچى ماددىسىغا قاراپ سۈرگە بېرىش

لازم. ئىسسىق مونچىغا چۈشۈش، ئۆتكۈر ۋە تۈزلۈك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

كوز قارىچۇغىنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى قەرنىنە)

كوز تومۇرلىرى قىزىرىپ كوز قارىچۇغىدا ياللۇغ
لىنىش (ۋەرەم) پەيدا قىلىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئۆزىگە بولۇت
ياكى تۇتۇندەك نەرسىلەر كۆرىنىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تومۇرسىدىن قان
ئېلىش كېرەك. ئاندىن كېيىن مىڭە ۋە كۆزنى ماددىلاردىن
تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا ياكى ھەببى قوقىيا
(16 - 17 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ. سامساق، پىياز، قوغۇن،
كالا گۆشى، بېلىق گۆشى، شورپا، قورداق قاتارلىق تا-
ماقلاردىن پەرھىز قىلىش، توپا - چاڭ ۋە تۇتۇنلۇك جاي-
لاردا تۇرماسلىق كېرەك.

كوز ئالدىدا پاشا ئۇچقاندىك سېزىلىش (خىيالات)

كوز ئالدىدا پاشا، چىۋىنىدەك ئۇششاق نەرسىلەر
ئۇچۇپ يۈرگەندەك كۆرىنىشى خىيالات دەپ ئاتىلىدۇ.
سەۋەبى: كۆزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇما) كېسەل-
لىنىڭ باشلىنىش ئالامىتى بولۇپ كېلىدۇ؛ مەئىدە
ھەزىم قىلىشنىڭ ناچار بولۇشى نەتىجىسىدىكى بۇسلارنىڭ
يۇقۇرى ئورلىشى؛ كوز پەردىلىرى ۋە سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ
زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: كۆزگە سۇ چۈشۈش سەۋەبىدىن بول-
غاندا كوز ئالدىدا كۆرىنىدىغان پاشا كومۇتىدەك نەرسە-
لەر بارغانسېرى كۆپىيىدۇ. داۋاسى كۆزگە سۇ چۈشۈش
كېسەلىنى داۋالاش بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

مەئدە خىزمىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولسا، قوساق
توق چاغدا خىياللات كۆپ بولۇپ، مەئدە بوش بولغاندا
بولمايدۇ.

داۋاسى: مىگە ۋە باش تەرەپنى تازىلايدىغان
ھەبى قوقىيا، ئايارەج پەيقارا (16 - 17 - نۇسخىلەر) گە
ئوخشاش دورىلار بېرىلىدۇ.

كۆز نېپىز پەردىسى ۋە كۆر سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ
زەرەرلىنىشى سەۋەپ بولسا كۆز ئىچىنىڭ ئوزگىرىشلىرى،
باش ئاغرىش ۋە كۆز نېپىز پەردىسىدىن كېيىن بۇ خىل
ئالامەتلەر يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرقىدەك تاماق ئۇچۇن نوقۇت بىلەن
مىكىيان توخۇ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. كۆزگە مۇۋاپىق
سۈرمە تارتىشقا بېرىلىدۇ.

كۆزگە ئاق چۇشۇش (بەيازۇلئەيىن)

كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردە (قەرىنە—كورنېيا) ئاستىغا
چۇشكەن ئاق سۇيۇقلۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، كۆزنىڭ
كورۇش خىزمىتى ئوخشاش بولمىغان ھالدا بۇزۇلىدۇ.
چۇشكەن ئاقنىڭ بەزىلىرى نېپىز بولۇپ "بۇلۇت" دەپ
ئاتىلىدۇ. بەزىلىرى قېلىن بولۇپ مۇتلەق ئاق دىيىلىدۇ.
ئاق بەزىدە كۆز قارىچۇغىنىڭ بىر قىسمىنى قاپلايدۇ
ياكى پۈتۈنلەي قاپلايدۇ.

سەۋەبى: كۆزنىڭ ھەر خىل زەخمىلىنىشلىرى نەتىجىسىدە ئاق چۇشۇپ قالىدۇ. كۆز نېپىز پەردىسىنىڭ يال

لۇغى ياكى كوز ئېقىنىڭ كېسەللىرىنى داۋالاشتىكى خاتالىقلار سەۋەپچى بولىدۇ؛ شەققە كېسىلىدىن كېيىنمۇ كوزگە ئاق چۈشىدۇ.

داۋاسى: نېپىز ئاق پەردە داۋالاش بىلەن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ. ئەمما قېلىن بولغىنىنىڭ ساقىيىشى تەس.

ئەگەر سەۋەپ مەۋجۇت بولسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىش ياكى سۈرگە بېرىش كېرەك، لەيلى قازاقنىڭ سۈيى، قەنتەرىون سۈيى، ھەسەللەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ كوزگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر چوڭ قېلىن بولسا بېرىلىدىغان دورىلار كۈچلۈك بولۇشى لازىم. مەسىلەن كويدۇرۇلگەن مىس، زەڭگەر، نوشىدىر، نەمەكى ھىندى، كوپىگى دەريا، زەرمۇرەلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ يۇم-شاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كوزگە تارتىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ (زەرمۇرە كۈشتە قىلىنىدۇ) ياكى توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

(1) نۇسخە: قىليورغا (سۇمار) 3 مىسقال، قەنتەرىون 5 مىسقال، مەرۋايىت، زەڭگەر 1 مىسقالدىن، بېخ مارجان، پورەئەرمىنى (ياكى ئورنىغا توغرۇغۇ) 2 مىسقالدىن، ئۇشە $\frac{1}{2}$ مىسقال، كويدۇرۇلگەن تۇخۇم شاكىلى 3 مىسقال،

تۇتيا $\frac{1}{2}$ مىسقال، ئىپار 2 تال ئارپا مىقدارى. تەييار-لاش ئۇسۇلى: تاش دورىلار كۈشتە قىلىنىدۇ. باشقا دورىلارنى

قوشۇپ ئۆپىدەك ئۇششاق سوقۇپ كۈنگە 3 قېتىم سۇر-
مە قىلىپ كوزگە تارتىلىدۇ.

2 - نۇسخە: دەريا قۇلۇلىسى (سەرتان نەھرى)،
كوپىگى دەريا، قىليورغا مايىغى، توخۇ تاشلىغى، مىسىر
توتىياسى، تۇخۇم شاكلى، مىس، مەرۋايىت (كويدۇرۇل-
گەن)، ھېقىق، كوك قاش تېشى، پىلىپىل، ئاقمۇچ، ئىقلى-
مىيا، بىخ مارجان، گىل مەختۇم، مەھمودە كېرەكلىك
مىقداردا ئېلىپ يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تەييارلىنىدۇ.

كورۇش زەئىپلىگى (زەئىپىل بەسەر)

كوزنىڭ كورۇشى ناچار بولۇش — يىراقتىكى نەرسى-
لەرنى ئېنىق پەرق قىلالماسلىق، توغرا كورەلمەسلىك
مەسىلەن، قارا نەرسىنىڭ كوك رەڭدە كورنىشى، كوكنىڭ
قارا كورنىشى، ئۇزۇن نەرسىنىڭ قىسقا، قىسقىنىڭ ئۇزۇن
كورنىشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت بولۇپ، كورۇش ئالەت-
لىرى (ئاپپاراتلىرى) نىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن يۈز بېرىدۇ.
سەۋىيى: كورۇش ئالەتلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى ۋە
مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: كورۇش ئالامەتلىرى سەۋىيىدىن بول-
غان كورۇش ئاجىزلىقىدا كوزدىن ئاز مىقداردا قويۇغراق
ياش ئاقىدۇ، ئازراق چاپاقلىشىدۇ. كوز گوھىرى ئادەت-
تىكىگە قارىغاندا چوڭراق بولىدۇ. ئەمما ئاغرىش ياكى
قىزىللىق بولمايدۇ. تاماقتىن ياكى ئۇيغىدىن كېيىن ۋە

ھەزىم ناچار بولغان چاغلاردا كوزدىكى زەئىپلىك تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ.

داۋاسى: مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا (17 - نۇسخە) ياكى توۋەندىكى سۈرگە كومۇلىسى (ھەببى مۇسھىل) بېرىلىدۇ.

سېرىق ھېلىلە، كابۇل ھېلىلىسى، بەلىلە پوستى ھەر بىرى 1 مىسقالدىن، سانا 2 مىسقال، غارىقۇن،

تۇرپۇت، يۇيۇلغان لاجىۋەرد $\frac{1}{2}$ 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇقىدا ھەپ قىلىپ، بادام يېغى بىلەن ياغلاپ قويۇپ ھەر كۈنى ئاخشامدا 11 دانە ياكى 7,5 دانىدىن بېرىلىدۇ. كوزگە تارتىش ئۈچۈن سۈرمە رۇشنايى (41 - نۇسخە بېرىلىدۇ).

مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغاندا مىڭنىڭ مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تۇرۇلغا گۆشى ياكى مىكياڭ گۆشە - نىڭ شورپىسىغا نوقۇت، دارچىن سېلىپ بېرىلىدۇ. بۇرۇنغا ياسىمەن يېغى تامغۇزۇش لازىم.

كوزگە توۋەندە كورسىتىلگەن شامچىلەرنىڭ بىرىنى سۇرتۇش ئۈچۈن بېرىلسە بولىدۇ.

سېرىق شامچە (شىافى ئەسفەر) نىڭ نۇسخىسى:

سېرىق ھېلىلە، توتىيا، ئۇدى ھىندى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، پىلىپىل، سەمغى ئەرەبى ھەر بىرى 3 مىس -

قالدىن، زەپەر 1 مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ جىگدە ئۇرۇغىدەك شامچە تەييارلىنىدۇ.

يېشىل شامچە (شيافى ئەخزەر) نىڭ ئۇسخىسى:
زەڭگەر 3 مىسقال، كويدۇرۇلگەن زاك 6 مىسقال،
ئۇشەق 1 مىسقال، بۆرەنەرمىنى، كۆپىكى دەريا، قىزىل
زەرنەخنىڭ ھەر بىرى 1 مىسقالدىن، ئوشىدىر $\frac{1}{2}$

مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى: ئۇشەقنى سۇزاپ سۇيىدە ئېرىتىپ قالغان دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈرۈپ شامچە تەييارلىنىدۇ. سايىدا قۇرۇتۇپ كېرەك بولغاندا كوزگە سۇرتۇشكە بېرىلىدۇ.

كوزدىكى يات نەرسىلەر (قەزى)

كوز ئىچىگە پاشا، كوموتىغا ئوخشاش جاندارلارنىڭ ياكى باشقا جانلىق نەرسىلەرنىڭ كىرىپ كېتىشى قەزى دەپ ئاتىلىدۇ.

كوزگە كىرگەن نەرسە مەيلى قانداق نەرسە بولسۇن ھەرگىز كوزنى ئۇۋۇلىماسلىق كېرەك. ئەگەر بىرەر زەھەر-لىك ياكى قاتتىق نەرسە كىرىپ كەتكەندە كوزنى قالايمىقان ئۇۋۇلاش قارغۇلۇققا ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن، چىقىرىش تەدبىرى شۇكى: كوزگە بىر نەرسە كىرىپ كەتكەن ھامان كوزنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش، بالا ئېمىتىۋاتقان ئايالنىڭ سۈتىنى كوزگە تامغۇزۇش لازىم. ئەگەر كوزگە كورۇنگىدەك بولسا، پاختا بىلەن ئېلىۋېتىش كېرەك. بۇ

خىل چارىلار نەتىجە بەرمىسە كوز ئىچىگە توشقۇزۇپ
نىشاستە قويۇپ بىردەمدىن كېيىن ئىسسىق سۇ بىلەن
كوزنى چايقاش كېرەك. كوز ئىچى زەخمىلەنگەن بولسا،
كوز جاراھەتلىرى قاتارىدا چارە قىلىش لازىم. قىز تۇققان
ئايال سۈتىگە تۇخۇم ئېقىنى ئارىلاشتۇرۇپ كوزگە تامغۇ-
زۇش كېرەك.

كوزگە زەربە تىگىش (زەربە بۇلىتىپ)

كوزنىڭ سىرتقى تەرەپتىن ئۇرۇلۇش، سوقۇلۇشى
نەتىجىسىدە ھاسىل بولغان قىزىللىق ياكى ئىششىقتىن
ئىبارەت بولۇپ، ھەرخىل سەۋەپلەردىن بولۇشى مۇمكىن.
ئاغرىقتا ھارارەت بولسا، قىپال تومۇردىن قان ئېلىش
كېرەك. ياكى قايسى ماددا زىيادە بولسا شۇنى ياندۇرۇشقا
تەدبىر قىلىش، تۇخۇمنىڭ ئاق - سېرىغىنى ئارىلاشتۇرۇپ
گۈل يېغى بىلەن كوز ئۈستىگە قويۇش لازىم. ئاغرىش
تۈگەپ كەتكەندىن كېيىن كۆكەرگەن يەرگە يۇمىلاقسۇت،
پىننە، قارىمۇچ ئارىسىدىن چىقىدىغان تاش، زەرنىخلەردىن
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ كوز ئۈستىگە قويۇشقا
بېرىلىدۇ. ئەگەر جاراھەت بولسا، جاراھەتلىر قاتارىدا
تەدبىر قىلىش لازىم.

كەچقۇرۇن كۆرمەسلىك (ئەشا-شەبكۇرى) ①

كوزنىڭ كۈندۈزى ياخشى كۆرۈپ ئاخشىمى ياخشى

① ئادەتتە ناماشىم قارغۇلىغى دەيدىغان كېسەللىك.

كورمەيدىغان ھالغا كېلىپ قېلىشى كەچقۇرۇندا كورمەسلىك
(ئەشا، شەبكورى) دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىبى: كوزدىكى سۇيۇقلۇقلار (رۇتۇبەتلەر) بىر-
نىڭ قويۇقلىشىپ قېلىشى كوزنىڭ كورۇش قۇۋۋىتىنىڭ
ئاجىزلىغى ياكى ماددىنىڭ غەلىزلىگى، ئوزۇقلۇق ماددى-
لىرىنىڭ ياخشى بولماسلىغى سەۋەپ بولىدۇ.

داۋاسى: قان كوپ بولسا قىپالدىن قان ئېلىش
لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە ماددىلارنى سۇرگۇچى دورى-
لارنى بېرىش كېرەك. كوزگە تامغۇزۇش ئۇچۇن سۇزۇلگەن
ھەسەلگە بېدىيان سۈيى ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ ياكى
ئوشكە جىگىرىگە پىلىپىلنى سوقۇپ سىپىپ كاۋاپ قىلىنىدۇ.
جىگەردىن ئېقىپ چىققان سۇنى ئېلىپ قويۇپ كوزگە
تامغۇزۇلىدۇ، جىگەرنى يېمىشكە بېرىلىدۇ.

① كۈزگە سۇ چۇشۇش (نوزۇللۇما)

”نوزۇللۇما“ ئەرەبچە سۇ چۇشۇش دىگەن سوز
بولۇپ، كورۇشكە توسالغۇچى بولغۇچى سۇيۇقلۇقلار نەتە-
جىسىدە كوزنىڭ كورىشى ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە
بۇزۇلۇشتىن ئىبارەت. كوزگە سۇ چۇشۇشنىڭ كېلىپ
چىقىشى ۋە سەۋىبى جەھەتتە ئىختىلاپلار كوپ بولسىمۇ،
كوپچىلىك تىۋىپلار ئەبوتئەلى سىنانىڭ توۋەندىكى پىكىرىنى
قۇۋۋەتلەيدۇ.

نوزۇللۇما — ئوقياسىمان قاتلام (ئەنەبىيە) توشۇ-

① نوزۇللۇما دوختۇرلۇقتا كاتاراكتا دەپ ئاتىلىدۇ.

گىدە، ئاقسىلىسىمان قاتلام بىلەن مۇڭگۈز قاتلام ئارىسىدا تۇرۇپ قالدىغان كېرەكسىز سۇيۇقلۇق (رۇتۇبەتى غەرىبى) لەردىن ئىبارەت. ئۇ سۇيۇقلۇق نەرسىلەر سايىسىنىڭ كوزگە چۈشۈشىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ.

سۇيۇقلۇق چۈشۈش مىقدار ۋە كەيپىيات جەھەتتە - لىرىدىن ھەر خىل بولىدۇ. مىقدار جەھەتتىن ھەرخىل بولىشى:

سۇيۇقلۇق مەزكۇر توشۇككە قارىغاندا جىقراق بولۇپ، ئۇنى پۈتۈنلەي توسىۋالىدۇ. بۇ ئەھۋالدا كوز ھىچنەر - سىنى كورەلمەي قالىدۇ. بەزىدە توشۇككە قارىغاندا ئاز بولىدۇ، ئۇنىڭ بىر تەرىپىنى توساپ، بىر تەرىپىنى ئو - چۇق قويىدۇ؛ توسالغان تەرەپتە تۇرغان نەرسىلەرنى كوز كورمەيدۇ؛ ئوچۇق قالغان تەرەپتىكىلەرنى كورۇش مۇمكىن. بەزىدە كوز نەرسىلەرنىڭ يېرىمىنى ياكى بىر قىسمىنى كورۇپ قالغىنىنى كورمەيدۇ، لېكىن باشنى ئايلاندۇرسا كورەلەيدۇ. بەزىدە ئۇ نەرسىنى بىر قېنىم تولۇق كورۇپ، ئىككىنچى قېتىمدا تولۇق كورەلمەيدۇ؛ بۇ، نەرسىلەرنىڭ تۇرۇش جايىغا قاراپ شۇنداق بولىدۇ، چۈنكى نەرسە پۈتۈن گەۋدىسى بىلەن توسالغان جايىنىڭ ئۇدۇلىدا بولسا، كوز ئۇنىڭ ھىچبىر جايىنى كورمەيدۇ؛ ئوچۇق قالغان تەرەپتە بولغاندا پۈتۈن گەۋدىسىنى كورەلەيدۇ. سۇ تولۇق بولمىغان توسىلىش كورۇش توشۇگىنىڭ يۇقۇرقى تەرىپىدە بولۇپ، يۇقۇرىنىلا توسىدۇ. ياكى يۇقۇرى ھەم توۋەندە

بولىدۇ. گايدا توشۇكنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا بولۇپ،
توشۇكنىڭ چورسى ئوچۇق قالىدۇ. بۇ ھالدا نەرسىلەرنىڭ
ئەتراپى كورىنىدۇ، ئوتتۇرىسى كورۇنمەيدۇ. ھەتتا ئۇ
نەرسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇڭلۇك ياكى چوڭقۇرغا ئوخشاش
بىر شەكىل كورۇنۇپ تۇرىدۇ. يەنى ئۇ كىشى شۇ جايىنى
كورمەيدۇ ۋە ئۇ يەردە بىر قاراڭغۇلۇق كورۇنۇپ تۇرۇپتۇ،
دەپ گۇمان قىلىدۇ.

كوزگە سۇ چۇشۇشنىڭ كەيپىياتى جەھەتتىن ھەرخىل
بولۇشىغا كەلسەك ئۇنىڭ قويۇق - سۇيۇقلۇقى ھەرخىل
بولىدۇ. بەزىسى سۇيۇق ھەم سۇزۇك بولۇپ، ئورنى (چىراق
يورۇغىنى) ۋە كۇلنى توشىمايدۇ؛ بەزىسى بەك قويۇق بولىدۇ.
قويۇق خىللىرىدىن شۇنداقلىرى باركى، ئۇ ناھايىتى
قاتتىق بولۇپ، سۇ چۇشۇش دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىدۇ
ۋە ئۇنى داۋالغىلى بولمايدۇ. سۇيۇق ھەم سۇزۇك خىل
دىكىسى داۋالاشنى ئاسان قوبۇل قىلىدۇ.

رەڭ جەھەتتىن ھەرخىل بولىشى - بەزىسى ھاۋا -
رەڭ، بەزىسى ئاق گەژگە ئوخشاش، بەزىسى ئاق مەر -
ۋايىت رەڭلىك، بەزىسى ئاق بولۇپ، كوك ياكى چەشەرەڭگە
ۋە ئالتۇن رەڭگە مايىل كېلىدۇ. بەزىسى سېرىق، بەزىسى
قارا، بەزىسى گۇڭگىراق بولىدۇ. ئۇنىڭ گەژ رەڭدىكىسى
يېشىل، گۇڭگۇرت رەڭلىكلىرىنى تۇم قارا ۋە سېرىغىنى
داۋالاشمۇ ھەتتا كېسىپ ئېلىشمۇ مۇمكىن ئەمەس.

سەۋىيى: (1) يىقىلىش ياكى باشقا زەربە ئەتە -

جىسىدە مېڭە سىلكىنىشى بىلەن مېڭىدىكى سۇيۇقلۇقنىڭ كوز قاتلاملىرىغا چۇشۇپ توختاپ قېلىشى؛

(2) ناچار ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنىڭ بۇسلىرى نەتبە جىسىدە، خۇددى ئوت ھاسىل بولغاندەك تەدرىجى ھالدا سۇيۇقلۇق كېلىپ كوزگە چۇشۇپ قالىدۇ؛

(3) ئۇزۇنغا سوزۇلغان قاتتىق باش ئاغرىشى؛

(4) كۈچ بىلەن قاتتىق قوشۇش؛

(5) قاتتىق سوغاق مىزاجلىق ياكى تەسادىپى ھالدا

قارغا، مۇزدەك سوغاق سۇغا چوكۇپ كېتىشلەر؛

(6) كوزنىڭ زەئىپلىكى بولۇپمۇ ياشانغان كىشىلەر

ياكى ئۇزۇن ۋاقىت كېسەل بولغۇچىلار كوزنىڭ زەئىپلىكى.

ئالامەتلىرى: كوزگە سۇ چۇشۇشنىڭ دەسلەپكى

ئالامەتلىرى ئېنىق سەۋەپچىسى بولمىغان ھالدىكى كوز

ئالدىدا پاشا - كەمۇتىدەك نەرسىلەر ئۇچۇپ يۇرگەندەك

سېزىلىشتىن ئىبارەت. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كوزدە، بو -

لۇپمۇ ئىككى كوزنىڭ بىرىدە خىرىلىك بولىدۇ ۋە كوزگە

چىراققا ئوخشاش يورۇغلۇق نەرسىلەر ئىككى بولۇپ كو -

رىنىدۇ.

كوزگە سۇ چۇشۇش بىلەن كوز ئىچكى قىسمىدىكى

توسىلىشتىن كېلىپ چىققان كوز ئالدىدا پاشا ئۇچقانداك

كورۇنۇش ئوتتۇرىسىدىكى پەرق تۈۋەندىكىچە:

(1) ئەگەر كوزگە سۇ چۇشۇش بولسا كوزنىڭ

بىرىنى يۇمىغاندا ئىككىنچى كوزنىڭ قارىچۇغى كېڭىيىدۇ.

كوز ئىچكى قىسمىدىكى توسىلىشتا كېڭەيمەيدۇ.

(2) كوز ئالدىدا چىۋىن ئۇچقاندەك كورۇنۇش بىر كوزدە كوپرەك ئۇچرايدۇ؛

(3) كوز ئالدىدا چىۋىن ئۇچقاندەك كورىنىش بارغانسېرى زىيادىلىشىدۇ. يەنى دەسلەپتە پاشىدەك، كېيىنچە چىۋىندەك نەرسىلەر كورىنىدۇ.

(4) مەيدىنىڭ كۆپكەن ياكى بوش بولۇشى چىۋىن ئۇچقاندەك كورىنىشنىڭ ئاز - كۆپ بولۇشىغا سەۋەپ بولمايدۇ.

(5) چۈشكەن سۇنىڭ رەڭگىگە قاراپ ھەرخىل رەڭلىك زەرەرلىنىش كورىنىدۇ.

(6) سۈرگە ياكى ئايارەج دورىلار نەتىجە بەرمەيدۇ. تېۋىپ داۋالاشتىن بۇرۇن زادى كوزگە سۇ چۇشۇشمۇ ياكى ئەمەسمۇ ئېنىق ئايرىشى كېرەك. قالايىمقان چارە - تەدبىر قىلىش بىلەن كوزگە سۇ چۇتۇشۇشنى داۋالاش دائىرىسىدىن چىقىپ ۋاقىتنى قولىدىن بېرىپ قويۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: (1) كوزگە سۇ چۇشۇش ئىكەنلىكى ئېنىقلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ھەببى زەھەپ (44 - نۇسخە)، تازىلاپ چىقىرىش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (43 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەمما بۇ خىل دورىلارنى بەرگەندە ئاغرىقنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىنى نەزەرگە ئېلىش لازىم. سۈرگە دورىلارنى بەك كۈچلۈك ياكى ئاز - تۇق بەرگەندە زەرەر كەلتۈرۈشى مۇمكىن.

(2) قان ئېلىش، بولۇپمۇ قۇلاق ئارقا تومۇرىدىن قان ئېلىشنى ئويلاپ بېقىش كېرەك. چۈشكۈرتكۈچى ۋە قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرى بولسىمۇ لېكىن خەتەردىن خالى ئەمەس.

(3) ئەفئەللىنىشنىڭ زەھىرىنى كوزگە ناھايىتى ئاز مىقداردا سۇرىمىدەك تېمىتىپ بۇ كېسەلنى داۋالاشلىق ھەققىدە خاتىرىلەر بار.

بەزىلەر ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مەتبۇخى قەند-تەرىون بېرىشنى كورسىتىدۇ (46 - نۇسخە)، مەتبۇخى قەنتەرىونغا 3 مىسقال مىقدارى ئايارەج پىيقارانى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئاغرىق جىنسى ئالاقە ۋە مىڭىنى سۇسلاشتۇردىدىغان ئىشلاردىن ساقلىنىش لازىم.

(4) ئەبوتەلى ئىبنىسىنا — نەزۇل^① تامام بولغاندا كوز پۇتۇنلەي كورمەيدۇ. بۇنىڭ دورىسى پەقەت كېسەۋېلىش (قەدەھ) دۇر — دېگەن. ھەقىقەتەنمۇ نۇزۇللۇلمانى باشلىنىشىدىلا بايقاپ تەدبىر قىلىنسا پايدا قىلىدۇ. ئەمما ئورنىتىپ قالغاندا كېسىپ ئېلىشتىن باشقا ئىلاج يوق. بۇ كېسەلگە دۇچار بولغان كىشىنىڭ بەك تويۇپ تاماق يېيىش ۋە ئىچىشتىن، جىنسى ئالاقىدىن ساقلىنىشى، چۈشتە بىر قېتىم تاماق يېيىش بىلەن چەكلىنىشى كېرەك؛

① قەدەھ — 11 - ئەسىردىكى تىۋىپلارنىڭ كوزگە سۇ چۈشۈشنى ئوپپىراتسىيە قىلىش جابدۇغى مەقدۇھ، كېسەۋېلىش ئۇسۇلى قەدەھ دەپ ئاتىلىدۇ.

شۇنىڭدەك بېلىق، ھول مەۋە، بولۇپمۇ ھەزىم بولۇشى
ئېغىرراق گۈشلەردىنمۇ ساقلىنىشى لازىم.

كۈزگە سۇ چۈشۈشنى كېسىۋېلىش تەجرىبىسى:
ئالدى بىلەن كېسىۋېلىشقا مۇمكىن ياكى مۇمكىن
ئەمەسلىكىنى ئېنىقلاش كېرەك (بۇلار يۇقۇرىدا تەپسىلى
سۆزلەندى)، مەسىلەن، سۇيۇق ھەم سۇزۇك بولغىنىنى ئالاق،
ئۇنى يورۇق چۈشۈپ تۇرغان دالدا - يايدا تەكشۈرۈپ
كورۇپ، ئۈستىگە بارماق بىلەن بېسىلىدۇ. ئۇ دەرھال
تارقىلىپ قايتا يىغىلىدۇ. ئاشۇنداق كۈزگە چۈشكەن سۇنى
كېسىۋالغاندا يوق بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. ئەمما شۇنداق
تەجرىبىنى بىرقانچە قېتىم تەكرارلاش كېسەلنى تىنچىتىپ-
لاندۇرىدۇ ۋە كېسىۋېلىشنى قىيىنلاشتۇرىدۇ. بەزىدە
ئۇنى باشقا يول بىلەن سىناپ كورۇلىدۇ؛ كۈزگە بىر
پارچە پاكىز پاختا قويۇپ شۇ پاختىغا قاتتىق پۇلىنىدۇ.
ئاندىن يىغىلغان سۇدا قوزغىلىش بار - يوقلۇغىنى بايقاش
ئۇچۇن پاختىنى تېزلىكتە ئېلىپ قارىلىدۇ. ئەگەر قوز -
غىلىش كورۇنسا بۇنى كېسىش نەتىجىلىك بولۇشى مۇمكىن.
بىر كۈزنى يۇمغاندا ئىككىنچىسىنىڭ قارىچۇغى كېڭەيسمۇ
كېسىش نەتىجە بېرىدۇ.

كۈزگە سۇ چۈشۈشنى كېسىشتىن ئاۋال تىۋەندىكى
بىرقانچە تەدبىرلەرنى قوللىنىش كېرەك:

1) پۇتۇن بەدەننى خۇسۇسەن مېڭىنى ھاددا سۇر-
گىسى بىلەن تازىلاش ياكى قان ئېلىش لازىم،

(2) تاماقنى ئاز بېرىش. خۇسۇسەن ئېغىر تاماق-
لاردىن، ماددىنى قويۇقلۇق تۇرغۇچى نەرسىلەردىن مەسىلەن،
كالا گۆشى، ماش، پۇرچاق، سامساق، چەيزە، شوخلا،
تۇرۇپ، قېتىق، ھاراقلارنى چەكلەش، جىنسى ئالاقىنى
مەنى قىلىش كېرەك. چۈنكى بۇ نەرسىلەر كوزگە سۇ
چۇشۇشنى تېزلەشتۈرىدۇ.

(3) ئاغرىقتا باش ئاغرىغى، يوتەل، زۇكام، يۈرەك
سىقىلىش ۋە تېز غەزەپلىنىدىغان ئەھۋاللار بولسا داۋالاپ
ساقايتىش لازىم. بۇلار كوزدە ئىششىق پەيدا بولۇش ياكى
كوزگە سۇ چۇشۇشنى تەكرارلايدىغان ئامىللاردۇر.

(4) كېسىش ئالدىدا ھاراقىتىن، جىنسى ئالاقىدىن
ۋە مونچىغا چۇشۇشتىن ساقلىنىش لازىم.

(5) "كامالەتكە يەتكۈزۈش" كېرەك. كېسەل باش-
لىنىشىدىلا كەسمەستىن بەلكى سۇ توختاپ، ئۇنىڭ چۇ-
شىدىغىنى چۇشۇپ ۋە ئوزى بىر ئاز قويۇقلاشقاندىن كېيىن
كېسىش كېرەك. بۇنداق قىلىشتىن مەقسەت چۇشكەن
سۇنى مىقدەھە ياردىمى بىلەن كوزنىڭ تىۋەن قىسمىغا
سۈرگەندە ئۇ ئەنە شۇ جايدا توختاپ قالىدۇ. شۇنىڭ
ئۈچۈن سۇنىڭ قويۇقلۇغى يېتەرلىك بولمىسا قويۇقلاش-
تۇرغۇچى نەرسىلەر بېرىپ قويۇقلاشتۇرۇش ياكى بەك
قويۇق بولسا يۇمشاتقۇچى نەرسىلەرنى بېرىپ ئېتىدالغا
چۇشۇرۇش لازىم. مەسىلەن، بېلىق گۆشى يىگۈزۈش، كۆھلى
جاۋاھىر سۇزمىسى تاتقۇزۇش كېرەك. چۈنكى بەك سۇيۇق

ياكى قويۇق بولسا چۈشكەن سۇنى كېسەشكە بولماي قالىدۇ.
(6) باھار پەسلىدىن باشقا پەسىللەردە كەسكىلى
بولمايدۇ. كۈن ئوچۇق، شامال—بورانسىز بىر كۈنى ۋە
بەك يورۇق بولمىغان بىر جاينى تاللاش كېرەك.
(7) كېسەلنىڭ ساق كوزىنى تېگىپ بىر كىشىنى
ئاغرىقىنى تۇتۇپ بېرىشكە ياردەملەشتۈرۈش كېرەك.
(8) ئاغرىقىنى چىداملىق بولۇش ئۈچۈن كوندۇرۇش
كېرەك.

كېسىش باسقۇچلىرى: كېسەلنى كوزنىڭ ئىچكى
بۇرجىگىگە ۋە بۇرنىغا قاراپ تۇرۇشقا بۇيرۇلىدۇ؛ شۇ
ھالەتنى ساقلاپ تۇرغان ۋاقىت ئىچىدە مەقدەھە بىلەن
تېشىلىدۇ. بۇ ئەسۋاپنى ئىككى قاتلام ئارىسىغا تاكى
كورۇش توشۇگىنىڭ ئۇدۇلىغا بارغىچە كىرگۈزۈلىدۇ. ئەسۋاپ
شۇ يەردە بوشلۇق ۋە ئارىلىققا ئۇچرايدۇ. شۇ چاغدا
بەزى ماھىر تىۋىپلار مەقدەھەنى چىقىرىۋېلىپ، شۇ ئارى-
لىققا مېھات①نىڭ قۇيرۇغىنى تىقىدۇ. ئۇنى كۆ-
رۈش توشۇگىنىڭ ئۇدۇلىغىچە كىرگۈزۈپ، مېھاتنىڭ ئۆتكۈر
تەرىپى ھەركەتلىنالايدىغان بوش جاي تەييارلايدۇ. ۋە
ئاغرىقىنى چىداشقا ئۈگىتىدۇ. كېيىن مېھاتنى بەلگىلەنگەن
چېگىرىغىچە كىرگۈزۈلىدۇ. ۋە ئۇنى سۇنىڭ ئۈستىگە قو-
يۇپ، كوزنى تازىلاپ، سۇ موڭگۈز قاتلام ئارىسىغا توۋەن
تەرەپكە يوشۇرۇنغىچە پەسكە قاراپ بېسىلىدۇ. كېيىن
① مېھات، كوزنى كېسىش ئەسۋاپلىرىدىن بىرى.

مەھاتنى خېلى ۋاقىتقىچە شۇ جايدا تۇتۇپ تۇرىدۇ، شۇنداقلا ئۇزۇل ئۆتكەن جاينىغا ئورۇنلىشىدۇ. كېيىن مەھاتنى ئۇ يەردىن ئېلىپ چۈشكەن سۇ بالدۇرقى ئو-رۇنغا قايتامدۇ - يوقمۇ قارىلىدۇ. ئەگەر ئۇ يەنە قايتسا، تاكى ئۇنىڭ قايتماسلىغىغا ئىشەنچ ھاسىل بولغىچە بالدۇرقى تەدبىر تەكرارلىنىدۇ. ئەگەر سۇ پەستكى تەرەپكە چۈشۈشكە بويسۇنمىسا، بەلكى باشقا تەرەپكە چۈشىدىغان بولسا، ئۇنى ئۆزى بېرىۋاتقان تەرەپكە ھەيدەپ شۇ يەرگە چېچىپ تاشلىنىدۇ.

ئەگەر سۇنىڭ قايتقانلىغى (قايتىلانغانلىغى) كو-رۇلسە دەل ئەنە شۇ ئېچىلغان توشۇككە مەھاتنى قايتىدىن كىرگۈزۈش لازىم، چۈنكى توشۇك تېخى پۈتۈپ كەتمىگەن بولىدۇ. ئەگەر توشۇككە قان ئېقىپ كەلسە ئۇنىمۇ چۈشۈرۈۋېلىش ۋە ئوز ھالىغا قويماسلىق كېرەك. چۈنكى ئۇ يەردە قان قېتىپ قالسا ئۇنى داۋالىغىلى بولمايدۇ.

چۈشكەن سۇنى چۈشۈرۈۋالغاندىن كېيىن كېسەل-نىڭ كوزىگە تۇخۇم سېرىغىنى بىنەپشە سۈيى ياكى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ پاختا بىلەن قۇيۇلىدۇ. ساق كوزىمۇ باغلاغلىق تۇرۇشى كېرەك. كېسەلنى 3 كۈنگىچە قاراڭغۇ جايدا ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇش لازىم. باش ئاغرىش ياكى كوزدە ئىششىشلار كورۇلسە بىر ھەپتىگىچە دورىنى يېڭىلاپ، تېڭىقنى ساقلاپ ئوڭدا ياتقۇزۇشقا توغرا كېلىدۇ.

ئەگەر ئىششىق يۇز بەرگەندە تېڭىق قاتتىق بولسا بىر ئاز بوشىتىش كېرەك. خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا كېسەل كىشى كۆزىگە قويۇلغان نەرسىنى ئاغرىق كەتكىچە ساقلىشى ۋە تېڭىقنى يەشمەسلىكى پايدىلىق. لېكىن تېڭىقنى ئادەتتە 3 كۈندە بىر قېتىم يېشىپ دورىنى يېڭىلاپ تۇرۇش كېرەك.

تېڭىق يېشىلگەندە قىزىلگۈلنى سۇدا قاينىتىپ بىر ئاز ئىلماق ھالغا كەلگەندە پاختا ياكى لاتىنى ھوللەپ كۆزگە قويۇش مۇمكىن.

كۆزگە چۈشكەن سۇنى كېسىۋېلىشتا تىۋىپلارنىڭ يەنە بىر قانچە ئۇسۇللىرى بار: بەزىلەر مۇڭگۈزسىمان قاتلامنى يېرىپ شۇ جايدىن سۇنى چىقىرىۋالىدۇ. بىراق بۇ ئۇسۇل خەتەرلىك. چۈنكى سۇ قويۇقراق بولسا، ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئاقسىلسىمان سۇيۇقلىقنىڭمۇ چىقىشى مۇمكىن.

III ماقالا. قۇلاق، بۇرۇن ۋە گال (تاماق) كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: قۇلاق كېسەللىكلىرى

قۇلاق ئاغرىش (ۋە جىمىل ئۇزۇن)

قۇلاق ئىسسىق ياكى سوغاقتىن ۋە يەلدىن ئاغ-
رىيدۇ. شۇنىڭدەك قۇلاقنىڭ باشقا ھەرخىل زەرەرلە-
نىشلىرىگە قوشۇلۇپمۇ كېلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىسسىقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىغى:

1. قۇلاق ئىچى قاتتىق ئېچىش بىلەن كىشىنى
بىئارام قىلىدۇ. كوز ۋە قۇلاق ئەتراپلىرى قىزارغان
بولىدۇ. كېسەل قۇلىغىدا ئوت كويۇۋاتقاندا ھىس قى-
لىدۇ، يېرىك ئاقىدۇ ۋە سوغاق تەدبىرلەر قىلىنسا ئارام
بېرىدۇ. مەيدىدىكى سەۋەپتىن كېلىپ چىققان بولسا
قىزىل ئوڭگەچ ئېچىشىدۇ. ئۇسسۇزلۇق يامان بولۇپ،
كوزدىن ياش ئاقىدۇ. بەزىدە قاتتىق ئىسسىق ھاۋادا
يول مىڭىش ياكى ئىسسىق ئارىشاڭلارغا چۇشۇش بە-
لەنمۇ قۇلاق ئاغرىغى كېلىپ چىقىدۇ. ئالامەتلىرى يۇ-
قۇرقىدەك بولىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر زورۇر بولسا، باسلىق تومۇر-
دىن قان ئېلىش ۋە سوغاق نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلە-
نىش كېرەك. قۇلاق ئىچىگە بىنەپشە يېغى، گۈل يېغى
تامغۇزۇش ياكى بىر ئاز ئەپيۇننى ئايال سۈتىدە ئېرىتىپ
قۇلاققا تامغۇزۇش لازىم. گۈل يېغى بىلەن سىركىنى
بىللە قاينىتىپ سۈۋۈغاندىن كېيىن قۇلاققا تامغۇزۇش،
قۇلاققا سوغاق ئوتكۈزۈش يۇمغاقسۇت، ھول قاپاق، ئو-
سۇڭ قاتارلىقلارنى كۆپرەك ئىستىمال قىلىش.

2. سوغاقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقى:

مەئىدە بارلىققا كەلگەن سوغاق يەللەر ياكى
مىڭدە بولغان ئارتۇقچە سوغاق ماددىلارنىڭ قۇلاققا
چۈشۈشى بىلەن ئاغرىش پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەئىدىدىكى سەۋەپتىن كېلىپ چىق-
قان بولسا، كۆڭلى ئاينىش، ئېغىزدىن كۆپ سۇ ئېقىش،
يېنىك باش ئاغرىشلار بولۇپ، باشقا ئىسسىق سۇ قۇيۇل-
سا ئارام ئالىدۇ. مىڭدىكى سەۋەپتىن كېلىپ چىققان
بولسا باش ئېغىرلىشىپ ئاغرىپ تۇرىدۇ. قۇلاققا ھەرخىل
ئاۋازلار ئاڭلىنىش بىلەن ئاغرىشىمۇ بىللە داۋاملىشىدۇ.

داۋاسى: ئايارەج پەيقارا، ھەببى قوقسىيا
(16 - 17 - نۇسخىلار) نىڭ بىرى بېرىلىدۇ. قۇلاق ئىچىگە
ھەرخىل ئىسسىقلىق ياغلار مەسىلەن، سۇزاپ يېغى، ئىنەك
پىتى يېغى تامغۇزۇش كېرەك. ئەگەر تېخىمۇ ئىسسىقلىق
قىلىش ھاجەت بولسا، مەزكۇر ياغلارغا ئازراق قۇندۇز
قەرى، پەرىپيون ئارىلاشتۇرۇپ تېمىتىش كېرەك.

ئاڭلاشنىڭ بۇزۇلۇشى (تەرەش)

ئاڭلاشنىڭ بۇزۇلۇشى — ئاڭلاش قابىلىيىتىنىڭ يېم-
تەرسىزلىكى (تەرەش)، تۇغۇلغاندىن كېيىنكى پائاللىق
(ۋەقەرى) ۋە تۇغما پائاللىق (سۇمام) دەپ ئۈچ خىلغا
بولىنىدۇ.

سەۋەپلىرى:

- (1) تۇغما بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭ داۋاسى يوق؛
- (2) قۇلاقنىڭ ھاۋا كىرىش يوللىرىغا توسالغۇ پەيدا
بولۇشى؛ (3) قېرىقلىق نەتىجىسىدە مىزانىڭ قۇرۇق
سوغاقلىققا ئۆزگىرىشى؛ (4) يىقىلىش ياكى ئورۇلۇش
نەتىجىسىدە ئاڭلاش ئەسەپلىرىنىڭ زەھەرلىنىشى؛ (5) كې-
رىك قاتارلىق قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا بوھران بولغاندا
تەرلەش بىلەن سەپرا ماددىسى قۇلاققا كېلىپ چۈشۈشى
نەتىجىسىدە گاسلىق پەيدا بولىدۇ. ياكى كېزىكنىڭ
ئاخىرقى دەۋرلىرىدەمۇ گاسلىق پەيدا بولۇشى مۇمكىن،
- (6) ئىسسىق، سوغاق، ھول، قۇرۇق ھالەتتىكى مىزان-
نىڭ بۇزۇلۇشى قۇلاقنىڭ ئاڭلاش ئالەتلىرىگە چۈشۈپ
قالسا قۇلاققا گاسلىق پەيدا قىلىدۇ. چۈنكى مىزاننىڭ
بۇزۇلۇشى قۇلاق ئەسەپلىرىنى ھەرخىل دەرىجىدە زەرەرلەپ
ئاڭلاشنى بۇزۇپ قويدۇ.

ئالامەتلىرى: مىزان بۇزۇلمىغان تۇرلىرىدە
ئالامەتدە ئالامەتلەر بولمايدۇ. پەقەت ئاڭلاشنىڭ ھەرخىل
دەرىجىدە بۇزۇلغانلىقى كۆرىلىدۇ. مىجەز بۇزۇلغان تۇر-

لىرىدە بولسا قۇلاقنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدا ئاغرىش ۋە ئېچىش بولىدۇ. سوغاقلق تۈپەيلىدىن يۈز بەرگەن بولسا، سوغاق دورا ياكى سوغاق ئوتكۈزۈش تەدبىرلىرى پاڭلىقنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئىسسىقلىق بولغانلىرىدا بولسا ئىسسىقلىق قىلىش زەرەر قىلىدۇ.

داۋالاش: تۇغما پاڭ، قېرىقلىتىكى ۋە توسانغۇ-لار نەتىجىسىدىكى پاڭلىق ساقايمايدۇ. ئاڭلاش ئەسەپ-لىرىنىڭ زەخمىلىنىشى بىلەن بولغان پاڭلىقمۇ تولۇق ساقايماستىن مۇمكىن. كېزىك ئاغرىقلىرىدىن بولغان پاڭلىقتا ئالدى بىلەن مەتبۇخ ھېلىلە (38-نۇسخە) بېرىپ ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش، ئۇندىن كېيىن تو-ۋەندىكى تەدبىرنى قىلىش لازىم.

ئانار بىلەن داۋالاش (داۋايى رۇممان):

ئاچچىق ئانار 1 دانە، سىركە 5 مىسقال، كۈن-دۇر 1 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئانارنىڭ كىز-

دىگىدىن تېشىپ دانلىرى ۋە ئىچىدىكى پوستلىرىنى پۈتۈنلەي ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئانار دانە-لىرىنى سىقىپ، سۇزۇپ سۈيىنى ئانار ئىچىگە قۇيۇپ ئۇستىدىن سىركە قۇيۇپ ئۇستىگە كۈندۈرنى تاشلايمىز. ئانارنى چوغ ئۇستىدە بىر دەم قۇيۇپ قىزىتىپلا ئېلىپ ئىچىدىكى سۇدىن قۇلاق ئىچىگە تامغۇزۇلىدۇ.

مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغاندا، ئالدى بىلەن

مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تورۇلغا گۆشى، مىكىيان گۆشى بېرىش بىلەن بىللە، ئىچىشكە دىنار شەرۋىتى بېرىلىدۇ. بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك، سەئىتەر، بىنەپشە، چىگسەيلەرنى قاينىتىپ ئۇنىڭدىن چىققان ھورغا قۇلاقنى ھەرلىگىچە تۇتۇش لازىم. قۇلاق ئىچىدىكى كىرلەر توسالغۇ پەيدا قىلىپ ئاڭلاشقا تەسىر بەرگەن بولسا، كىرنى تازىلاش لازىم. ھەركۈنى ئاخشىمى قۇلاق ئىچىگە كۈنجۈت يېغى، گۈل يېغى ياكى بادام يېغىدىن بىرنى تامغۇزۇپ، ئەتىسى قۇلاقنى قايناقسۇ ھورىغا تۇتۇش لازىم. شۇنىڭ بىلەن يۇمشاپ چىققان كىرلەر تازىلىنىدۇ.

قۇلاق قىچقىرىش (تىنىمىن)

قۇلاق ئىچىدە قاتتىق چىقىرىغاندەك ئاۋاز ئاڭ-لىنىپ تۇرۇش قۇلاق قىچقىرىش (تىنىمىن) دەپ ئېيتىلىدۇ. بوشراق گۆكىرىگەندەك ئاۋاز ئاڭلىنىشى "دەۋى" دىيىلىدۇ. **داۋاسى:** سەۋەپنى يوقىتىش كېرەك. ئەگەر قۇلاقنىڭ ھىس قىلىش قۇۋۋىتى ئېشىپ كېتىش ياكى قالايىمقانلىشىپ كېتىشى سەۋەپ بولسا، قوي، كالا پا-قالچەكلىرى بىلەن ئوزۇقلىنىش، سىركە بىلەن گۈل يېغىنى بىللە قاينىتىپ ئازراق ئەپيۇن ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاق ئىچىگە تامغۇزۇش كېرەك.

قۇلاقتىن قان ئېقىش

ئەگەر قاننىڭ بەك زىيادىلىكىدىن بولسا، بەدەندە قان زىيادىلىك ئالامەتلىرى بولىدۇ. مۇنداق ھاللاردا

قېپال تومۇردىن قان ئېلىش لازىم. زەربە نەتىجىسىدىن بولسا موزنى سىركە بىلەن قاينىتىپ قۇلاققا تامغۇزۇش كېرەك. ئەگەر قىزىتما بوھرانىدىن بولسا، كېسەلنىڭ ئايلىنىپ كېتىش خەۋپى بولمىسا قاننى توختاتماسلىق لازىم.

ئىلان، چايان قاتارلىق زەھەرلىك جاندارنىڭ چېقىشى بىلەن قۇلاقتىن قان كەلسە زەھەرنى قايتۇرۇش چارىلىرىنى بىرلىكتە كورۇش لازىم. بۇلاردىن باشقا قۇلاقنىڭ دائىم قىچىشى ئۇچ-رايدۇ. بۇنىڭغا ئەپسەنتىنى سىركە بىلەن قاينىتىپ، سۇزۇپ، ئاچچىق بادام يېغى بىلەن قۇلاققا تامغۇزۇلىدۇ.

2 - پەسىل: بۇرۇن كېسەللىكلىرى

پۇراش سىزىمىنىڭ يوق بولۇشى

بۇرۇنغا ھىچقانداق پۇراق پۇرمايدىغان ئەھۋال-لار بۇرۇن ئىچىدە گۆش ئۆسۈپ قېلىش ياكى توسالغۇ بولىدىغان ياللۇغلىنىشلار نەتىجىسىدە يۈز بېرىدۇ.

زىيادە گۆشنىڭ پەيدا بولۇپ قېلىشى بۇرۇن بوۋاسىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭغا كورلىدىغان چارە-تەدبىرلەر بوۋاسىر بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ياللۇغلىنىش نەتىجىسىدىكى توسىلىشىنىڭ ئالامەتلىرى — بۇرۇندىن زەر-داپ سۇ ئاقىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ. زەخمىلىنىش جارا-

ھەتكە ئايلىنىپ بۇرۇن قاناتلىرىغا زەرەر يەتكۈزگەندە
”ئەلەق“ دەپ ئاتىلىدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىش بىلەن مۇۋاپىق جايغا
ھىجامەت قويۇش كېرەك. ھەببى قوقىيا ياكى ھەببى
ئايارەج بىلەن تازىلاش كېرەك. جاراھەتكە توۋەندىكى
دورىلار بېرىلىدۇ:

كويىدۇرۇلگەن مىس، زاكىلارنى باراۋەر مىقداردا،
زەررىخىدىن $\frac{1}{2}$ ھەسسە ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ مۇۋاپىق
ماي بىلەن مەلھەم قىلىپ سۈركەشكە بېرىلىدۇ.
زىيادە ئۆسۈپ قالغان گوشنى تېغ بىلەن كېسىش
كېرەك، ياكى قىل بىلەن بوغۇپ قويۇلسا بىر ئەچچە
كۈندىن كېيىن ئۆزىچە چۈشۈپ كېتىدۇ.

پۇراشنىڭ بۇزۇلۇشى

پۇراشنىڭ بۇزۇلۇشى — ھەرخىل پۇراقلىق ماددىلار -
دىن بىرخىل پۇراق سېزىش، بىرخىل پۇراقلىق ماددىدىن
بىر قانچە خىل پۇراق سېزىش ياكى بىرخىللا پۇراقنى
سېزىپ، باشقىنى سەزمەسلىك (مەسىلەن، خۇشپۇراقنى
سېزىپ بەدبوي پۇراقنى سەزمەسلىك) دىن ئىبارەت.

سەۋىبى: (1) مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشى ياكى بۇ -
رۇن يوللىرىدىكى زەرەرلىنىشلەر، (2) ئىسسىق ياكى
سوغاقلارنىڭ تەسىر قىلىشى، مەسىلەن، ئىسسىقلىق مىڭ -
نىڭ پۇراش خىزمىتىنى بۇزىدۇ. سوغاقلىق ھىس قابى -
لىيىتىنى توۋەنلەشتۈرىدۇ.

داۋاسى: مىزاجنى ئۆزگەرتىش تەدبىرلىرىنى قىلىش بىلەن ھەببى ئايارەج، ھەببى قوقىيا بېرىلىدۇ (16 - 7 - نۇسخىلار) ۋە بىنەپشە، نىلۇفەر ۋە بابونىلارنى قاينىتىپ بۇرۇنغا تۇتۇش كېرەك. مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئىسسىق مىزاج بولسا كافۇر، سەندەل-لەرنى كۆيدۈرۈپ بۇرۇننى ئىسلاپ بېرىش لازىم. ئەگەر سوغاق مىزاج بولسا، بابونە، ئەكىللىك، سوتتەر، دەرەمەنە، مەر زەنجۈشلەرنى قاينىتىپ بۇرۇنغا تۇتۇلىدۇ. ئەگەر خۇشپۇراقنى سېزىپ، سېسىق پۇراقنى سەز-مىسە قۇندۇز قەرىنى يۇمشاق سوقۇپ بۇرۇنغا تارتىش كېرەك. سېسىق پۇراقنى سېزىپ خۇشپۇراقنى سەزمىگەندە بۇرۇنغا ئىپار تاتقۇزۇش لازىم.

بۇرۇندىكى جاراھەت

بۇرۇن ئىچىگە تۇرلۇك سەۋەپلەر بىلەن تۇرلۇك جاراھەتلەر چىقىدۇ. بۇلارنىڭ بەزىلىرى نەم، بەزىلىرى قۇرۇق بولىدۇ.

سەۋەبى: نەم جاراھەتلەر مىڭدىن ئوشۇقچە ھوللۇكنىڭ بۇرۇنغا چۈشۈشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. بۇ خىلدىكى جاراھەتلەرگە چارە كۆرۈشتە ئالدى بىلەن مۇۋاپىق جايغا ھىجامەت قويۇش ۋە مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا (17 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. ھەمدە توۋەندىكى ياغ دورا ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

ئىسپىداچ (قەلەي تۈزى)، مۇردارسەڭ، قوغۇشۇن

تۈزىنى يۇمشاق سوقۇپ، گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ
جاراھەتنى ياغلاشقا بېرىلىدۇ. 50 - نۇسخىدىكى مەلەمى
ئىسپىداچ بېرىلىدۇ.

قۇرۇق جاراھەتلىرىنىڭ سەۋىيى كويگەن خىلتلار
بولۇپ كۆپ ئۇچرايدۇ. داۋالاشتا، بۇرۇنغا 51 - نۇسخا -
خىدىكى مايىنى ياغلاشقا بېرىلىدۇ. بۇ جاراھەتلىر ئۇزۇن -
غا سوزۇلۇپ كەتسە، يامان سۈپەتلىك جاراھەتلىرىگە
ئايلىنىپ، دائىم سېسىق پۇراق چىقىرىپ تۇرىدۇ.
بۇنداق بولشى مەزكۇر جاراھەتلىرىگە ھەرخىل جەراسم -
لارنىڭ قوشۇلۇشىدىندۇر. بۇنىڭغا قارا خەربەقنى سوقۇپ
بۇرۇنغا پۈركەش بىلەن، بۇرۇن ئىچىنى سىركە بىلەن
چايقاش كېرەك.

بۇرۇن قاناش (رناف)

بۇرۇن قاناش ئادەتتە قىزىتمىلىق كېسەللەرنىڭ
بوھرانىدىن ۋە بەدەندە قاننىڭ بەك زىيادىلىغىدىن
كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

سەۋىيى: (1) تەپ يەنى كېزىك كېسەللەكلە -
رىدە بوھران كۈنلىرىدە بۇرۇن قانايدۇ، بۇ ئاغرىقنىڭ
ساقىيىش دەۋرىگە كىرگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى
كېسەللىك ماددىلار قان بىلەن قوشۇلۇپ چىقىپ كېتىدۇ.
لېكىن ئارتۇق قاناپ ھۇشىدىن كېتىشتەك ئەھۋال -
لارنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىش لازىم. (2) قاننىڭ
بەدەندە ئېشىپ كېتىشىدىن بۇرۇن ئىچىدىكى تومۇرلار

ئېچىلىپ كېتىپ (يېرىلىپ كېتىپ) بۇرۇن قانايدۇ. مۇنداق ھاللاردا قان ئاز-ئاز ئەمما سۇيۇق ئاقىدۇ. سەپ-رانىڭ غالىپلىقى كورۇلىدۇ.

داۋاسى: بوھران ئەمەسلىكى بىلىنگەن زامان دەرھال توختىتىش تەدبىرلىرىنى كورۇش كېرەك. مەسەلەن قول، پۇت، ئەمچەك، قۇلاقلىرىنى تېگىش بىلەن ئاق سەندەل گۇلابىغا كافۇر ئېزىپ پىشانىگە چېپىلىدۇ. باشقا مۇز قويۇلىدۇ. موزا، قۇرۇق يۇمغاقسۇت، تۈگمەن توزۇندىسى، كۈندۈر، سەبرى، خۇسنىياۋشان، زەمچىلەرنى ھاجەتكە لايىق ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، تۇخۇم ئېقىغا چىلانغان پاختا پىلىتىگە يۇقتۇرۇپ قاناۋاتقان بۇرۇن توشۇگىگە تىقىلىدۇ. بۇ چارە بىر قانچە قېتىم تەكرارلىنىدۇ. ئەگەر قان بېسىمى يۇقۇرىلىقتىن بولسا ئاغرىقتا قان بېسىمى يۇقۇرىلىقنىڭ ئالامەتلىرى بولىدۇ.

مۇنداق ھاللاردا ئەھۋالغا قاراپ قان ئېلىش ياكى ھىجامەت قويۇش كېرەك. لىمون قوشقان چىلان شەرۋىتى، ئالما شەرۋىتى، ئۇزۇم غورىسىنىڭ شەربىتى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ ۋە يۇقۇرقى چارە بىلەن بۇرۇنغا پاختا پىلتە تىقىش كېرەك. ياكى ئومچۇك تورىنى تازىلاپ بۇرۇنغا تىقىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

بۇرۇندىن سېسىق پۇراق كېلىش (نەتۈلى ئەنەق)

بۇ كېسەلدە كۆپىنچە ئاغرىق ئوزۇننىڭ تىنىغە-دىكى سېسىقلىقنى سەزمەيدۇ.

سەۋىيى: بۇرۇن ئىچىدىكى كونىراپ كەتكەن بوۋاسىر ياكى باشقا ھەرخىل جاراھەتلەرنىڭ سېسىقلىق بېرىشى؛ مىڭە ياكى باشقا ئەزالار (مەسىلەن، مەئدە) دىكى خىلىتلار بۇزۇلۇپ ئېغىز ياكى بۇرۇن ئارقىلىق پۇراق بېرىشىدىن بولۇپ، شۇ ئەزالاردىكى قوشۇمچە ئاغرىقلار بىللە بولىدۇ.

داۋاسى: خىلىتلارنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا (17 - نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سىركە، ئۇزۇم غورىسىنىڭ سۈيى ۋە قىچىلار - نى ئارىلاشتۇرۇپ ئېغىزنى چايقاش لازىم. قىزىلگۈل، قەلەمپۇر، سۈمبۇللارنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش بىلەن بۇرۇنغا رەبھان شارابى تامغۇزۇش كېرەك.

چۈشكۈرۈش (ئەتسە)

چۈشكۈرۈش ئۆپكىدىن كەلگەن يۈتەلگە ئوخشاش مۇھاپىزەت قىلغۇچى ئامىل بولۇپ مىڭنىڭ ساغلاملىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ ئېتىدالدىن زىيادە بولۇپ كېتىشى مىڭنىڭ زەرەرلەنگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بولۇپمۇ زۇكام ۋە قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ باشلىنىشىدا چۈشكۈرۈشنىڭ كۆپ بولۇشى ياخشى ئالامەتلەر. دىن ئەمەس. ساغلام كىشىلەرنىڭ ۋە تۇغۇت ۋاقتىدا ئاياللارنىڭ چۈشكۈرۈشى پايدىلىق ھېساپلىنىدۇ. ھەددىدىن ئارتۇق چۈشكۈرۈشنى داۋالاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن باشقا ئىسسىق سۇ قۇيۇشقا بۇيرۇلىدۇ. بۇرۇنغا سۈمبۇل،

ئاق سەندەل ئەرەقىنى تارتىشقا بېرىلىدۇ. قۇلاق ئىچىگە بادام يېغى، گۈل يېغى تامغۇزۇش كېرەك. ئەگەر بوۋاق-لاردا بولسا قوي بورىگىنى كاۋاپ قىلغاندا ئېقىپ چىق-قان سۇنى تامغۇزۇشقا بۇيرۇش كېرەك.

بۇرۇن قىچىشىش (ھىككە تۇل ئەنەفى)

بۇرۇننىڭ كۆپ قىچىشىپ كېتىشى زۇكام، نەزلە ياكى چېچەك كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرى سۈپىتىدە كۆرىلىشى مۇمكىن. بۇنداقتا سەۋىيىنى داۋالاش كېرەك. ئەگەر سوغاق ھاۋا ياكى بەدەندىكى بۇخاراتلار سەۋىيىدىن بولسا مەتبۇخ شاتەرە بېرىلگەندىن كېيىن، ئىترىپىل كەشىنىز بېرىلىدۇ (6 - 39 - نۇسخىلار).

3-پەسىل: تىل كېسەللىرى

1. تىلنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى لىسان)

تىلنىڭ ياللۇغلىنىشلىرى سەۋەپ جەھەتتىن قاندىن، سەۋدادىن، بەلغەمدىن ۋە سەپرادىن بولغان دىگەندەك 4 خىلغا بولىدۇ.

(1) قاندىن بولغان ياللۇغلىنىش (ۋەرەمى دەمەۋى): ئالامەتلىرى تىل قىزىرىپ قالىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ ۋە ئېغىزدىن شولىگەي ئاقىدۇ.

داۋاسى: قىيال تومۇرىدىن قان ئېلىش، سۈرگە دورىلار بىلەن بىللە مەتبۇخ بېرىلىدۇ. تىل ئۈستىگە

مەلەم ئىشلىتىشنىڭ ھاجىتى يوق. ۋەرەمنى ياندۇرۇش ئۈچۈن بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك، بىنەپشە، خىيارى شەنبەر، ئانار گۈلى، سەندەل، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى قوشۇپ ئېغىزنى چايقاشقا بېرىلىدۇ.

(2) سەۋدادىن بولغان تىل ياللۇغلىرىدا تىلنىڭ رەڭگى سېرىق بولىدۇ. ئاغرىش ۋە ئېچىشىش بولۇپ، تىلنىڭ شەكلى تامامەن ئۆزگىرىدۇ. داۋاسى — قان ئېلىش پايدا بەرمەيدۇ، قاندىن بولغان تىل ياللۇغىدىكى چارد-لارنى قىلىش بىلەن ھېلىلە قايناتمىسى (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەمدىن بولغان تىل ياللۇغلىرىدا تىل ئاق رەڭلىك بولۇپ، ئېغىزدىن كۆپ سۇ ئاقىدۇ. ئاغرىش ئانچە بولمايدۇ. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھەقنە قىلىنىدۇ. بېدىيان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بىنەپشە، چىلانلارنى قاينىتىپ سۈيگە گۈلقەن سېلىپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك. مەجۇنى مەشدر تۇس (25 - نۇسخە)، سەنجەرىنا (33 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) سەۋدادىن بولغان تىل ياللۇغىدا تىلنىڭ رەڭگى قارا، ئېغىز ئىچى قۇرغاق بولىدۇ. ئەنجىر، شۈمشە زىغىرنى قاينىتىپ، سۈيگە بىنەپشە يېغى قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش ئۈچۈن بېرىلىدۇ ۋە ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخ ئەپتىمۇن بېرىلىدۇ (20 - نۇسخە).

تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى

تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى ئاساسەن ئېغىزغا بىر نەرسە تېتىماسلىق، ياكى ئەكسىچە سېزىش مەسىلىسى، ئاچچىق نەرسىنى تاتلىق، تاتلىق نەرسە ئاچچىق سېزىشلەردىن ئىبارەتتۇر.

سەۋەبى: (1) مىڭدىن كېلىپ شاخلاغان تىل ئاستى سەزگۈ ئەسەپلىرى ئارتۇق سۇيۇقلۇقلار تەسىرى بىلەن نەملىكنى قوبۇل قىلىپ، تىلنىڭ تەم سېزىشى ئۈزگۈرىدۇ. (2) ماددىلارنىڭ كەيپىيات ئەھۋالى سەۋەپ بولىدۇ. مەسىلەن، قان غالىپ بولغاندا ئېغىز دائىم تاتلىق، سەپرادا ئاچچىق. بەلغەمدە تۈزلۈك، سەۋدادا چۇچىمەل بولىدۇ.

داۋالاش: ئارتۇق سۇيۇقلۇقنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (45 - نۇسخە) بېرىپ، ئېغىزنى چايقاش ئۈچۈن ئاقىر قەرھا، تۇخۇمەك ئۇزۇمى، قىچىلارنى ھا - جەتكە لايىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىدە ئېغىز چايقىلىدۇ. تازىلاش ئۈچۈن ئايپارەج پەيقارا، ھەبىي قوقىيا (16 - 17 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.

تىلنىڭ ئېغىرلىغى

بۇ كېسەلدە ئاغرىق سوزلەشتە قىيىنلىدۇ. ھەرىپ - لەرنىڭ تاۋۇشىنى توغرا تەلەپپۇز قىلالمايدۇ.

سەۋەبى: مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى - كوپىنچە ئىس - سىقتىن بولىدۇ. بۇنداق ھاللاردا تىل سۇيۇقلۇقنى يو -

قىتىدۇ. تىل گەشلىرى ۋە پەيلىرى تارتىشىش ھالىغا كېلىپ تىلنىڭ ئەركىن ھەركەت قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن سوزنى دادىل ۋە ئاھاڭلىق چىقىرىشقا تەسىر بېرىدۇ. بۇخىلدىكى تىلنىڭ ئېغىرلە-
غىنى ساقايتىش قىيىن، پەقەت كېسەلنىڭ ئېغىرلىشىپ كەتمەسلىكىگە چارە قىلىنسا نەتىجىلىك بولىشى مۇمكىن.
(2) تىلنىڭ پالەچ بولۇشى — بۇ چاغدا باشقا

ئەزالاردا پالەچلىك ئالامەتلىرى بولماسلىقى مۇمكىن. ياكى مىڭنىڭ سېزىش قابىلىيىتى زەرەرلەنگەن بولۇپ، تىل ھەركەتسىز ۋە ئېغىزدىن دائىم سۇ ئېقىپ تۇرىدىغان بولىدۇ. پالەچ ئېغىر بولسا، پەقەت سوز قىلالايدۇ. يېنىڭىرەك بولغاندا كېكەچلىنىپ سوزلايدۇ.
(3) قۇرۇقلۇق نەتىجىسىدە تىلنىڭ پەيلىرى تارتىشىپ قالىدۇ. سوز قىلغاندا تەسلىك بىلەن سوزلەيدۇ. تىلنىڭ ھەركەت قىلىشى ناچار بولىدۇ.

(4) مىڭ پەردە ياللۇغى (سەرسام) كېسىلىنىڭ بىر ئالامىتى بولۇپ كېلىدۇ ياكى مەزكۇر كېسەلدىن كېيىن ئاسارەت بولۇپ قالىدۇ. بۇ مىڭ پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشى نەتىجىسىدە ماددىنىڭ مىڭدىن تىل ئەسەپلىرىگە قۇيۇلىشىدىن بولىدۇ.

(5) تىل ئاستىدىكى چاندېرنىڭ قىسقا بولۇشى — بۇ تۇغما بولۇشى ياكى تىل ئاستىغا جاراھەت چىقىپ قالدۇرغان تارتۇق نەتىجىسىدە تىل ئاستىدىكى پەيلەر قىسقىرىپ قېلىشىدىن بولىدۇ.

داۋاسى: (1) ئىسسىقتىن مىزاجى بۇزۇلغان

ئاغرىقلارغا ھوللۇك نەرسىلەرنى تىلغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. مەسىلەن، بىنەپشە يېغى، قاپاق مېغىزى، تاتلىق بادام يېغى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ لۇئانى، توخۇ يېغى، ئودەك يېغى قاتارلىقلارنى بىرلەش- تۇرۇپ مېغىز دورىلارنى ئېزىپ بىرلىكتە تىل ئۈستىگە بىر قانچە قېتىم سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(2) خىلىدىكىلەرگە ئالدى بىلەن مۇۋاپىق سۈرگە بېرىلىدۇ. قىچا، ئاقىر قەرھا، سوتتەر، توغرىغىلارنى بىرلىكتە قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشقا ۋە تىلگە سۈركەش- كە بېرىلىدۇ.

(3) قۇرۇقلۇق نەتىجىسىدە تىل پەيلىرى تارتى- شىپ قالغان ئاغرىقلارغا ئالدى بىلەن ھەببى ئىستەم- خىقۇن ياكى ئايارەج پەيقارا (7 - 11 - نۇسخىلار) بېرىد- لىپ، نۇشادىر، پىلىپىل بىلەن ئېغىزنى چايقاپ، سېرىق چىچەك يېغى، بابونە يېغىنى تىلگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(4) مىڭ پەردە ياللۇغىدا ئېغىزدىن سۇ ئاققۇزۇش كۇپايە قىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن نوشۇدور بىلەن ئاق تۈزنى ئارىلاشتۇرۇپ تىلغا سۈركەش كېرەك.

(5) تىل ئاستىدىكى چاندىر قىسقىرىپ قالغاندا چاندىرنى كېسىش كېرەك. كەسكەندە تىل ئاستىدىكى شىريانلەرنىڭ كېسىلىپ كەتمەسلىگىگە دىققەت قىلىش بىلەن كېسىپ بولغاندىن كېيىن قان توختىتىش ئۈچۈن كەسكەن جايغا زاك سېپىلىدۇ.

تېلنىڭ چۇڭىيىپ كېتىشى (ئىدلا ئۇللىسان)

ئاغرىقنىڭ تىلى بەك چۇڭىيىپ كېتىپ ئېغىزغا پاتماستىن سىرتقا چىقىپ قالىدۇ.

سەۋىيى: ئارتۇقچە ھوللۇكنىڭ باشتىن كېلىپ تىل گۈشلىرىگە چۇشۇشى ياكى ماددىلاردىن قان ياكى بەلغەم نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بىلەك ياكى تىل ئاس-تىدىن قان ئېلىش، تىل ئۇستىگە قاتۇرغۇچى (قابىز) دورىلارنى — سۈركەش، ئاچچىق ئانار سۈيى بىلەن ئېغىز ئىچىنى چايىقاپ بېرىش لازىم. نەتىجە بەرمىگەندە دەستكارە (ئوپىراتسىيە) بىلەن ئىلاج قىلىنىدۇ.

تىل ئاستى ئوسمىسى (زەپدەغ) ①

تىل ئاستىدا ئوسۇپ قالغان ئوسمە گۈش بولۇپ، شەكلى ۋە رەڭگى خۇددى پاقىغا ئوخشايدۇ.

سەۋىيى: كۆپىنچە قان ياكى بەلغەم ماددىسىنىڭ تىل ئاستىغا چۇشۇپ قېتىپ قېلىشىدىن بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەتبۇخ ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سوۋىتىر، زۇپا، تۇز، ئانار پوستى، نوشۇدور، زاك، زاڭگار، گۈل سەسەنلەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ سىركە ئېلەشتۈرۈپ ئېغىزنى چايىقاش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

① زەپدەغ — پاقا دېگەنلىك بولۇپ تىل ئاستى ئوسمىسى پاقاسىمان شەكىلدە بولىدىغانلىقى ئۈچۈن شۇ نام بېرىلگەن.

ئەگەر بۇ ئۇسۇل نەتىجە بەرمىسە يىڭنە بىلەن تېشىپ سۈيىنى چىقىرىپ تاشلىغاندىن كېيىن قاچا بىلەن كېسىپ ئېلىنىدۇ.

تىلىنىڭ يېرىلىپ كېتىشى

مىڭە قاتتىق قۇرۇقلۇق كەيىپياتقا ئۇچراپ قېلىشى نەتىجىسىدە ياكى ئوزۇقلۇق ماددىلىرى ناچار ۋە كوك-تاتلارنى ئاز يىگەندە ئەتىيازدا پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تىل ئۇستى يول-يول بولۇپ يېرىلىپ كېتىدۇ. رەڭگى قىزىل بولۇپ دائىم ئېچىشىپ تۇرىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىك قۇرۇقلۇق ئالامەتلىرىمۇ بولىدۇ. بۇ ھال كۆپىنچە چالاش كېسەللىكىدە ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، بىنەپشە يېغى ۋە موم يېغى قاتار-لىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئوزۇغىنى ياخشىلاپ، يېڭى كۆكتاتلار ئىستىمال قىلدۇرۇلىدۇ.

تىلىنىڭ قۇرۇپ كېتىشى

تىلىنىڭ قۇرۇپ كېتىشى كۆپىنچە كېزىك ئاغرىق-لاردا قىزىتمىدىن، قان، سەپرا ماددىلارنىڭ غالىپ بو-لىشىدىن، ياكى مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى — قۇرۇق ئىسسىق-لىقتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تىل دائىم قۇرۇق بولۇپ سېرىق گەز باغلاپ تۇرىدۇ. بەدەندە قان ياكى سەپرا كۆپلىك ئالامەتلىرى بار بولىدۇ. بەزىدە بەدەندە ھىچبىر ئالا-

مەتلەر بولماستىن تىلنىڭ قۇرۇق بولۇشىمۇ ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: ھوللۇك نەرسىلەر بېرىلىدۇ. مەسىلەن،
 بىيە ئۇرۇغى، ئىلۇفەر ۋە شېكەرلەرنى ئېھتىياجغا لايىق
 مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ، سۈيىنى ئېغىزدا تۇتۇپ
 تۇرۇش لازىم. قاپاق ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، پە -
 تەنگان ئۇرۇغى، تاۋۇز ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزلىرىدىن شىرە
 چىقىرىپ، ئېغىز ئىچىدە تۇتۇپ تۇرۇپ ئىچىشكە بېرىدۇ.
 بەزىدە جىگەر خىزمىتىنىڭ ئاجىزلىغىدىمۇ تىلنىڭ
 قۇرۇق قېلىشى ئۇچرايدۇ. بۇخىل ئەھۋالدا ئەسلى سە -
 ۋىبىنى داۋالاشنى بىرلىكتە ئېلىپ بېرىش لازىم.

تىلنىڭ جاراھەتلىنىشىلىرى

تىلنىڭ ياللۇغلىنىشى، ئىسسىق خىلىتلارنىڭ تەسىرى،
 ئۆتكۈر نەرسىلەر (مەسىلەن، تىزاب) نى بىلىمەي
 ئىچىپ تاشلاش، مەئدە ۋە مىڭدىكى ھارارەتلەر سە -
 ۋىبىدىن يۈز بېرىدۇ.

ئالامەتلىرى: تىل ئىششىيدۇ، قىزىرىدۇ. تاماق
 چايناش ۋە سوز قىلىش تەس بولۇپ، ئېغىزدىن سۇ
 ئاقىدۇ. خىلىتلارنىڭ كۆپ بولۇشىغا قاراپ ئۇلارغا خاس
 ئالامەتلەر بولىدۇ.

داۋاسى: قان زىيادىلىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە،
 ئالدى بىلەن قان ئېلىش لازىم. ئاندىن كېيىن سوغاق -
 لىق تەدبىرلىرى قىلىنىدۇ. مەسىلەن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى،
 يۇمىغاقسۇت، بىيە ئۇرۇغى، ئىسپۇغۇل قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق

پىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئېغىز چايقاش
ئۇچۇن بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك،
بىنەپشە، خىيارى شەنبەرلەرنى كېرەكلىك مىقداردا ئېلىپ،
قاينىتىپ، سۇزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر بەلغەم
ئالامەتلىرى بولسا ھەسەلنى يالغۇز ياكى ئايارەج پەيقارا
(16 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ. يالغۇزنىڭ سەرەتانغا
(راكقا) ئايلىنىپ كەتمەسلىكى ئۇچۇن ئېغىز ئىچىدە كاسىن
ۋە يۇمىغاقسۇتنى دائىم چاپداپ يۇرۇش كېرەك.

ئېغىزنىڭ ئاق يارىسى (قەلا)

ئېغىز شىللىق قاتلاملىرىدا پەيدا بولىدىغان ئاق
رەڭلىك زەخمىلىنىشلەردىن ئىبارەت بولۇپ، تەرەققى قىل-
لىپ پۈتۈن ئېغىز ئىچىنى، ھەتتا قىزىل ئوڭگەچلەرگىچە
تارقىلىشى مۇمكىن. بەزىدە سۇ كۆتىرىلىپ چىققان ھال-
دىمۇ بولىدۇ.

سەۋەبى: قان ياكى سەپىرادىن پەيدا بولىدۇ.
بەزىدە ھەر ئىككىسىنىڭ بىرلىشىپ كېلىشىمۇ ئۇچرايدۇ.
داۋاسى: قان ئېلىش بىلەن تاباشىر، كافۇر،
ئانارگۇللىرىنى سوقۇپ ئېغىز ئىچىگە سېپىلىدۇ. ئېغىز
ھاللاردا سىركە ۋە تۇزنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشقا
بېرىلىدۇ. ئەگەر سىركىنىڭ چۈچۈمەللىكى ئۆتكۈر بولسا
ئازراق زەپەر قوشۇپ ئىشلەتسە بولىدۇ. كىچىك بالىلاردا
بولسا كىراخمالنى ئىت ئۇزۇمى سۈيىگە ئېزىپ چېپىشقا
بېرىلىدۇ ياكى گازىۋانىنى كۆيدۈرۈپ كۈلى سېپىلىدۇ.

ئېغىزنىڭ يەل يارا كېسىلى (ئاكىلە تۇلغەم) ①

“ئاكىلە” دىگەن سوز “ئويۇپ يەپ تاشلىغۇچى” دىگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ. بۇ كېسەل ئېغىز ئىچىدە بىر ئورۇندا پەيدا بولۇش بىلەن بىللە چاپسانلا ئەتراپقا كېڭىيىپ ئويۇلغاندا چوڭقۇر يارا ھاسىل قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىز ئىچىدە، بولۇپمۇ قوۋۇز گوشىدا دەستلەپ چېكىت چوڭلىغىدا يارا پەيدا بولۇپ، بىر قانچە كۈن ئىچىدىلا زورىيىپ، يۈز گوشىنى چىرىتىپ تاشلاپ چوڭ كامار ھاسىل قىلىپ چىش مۈلكىنى ئېچىپ قويدۇ. سېسىق پۇرايدۇ. كۈيۈشۈش ۋە ئېچىشش ئەھۋاللىرى ئېغىر بولىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئاغرىق تاماق يىيەلمەي قالىدۇ.

داۋالاش: ئەگەر مەئى قىلىدىغان ئەھۋاللار بولسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىپ، ئۇندىن كېيىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئېغىز ئىچىنى سىماق-نىڭ قاينىتىلغان سۈيى بىلەن چايقاش كېرەك. سىرتتىن سېپىش ئۈچۈن قۇرسى پەلدىيۇن (46 - نۇسخە) نى ئېزىپ جاراھەتكە سېپىشكە بېرىلىدۇ. ياكى تاتلىق ئانار پوستى، ئاچچىق ئانار پوستىنىڭ ھەربىرىنى 3 سەردىن، موزا، ئازارگۈلى، سېرىق چېچەك، ئاقىر قەرھانىڭ ھەربىرىنى 1 سەردىن، سىماق 15 مىسقال، ئەمەكى ھىندى، نو-شۇدۇر ھەربىرىنى 5 مىسقالدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ ① ئاكىلە تۇلغەم — دوختۇرلۇقتا “نوما” دەپ ئاتىلىدۇ.

ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە بىلەن يۇغۇرۇپ توقچاق تەييارلاپ، لازىم كەلگەندە ئېزىپ ئىشلەش كېرەك.

ئېغىزدىن شولگەي سۇ ئېقىش

ئۇيىقا ۋاقتىدا ياكى ئادەتتىكى چاغلاردا ئېغىزدىن كۆپ مىقداردا شولگەي ئاقىدۇ.

سەۋەبى: مەيدىنىڭ تەبىئىتىدە ھول ئىسسىقلىق-نىڭ غەلبە قىلغانلىقى ياكى مەئدە ئىچىدە سوغاق سۇيۇقلۇقلارنىڭ توپلىشىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ. بۇ ھەزىمنىڭ ناچارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىسسىقلىقتىن بولسا، شولگەي قوساق ئاچ ۋاقتىدا كۆپىيىدۇ. ئەگەر سوغاقتىن بولسا، قوساق توق ۋاقتىدا شولگەي كۆپىيىپ، ئېغىز چۈچمەل بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسسىقلىقتىن بولغانلىرىغا ئانار ۋە ئالما شەرىتى (47 - 48 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. سىماق، ماش قىزىلگۈللەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قايىنىتىپ سۇيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم. ئەگەر سوغاقلقتىن بولسا ئالدى بىلەن سېرىق چىچەك، تۇرۇپ ئۇرۇغى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن ئىترىپىل كەبىر (1 - نۇسخە) ۋە جاۋارش كۈمۈنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كۈندۈز بىلەن مەستىكى چايناشقا بېرىلىدۇ.

تاڭلاي ياللۇغى

بەلغەم ياكى قاننىڭ سەۋىيىدىن تاڭلاي ئىششىپ قالىدۇ. تاماق يېيىش ۋە سوزلەشكە مەلۇم تەسىر بېرىدۇ. **ئالامەتلىرى:** قان سەۋىيىدىن بولغانلىرىدا ھارا-رەت بىللە كېلىپ ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ. تاڭلاي قىزىرىدۇ ۋە ئىششىيدۇ. ئەگەر بەلغەمدىن بولغان بولسا رەڭگى ئاق ۋە ئاغرىش ئانچە بولمايدۇ. **داۋاسى:** ماددىسىغا قاراپ تازىلىغۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. باشقا چارىلار ئېغىز ئىچىنىڭ ئاقۇش يارىسى-دىكىگە ئوخشاش.

كالىپۇكنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى

كالىپۇك (لەب) نىڭ ئاق رەڭدە بولۇپ قېلىشى قاننىڭ ئوزگىرىشى، بەلغەمنىڭ خاملىغى ۋە باشقۇرغۇچى ئەزالار (ئەزايى رەئىسە) نىڭ ھارارىتى ناچارلاشقانلىقتىن يۈز بېرىدۇ. مۇھىم سەۋىيى بەلغەمدۇر.

داۋاسى: تەرتىپ بىلەن بەلغەمنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن ئايىارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. گۈل يېغى، ياسمەن يېغى بۇرۇنغا تامغۇزۇلىدۇ. يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. ئەگەر سەۋىيى قىزىتمىلىق كېسەللەردىكى بوھران بولسا داۋا قىلىش ھاجەتسىز، ئۈزلىگىدىن يوقاپ كېتىدۇ. ئۇندىن باشقا كالىپۇكتىكى قۇتاق قاتارلىق مۇدۇرلارنىڭ سەۋىيى قان ۋە سەپرادىن

بولغانلىقى ئۇچۇن ئۇلارنى بىللە داۋالغاندا قىپال
تومۇرىدىن قان ئېلىش كۇپايە قىلىدۇ.

4- پەسىل: چىش كېسەللىكلىرى

چىش ئاغرىش (دەردى دەندان)

چىش ئاغرىغى سەۋەپلىرىگە قاراپ توۋەندىكىچە
4 خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئۇلار سەۋەپلىرىگە قاراپ داۋاسىمۇ
بىر-بىرىدىن پەرقلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۇچۇن چىش ئاغرىغىنى
داۋالاشنىڭ مۇھىم باسقۇچى ئۇنىڭ سەۋىيىنى بىلىشتۇر.

(1) ماددىلاردا ئۆزگىرىش بولمىغان ھالدا مىزاج
بۇزۇلۇپ ئىسسىقلىق ئاغرىش: ئىسسىقلىقتىن كېلىپ چىققان
چىش ئاغرىقلىرىدا مۇھىم ئالامەتلىرىدىن بىرى ئېغىز
ئىچىگە سوغاق نەرسە ئالسا ئاغرىش پەسىيىپ قالىدۇ.
چىش تۇۋى قىزىق بولىدۇ، ئاغرىش قاتتىق باشلىنىدۇ.

داۋاسى: سىركە بىلەن گۈلاپنى ① ئارىلاشتۇرۇپ
ئېغىزدا تۇتۇپ تۇرۇلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا
بىر ئاز ئەپيۇننى گۈل يېغى بىلەن بىرگە ئاغرىۋاتقان
چىشقا قويسا دەرھال ئاغرىق ئارام بېرىدۇ.

(2) ماددىلاردا ئۆزگىرىش بولمىغان ھالدا مىزاج
بۇزۇلۇپ سوغاقتىن ئاغرىش: سوغاق شامال ياكى سوغاق
نەرسە تىگىش بىلەن ئاغرىش كۈچىيىپ كېتىدۇ. ئىسسىق

① گۈلاپ: قىزىلگۈل ئەرەقى.

نەرسە تەسىر قىلسا دەرھال پەسىيىپ قالىدۇ. ئاغرىش قاتتىق بولماستىن، بەلكى تېلىپ ئاغرىپ تۇرىدۇ. (بۇ ئەھۋال بەلغەمدىن بولغان چىش ئاغرىشىمۇ ئۇچرايدۇ).

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن

ھەببى ئايارەج ياكى ھەببى سەبەرە (4 - 7 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ئاقىر قەرھاء، توغرىغۇ، زەنجىۋىل، پىلىپىللارنى سىركە بىلەن قاينىتىپ ئېغىزغا ئېلىش، 52 - نۇسخىدىكى تەرياقى سۇنۇنىنى چىش تۈۋىگە قويۇش كېرەك. ئەگەر بۇ چارىلار نەتىجە بەرمىسە تومۇر زىخنى قىزىتىپ دىققەت بىلەن ئاغرىۋاتقان چىشنىڭ دەل ئۈستىگە بىر قانچە قېتىم قويۇپ داغلاش ياكى گۇڭگۇرت تېزىبى (گۇڭگۇرت كىسلاتاسى) بىلەن كويدۇرۇش لازىم. داغلاش ياكى تىزىپنى ئىشلىتىشتە باشقا ساق چىش ياكى ئېغىز ئىچىگە تەككۈزۈپ قويۇشتىن قەتئىي ساقلىنىش كېرەك.

(3) قان ماددىسىنىڭ غالىپلىغىدىن ئاغرىش: بۇ -

ئىگدا چىش تۈۋى قىزىرىپ ئىششىغان ھالدا بولۇپ، ئاغرىش چىشنىڭ تېگىدىن چىقىۋاتقاندا كىرىدۇ.

داۋاسى: ئەھۋالغا قاراپ قىپال تومۇردىن قان

ئېلىش، ياكى ھىجامەت قويۇش لازىم. ئۇنىدىن كېيىن مەتبۇخى ھېلىلە ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (38 - 20 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. گازىۋان، ئىت ئۇزۇمى، يۇمىلاقسۇت - لەرنى قاينىتىپ سۈيىنى ئېغىزدا تۇتۇپ تۇرۇش، ئاغرىق قاتتىق بولسا، 52 - نۇسخىدىكى تەرياقى سۇنۇنىنى چىشقا قويۇش كېرەك.

4) سەپرادىن بولغان ئاغرىش: ئاغرىش قاتتىق بولمايدۇ. لوقۇلداپ ئاغرىپ پەسىيىپ تۇرىدۇ. چىش تۈۋى سېرىق بولىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخ ھېلىلە ياكى تەمىرى ھىندى بېرىلىدۇ. يۇقۇرىدا سوزلەنگەن ئاغرىق پەسەيتكىۋىچى تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ.

ئۇندىن باشقا چىش ئاغرىقلىرى ئۈچۈن جەۋھەرى شىپا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى — پاخ-تىغا تەككۈزۈپ ئاغرىق چىش ئۈستىگە قويۇپ چىشلەپ تۇرۇش لازىم.

چىشنىڭ قاماپ قېلىشى

ئادەتتە كىشىلەر چۈچۈمەل نەرسىلەرنى يىگەندە چىشى قاماپ قېلىپ بىر نەرسە چايناش قىيىن بولۇپ قالىدۇ. شۇنىڭدەك چىش ئەسەبلىرىنىڭ سەزگۈرلىكى ئېشىپ كەتسە چىش قاماپ قېلىشى دائىم ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: ئاغرىقنىڭ مىزاجى ئىسسىق بولسا مەت-بۇخ ھېلىلە ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (38 - 20 - نۇس-خىلار) بېرىپ گۈل يېغى، كافۇرلارنى چىشقا قويۇش لازىم. ئەگەر سوغاق بولسا جويۇز، ئاچچىق بادام مې-خىزىنى قىزىتىپ چىشلارغا سۈركەش لازىم. ياكى تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ سىركە بىلەن قاماپ قالغان چىشلارغا چېپىش كېرەك.

قۇرۇت يىگەن چىش

ئادەتتە كىشىلەر بۇ كېسەلنى چىشنىڭ قۇرۇتلاپ كېتىشى دەپ ئاتايدۇ.

سەۋىبى: بۇزۇق ماددىلار سەۋىبى بىلەن چىشنىڭ چىرىشىدىن ئىبارەت.

داۋاسى: ئاغرىش بولمىغاندا ئالدى بىلەن مىڭنى ئارتۇق-چە ماددىلاردىن تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا بېرىلىدۇ. چىش كاۋاكلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە چىشنىڭ قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن رۇسۇت، نارجىل، سۇندى ھىندى، موزا، ئاقىر قەرھالارنى قايناتقان سۇ بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم. ۋە ھەببى ئاس، ئانار گۈلى، زەمچىلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ بىر ئاز سۇ بىلەن پىشۇرۇپ چىشنىڭ كاۋاك يېرىگە قويۇلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بولسا، چىش ئاغرىغىدا كور-سىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

چىش رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى (تەغىرىزى رەڭگى دەندەن)

چىشلاردا قارا، كۆك، سېرىق داغلار پەيدا بولۇپ قالىدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى بۇزۇق ماددىلارنىڭ چىش جەۋھىرىگە ئۆتۈشىدىندۇر. قايسى ماددىنىڭ سەۋىبىدىن ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ رەڭگى بەلگىلەيدۇ. ئەگەر ماددا قويۇق بولسا ئۆزگىرىش ئاستا بولىدۇ، سۇيۇق بولسا تېز بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەدەن ۋە مىڭنى كېرەك-
سىز خىلىتلاردىن تازىلاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەببى
ئايارەج ياكى ھەببى قوقىيا (7 - 17 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.
ئۇندىن كېيىن ئەگەر رەڭگى سېرىق بولسا، ئىت ئۇزۇمى
سۈيى بىلەن سىركىنى ئارىلاشتۇرۇپ چىشقا سۈركەپ،
ئېغىزنى چايقاش لازىم. قارا رەڭدە بولسا بىخكەبىر،
ئەپسەنتىن، سېرىق ئوت، مەستىكى، ئۇشنىلەرنى لازىم
مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چىشقا قويىلىدۇ. ھەم
تاتلىق مېۋىلەرنىڭ ياغىچىدىن مىۋاڭ ياساپ (ياغاچنىڭ
ئۇچىنى سوقۇپ چۈتكىغا ئوخشاش قىلىپ) چىشىنى يۇيۇپ
تۇرۇش لازىم.

چىشنىڭ مىدىرلاپ قېلىشى

چىش تۇۋىدىكى نەملىكنىڭ ئارتۇق بولۇشى ياكى
چىش گۆشلىرى قاچقانلىقتىن چىشلار مىدىرلاپ قالىدۇ.
بەزىدە يىقىلىش ياكى زەربىدىنمۇ چىشلار مىدىرلاپ
قالىدۇ.

داۋاسى: مىدىرلىغان چىشنى قول ياكى تىل
بىلەن تولا مىدىراتماسلىق، قاتتىق نەرسىلەرنى چاينە-
ماسلىق، ھەببۇل ئاس، سەكبىنەجلەرنى قاينىتىپ سۈيىدە
چايقاش لازىم. ئاچچىق ئانار پوستى، سېرىق ھېلىلە
پوستى، قىزىلگۈلنىڭ يوپۇرمىغى، ئانار گۈلى، موزىلارنى

لازم مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ
چىشلار تۇۋىگە باسسا بولىدۇ.

چىش مۇلۇكلەرنىڭ قانەشى

قاننىڭ بۇزۇلۇشى ياكى چىش مۇلۇكلەرنىڭ
تۇتۇش قۇۋۋىتى ناچارلىشىپ كەتكەنلىكتىن چىش
سەۋەپسىز قانايىدۇ.

داۋاسى: چىش تۇۋىدىن چىققان قاننى كۆپىرەك
چىقىرىش مۇمكىن. بۇ قان ئېلىشنىڭ ئىزىنى باسىدۇ.
ئۇندىن كېيىن قىزىلگۈل، جۇپتى بەلمۇت، ئازارگۈلى،
ھەببۇل ئاس، خەرنۇپ شامى، سىماق، سۇئىدە، پىلىپىل
دارازلارنى باراۋەردىن ئېلىپ سوقۇپ چىش تۇۋىگە
بېسىش لازىم.

5 - پەسىل: گال ئاغرىقلىرى

بوغما (ھونناق)

يۇتقۇچ ۋە تاماق ئەتراپىنىڭ قويۇق بۇزۇق
ماددىلار سەۋىيىدىن ئىشىشىپ يالغان ئاق پەردە بىلەن
قاپلىنىشى بوغما (خەنناق ۋابائى) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ كېسەل
كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا ئۇچرايدۇ. بوغما يۈرەككە تە -
سىر بەرسە ئاقىۋىتى يامان؛ ئۆپكەگە تەسىر بەرسە ئۆپكە
ياللۇغى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بوغما ئېغىر ئۆتكەندە
قىزىتما، تارتىشىپ قېلىشلار قوشۇلۇپ كېلىشى مۇمكىن.

بۇ ئاغرىق ئۇچۇن خەتەرلىك ئاقىۋەت بېرىدۇ. بوغما -
نىڭ ماددىسى ئاساسەن قان، سەپرا ۋە بەلغەمدىن ئى -
بارەت. سەۋدادىن كەمرەك بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: بوغما (خەنناق ۋابائى) نىڭ ئالامەتلىرى
ماددىنىڭ خىلىغا قاراپ توۋەندىكى بىر قانچە تۈرلۈك
بولىدۇ:

(1) ھارارەت يۇقۇرى بولۇپ ئېچىشىش ئاغرىشقا
قارىغاندا ئۆتكۈر بولىدۇ. گال ئىچىگە قارىسا بوغۇز
ئەتراپى ئىششىغان بولۇپ، رەڭگى ساغۇش ساختا پەردە
بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ سەپرانىڭ ئالامىتىدۇر.

(2) ئاغرىش ناھايىتى قاتتىق بولۇپ، ئىچىشىدۇ.
ھارارەت ئۈستۈن، گال، بوغۇز ئەتراپى قىزارغان بولۇپ،
ئىششىق ئېنىق كۆرىنىدۇ. بۇ قان ماددىسىنىڭ بەلگە -
سىدىن ئىبارەت.

(3) بەلغەم ماددىسىدىن بولغاندا يۇقۇرقى ئالا -
مەتلىرى ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. لېكىن ئىششىق ئاق
رەڭلىك بولۇپ كۆرۈنىدۇ.

ئومۇمەن بوغما كېسىلىدە يۇقۇرقى ئالاھىدە ئالا -
مەتلىرىدىن باشقا، كېسەلنىڭ ئومۇمى ئالامەتلىرى -
نەپەس سىقىلىش، ئېغىزنىڭ دائىم ئوچۇق قېلىشى، كۆزى
چاچىراپ چىقىپ كېتىدىغاندەك ھالەت ۋە تىلىنىڭ
سىرتقا ئېسىلغاندەك بولۇپ قېلىشى قاتارلىقلارمۇ كۆرۈ -
لىدۇ. كېسەلنىڭ ئاۋازى پۈتۈپ قالىدۇ، كوڭلى ئاينىدۇ،
لېكىن قۇسالىمايدۇ.

داۋاسى: (1) قان ياكى سەپرادىن بولسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىش لازىم. بوغمىدا قان ئېلىش بەزىدە چوڭ نەتىجىلىك بولۇپ چىقىدۇ. ئەگەر كېسەلنىڭ ئومۇمى ھالىتى ناچار بولسا بىراقلا كۆپ قان ئېلىشقا بولمايدۇ. بىر قانچە كۈنگىچە كۈندە بىر قېتىم ئاز-ئازدىن قان ئېلىش لازىم. ياكى پاقالچەك ساھىبىغا ھىجامەت قويۇلسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئېغىر بولماي ئاغرىق كۈچلۈك بولسا، گەدەننىڭ بىر تەرىپىگە ياكى ئىككى تەرىپىگە ھىجامەت قويۇلىدۇ. ھىجامەت قويغان جايدىن بىر ئاز قان چىقىرىش مەنپەئەت قىلىدۇ. ئەگەر قان ئالمىسىمۇ بولىدىغان ھاللاردا قان ئالماستىن مۇۋاپىق سۈرگە بېرىش كۇپايە قىلىدۇ. ئەمما ئاغرىقنىڭ تىلى سىرتقا چىقىپ ئەھۋالى ناچارلاشقاندا دەرھال تىل ئاستى تومۇرلىرىدىن بولسىمۇ قان چىقىرىش لازىم.

(2) ئارقا تەرەتنىڭ ئەھۋالىغا دائىم دىققەت قىلىپ، قاتتىق كەلسە ياكى تەستە كەلسە يۇمشاتقۇچى ھوقنە (53-نۇسخە) قىلىنىدۇ. ھەم تۈرلۈك مېۋە سۇلارى بېرىلىدۇ. قان ۋە سەپرانىڭ بۇخاراتلىرىنى پەسەيتىش ئۈچۈن سىركە، گۈلاپ، ئىسكەنجىۋىل، چىلان شەرىۋىتى بېرىلىدۇ. ۋە كاسىن ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغى، يۇمغاقسۇت قاينىتىلغان سۇغا شاتۇت سۈيىنى قوشۇپ غار-غار قىلىشقا بېرىلىدۇ. غىزاسىغا ئاقلىغان ئارپا شىرىسى بېرىش پايدىلىق.

(3) كېسەلنىڭ 3 - كۈنى پۇنۇسىنى كالا سۈتىگە ئېزىپ گالىنى چايقاشقا بېرىلىدۇ ياكى يۇمىخاقسۇت كۈ - كىنىڭ سۈيى، ئىت ئۇزۇمىنىڭ سۈيى، شاتۇت، قىزىل - گۈل، چۈچۈكبويىلارنى قايناتقان سۇغا پۇنۇسىنى ئېرىتىپ ئېغىزنى چايقايدۇ.

(4) ياللۇغنىڭ يىرىك پەيدا قىلىپ ئېغىز ئال - ماي ئاغرىتىپ تۇرسا توغرىمۇ، ھىڭ ۋە قالىنچاچ ماي - غىنى ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ يېڭى كالا سۈتى ۋە قىزدۇرغان كۈنجۈت يېغى بىلەن گالىنى غار - غار قى - لىنسا ئاسان ئېغىز ئالىدۇ. ئېغىز ئالغاندىن كېيىن ئېغىز ئىچىنى تازىلاش ئۈچۈن كالا سۈتىگە ھەسەل ئېلەشتۈرۈپ ئېغىز چايقىلىدۇ.

بوغمىنى ئېغىز ئالدۇرۇش ئۈچۈن، تاشقى تەرەپ - تىن سوغاق دورىلارنى ئىشلىتىشكە رۇخسەت قىلىنمايدۇ. مۇنداق قىلىش ياللۇغلىنىشتىكى ئوفۇنەتلىرىنى بەدەنگە تارقىتىپ قويىدۇ.

ئەگەر سەۋدانىڭ كۆپلىگى كورۇلسە يۇقۇرقى چارىلار بى - لەن بىللە ئايپارەج پەيقارا، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - 16 - نۇسخىلار) قوشۇمچە بېرىلىدۇ.

گال ئاغرىغى (ۋەرەمى ھەلەق)

ئالامەتلىرى جەھەتتىن بوغمىدىن ئانچە پەرقلىن - مەيدۇ. ئەمما بوغۇلۇش، ساختا پەردە بولمايدۇ. ئايرىم

كىشىلەردە ئۆتكۈر قىزىتما بولماسلىقى مۇمكىن. سەۋەپ-
چى ماددىلارغا قاراپ ياللۇغلىنىپ ئىششىغان جايىنىڭ
رەڭگى ھەر خىل ۋە ئاغرىشىمۇ ئوخشاش بولمىغان
دەرىجىدە بولىدۇ. ئاغرىش بىر نەرسە يىگەندە، ھەتتا
تۈكرۈكنى يۇتقاندا روشەن بىلىنىدۇ. گال قۇرۇق، تەش-
ئالىق كۆپ بولىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئىششىق روشەن
كورۇنۇپ، ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ.

داۋاسى: بوغىمىدىكى چارىلار ئاساس قىلىنىدۇ.
تەشنىلىق ۋە گالىنىڭ قۇرۇشى ئېغىر بولغاندا
تەمىرى ھىندى، تەرەنجىۋىل ھەر بىرىدىن 2 سەردىن
ئېلىپ قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى ئوبدان چىقىرىپ مائا
بىلەن سۇزۇپ بىراقلا ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ياكى مەتبۇخى
خيار شەنبەر (54-نۇسخە) بېرىلىدۇ. بەلغەم ماددىسى-
نىڭ كۆپلىگى كورۇلسە بەلغەمنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۇ-
چۇن ھەببى قوقىيا (17-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئېغىزنى
چايقاش ئۈچۈن بوغىمىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ.

كىچىك تىل ۋە يۇتقۇچ ئەتىراپىنىڭ پالەمچى (ئەستىرخايى لوھات)

بۇ مىزاج بۇزۇلۇش سەۋىيىسى بىلەن پەيدا بولغان
يۇتقۇچ ۋە كىچىك تىلنىڭ پالەچ بولىشىدىن ئىبارەت.
بۇ كېسەلنىڭ سەۋىيىسى توۋەندىكىچە ئىككى خىل بولىدۇ.

(1) مىزاجىنىڭ ئىسقىتىن بۇزۇلىشىدىن كېلىپ چىققان پالەچلىك — بۇنىڭ ئالامەتلىرى شۇكى: ئاغرىق گال ئىچىدە بىر نەرسە ئېسىلىپ تۇرغانلىغىدىن زارلىنىدۇ، ئاغرىش بولمايدۇ. قاراپ كۆرگەندە كىچىك تىل ۋە يۇتقۇچنىڭ قىزارغان ھالدا ئېسىلىپ تۇرغانلىغى كۆرۈلىدۇ. تاماقنى يۇتۇش بارغانسېرى قىيىنلىشىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تومۇردىن قان ئېلىش بىلەن تەرەن-جەۋىل، پۇنۇس، شېكەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ قايناقسۇدا ئېرىتىپ پاكىزە ماتا ئارقىلىق سۈزۈپ ئىچىرىلىدۇ ۋە (53 - نۇسخىدىكى) دورا ھوقنە قىلىنىدۇ.

(2) مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلىشىدىن كېلىپ چىققان پالەچلىك — بۇنىڭدا يۇقۇرقى ئالامەتلىرىدىن باشقا زەرەرلەنگەن جايىنىڭ ئاق بولۇشى، ئېغىزدىن شولگەي كۆپ ئېقىشلارمۇ ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: زەمچە، ھەببۇلئاسلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، ئانار سۈيىگە سېلىپ، ئېغىزنى چايقاشقا بېرىلىدۇ. زەمچە، بۇغا مۇڭگۈزى (كويىدۇرۇلگەن) ۋە نوشۇدۇرلارنى كىچىك تىل ۋە يۇتقۇچقا پۇركۇش كېرەك.

ئۇندىن باشقا ئالامەتلىرىنىڭ تەرەققى قىلىش ئەھۋالىغا قاراپ پالەچكە قارشى تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

قەزىل ئوڭىگە چىمكى يات نەرسىلەر

قەزىل ئوڭىگە چىمكى ھەر خىل يات جىسىملار — تا —
ماقنىڭ تۇرۇپ قېلىشى، زۇلۇك قۇرۇتى چاپلىشىپ قې —
لىش قاتارلىق ئەھۋاللار ئۇچراپ تۇرىدۇ. بۇنىڭغا دەر —
ھال چارە قىلىنمىسا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە يۇ —
تۇش قىيىنلىشىش، روھى جەھەتتە بىئارام بولۇش، قور —
قۇش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ. ھەتتا بەزى يات ماددىلار
گالدىن ئوتۇپ كېتىش بىلەنمۇ روھى جەھەتتىن يۈك
بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: 1 تومۇر جىنىسلىق نەرسىلەر (يىڭىنە،
مىخ قاتارلىق) نى يۇتۇپ تاشلىغاندا ئاھانرە-باتاش
(ماگىنت تېشى) دىن بىر مىسقالنى يۇمشاق سوقۇپ بىر
قوشۇق ئىشاستە بىلەن يىگۈزىلىدۇ (ئاچ قوساقتا)، يېرىم
سائەتتىن كېيىن 5 مىسقال سانا، 2 مىسقال قىزىلگۈل،
بىنەپشە، 3 دانە سەرىپىستاننى بىر پىيالە سۇ بىلەن قاي —
نىتىپ 15 مىسقال تەرەنجىۋىل قوشۇپ سوزۇپ ئىچىشكە
بېرىلىدۇ. ئۈستىدىن قەن چايىنى رەيھان ئۇرۇغى بىلەن
بېرىلىدۇ.

2 گۆش، نان پارچىسى، سۆڭەك قاتارلىقلار
تۇرۇپ قالغاندا دەرھال ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا مۇش
بىلەن بىر قانچە قېتىم بوشراق ئۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ
بىلەن چاچراپ چىقىپ كېتىدۇ ياكى تەۋەنىگە چۈشۈپ

كېتىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن نەتىجە بولمىسا قەي قىل-
 دۇرۇش كېرەك (گالغا توخۇ پېيى ياكى بارماقنى سې-
 لىپ قەي قىلىنىدۇ) شۇنىڭ بىلەن چىقىپ كېتىشى
 مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ ھەل بولمىسا كېسەلنى ئۇڭدا يات-
 قۇزۇپ قاراش كېرەك. ئەگەر كورگىلى بولمىسا ئۇزۇن
 قىسقۇچ بىلەن ئېلىشقا چارە قىلىنىدۇ. ئەڭ ياخشىسى
 دەرھال دوختۇرخانىلارغا يوللاپ تېز قۇتقۇزۇش كېرەك.
 3) زۇلۇك قۇرۇتى يۇتقۇچ، كاناي ۋە بۇرۇن
 يوللىرىغا چاپلىشىۋېلىپ كىشىلەرگە چوڭ ئازاپ كەلتۈ-
 رىدۇ. دائىم كوڭلى ئاينىش، غەم بېسىش ۋە بەزىدە قان
 قۇسۇش ياكى قانلىق سۇ كېلىشلەر بولىدۇ. كانايغا
 چاپلىشىۋالسا توختىماستىن يۈتەل تۇتىدۇ. مۇنداق
 ھاللاردا ئەگەر زۇلۇك كورنىپ تۇرسا قالايىمقان تارتىپ
 ئۇزۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئازراق ئېرىق لېپى-
 نى لاتىغا ئىراپ كېسەلنىڭ ئېغىزىغا تىقىپ قويۇلسا
 زۇلۇك قۇرۇتى لايىغا قاراپ مېڭىپ چىقىدۇ. ۋە لايىغا
 چاپلىشىۋالىدۇ. لايىنى ئالغاندا زۇلۇك-مۇ بىللە چىقىپ
 كېتىدۇ ياكى كېسەلنى ئىسسىق مونچىغا ئەكىرىپ بىر-
 دەمدىن كېيىن ئېغىزىغا مۇز سالسا زۇلۇك ئاجراپ چىقىدۇ.

قىزىل ئوڭگەچ ۋە يۇتقۇچنىڭ قىچىشى

مەئىدگە يىغىلىپ قالغان كويگەن قويۇق خىلىتلار
 بۇخارات ۋە يەل پەيدا قىلىپ مەئىدنىڭ ئۈستىدىكى قە-

سىملىرىنى — قىزىل ئوڭگەچ، يۇتقۇچلارنى غىدىغلاپ قىچە-
شش ھاسىل قىلىدۇ. كېسەل دائىم گېلى قىچىشىش
بىلەن توختىماستىن تۇتقان يۈتەلدىن شىكايەت قىلىدۇ.
داۋاسى: سېرىق چىچەك، لوبىيا، تۇرۇپ ئۇرۇغ-
نى ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىگە سىركە
بىلەن شېكەر قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرىلىدۇ. كونا
سىركىنى ئېغىز چايقاشقا ۋە سۈتكە شېكەر سېلىپ ئى-
چىشكە بېرىلىدۇ.

يۇتۇشنىڭ قىيىنلىشىشى

يىگەن ۋە ئىچكەن نەرسىلەر گالدىن قىيىنلىق
بىلەن ئۆتىدۇ. دەسلەپتە قاتتىغراق نەرسىلەر ئۆتمەسە،
كېيىنچە بارغانسېرى سۇمۇ ئۆتمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ.

سەۋەبى: قىزىل ئوڭگەچنىڭ تارىيىشى؛ قىزىل
ئوڭگەچتىكى ئوزگىرىشلەردىن ئىبارەتتۇر. يۇتۇش ئاساسەن
يۇتقۇنچاق ۋە ئەتراپىدىكى گۆشلەر ھەمدە قىزىل ئوڭ-
گەچنىڭ تەبىئى پائالىيىتى بىلەن بولىدۇ. مەسىلەن،
قۇرۇق ئىسسىقلىق يۇتقۇنچاقنىڭ تۈۋەنگە ھەيدەش
قۇۋۋىتىنى بۇزىدۇ. بۇنىڭ بىلەن گالدىن تاماق ھەيدى-
لىشى بۇزۇلىدۇ. قۇرۇق سوغاق غالىپ بولغاندىن قىزىل
ئوڭگەچنىڭ ئوزىگە تارتىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى جازىبە-
سى) بۇزۇلۇپ تاماقنىڭ مەئىدىگە قاراپ تارتىلىشى نا-

چارلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۇتۇشنىڭ قىيىنلىقى كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئاغرىق يىگەن، ئىچكەن نەرسىلەر- نىڭ گېلىدە تۇرۇپ قالىدىغانلىقى، گالىدىن ناھايىتى ئاستىلىق بىلەن ئۆتمىدىغانلىقى، ھەتتا يېنىپ كېتىدۇ- غانلىغىدىن زارلىنىدۇ. قۇۋۋەتسىزلىك ئالامەتلىرى ۋە ئورۇقلاش كۈندىن- كۈنگە تەرەققى قىلىدۇ. ئەمما تاماق يۇتقاندا ئاغرىش بولمايدۇ. ئىسسىقلىق بولغاندا تەشەللىق يامان بولىدۇ، سوغاق سۇ ئىچسە راھەتلىنىدۇ. ئەگەر سوغاقلىق بولسا، ئەكسىچە ئېغىزدىن دائىم شولگەي ئېقىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مىزاجنى ئۆزگەرتىش لازىم. ئاغرىقنىڭ مىزاجى ئەھۋالىغا قاراپ ئىسسىق بولسا نۇقۇنى تەمىرى ھىندى (55- نۇسخە) سېمىز ئۇت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ئىسپىغۇل لۇئابىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ھول يۇمىغاقسۇت، كاسىن ۋە ئوسۇڭ يوپۇرمىغىنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشقا بېرىلىدۇ. سەن- دەل، كاپۇر، يۇمىغاقسۇت، بىنەپشە يېغى، موم يېغى بىر- لەشتۈرۈپ ئىككى تاغاق ۋە غول ئارىسىغا چېپىش لازىم. ئەگەر سوغاقلىق بۇزۇلغان مىزاج سەۋىيىدىن بولغان بولسا شەرۋىتى دىنارى (56- نۇسخە) ياكى شارابى بادىرىنجىبۇيىغا رۇمىدىيان، سۇمبۇل، مەستىكىلەرنى قوشۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. سۇمبۇل، مەستىكى، ئەپسەنتىنلەرنى قۇست يېغى،

سېرىق چېچەك يېغى ياكى تۇرۇپ يېغىنىڭ بىرىگە قۇيۇلۇپ
شۇپ تاغاق ئارىلىغى ۋە غۇل ئەتراپىغا سىرتتىن سۇر-
كەشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر تەبىئىي نەملىككە زىيادە مايىل
بولسا ئالما شەرىۋىتى (48 - نۇسخە) غا بىر ئاز زەپەر
قوشۇپ بېرىش كېرەك.

قىزىل ئۆڭگەچ يارىسى

يارا قىزىل ئۆڭگەچتە بولسا يۇتۇش بىلەن قاتتىق
ئاغرىش سېزىلىدۇ. يۇتقۇچ ئەتراپلىرىمۇ قىزارغان بولۇپ
ھارارەت بولىدۇ. ئاغرىش ئادەتتىكى چاغلاردىمۇ بولىدۇ.
ئەگەر يارا ئۆپكە بېغى ئەتراپلىرىغا تارقىلىپ كەتسە
سوزلىگەندە تۇتۇن، چاڭ - توزاڭلىق جايلاردا كېسەل كە-
شى كاناي ساھىسىدا بىئاراملىق، ئاغرىش سېزىلىدۇ.
يوتەل ۋە بۇزۇلغان بەلغەم بولىدۇ.

داۋاسى: باسلىق تومۇردىن قان ئېلىش، ئەينۇلا،
تەمەرى ھىندى، خىيار شەنبەرلەرنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ قايىناقسۇغا چىلاپ، سىقىپ تەمىنى چىقىرىپ ئى-
چىشكە بېرىلىدۇ. ئەتە - ئاخشام گۈل يېغى، بىنەپشە،
ئىسپىغۇل لۇئاپلىرىغا شېكەر قوشۇپ بېرىلىدۇ. سوغاق
نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك، سىماپلىق دورىلارنى
ئىشلىتىشنى ئويلاپ باقسا بولىدۇ.

ئاۋاز پۇتۇشى (بەتلانى سەۋەت)

ئاۋازنىڭ پۇتۇشى غىرىتلىداق (ھەنجەر) نىڭ ھەر
خىل سەۋەپلەر بىلەن زەرەرلىنىشىدىن پەيدا بولۇپ، سوز-

لىگەندە ئاۋاز چىقماسلىق، كىسىلداپ قېلىش ياكى ئەس-لىدىكىدىن ئۆزگىرىپ كېتىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. سەۋەپ-لىرىگە قاراپ تەۋەندىكىچە 4 خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئۆز ۋاقتىدا داۋالسا تېز ساقىيىدۇ. ئەگەر ئۇزۇنغا قالسا ساقىيىش تەس.

(1) مىزاج بۇزۇلۇش ھالىتى — يەنى غىرىتىلىداق مىزاجنىڭ ماددىلار ئارلاشمىغان ھالىدىكى بوزۇلۇشىدىن پەيدا بولغان ئۇنى پۇتۇش — غىرىتىلىداقنىڭ ئەسلى مىزاجى ھول — قۇرۇقلۇقتا مۆتىدىل بولۇپ، بۇ ئاۋازنىڭ ئۆز يولى بىلەن چىقىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بۇ ھال ئۆزگەرسە مەسىلەن، ھوللۇك ياكى قۇرۇقلۇق ئېشىپ كەتسە ئاۋاز بوزۇلىدۇ. ھوللۇكنىڭ ئېشىپ كېتىشى ھوللۇك تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى: سۆزلىگەندە ئاۋاز ئۇشقىتىقاندەك چىقىدۇ. قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى — قۇرۇق تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، قۇرغاق ھاۋادا ئۇزۇن مۇددەت نەپەس ئېلىپ تۇرۇشلار سەۋەپ بولۇپ، ئالامىتى سۆزلىگەندە ئاۋاز كىسىلداپ چىقىدۇ. ئېغىز ۋە لەۋلەر قۇرغاق بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپىغۇل لۇئابى، شېكەر، توخۇ شورپىسى، مەسكە مايلىرىنى مۇۋاپىق ھالدا بىرلەشتۈرۈپ بېرىلىدۇ. ياكى ئانارنىڭ بېغىنى ئېلىۋېتىپ كىچىك

توشۇك ئېچىلىدۇ، ئانار چوغ ئۈستىدە بىردەم تۇرغاندىن كېيىن ھور چىقىشقا باشلىغاندا توشۇكتىن بىر ئاز بىسەپشە يېغى، بىلەم يېغى قۇيۇپ سەل تۇرغۇزۇپ چوغلدىن ئېلىپ سىقىپ سۈيى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئۇنۇمى ناھايىتى ياخشى. ياكى لۇتۇقى زەنجىۋىل، لۇ-ئۇقى ئەلجىر، لۇتۇقى ھولبە (57 - 58 - 59 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار غىرىتلىداقنىڭ مىزاجىنى تەكشەشكە زور پايدىلىق بولۇپ، ئاۋازنى ئاچىدۇ.

(3) نەزلە سۇيۇقلۇقى مىڭە تەرەپتىن گالغا قۇيۇلۇشى بىلەن ئاۋاز پۈتۈشۈشنى نەزلە ئاۋازى (سەۋىتى نەزلى) دېيىلىدۇ.

ئالامەتى: كاناي قىسمى تاتىلغاندەك ئېچىش ۋە گال قۇرۇش بىلەن ئاۋاز ھەر خىل دەرىجىدە پۇتسىدۇ.

داۋاسى: لۇتۇقى سەرىپىستان (60 - نۇسخە) ۋە لۇتۇقى خەشخاشلار (61 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) قىزىتمىلىق كېسەللەردە بولىدىغان ئاۋاز پۇتۇش غىرىتلىداقنىڭ سۇيۇقلۇقنىڭ يوقىلىشىدىن بولۇپ، بەلگىسى قۇرۇقتىن بولغان ئاۋاز پۇتۇش بىلەن ئوخشاش. داۋالاشتا ئارچا قايناتقان سۇ ئىچىشكە بېرىپ ئاقلىغان ئارپا، چىلان، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، سەرىپىستانلارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىگە ناۋات سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

IV ماقالا. كوكرەك بوشلۇغى (سەنە) كېسەللەكلەرى

1 - پەسىل: ئۆپكە كېسەللەكلەرى

ئۆپكە كېسەللەكلەرى، ئۆپكە ياكى ئۇنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق زەرەرلىنىش ھەم باشقا ئەزالاردىكى ئۆزگىرىشنىڭ مەسىلىسى، مىڭە يۈرەك، جىگەر قاتارلىقلارنىڭ زەرەرلىنىشلىرى سەۋەبى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ. بۇلار ئومۇمەن تۈۋەندىكى بىر - قانچە خىلدىن ئىبارەت: ماددىسىز مىزاج بۇزۇلۇش ياكى ماددىلىق ئۆزگىرىش؛ ياللۇغلىنىش ۋە جاراھەت توسالغۇ؛ ئۆپكەنىڭ زەرەرلىنىشى ئۆپكەدىكى ئۆزگىرىشلەر مەيلى قايسى سەۋەبتىن بولمىسۇن دەم سىقىش ۋە يۈتەل بەلمەن ئۆتىدۇ.

دەم سىقىش (زەپقۇلنەپەس رەۋە)

نەپەس سىقىلىش ئۇزۇنغا سوزىلىدىغان ئاغرىق بولۇپ، ۋاقىت ئۆتكەنسېرى داۋالاش شۇنچە تەس بو-

لىدۇ. كېلىپ چىقىش سەۋەپلىرىگە قاراپ بۇ توۋەندى -
كىچە 9 خىلغا بۆلۈنىدۇ.

(1) بەلغەم ماددىسىنىڭ كۆپىيىپ ئۆپكەنىڭ ھاۋا يولىغا توپلىشىپ ئالغانلىغىدىن پەيدا بولىدۇ. ئالامەت - لىرى يۈتۈلىدۇ، كۆپ مىقداردا بەلغەم چىقىش بىلەن ئۆپكەندە غىزىلداشنىڭ بولۇشىدۇر.

داۋاسى: زۇپا شەرىتى بىلەن بەلغەمنى پىشۇ - رۇپ، ئۇنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى غارىقۇن (2 - 63 - 64 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. زۇپا شەرىتىدىن 2 قوشۇققا 3 قوشۇق قايناقسۇ قوشۇپ كۈنىگە 3 قېتىمدىن داۋاملىق بېرىلىدۇ. ئەگەر ھاجەت بولسا تۇرۇپ (لۇبو) قاينىتىلغان سۇغا ھەسەل قوشۇپ ئىچىشكە بېرىپ قەي قىلدۇرىلىدۇ. يىمىشكە توخۇ گۆشى، قۇشقاچ گۆشى يېرىش لازىم. نەپەس قىيىنلىشىشى ئېغىر بولسا، زىغىرنى چالا سوقۇپ قاينىتىپ سۈيىگە بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ بېرىلسە نەتىجىسى ياخشى. كۈچلۈك تەسىر قىلغۇچى دورىلارنى بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. زىغىر يېغى ئۆشكە بورىگىنىڭ يېغىدىن 1 سەردىن، ئاق مومىدىن 5 مىسقال ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ ئېرىتىپ كۆكرەك ئۈستىنى ياغلاشقا بۇيرىلىدۇ. بەلغەمنى چىقىرىش ئۈچۈن ھەببى پىلىپىل بېرىلىدۇ (64 - نۇسخە).

(2) يۈرەكتىكى زەرەرلىنىش نەتىجىسىدە بۇخارات - لارنىڭ ئۆپكەگە تەسىر قىلىشى بىلەن بولغان نەپەس

قىيىنلىشىش. بۇنىڭدا نەپەس ھەركىتى تېز بولۇپ، تو-
مۇر تەرتىپسىز، چوڭ ۋە تېز سالىدۇ. ئۇسسۇزلۇق كۆپ
بولىدۇ.

داۋاسى: سول قۇل باسلىق تومۇردىن قان ئې-
لىنىدۇ. ئىسپۇغۇل لۇئابى ① نى ئىلۇفەر شەرۋىتى ياكى
بىنەپشە شەرۋىتىگە قوشۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. تەشئالىق
ئۇچۇن ئالما شەرۋىتى قايناقسۇ بىلەن تەڭشەپ بېرىل-
دۇ. ياكى سەندەل شەرۋىتى (48 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
ئەزالارنى مۇجۇپ تۇتۇش، ئىسسىق ئۆتكۈزۈش پايدىلىق
ئامىللاردىندۇر، ئەڭ مۇھىمى يۈرەكتىكى كېسەلنى دا-
ۋالاش چارىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىش لازىم.

(3) ماددىسىز مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان دەم سىقىش
ئىسسىق - سوغاق ۋە قۇرۇقلۇقتىن پەيدا بولىدۇ.

ئىسسىقنى بولغىنىدا تومۇر ھەركىتى تېز ئەمما
كىچىك بولىدۇ، كۆپ ئۇسسايدۇ، سوغاقلىقتىن راھەتلى-
نىدۇ (كېسەلى يېنىكلىشكەندەك بولىدۇ).

داۋاسى: ئىسپۇغۇل لۇئابىنى مەجۇنى بىنەپشە
(65 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

قۇرۇقلۇقتىن بولغىنىدا قۇرغاق ھاۋادا ئۇزۇن تۇ-
رۇش، چول ۋە قۇملۇقلاردا سەپەر قىلىشلاردىن پەيدا

① ئىسپۇغۇل لۇئابى تەييارلاش: كېرەكلىك مىقداردىكى
ئىسپۇغۇلنى چىلاشقىدەك سۇغا سېلىپ بىردەمدىن كېيىن تازا
چالغۇتۇلسا شىلمەلىق بىر سۇيۇقلۇق يەنى لۇئاپ ھاسىل
بولىدۇ.

بولىدۇ. ئالامىتى خەپرۇك بولمايدۇ، ئاۋازى پۇتىدۇ،
تەشئالىق زىيادە بولىدۇ،

داۋاسى: ئارپا سۈيى، ئۈچكە سۈتى ئىچىشكە بېرىلىدۇ
ھەم قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتى كۆكرەككە سۈرتىلىدۇ.
سوغاقلىقتىن بولغىنىدا كۆپىنچە ئۆپكەگە سوغاق
ئوتۇپ كېتىش سەۋەپ بولىدۇ. كېسەل ھاۋانىڭ سوغاق
كونلىرى ياكى يامغۇرلۇق كۈنلىرىدە نەپەس قىيىنلە-
شىشنىڭ زىيادە بولىشىدىن زارلىنىدۇ.

داۋاسى: تاشقىرىدىن ئۆپكەگە ئىسسىق ئوتكۇزىلىدۇ
ۋە شۈمىشە (شياڭدۇزا) دەملەمسى (66 - نۇسخە) ئىچىش-
كە بېرىلىدۇ. ياسمەن يېغى، نەغەز گۈل يېغى كۆكرەككە
سۈرتىلىدۇ. تۇخۇم سېرىغى، زىرە ۋە پىنئە بىلەن بې-
رىلىدۇ.

(4) ھاۋا يوللىرىدىكى يەل سەۋىيىدىن بولغان
دەم سىقىش: كۆكرەك ئىچىدە يېقىمىسىزلىق سېزىلىدۇ،
بەلغەمسىز يۈتەل بولىدۇ ۋە يەللىك نەرسىلەر ئاغرىقنى
يامانلاشتۇرىدۇ.

داۋاسى: بىرىنچى خىلدىكى چارلار بىلەن ئايارەج
پەيقارا بېرىپ ئارقىسىدىن نۇشدارى (16 - 21 - نۇسخىلار)
ياكى مەجۇنى فىلاسپە (18 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سىرتتىن
سۇزاپ يېغى، سېرىق چىچەك، بابۇنە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.
(5) ئۆپكە ۋە ئۇنى قاپلاپ تۇرغۇچى پەردە، كىر-
گىت پەردە ۋە جىگەر ياللۇغلىرىدىكى نەپەس قىيىنلە-

شېشىنىڭ. ئالامەتلىرى: يۈتەل ئاز مىقداردىكى بەلغەم ۋە كۆكرەكنىڭ ئاغرىشىدىن ئىبارەت. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئۆپكەنىڭ ئۆزىدە بولسا چىرايى قىزارغان بولىدۇ. پەردىدە بولسا ئاغرىش ئېغىر بولىدۇ.

(6) بوغمىدىن نەپەس قىيىنلىشىش — يۇتقۇچ تو- شۇڭى ئەتراپىنىڭ ياللۇغلىنىشى نەتىجىسىدە بوغۇلۇش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ داۋاسى بوغمىنى داۋالاشتىن ئىبارەت.

(7) مەئىدىنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق كوپۇپ كېتىشە- دىن دەم سىقىش. كوتۇرۇلگەن مەئىدە ئۆپكەنى قىسىپ قويغانلىقىدىن نەپەس قىيىنلىشىدۇ.

داۋاسى: ئايارەج پەيىقارا (16 - نۇسخە) بىلەن مەئىدىنى بوشىتىپ ھەزىمنى ياخشىلىغۇچى دورىلار مەسىلەن، مەجۇنى كۇمۇنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(8) كىرگىت پەردە (ھىجابى ھاجىزە) نىڭ بوشە- شىپ كېتىشى بىلەن ئاغرىق قوش نەپەس ئالىدۇ. نە- پەس ھەرىكىتى كېڭىيىش ھالىتىدە بولىدۇ. تومۇر يۇمشاق ئۇرىدۇ.

داۋاسى: شۇمشە قاينىتىلغان سۇغا ھەسەل قۇ- شۇپ بېرىلىدۇ، سىياداننى يۇمشاق سوقۇپ ھەسەل ۋە سېرىق چىچەك يېغى بىلەن كۆكرەككە سىرتتىن سۇرتۇشكە بۇيرۇلىدۇ. ھول سوغاق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

(9) نەپەس يوللىرىغا قۇيۇق خىلىتلار قاپلىشىپ ياكى ياللۇغلىنىپ توسىلىشتىن بولغان دەم سىقىش: بۇ

ناھايتى ئېغىر ئوتىدۇ، ئاغرىق ياتالمايدۇ. ئولتۇرغان-
دىمۇ نەپەس قىيىنلىشىپ بىئارام بولىدۇ. بەلغەم چىقىش
بىلەن بىرئاز يېنىكىلىشىدۇ.

داۋاسى: ئاغرىقنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئالا-
مەتلىرىنى يېنىكىلەشتۈرۈش ئۈچۈن يۇقۇرىدا كورستىلگەن
چارىلاردىن مۇۋاپىق بولغانلىرى قوللىنىلىدۇ.

يوتەل (سۇئال)

چۈشكۈرۈش مىڭىنىڭ مۇداپىئەلىنىش ھەرىكىتى
بولغىنىدەك، يوتەل ئوپكىنىڭ ئاپەتلىرىدىن قوغدىنىش
پائالىيىتىدۇر.

يوتەلنىڭ سەۋىبى ئاساسەن مىزاج بۇزۇلۇش، يال-
لۇغلىنىش، جاراھەتلەر ۋە ھەرخىل تاشقى تەسىراتلار
مەسىلەن، سوغاق شامال، چاڭ-توزاڭ، تۇتۇن، ئاچچىق-
چۈچۈك تاماقلار ياكى ئۇنىڭ نەپەس يوللىرىغا ئوتۇپ
كېتىشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

(1) مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى ماددىسىز ۋە ماددىلىق
دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ:

(1) سازەج يەنى ماددىسىز يوتەلنىڭ ئىسسىقلىق
بولغىنى ھارارەتلىك شارائىتلاردا مەسىلەن. خۇمدان، تو-
نۇر باشلىرىدا ئۇزۇن تۇرۇش، قۇملۇق چوللۇك جايلاردا
تۇرۇش بىلەن ئوپكىگە يۇقۇرى ھارارەت تەسىر قىلىپ
ئوپكىدە ساپ ھاۋا يېتىشمەسلىك ئەھۋالى

پەيدا بولىدۇ. يەنى ھاۋاغا بولغان ھاجەت كۆپىيىدۇ. ئۆپكەنىڭ جازىبە (تارتىش) قۇۋۋىتى يېتىشمەسلىك نەتىجىسىدە ئۆپكە غەدىغلىنىش بىلەن يۆتەل پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپ ئۇسسايدۇ، ئېغىز ئىچى قور-غاق بولۇپ، سوغاق نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغاندا يۆتەل بىر ئاز يېنىكلەشكەندەك بىلىنىدۇ. ئىسسىق ھاۋا ياكى ئىسسىق شارائىت يۆتەلنى يامانلاشتۇرىدۇ. ئاغرىقنىڭ رەڭگى قىزارغان ھالەتتە بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپۇغۇل لۇئابى بېرىلىدۇ. ئاق سەندەل، كاپۇر، يۇمىغاقسۇت، قاپاق لېشىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەككە قويۇلىدۇ. لۇئۇقى سەرپىستان (60 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2) ماددىسىز يۆتەلنىڭ سوغاقنىڭ بولغىنى: ئوپ-كىگە سوغاق تەسىر قىلىشى بىلەن ئۆپكەدە سوغاق ھاۋا تۇرۇپ قالىدۇ، سىرتتىن كىرگەن ھاۋا ئۆپكەنىڭ چەقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى بىلەن قايتۇرۇپ چىقىرىلىپ نەتىجىسىدە يۆتەل تۇتىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىسسىق ھاۋا ۋە ئىسسىق يىمەك-ئىچمەكلىكلەر بىلەن يۆتەل بىر ئاز پەسىيىدۇ. سوغاقلىق يۆتەلنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئاغرىقنىڭ رەڭگى كۆكرەگەندەك ھالەتتە (قوغۇشۇن رەڭلىك) بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيى (سوغاق شارائىتى-نى) يوقىتىپ، ئاندىن لۇئۇقى ئىنجۇر ياكى باشقا

ئىسسىقلىق شىرىلىك دورىلاردىن بىرى بېرىلىدۇ (58 - نۇسخە).

(2) ماددىلىق مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان يوتەل: بۇ، ئوپكىگە قان ئارىلاش سەپرانىڭ قۇيۇلۇشىدىن پەيدا بولىدۇ. ھاۋا يوللىرىنىڭ توسىلىپ ياكى چىڭقىلىپ كېتىشى بىلەن ئوپكىدە سىقىلىشتەك بىر ئەھۋال كېلىپ چىقىپ، ئوپكىنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى تەسىرىدە يوتەل كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: نەپەس ئېلىش چوڭقۇر بولۇپ، سىرتقا چىققان نەپەس قىزىق سىزىلىدۇ. يوتەل بەلغەمسىز ۋە ئاغرىقنىڭ چىرايى قىزارغان بولىدۇ. ئەگەر سەپرا غالىپ كەلسە ئاز مىقداردا سېرىق رەڭلىك بەلغەم چىقىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. كېيىن توۋەندىكى قايناتما بىلەن ماددىلار تازىلىنىدۇ. **تەركىمى:** گۈل بىنەپشە، گازىۋان، ئاق لەيلى ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن، قاپاق، ئۇرۇغى 2 مىسقال، چىلان، سەرپىستان 20 دانىدىن، سانا 2 مىسقال، تەرەند-جىۋىل 2 سەر. تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئىچىش مىقدارى ئادەتتىكى قايناتمىلار بىلەن ئوخشاش.

(3) نەزلە ماددىسى مىڭدىن ئوپكە يوللىرىغا چۇشۇش بىلەن بولغان يوتەل، ئاساسى سەۋىيى كىنايى شاخچىلىرىنىڭ نەزلە ماددىلار بىلەن زەرەرلىنىشىدىن بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۈتەل كۆپىنچە كېچىلىرى، ئۇيقىدىن كېيىن ئېغىرلىشىپ قالىدۇ. بەلغەم بولمايدۇ. باش ۋە چېكىلىرى قىزىپ تۇرىدۇ. بۇ خىلدىكى يۈتەلنىڭ سىل كېسىلىگە ئايلىنىپ كېتىش ئىھتىمالى بار. كۆكرەك قىسمىدا ئېغىرلىق ياكى ئاغرىش سېزىدۇ.

داۋاسى: خەشخاش لۇئۇقى (61 - نۇسخە) ياكى خەشخاش شەرۋىتى (69 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەنجۈر قايناتقان سۇغا قىچا تالقىنى سېلىپ باشقا چېپىشقا بۇيرىلىدۇ. ئېغىزدا شۇمۇپ يۇرۇشكە ھەببى سوئال (70 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) ئۆپكە ۋە كىرگىت پەردىدە ئارتۇق سۇيۇقلۇق يىغىلىپ قالىدۇ. بۇ كۆپىنچە قېرى كىشىلەر ۋە ھول مىزاجلىق كىشىلەردە ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: يۈتەل بىلەن كۆپ مىقداردا شىلىملىق بەلغەم چىقىدۇ. كۆكرەكتە خېقىراش كۆپ بولىدۇ، ھەركەت قىلغاندا نەپەس قىيىنلىشىدۇ.

داۋاسى: زۇپا شەرۋىتى (63 - نۇسخە) بېرىپ، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى بىلەن تۇرۇپ ئۇرۇغىنى قاينىتىپ، سۈيىگە بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ياكى مۇۋاپىق بولغان سۈرگىلەردىن تاللاپ بېرىلىدۇ. بۇنىڭغا توۋەندىكى سۈرگە بېرىلىدۇ.

چىلان 10 دانە، بىنەپشە 2 مىسقال، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ھەمىشۋا ئۇرۇغى، سانا 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا

يىلتىزى $1\frac{1}{2}$ مىسقال، ئەنجۇر 5 مىسقال، ئۇرۇق -

سىز ئۈزۈم 6 مىسقال، خىيار شەنبەرنىڭ ئىچكى قىسمى 15 مىسقال، تەرەنجىۋىل 15 مىسقال، بادام يېغى 1 مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى - خىيار شەنبەر ۋە تەرەنجىۋىلدىن باشقىلىرىنى بىرئاز سوقۇپ 3 چوڭ چىنە كەلگىدەك قايناقسۇغا ئىككى سائەت چىلاپ قويۇپ، باتادىن ئۆتكۈزۈپ، راسا سىقىپ سۈيىگە خىيار شەنبەر بىلەن تەرەنجىۋىلنى سېلىپ بىر قېتىم قاينىتىپ ئېلىپ، بادام يېغىنى ئۈستىگە قويۇپ بىر پىيالىدىن ئەتە - ئاخشامدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(5) ئوپىكە مىراجىنىڭ قۇرۇق ئىسسىقلىققا ئۈزگىرىپ كېتىشىدىن بولغان يۈتەل ئاچلىق ۋە تەشنا - لىق ۋاقىتلىرىدا ئېغىرلىشىپ، مونچىغا كىرگەندە ياكى قوسىغى تويغاندا يېنىكلىشىپ قالىدۇ. يۈتەل بىلەن نەپەس قىيىنلىشىش بولۇپ ئاغرىق ئورۇقلايدۇ، بەلغەم بولمايدۇ، تومۇر ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ، بەزىدە قىزىتما بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپۇخۇل لۇئابى ياكى ئارپا سۈيى بېرىلىدۇ. بادام يېغى بىلەن سوڭ (مەقئەت)، تاپان ۋە كۆكرەك ياغلىنىدۇ. قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا قاينە - تىلىمىسى، قاپاق ئۇرۇغى، تەرخەمەك ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى نىشاستە، كەتىرا، گۈل بىنەپشەلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا

ئېلىپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە تۇخۇم ئېقى بىلەن تەييارلانغان كۇمۇلاچنى ئېھتىياجغا قاراپ ئېغىز ئىچىدە شۇمۇپ تۇرۇشقا بېرىلىدۇ.

(6) چاڭ-توزاڭ تۇتۇن ۋە ئىسلاردىن بولغان ياكى ئۇزاققىچە يۇقۇرى ئاۋاز بىلەن ۋاقىراشتىن بولغان يوتەل. بۇنى (5) قىسمىدا كورسىتىلگەن چارىلار بىلەن داۋالسا ئۇنۇم بېرىدۇ.

(7) ئوپكە ياكى ئۇنى ئۇراپ تۇرغۇچى پەردىدىكى كېسەللىكلەر يوتەلگە سەۋەپ بولىدۇ، بۇ خىلدىكى يوتەل قان تۇكۇرۇش، كوكرەكنىڭ ئاغرىشى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ ۋە گال ئەتراپىدىكى جاراهەتلەردىمۇ يوتەل بولىدۇ. بۇخىل يوتەلنى داۋالاش ئاساسەن سەۋەپچى ئاغرىقنى داۋالاش ۋە يوتەل پەسەيتكۈچى دورىلارنى مۇۋاپىق ھالدا تاللاپ بېرىش لازىم.

قان تۇكۇرۇش (نەپسىددەم)

قان تۇكۇرۇش ئومۇمەن قاننىڭ چىقىش ئورنى- ھا قاراپ توۋەندىكىچە 3 قىسمىغا بولىنىدۇ.

(1) ئېغىز بوشلۇغىدىن كەلگەن قان: چىش مۇلۇكلىرىدىن، تاماق ۋە يۇتقۇچتىن چىققان قانلار بولۇپ، چىش مۇلۇكلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى، چىش تۈۋىنىڭ بوشاپ قېلىشى ياكى چىش مۇلۇك قانتەمۇرلىرىنىڭ يېرىلىشىدىن تۇكۇرۇك بىلەن يېڭى قان چىقىدۇ. بۇنداق ھاللاردا چىش مۇلۇكىنىڭ زەرەرلىنىشى.

رىگە قاراپ چىش كېسەللىكلىرىدە كورسىتىلگەن چارلار قىلىنىدۇ. ھەبۇل ئاس، ئانارگۇلى، رۇسۇت ۋە زەمچە-لەرنى باراۋەر سوقۇپ چىش تۈۋىگە قويىلىدۇ.

(2) ھەنچەردىن كەلگەن قان: كاناي ئاغزىدىن چىققان قان بولۇپ، بۇنىڭ ئىپادىسى شۇكى، ئادەتتىكى بەلغەم ياكى تۈكۈرۈكلەردە قان بولماستىن، بەلكى بەلغەم چىقىرىش ئۈچۈن كۈچەپ قاقىرىش بىلەنلا ئاچ قىزىل رەڭلىك قان ئارىلاش قاقىرىق چىقىدۇ، يوتەل بولمايدۇ.

داۋاسى: ھەبۇل ئاس، ئانارگۇلى، ئانار پوستى، موزا ۋە زەمچىلەرنى باراۋەردىن ئېلىپ قاينىتىپ ئۇنىڭ سۈيىدە گال چاپقاشقا بۇيرىلىدۇ ۋە قورسى كەھرىپا بېرىلىدۇ (71- نۇسخە). ئەگەر يۇتقۇچتا جاراهەت بولسا كۈندۈر، خۇنسىياۋشاندىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ سوقۇپ پۈركۈلىدۇ.

(3) كانايدىن كەلگەن قان: يوتەل ۋە كۆكرەك ساھىسىدا ئاغرىشلار بولۇپ، يوتەل بىلەن كۆپۈكتەك قان چىقىدۇ، داۋاسى يۇقۇرقى بىلەن ئوخشاش.

(4) دىماقتىن كەلگەن قان: بۇخىل قان بۇرۇن يولى بىلەن چىقماستىن ئېغىزغا چۈشۈپ، تۈكرۈك بىلەن بىللە چىقىدۇ. كۆپىنچە بۇرۇن شىلىمىشىغىنى ئىچىگە تارتىش بىلەن تولاراق ئۇيۇپ قالغان ھالەتتە چىقىدۇ. قان چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن باش بىرنىز يېنىكلەشكەن-

دەك سېزىلىدۇ. كۆپىنچە كېسەل كىشى زۇكام بولغان ياكى بېشى ئاغرىغان بولىدۇ. بۇرۇننىڭ يۇقۇرقى تەرەپ-لىرى قىچىشىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇردىن قان ئېلىش ياكى كۆمۈش نەرسىلەر بىلەن ھىجامەت قويۇش لازىم. باشقا چارىلىرى بۇرۇن قاناشتىكى چارىلار بىلەن ئوخشاش. 5) ئۆپكە ۋە قىزىل ئوڭگەچتىن كەلگەن قان: يىقىلىش، سىرتقى زەربىلەر ياكى ئۆپكەنىڭ ساددە ۋە ماددى زەرەرلىنىشلىرى ۋە ئۆپكە قانتومۇرلىرىنى زەخمە-لەندۈرگەن ئوزگىرىشلەر نەتىجىسىدە يۈتەلدىن كېيىن بەلغەم بىلەن قان كېلىدۇ. قان دەسلەپتە ئاز بولسا كېيىنچە زەخمىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ كۆپىيىدۇ. رەڭگى قىزىلگۈل رەڭدە، داترەڭدە بولۇپ قاتتىق يۈتەل بىلەن ئۇيىغان ھالدا بەلغەمگە ئارىلىشىپ چىقىدۇ. بۇ ئۆپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە) نىڭ ئالامىتى بولۇپ، كۆكرەك ۋە بىقن ئەتراپلىرىمۇ ئاغرىيدۇ. يۈتەلگەنسىمۇ ئاغرىق كۈچىيىدۇ.

داۋاسى: قىپال ياكى باسلىق تومۇرلىرىدىن قان ئېلىش، قۇرسى كەھربا يەنى قان تۈكۈرۈش تابلېتى (71- نۇسخە) نى شەرۋىتى ئەنجىبار (72- نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

قىزىل ئوڭگەچتىن كەلگەن قان دائىم قۇسۇق بىلەن كۆڭلى ئاينىشتىن كېيىن كېلىدۇ. قاننىڭ

مقدارى كوپ بولسا مەئدە ياكى قىزىل ئوڭگەچتىن كەلگەنلىكىگە گۇمان قالمايدۇ. ئەمما ئاز بىرلغاندا باشقا جايدىن كەلگەن قاندىن پەرق قىلىش ئۇچۇن، يوتەل بولماسلىقى ۋە مەئىدىدىكى ئالامەتلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك.

ئوپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)

زاتلىرىيە ئوپكىنىڭ ياللۇغلىنىشلىق زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، پەيدا بولۇش سەۋەپلىرى: مىڭدىن ئىسسىق ياكى سوغاق تەبىئەتلىك سۇيۇقلۇقلارنىڭ ياكى زۇكام نەزلە ماددىسى بىلەن تۇرلۇك زەرەرلىك خىلىتلىق سۇيۇقلۇقلارنىڭ ئوپكىگە قۇيۇلۇشى؛ بىرغىچە ياكى گال ئەتراپىدىكى باشقا جاراھەتلەرنىڭ يىرىڭلىق ئاجرايملىرىنىڭ ئوپكىگە چۈشۈش؛ ئوپكىنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ ياللۇغى (زاتلىجەنە) ياكى (كىر-گىت گۆش) پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشلىرىدا يىرىك ۋە ئىششىق ئوپكىگە ئوتۇش؛ ئوپكىنىڭ ئۆزىدە سۇ يىغىلىپ، ۋاقىت ئۆتكەنسېرى بۇزۇلۇپ ئوپكىدە ياللۇغلىنىش ھاسىل قىلىشلاردىن ئىبارەتتۇر.

ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا ئوپكە ياللۇغىنىڭ مۇھىم سەۋىيىسى — قان ۋە ئارتۇقچە بەلغەم بولۇپ، سەپرا تۈپەيلىدىن كەمرەك كېلىپ چىقىدۇ. كۆپىنچە نەزلىدىن كېيىن ياكى ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئوپكىنىڭ زەرەرلىنىشى يۈرەككە تەسىر بېرىدۇ. ئوپكە

دىكى خىلىتلارنىڭ تارقىلىشى قىيىن بىر مەسىلە.
ئوپكە ياللۇغى سەۋەپلىرىگە قاراپ توۋەندىكىچە 3 چوڭ
تۈرگە بۆلىنىدۇ:

(1) ئىسسىق ياكى سوغاق، نەزلە سۇيۇقلۇقلىرى
بولىمىسۇن ياكى قان، سەپرا ماددىلىرى سەۋىيىدىن
بولىمىسۇن، ئوفۇنەتلىر تەسىرىدە ئۇلار ئىسسىققا ئۆزگە-
رىدۇ.

ئالامىتى: ئىستىمنىڭ داۋاملىق يۇقۇرى بولىشى
بىلەن ئاغرىق كۆكرەك ساھىسىدا ئېغىرلىق، كېيىنچە
قاتتىق ئاغرىش سېزىدۇ. يۈز ۋە كۆزلىرى قىزارغان،
بولۇپمۇ ئىككى ئىگەك قىسمى روشەن قىزارغان ھالدا
بولىدۇ. ئېغىر كېسەللەرنىڭ قاپاقلىرى ئىششىغاندەك
كۆرىنىدۇ. تەشئالىق كۆپ بولۇپ، تىلى قېلىن گەزباغلايدۇ.
تومۇر دولقۇنىسىمان سالىدۇ. كېسەلنى يۈتەل بەكمۇ
ئازاپلايدۇ، سوغاقتىن راھەتلىنىدۇ، كۆڭلى سوغاق
نەرسىلەرنى تارتىدۇ. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئوپكىنىڭ،
توۋەندىكى قىسمىدا بولسا نەپەس قىيىنلىشىش ئېغىر
بولىدۇ. يەنە بۇلاردىن باشقا، خىلىتلارنىڭ ئالاھىدىلىك-
لىرىگە ئاساسەن تۈرلۈك ئالامەتلەرمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.
ئەگەر ياللۇغلىنىش ئوپكىنىڭ يۇقۇرقى قىسمىدا بولسا
كېسەل كۆكرەك ئارقا قىسمى، تاغاق ئارىلىغىنىڭ ئاغ-
رىشىدىن زارلىنىدۇ.

ئوپكىدىكى ياللۇغ ئومۇمەن تۈۋەندىكى 3 خىل

ئەھۋال بىلەن ئۆزگىرىش ياسايدۇ: (1) ماددە پىشىدۇ. ۋە بەلغەم ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. بەلغەم ئاز ۋە ئۇنىڭ رەڭگى ۋە سۈپىتى سەۋەبىچى ماددىلارنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىگە ئىگە. نەتىجىدە ياللۇغلىنىش قايتىپ، باشقا بەلگىلىرى يەڭگىلەشىپ، بەلغەم ئاسان چىقىدۇ. خان بولىدۇ. (2) يىرىڭ يىغىپ ئەھۋال ئېغىرلىشىدۇ، ياللۇغلانغان جاي تىشىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئېغىزىدىن بېلىق پۇرىغى كېلىپ تۇرىدۇ. ئەگەر ياخشىلىق بولسا يىرىڭ بەلغەم بىلەن سىرتقا چىقىپ كېتىپ، ئۆپكە ماددىلاردىن تازىلىنىدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا يىرىڭ باشقا ئەزالارغا تارقاپ كېتىدۇ. نەتىجىدە باشقا كېسەللىك قوشۇلىدۇ. يىرىڭ يىغىلىشقا باشلىغاندا كېسەلنىڭ ئەھۋالى بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ، ماددا پىشقاندا قىزىتما پەسىيىدۇ. ئاغرىشىمۇ بولمايدۇ. لېكىن كۆكرەك قىسمىدا ئېغىرلىق ھەس قىلىدۇ. ئەگەر تېشىلسە يەنە ھارارەت قايتىدىن باشلىنىپ، ئاغرىق تىترەيدۇ.

(3) ماددىلارنىڭ سۇيۇق قىسمى تارقاپ كېتىپ، قويۇق قىسمى قېتىپ قالىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت ساقلىنىدۇ. بۇ چاغدا باشقا ئالامەتلىرى يېنىكىلەشكەندەك سېزىلىدۇ. ئەمما نەپەس قىيىنلىشىش ئەۋج ئېلىپ، قۇرۇق يوتەل ۋە كۆكرەكتە ئېغىرلىق ساقلىنىپ قالىدۇ. بۇنىڭ تېشىلىشى ئاز ئۇچرايدۇ. بۇنداقلارنى داۋالاشتا ئۆپكەدىكى بۇخىل قالدۇقنى چىقىرىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

داۋاسى: قان ئېلىش ۋە تەبىئەتنى يۇمشاتقۇچى

سۇرگىلەرنى بېرىش، ھوقنە قىلىش لازىم.

قان ئېلىشتا ئەگەر كېسەللىك نەزلىدىن بولسا قىپال تومۇرىدىن، قاندىن بولسا سافىن، كېيىن باسلىق-تىن ئېلىنىدۇ. قان ئالىدىغان تومۇرلارنى تاللاشتا تۆۋەندىكى قائىدە بويىچە تاللاش كېرەك. (1) كېسەل-لىكنىڭ دەسلەپكى 3-كۈنلىرى قان ئالغاندا زەرەرلەن-گەن ئوپكىنىڭ قارشى تەرەپتىكى تومۇرلاردىن ئېلىنىدۇ. مەسىلەن، ئوڭ تەرەپ ئوپكە يالۇغلانغاندا سول تەرەپتىن ئېلىش كېرەك. 4-كۈندىن كېيىن قان ئېلىشقا توغرا كەلگەندە زەرەرلەنگەن ئوپكە تەرىپىدىن ئېلىنىدۇ. ئوپكىنىڭ قايسى تەرەپتىكى زەرەرلەنگەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن شۇ تەرەپ كۆكرەكنىڭ ئېغىرلىق سېزىشى، شۇ تەرەپ يۇزقىسىمنىڭ قىزىرىپ تۇرۇشى، ئاغرىق ياتقاندا شۇ تەرەپ ئېغىز بۇرجىكىدىن شولگەي ئېقىپ تۇ-رۇشلار ئاساس قىلىنىدۇ. ياكى ئاغرىق قايسى تەرەپنى بېسىپ ياتقاندا بەلغەم كۆپ چىقسا يالۇغ-لىنىش ئوپكىنىڭ شۇ تەرەپىدە ھەم بېسىپ كۆر-گەندە ئاغرىق كۈچەيگەن تەرەپىدە يالۇغلىنىش بولىدۇ. سۇرگە بېرىش مەسىلىسىدە جالنىۇس ھىكىمنىڭ

پىكرىچە، ھارارەت يۇقۇرى بولسا قان ئېلىش بىلەن كۇپايىلىنىش كېرەك. بۇ تىۋىپنىڭ كېسەل ئەھۋالىغا قاراپ قارار قىلىشىغا باغلىق مەسىلە. بېرىلىدىغان

سۈرگە يۇمشاتقۇچى قاينىتىلمىلار بولۇشى كېرەك ۋە تۈۋەدە-
دىكى ھوقنە قىلىنىدۇ (مەتبۇخ 73 - نۇسخە). بىنەپشە، ئىت
ئۇزۇمى، ئاق لەيلى گۈلى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، سەرپىس-
تان، چىلان 20 دانىدىن، ئەينۇلا 5 دانە، زاراڭزا چىچىڭى
7 مىسقال، قىزىلگۈل 15 مىسقال، گۈل يېغى 3 مىسقال (سې-
رىق ياغ بولسىمۇ بولىدۇ). چىقىندەر ① سۈيى 15 مىسقال،
قاراشېكەر 15 مىسقال. ھوقنە سۇيۇقلۇغى تەييارلاش
چارىلىرى بويىچە تەييارلاپ ھوقنە قىلىنىدۇ. بۇلارنى
بىر قانچە قېتىم تەكرارلاش كېرەك. ئۇندىن باشقا، ئاق
سەندەل، ئارپا ئۇنى، سېمىز ئوت سۈيىنى بىزئاز بىنەپ-
شە يېغى بىلەن كۆرەككە سۇرتۇش ۋە بابۇنە، ئەكىلىل
مىلىك، ئاق لەيلى، بىنەپشەلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا
ئېلىپ سوقۇپ، بابۇنە يېغى بىلەن كۆكرەكنىڭ كۆپ
ئاغرىغان جايىغا سۈركەش لازىم. بۇ ئىشنى يۇمشات-
قۇچى ۋە ياندۇرغۇچى تەسىر قىلىدۇ. نەپەس قىيىنلە-
شش ئېغىر بولسا ئىسپۇغۇل لۇئابىنى بىزئاز قەن سې-
لىپ بېرىش ياكى كۆكرەك ئەتراپلىرىغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش
ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. ئانار شەرىتى (47 - نۇسخە)،
ئىلۇفەر شەرىتى ۋە باشقا ئەرەقلەرنى بېرىش بىلەن
بەك چۈچىمەل بولمىغان ئىسكەنجىۋىل بېرىش كۆكرەك-
نى ماددىلاردىن تازىلاش، ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە
تەشلىقنى قاندۇرۇش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ. بەزىلەر

① چىقىندەر: (چوقۇندەر) قىزىلچىنىڭ بىر تۈرى.

كاپۇر، ئارپا، كاسىن سۈيى، خاڭگىدا، قوغۇن، تاۋۇز،
قاياقلارنىڭ سۈيى ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابى، سېمىز ئىرەت
ئۇرۇغى، ئۇسۇڭ سۈيى ۋە ئانار سۇلىرىنى ئېھتىياجغا
لايىق ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.
شەرۋىتى خەشخاش قاتارلىق تۇتقۇچى شەرۋەتلەر
بېرىش مەنىنى قىلىنىدۇ.

(2) بەلغەم ماددىسىدىن بولغان ئوپكە ياللۇغى: ھارارەت
ۋە رەڭگىنىڭ قىزىلىشى بولمايدۇ. نەپەس قىيىنلىشىش
ئېغىر بولۇپ، كۆپ مىقداردا يېپىشقاق بەلغەم چىقىدۇ.
ئوپكىدىن خىمىراش تاۋۇشلىرى ئاڭلىنىدۇ. ئەمما
ياللۇغلىنىشنىڭ تەرەققى قىلىش ئەھۋالىغا قاراپ
ئارىلاپ ئىستىما پەيدا بولۇپ تۇرىدۇ.

داۋالاش: تەبىئەتنى يۇمشاتقۇچى (مەتبۇخى
مۇلەين 73 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ياللۇغلىنىش قايتۇر-
غۇچى دورىلار كۆكرەك سىرتىدىن سۇرتىلىدۇ. زۇپا
شەرۋىتى (63 - نۇسخە) قاتارلىقلار مۇۋاپىق ھالدا
بېرىلسە بولىدۇ.

(3) قاتتىقلاشتۇرغۇچى ئوپكە ياللۇغى — ئوپكىدىكى
ماددىلارنىڭ سۇيۇقلۇق قىسمى تارقىلىپ، قاتتىق
قىسمى قېپىقالىدۇ. بۇنىڭغا سەۋدا ماددىسى ياكى قويۇق
بەلغەم كۆپرەك سەۋەپ بولىدۇ. ئالامەتلىرى — ئاساسەن
نەپەس قىيىنلىشىش (نەپەس ئېلىش قىيىن بولىدۇ)،
قۇرۇق يوتەل، ھارارەت بولماسلىقى كېسەلنىڭ ئۇزۇنغا
سوزۇلۇپ كېتىشىدىن ئىبارەت.

قېدىمقى زامان تەۋپىلىرى زاتىنىڭ بۇ قىسمىدا ئۆپكەدە خۇددى بىرورەكتىكى تاشقا ئوخشاش تاش ھاسىل بولغانلىقى توغرىسىدا يېزىپ قالدۇرغان. تاش ھاسىل بولغاندىن كېيىن يوتەل پەسىيىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئىچىنى يۇمشاتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. زىغىر لۇئابى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، بادام يېغى قىز تۇققان ئايالىنىڭ سۈتىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەك قىسمىغا چېپىش لازىم. سانا، ئىت ئۇزۇمى، پۇنۇس، ئەگرى خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، تەرەنجىۋىل قاتارلىق دورىلاردىن تەركىپ تاپقان قايناتما بېرىلىدۇ. ۋە ياۋا پىياز شىرنىسىنى 2 مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىمدىن بېرىلىدۇ. بۇنىڭ تەركىبىدىكى دورىلار: 3 مىسقال ياۋا پىياز (ئەنسەل) نى پىشۇرۇپ، گۈل سۇسەن يىلتىزىدىن 2 مىسقال، جۈسەي ئۇرۇغى، زۇپادىن 1 مىسقال ئېلىپ سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن تەييارلىنىدۇ.

ئۆپكە سىلى

“سىل” دىگەن سۆز ئۇرۇقلاش ئۇقۇمىنى بىلدۈرىدۇ. ئۆپكە سىلى — ئۆپكەنىڭ ئۆز جىسمىدا ئوزگىرىش يۈز بېرىش، كاۋاك ھاسىل بولۇش ۋە پۈتۈن بەدەننى ئورۇقلىتىپ ئاجىزلىتىش بىلەن ئوتىدىغان كېسەلدىن ئىبارەت. ئۇنىڭدا يوتەل، نەپەس قىيىنلىشىش، قىزىتما قاتارلىق ئالامەتلەر دائىم ئۇچرايدۇ. بۇ كېسەل

باللاردا، سوغاق مىزاج كىشىلەردە ھەم ئاياللاردا كۆپ-
رەك ئۇچرايدۇ.

سەۋىيى: ئوپىكە سىلىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەپلىرى
ئاساسەن تۆۋەندىكى 3 خىلغا بۆلۈنىدۇ.

(1) پىشقان نەزلە ماددىلىرى مىڭدىن ئوپىكىگە
تەۋەلىدۇ. بۇ ماددىلار ئوپىكىنىڭ نېپىز قەۋەتلىرىنى
كۆيدۈرۈپ يارا ھاسىل قىلىدۇ.

(2) كۆكرەك پەردە ياللۇغى ياكى ئوپىكە ياللۇغىنىڭ
ماددىلىرى ئوپىكە يۆللەرنى زەرەرلەپ سىلغا ئۆزگىرىشى
مۇمكىن.

(3) بۇلاردىن باشقا ئوپىكىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى
سەۋەپلەردىن بولغان يارىلىنىشلىرىمۇ سىلغا ئېلىپ
بېرىشى مۇمكىن. ئالامەتلىرى: سۇس ئىستېمىنىڭ بولۇپ-
شى بىلەن كېسەل كىشى يۈزىنىڭ ياڭاق قىسمى
قىزارغان ھالدا بولىدۇ، بولۇپمۇ بۇ ئەھۋال چۈشتىن
كېيىن روشەن كۆرۈنىدۇ. تەبىئەتنىڭ زەئىپ بولۇشىغا
ئەگىشىپ كېچىدە ۋە ئادەتتىكى چاغلاردىمۇ تەرلەيدۇ. كېسەل-
نىڭ پۈت - دۈمبىسىگە قىسمەن ۋاقىتلاردا ئىششىق پەيدا بو-
لۇپ قالىدۇ. بۇ ئالامەتلەر "تەپى دىق" (جۈدە تىكۈچى قىزىتما)
دىگەن ئاتالغۇ بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. ئوپىكە سىلىدە بەلغەمنىڭ
ئاجراپ چىقىشى تەسىرەك بولۇپ، شىلىملىق ئاق، سېرىق
سۇيۇق، بەزىدە كۆكۈشەرەڭلىك بەلغەم چىقىدۇ. ھەتتا
يىرىڭلىق بەلغەممۇ چىقىشى مۇمكىن. يىرىڭلىق بەلغەم

كېسەلنىڭ ئېغىرلىشىۋاتقانلىغىدىن خەۋەر بېرىدۇ. بەزى تىۋىپلار بەلغەمنىڭ شىرىلىك ۋە تەسلىك بىلەن ئاجراپ چىققىنىغا قاراپ پىشقان ماددا (ماددەئى نەزجى) دەپ خاتا ئويلاپ، ئۆپكەننى قويۇق بەلغەمدىن تازىلاشقا تىرىشماي، نەتىجىدە ئاغرىق ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن. بەلغەمنىڭ يىرىڭلىق ياكى يىرىڭسىز ئىكەنلىكىنى ئاددىيەنە توۋەندىكىچە ئايرىشقا بولىدۇ. مەسىلەن، خاس يىرىڭلىق بەلغەم دائىم سېسىق پۇرايدۇ. بۇنى ئايرىش ئانچە قىيىن ئەمەس. ئەمما باشقا شىلىملىقلار بىلەن قوشۇلۇپ كەلگەندە پۇرىماسلىقى مۇمكىن. بۇ چاغدا بەلغەمنى سۇغا سالغاندا چۆكسە يىرىڭ، چۆكەمسە يىرىڭ ئەمەس ياكى ئوتقا سالغاندا دەرھال كۆيۈپ سېسىق پۇراق چىقارسا يىرىڭ، كۆيمەي قايىناپ تارقاپ كەتسە يىرىڭ ئەمەس.

داۋاسى: 1) ئۆپكە سىلىنى داۋالاشنىڭ نەتىجىسىگە تىۋىپلارنىڭ كوز قارىشى بىردەك ئەمەس. بەزىلەر ئۆپكەدىكى جاراهەت ساقايمايدۇ، چۈنكى ئۆپكەنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ دائىم ھەركەتلىنىپ تۇرۇشى نەسىر كورسىتىپ ساقايغىلى قويمايدۇ دىيىشىدۇ. جالىنۇس ھېكم بولسا جاراهەتنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن شۇ ئەزانىڭ ھەركەتسىز تۇرۇشى ھاجەت ئەمەس دەيدۇ. ئەستايىدىل داۋالاش، ياخشى ئۇزۇقلاندۇرۇش بىلەن تولۇق ساقىيىشى مۇمكىن، لېكىن ۋاقىت ئۇزۇنغا سوزۇلۇشى ئېھتىمال. ئەبۇئەلى ئىبنىسىنا بىر

ئايالنىڭ 23 يىل سىل بىلەن ئاغرىپ يۈرگەنلىگىنى يازغان. ئارپا سۈيىدە دەريا قىسقىچ پاقىسى (سەرتان)نى پىشۇرۇپ يىگۈزۈش سىل ئۈچۈن بەكمۇ ياخشى پايدا قىلىدۇ. ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە يۈتەلگە ئارام بېرىپ كۆكرەكتىكى ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ئۆپكە كېسەل-لىكلىرى ھەققىدە ئىلگىرىكى پەسىلدە كۆرسىتىلگەن دورىلارنى تاللاپ بېرىش كېرەك. مەسىلەن، لۇئۇقى خەشخاش (61- نۇسخە) ۋە باشقىلار بېرىلىدۇ. قەۋزىيەت بولسا كۈچلۈك سۈرگىلىرىنى بەرمەي، ئىچىنى يۇمشىتىدىغان خىيار شەنبەرنى كاشكاپ قىلىپ بېرىلسە بولىدۇ. ئىگەر ئىچى سۈرۈپ كەتكەن بولسا شەرۋىتى ھەببۇلىئاس بېرىلىدۇ.

3) گۈلقەننىڭ ئۆپكە سىلىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئەبوتەلى ئىبنىسىنا ئۆز ئەسەرلىرىدە ئالاھىدە توختالغان، مەسىلەن، بىر ئايالنىڭ سىل كېسىلى بىلەن ئاغرىپ، داۋالاش نەتىجە بەرمەي ئۆلەر ھالەتكە يەتكەندە گۈلقەن بىلەن داۋالىنىپ ناھايتى ياخشى ئۇنۇم ھاسىل قىلىپ، ساقىيىپ ئۆز ئەسلىگە كەلگەنلىكى ھەققىدە يازغان. گۈلقەننىڭ شۇ يىلقى يېڭى بولغىنى ئەڭ ياخشى ھىساپلىنىدۇ. مىقدارى جەھەتتە چەكلىمە يوق نان بىلەن قوشۇپ ئەتىگەن ئاشىدا بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى.

4) سۇت بىلەن داۋالاشتا ئاساسەن ئۆچكە ۋە

ئىشەك سۈتى بېرىلىدۇ. بۇ ھايۋانلار ئالما يوپۇرمىغى، گازىۋان، پاقا يوپۇرمىغى ۋە مەستەكىلەر بىلەن بېقىلىپ سۈتى سېغىلىدۇ. سۈتىنى سېغىشتىن بۇرۇن ھايۋاننىڭ ئەمچەكلىرى 3 قېتىم پاكىزە يۇيۇپ قۇرۇتۇپ يەنە يۇيۇپ تازىلاش كېرەك. سۈت ساغىدىغان قاچا پاكىزە بولىشى، ھايۋاننىڭ ئوزى ساغلام بولىشى شەرت. ئىشەكنىڭ تەخمىنەن 4-5 ئايلىقتىن چوڭ بولىشى لازىم. ئىشەك سۈتى دەسلەپتە 15 مىسقالدىن بېرىلىپ تەدرىجىي ھالدا كۆپەيتىلىشى لازىم. يۇقۇرى مىقدارنىڭ چەكلىمىسى يوق، كېسەلنىڭ تەبىئىي كۈتەرگىدەك بولسا بولىدۇ. بەك ئىچەلمىسە سۈتكە يېرىم مىسقال تۇز، بىر مىسقال نىشاستە (بۇغداي كىراخمالى) قوشۇپ بېرىلىدۇ. بەزىلەر ئەگەر مەنپەئەت كۆرۈلسە ئىشەك سۈتىنى بىر ھەپتىگىچە بېرىشكە بولىدۇ دەپ قارايدۇ. ئۈچكە سۈتە - نى بەرگەندە قاش تېشىنى تاۋلاپ سۈتكە چىلاپ (7 قېتىم شۇ خىلدا تەكرارلاپ) تەييارلانغان سۈتنى بېرىش كېرەك.

5) دەريا قىسقىچ پاقىسى (سەرتان) نى بېرىش ئۇسۇلى - سەرتاننىڭ پۇتلىرىنى كېسىۋېتىپ تازىلاپ ئارپا سۈيىگە سېلىپ ئاشتەك پىشۇرۇپ بېرىلدۇ. گۈلگەن بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بەرسىمۇ ياكى يۆتەل توختاتقۇچى شېرىلىك دورىلار بىلەن بىرگە قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ. شۇنداقلا قىسقىچ پاقا تالقىنى (سۈپۈ - پى سەرتان) قىلىپ بېرىشمۇ مۇمكىن، نۇسخىسى:

كويدۇرۇلگەن قىسقۇچ پاقا ① 1 سەر، ئاق كوك-

نار، قارا كوكنار ھەر بىرى $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، كەتمرا

3 مىسقال، ئەرەپ يىلىمى، قېبرىس ئارىلىنىڭ گىلى 5
مىسقالدىن، قۇرۇق ئۈزۈم 2 مىسقال، دورىلارنى يۈم-
شاق سوقۇپ تالغان قىلىپ خەشخاش شەرۋىتى (65 -
نۇسخە) ياكى ئىشەك سۈتى بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.
تاماق جەھەتتىن، ئۇلاي، كەكلىك، تۇرۇلغا، كاڭكۇك
ياكى قۇشقاچ قاتارلىق ئۇچار قاناتلارنىڭ گۆشىنى
كاۋاپ ياكى شورپا قىلىپ (ياغسىزراق) بېرىلىدۇ.

كوكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلجەنبە)

ئۆپكە ۋە كوكرەكنى ئوراپ تۇرغۇچى نېپىز پەردىنىڭ
ياللۇغلىنىشى زاتىلجەنبە دىيىلىدۇ. ئۇ ھەقىقى ۋە
ساختا دەپ 2 تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

1) ھەقىقى كوكرەك پەردە ياللۇغى: ئۇقۇل سەپرا،
سەپرا ئارىلاشقان قان، سەپرا قوشۇلغان بەلغەم ياكى
بىر ئاز ھارارەتلىك سەۋدا ماددىلىرى بۇ پەردىگە چۈشۈپ
ياللۇغلىنىش ھاسىل قىلىدۇ. بۇ پەردە كىرگىت ۋە پەي-
لەردىن قۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن بەلغەم ۋە قان سەۋدا ماددى-

① قىسقۇچ پاقىنى كويدۇرۇش ئۇسۇلى: قىسقۇچ پاقىنى
تازىلاپ كوزىغا سېلىپ ئاغزىنى گىل بىلەن ياخشىلاپ بېكىتكەن-
دىن كېيىن ئوتى توختىغان تونۇر ئىچىدە بىر كېچە تۇرغۇزۇپ
ئېلىنىدۇ. قىسقۇچ پاقا كۆل ھالىتىگە كېلىپ قالىدۇ.

لىرى ئاسانلىقچە شىمىرىلىپ كېتەلمەيدۇ، سەپرا قوشۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن شىمىرىلىدۇ. كۆكرەك پەردە ياللۇغى كۆكرەك بوشلۇغى كېسەللىكلىرى ئىچىدە ئېغىر ئوتىدىغان، خەتىرى كۆپرەك بىر خىل كېسەل بولۇپ، ئومۇمىي بەدەندىكى بەلگىلىرىمۇ ئېغىر. مەسىلەن، ئىستىمنىڭ بەك زىيادە بولۇشى، يوتەل ۋە نەپەسلىنىشنىڭ ئېغىر دەرىجىدە قىيىنلىشىشى، قوۋۇرغىلار ئاستىدا سانجىقسىمان قاتتىق ئاغرىشلار كورۇلىدۇ، تومۇر ھەركىتى يېپىلغان شەكىلدە بولۇپ، كېسەل بىئارام بولىدۇ. ھەقىقىي كۆكرەك پەردە ياللۇغلىرى توۋەندىكىچە 4 خىلغا بۆلۈپ داۋالىنىدۇ.

(1) سەپرا قوشۇلغان قان ماددىسىدىن بولغان ھەقىقىي كۆكرەك پەردە ياللۇغى: يۇقۇرقى ئومۇمىي ئالا-مەتلەردىن باشقا، ئاغرىقنىڭ يۈزىمۇ، چىقارغان بەلغەمنىڭ رەڭگىمۇ قىزىلغا مايىل كېلىدۇ.

داۋاسى: چىلان، سەرىپىستان، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، ئەينۇلا، ئەنجىرلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى سىقىپ سۇزۇپ ئۈستىگە خىيار شەنبەر بىلەن تەرەنجىۋىلنى ئېرتىپ قوشۇپ بېرىش كېرەك. ياكى (73 - نۇسخە) دىكى يۇمشاتقۇچى قايناتما بېرىلسە بولىدۇ. بىنەپشە گۈل قېنى بىلەن بىنەپشە شەرىۋىتى (74 - نۇسخە) بېرىشمۇ پايدىلىق. بىنەپشە، ئاق لەيلى گۈلى، ئارپا ئۇنىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، ئىسسىق سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ بابۇنە يېغى بىلەن ياغلاپ ئاغرىۋاتقان كۆكرەك

قىسمىغا قويۇش كېرەك. تېدىمقى تىۋىپلار ئاغرىق جايىنىڭ قارشى تەرىپىدىكى باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىشنى تەۋسىيە قىلاتتى.

(2) نۇقۇل سەپرادىن بولغان ھەقىقىي كۆكرەك پەردە ياللۇغى: ئاغرىش ۋە سانجىق ئېغىر بولىدۇ، سانجىق بار ئۇرۇن ئېچىشىدۇ. ھارارەت يۇقۇرى بولۇپ، بەلغەمنىڭ رەڭگى سېرىققا مايىل كېلىدۇ. تومۇر ھەرىكىتى تېز ۋە تەرتىپسىز، تەشلىق كۆپ بولىدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرقى تۈرىدە كورستىلگەن دورىلار بېرىلىدۇ. شەرۋىتى نىلۇفەر (75 - نۇسخە) گە ئىسپۇغۇل لۇئابى قوشۇپ بېرىش كېرەك.

(3) سەۋدادىن بولغان ھەقىقىي كۆكرەك پەردە يال-لۇغى، يۇقۇرقى ئالامەتلەردىن باشقا، ئېغىز ئىچى قۇرۇق، تىلى قارامتۇل گەز باغلىغان، يىرىك ھالدا بولىدۇ. بەلغەم ئاز ۋە تەسلىكتە ئاجراپ چىقىدۇ، رەڭگى قارىغا-مايىل كېلىدۇ.

داۋاسى: ئاساسەن يۇقۇرقىلار بىلەن ئوخ-شاش بولۇپ، ئاغرىق بار ئۇرۇنغا كالىك بەسەي يوپۇرمىغى، بىنەپشە، بابۇنە، ئاق لەيلى ئۇرۇغىنى سوقۇپ قويۇش كېرەك. ئىسسىق سۇ بىلەن ھوللەنگەن ماتادەك نەرسە-لەرنى كۆكرەككە قويۇش سانجىقنى پەسەيتىدۇ. مۇۋاپىق يۇمشاتقۇچى ھوقنەلەر بىلەن تەرەتنى يۇمشىتىپ تۇرۇش لازىم.

(4) بەلغەمدىن بولغان ھەقىقىي كۆكرەك پەردە

ياللۇغى ئېغىر بولسىمۇ، ھارارەت يەڭگىل بولىدۇ، ساند-
جىق بولمايدۇ. بەلغەمنىڭ رەڭگى دەسلەپتە قىزىلغا
مايىل ئاق بولسا، كېيىنرەك پۈتۈنلەي ئاق رەڭگە كىرىپ
كۆپ ۋە ئاسان چىقىدۇ.

داۋاسى: زۇپا شەرىپىتى (63 - نۇسخە) ۋە ئوخۇت،
ئارپا بېدىيان قوشۇلغان ئارپا سۈيى بېرىلىدۇ.

(2) غەيرى ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغى: بۇ
خىلدىكى كۆكرەك پەردە ياللۇغى سەۋەپلىرىگە قاراپ
ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ.

(1) قەۋۋۇرغىلارنى سىرتقى تەرەپتىن ئوراپ تۇر-
غۇچى سۈڭەك پەردىلىرىنىڭ ياللۇغى: تاشقى زەرەپەر يىقى-
لىش، ئۇرۇلۇش، سوقۇلۇشلار بىلەن كۆكرەك سىرتقى
پەردىسىگە ئىششىق ھاسىل قىلىدۇ. ئورۇنلاشقان جاي
جەھەتتىن ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغىدىن پەرقلىنىسىمۇ،
ئالامەتلىر جەھەتتىن ئوخشاش، ئەمما، خەتىرى ئاز.
ئالامەتلىرى: سانجىقسىمان داغرىدۇ. تومۇر ھەرىكىتى

ۋە ئىستىملار بەزىدە ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغىغا
ئوخشاپ كەتسىمۇ، لېكىن ئېغىرلىق دەرىجىدە ئۇقەدەر
بولمايدۇ. داغرىپ تۇرغان جايدا پۇلتىيىپ تۇرغان ئىش-
شىق روشەن كۆرىنىپ تۇرىدۇ. باسقاندا قاتتىق داغرىي-
دۇ. يوتەل بولىدۇ، بەلغەم بولمايدۇ. داۋالاشتا ھەقىقى
كۆكرەك پەردە ياللۇغىدەك داۋالىنىدۇ. بولۇپمۇ سىرتتىن
چاپقۇچى دورىلارنىڭ مەنپەئىتى كۆپرەك.

(2) قويۇق يەللەرنىڭ قوۋۇرغا ئارىلىق گوشلاردى-
رىگە چۇشۇشىدىن بولغان ساختا كوكرەك پەردە ياللۇغى:
قوۋۇرغا ئارىلىقلىرى قاتتىق ئاغرىپ نەپەس ئېلىشقا
تەسەر قىلىدۇ. بۇ خىلدىكى كوكرەك پەردە ياللۇغىنى
بەزى تىۋىپلار ھەقىقى دەپ ئويلاپ قېلىشى مۇمكىن،
ئەمما ئىششىقنىڭ كورۇنمەسلىكى بىلەن بىرىنچى تۈردىكى
ساختا كوكرەك پەردە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش؛ ئالا-
ھىدە ۋە ئېغىر بولغان ئالامەتلىرىگە ئاساسەن ھەقىقى
كوكرەك پەردە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش مۇمكىن.

داۋاسى: بەلغەم ماددىسىنى تازىلاش، سىرتتىن
ئىسسىق دورىلارنى سۈركەش لازىم. مەسىلەن، پىرسىياۋشان،
بۇغداي كىپىكى، ئاق لەيلى گۈلى، بوغا مۇڭگۈزى،
بىنەپشە قاتارلىقلارنى بابونە يېغى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ
سىرتتىن چېپىش لازىم. ھەم ئىسسىق ئۆتكۈزۈش كېرەك.
كوكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ يەنە بىر تۈرى بوغۇ-
لۇش خاراكتىرلىك كوكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلىجەنە-
خەنئاقى) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدا ياللۇغلىنىش ئاساسەن
كوكرەك پەردىسىنىڭ تۈۋەندىكى قىسمى يەنى كىرگىت
پەردە قىسمىدا بولۇپ نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىپ كېتىدۇ.
بولۇپمۇ نەپەسنى ئىچىگە ئالغاندا ئاغرىش بەكمۇ كۈچ-
يىپ كەتكەنلىكتىن، ئاغرىق نەپەس ئالماي خېلى ئۇزۇن
تۇرۇپ قالىدۇ. بۇ ھال بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كەتسە
ئاغرىق بوغۇلۇپ ئولۇپ قالىدۇ. بۇنى داۋالاشتا بىرىنچى

تۇردىكى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ بىرىنچى خىلىنى داۋالاش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىش مۇمكىن.

شۈشە كېسىلى

شۈشە كېسىلى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ بىر خىلى بولسىمۇ، ئەمما زەرەرلىنىش كۆكرەك ئارقا قىسمى قوۋۇرغىلىرىنى ئىچكى تەرەپتىن ئوراپ تۇرغۇچى كىر-گىت گۈشلەرنىڭ ياللۇغلىنىشىدىن ئىبارەت. بۇنىڭدا كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەن كېسەللىك بەلگىلىرىدىن باشقا قاتتىق ئاغرىش سەۋىيىدىن ئاغرىق كىشى پۈتۈنلەي ھەركەتتىن قالدۇ، مىدىرلاش مۇمكىن بولمايدۇ، ئاغرىق ياتالمايدۇ.

داۋاسى: ھوقنە دورىلارنى مۇۋاپىق تاللاپ ئىش-لىتىش لازىم. سىرتتىن قالايمىقان دورىلارنى چېپىشقا بولمايدۇ، ئۇلار كېسەلنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئىش-لىتىلىدىغان دورىلار، ماددىلارنى تاشقىرىغا سۈرۈپ چىقىرىشنى ئاساس قىلىش لازىم. تال كېسەللىگىدە قول-لىنىدىغان ئوتلۇق ھىجامەت (لوڭقا) قويۇلىدۇ. ئاغرىق جايغا ئەنجۈر قېقى بىلەن بىللە سوقۇلغان قىچا قويۇلىدۇ. بىنەپشە، بابۇنە، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، زىغىر، شۈمبە ئۇرۇغى، ئارپا ئۇنىنى باراۋەر ئېلىپ بىر ئاز سۇ بىلەن قاينىتىپ، كۈنجۈت يېغى بىلەن ياغلاپ ئاغرىق جايغا قويۇش كېرەك. باشقا چارىلار كۆكرەك پەردە ياللۇغى بىلەن ئوخشاش.

توش ئىچكى پەردىسىنىڭ ياللۇغى (زاتىل سەدرى)

ئوپكىنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ توش سۈڭەك ئارقىسىدىكى قىسمىنىڭ ياللۇغى بولۇپ، سەۋەپلىرى كۆك-رەڭ پەردە ياللۇغىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

ئالامەتلىرى: توش ساھىسىدا قاتتىق ئاغرىش ۋە سانجىقسىمان ئېچىش بولىدۇ. توش تىك پاسىلىنىڭ بىر قىسمى ئىككى تەرەپ ئوقىرەك سۈڭەك بېشىدىن باشلىنىپ، خەنجەرسىمان ئوسۇككە كېلىپ توختايدۇ. ياللۇغلىنىش كۆكرەكنىڭ بىر قىسمىدا بولسا، ئاغرىق ئىككى تەرەپكە ھەركەت قىلالىسىمۇ، لېكىن ئاستىن تەرەپكە قاراش ياكى تۆۋەنگە ئىگىش قاتارلىق ھەركەت قىلىشقا مۇمكىن بولمايدۇ. ئەگەر تەسادىپى بۇ خىل ھەركەت قىلىنسا قاتتىق ئاغرىش نەتىجىسىدە كېسەل بىئارام بولۇپ كېتىدۇ. ئادەتتىكى چاغلاردا كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ باشقا ئالامەتلىرى قوشۇلىدۇ. كېسەل كىشى كۆكرەك قىسمىدا بوغۇزدىن باشلاپ تامەندە ئېغىزغا قەدەر بولغان ئارىلىقتا ئاغرىش سېزىدۇ. توش ئىچكى پەردىسىنىڭ 2-شاخچىسى ئوقىرەك سۈڭەك بىلەن گەدەن پەيلىرىگە تۇتاشقان ھالدا بولغانلىقى ئۈچۈن ئاغرىق ئىككى تەرەپكە قارىغاندا، يۆتەلگەندە ئېغىرلىشىدۇ.

داۋاسى: كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭكى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، سىرتتىن قىلىنىدىغان تەدبىرلەر توش ئىچكى پەردىسىنىڭ ئورنىغا قاراپ قىلىنىدۇ.

كىرگىت پەردە ياللۇغى (بەرسام)

كىرگىت پەردىنىڭ كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ تەسىرىدە ياكى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن مۇستەقىل ھالدا ياللۇغلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، قەدىمقى تىبابەتتە يەنىلا كۆكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلجەنبە) قاتارىدا ھىساپلىنىپ كەلگەن. كىرگىت پەردە (ھىجابى ھاجىزە) نىڭ نەپەس ئەزالىرى بىلەن قوساقنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۈندىلىك تۇرغۇچى پەردە ئىكەنلىكى ھەققىدە ئوخشاشمىغان كۆز قاراشلار بولسىمۇ، لېكىن كۆپچىلىك ھۆكۈمالار بىردەك ئېتىراپ قىلىدۇ. ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى قوساق قىسمى ۋە يېتىم قوۋۇرغىلار ئارىلىقلىرىدا قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ. كېيىنچە، ئوڭ تەرەپ جىگەر ئەتراپىدا سادىجىقسىمان ئاغرىق بىلىنىدۇ. يۈتەل كېسەلنى بەك ئازاپلايدۇ. كۆڭلى ئايىنىدۇ. قۇرۇق ھو ئاغرىشنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈپ ھۇشىدىن كەتكۈزىدۇ. قوساق ئەتراپىنى تۇتۇپ كورگەندە قىزىق سېزىلىدۇ. ئومۇمەن ھارارەتمۇ بولىدۇ. يۈتەل بەلغەمسىز بولۇپ كېسەل ئەس-ھۇشىنى يوقىتىدۇ. بۇ ھال مىڭگە تەسىر يەتكەندەلىكتىن دېرەك بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن مىڭ پەردە ياللۇغى (سەرسام) بىلەن ئوخشىتىپ بەرسام دەپ ئاتىلىپ كەلگەن.

داۋاسى: پاقالچەك ئەتراپىغا ھىجامەت قويۇش بىلەن يەرلىك ئورۇنغا ماددىلارنى پىشۇرغۇچى ۋە تارقاتقۇچى

(مۇھلىل) سۇرتۇش لازىم. مەسىلەن، بابۇنە، بىنەپشە، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ئارپا ئۇنى، پۇرچاق، زىغىرلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قايناقسۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، بىر ئاز قىزىتىپ ئاغرىق جايغا قويىلىدۇ. تەرەتنى راۋان قىلىش ئۈچۈن كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا كۆرسىتىلگەن ھەرقىسە، باشقا چارىلار قىلىنىدۇ.

كۆكرەك بوشلۇقىغا يىرنىك تولۇش (ئىھتىقانى سىنە)

ئوپكىنىڭ تۇرلۇك ياللۇغلىرىنىڭ تېشىلىشى ياكى ئوپكىنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىلەردىكى ئىششىقلارنىڭ ئېغىز ئېلىشى نەتىجىسىدە كۆكرەك بوشلۇقىغا يىرنىك يىغىلىپ قالىدۇ. يىرنىك قويۇق ھالەتتىكى سۇيۇقلۇق بولغاچقا، سىرتقا چىقىپ كېتىشى ئۈچۈن پەقەت سىرتقا قاراپ ئېغىز ئېلىشى زورۇر.

ئالامەتلىرى: يېڭى باشلانغاندا كۆكرەك پەردە ياللۇغىدىكى ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ. كۆكرەكنىڭ ئاغرىشى كۆرۈلۈپ، چوڭقۇر تىنغاندا ياكى يۈتەلگەندە كۈچىيىدۇ. بەدەن ھارارىتى ئۆرلەيدۇ، توڭۇپ تىترەيدۇ، يۈتەلىدۇ. نەپەس ئۈزە ۋە قىيىن، تومۇر ئىتتىك بولىدۇ.

كونارغان چاغدا ئاغرىق كىشى ئورۇقلاپ، ئاجىز - لاپ كەمقانلىشىپ كېتىدۇ. بارماقلىرىنىڭ ئۇچى تومىلىشىپ قالىدۇ. ئوپكە سىلى تۇپەيلىدىن كۆكرەككە يىرنىك

يىغىلغاندا، يىرىڭ كوپرەك بولسا يۇرەك ئويناش، نەپەس قىيىنلىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كورۇلىدۇ.

داۋالاش: ئاغرىقنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ياخشى كوگۇل قويۇپ داۋالاش (كوكرەك ياللۇغىغا قارشى) ئېلىپ بىرىش لازىم. يىرىڭنى سۇيۇلدۇرۇپ چىقىرىش تەدبىر-لىرىنى كورۇش كېرەك. مەسىلەن، ئەنجۇر، زۇپا، سەر-پىستان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پىرسياۋشان، ئۇرۇقسىز ئۈزۈملەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، بادام يېغى ۋە ناۋات قوشۇپ قاينىتىپ ئىچىشكە بىرىلىدۇ.

۷ ماقاللا. يۈرەك كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: يۈرەكنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىكلىرى

يۈرەكنىڭ ئىسسىق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى
يۈرەكنىڭ ئىسسىق مىزاجلىق كېسەللىكى يۈرەك
ھەركىتى جەھەتلىرىدىلا ئىپادىلەنمەستىن بەلكى پۈتۈن
بەدەندە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: نەپەس چوڭ، تومۇر ھەركىتى چوڭ
ۋە تېز بولىدۇ. ۋە بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) ئۇرىدۇ.
كۆكرەك قىزىق، تەشەللىق زىيادە بولىدۇ. سەۋەپسىز
غەم-ئەندىشە قىلىدىغان، روھى جەھەتتىن ئازاپلىنىدۇ.
غان بولۇپ قالىدۇ. يۈرەك ئەتراپىدىكى يېقىمسىزلىق
كېسەلنى تىنىچسىزلاندۇرۇپ قويىدۇ. سوغاق ھاۋادىن
راھەتلىنىپ تۇرىدىغان بولۇپ، ئورۇقلاپ كېتىدۇ.

داۋاسى: قايسى بىر ماددىنىڭ غالىپلىقى كۆرۈلسە
قائىدە بويىچە شۇ ماددىنى تازىلاپ چىقىرىش ئۇسۇل-
لىرى قوللىنىدۇ. مەسىلەن، قان غالىپ بولسا باسلىق
تومۇرىدىن قان ئېلىشى لازىم. ئەگەر قان ئېلىش مەنى

قىلىنىدىغان ئەھۋاللار بولسا ئىككى غول ئارىسىنى تىلىپ تۇرۇپ لوڭقا قويۇش لازىم. ئەگەر قىزىش ئارتۇق بولسا ماددىنى تازىلىغاندىن كېيىن قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) نى ئانار ياكى ئالما شەرۋىتى بىلەن بېرىش لازىم. ئاق سەندەل، كاپۇرلارنى گۇلاپقا سۇرۇپ كۆكرەككە چېپىش كېرەك. سوغاق ۋە خۇشپۇراقلىق نەرسىلەرنى پۇرۇتۇش، ھول مېۋە (ئانار - ئالما) لارنى كۆپرەك بېرىش، تامغىغا يۇمىغاقسۇت سېلىپ بېرىش كېرەك. قەۋزىيەت بولسا تەمىرى ھىندى بىلەن ئەينولانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قايناقسۇدا دۇملەپ تەمىنى ئىچىرىش لازىم. ئەگەر ئىچى سۇرگەن بولسا، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى بېرىلىدۇ. خېمىرى سەندەل (77 - نۇسخە)، ئەرەقى سەندەل قاتارلىق يۈرەككە قۇۋۋەت بەرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. ئەگەر كېسەل سەۋىيىسى ماددىسىز بولسا، تازىلاش ھاجەت ئەمەس، مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) يېتەرلىكتۇر.

يۈرەكنىڭ سوغاق مىزاجلىق كېسەلى

مىزاجىدا سوغاقلىقنىڭ غەلبە قىلغانلىقى سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تەمۇر ھەركىتى كىچىك، ئاستا، تەرتىپسىز بولىدۇ. نەپەس ئېلىشى سۇس، بەدىنى ئاجىز ۋە ئوزى ھورۇن بولۇپ قالىدۇ. چىرايى سولغان، دائىم غەمكىن ۋە ئادەم خالىمايدىغان بولۇپ، مالىخولىيا ئالا-

مەتلەرى كورىنىدۇ. ئىسسىق نەرسىلەردىن راھەتلىنىدۇ.
داۋاسى: داۋا ئۆلۈمىشكى-ھار (22 - نۇسخە)
 بېرىلىدۇ. شەرۋەتلەردىن گازىۋەن شەرۋىتى، بادىرەنجىبۇيا
 شەرۋىتى بېرىش (78 - 79 - نۇسخىلەر) كېرەك. ئىچىدە -
 دىغان چايغا ئىپار، قىزىلگۈل، سۈمبۇل ۋە زەپەر سېلىپ
 ئىچىش لازىم. غىزاسىغا كەپتەر، تورۇلغا، قۇشقاچ، توخۇ
 شورپىسىغا دارچىن، زەپەر، زىرە، پىننە قوشۇپ بېرىش
 كېرەك. سۈمبۇل، دارچىن، سەئىدى كۇپى، قەلەمپۇر،
 قىزىلگۈل، بادىرەنجىبۇيا، مەرزەنجۇش، رەيھانلارنى ھاجەت
 مىقدارى بىلەن ئېلىپ سوقۇپ، تۇخۇم سېرىغى بىلەن
 يۇغۇرۇپ كۆكرەككە قويۇش لازىم. سوغاق نەرسىلەردىن
 قەتئى پەرەز قىلىش لازىم. ھەسەل شەرۋىتى (81 - نۇسخە)
 بۇ كېسەلگە ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

يۈرەكنىڭ قۇرۇق مىزاجلىق كېسەلى

ئالامەتلەرى: تومۇر ھەركىتى قاتتىق، كىچىك ۋە
 بىر تۇتاش بولىدۇ. ئورۇقلاش ئانچە بولمايدۇ. روھى
 جەھەتتىكى غەيرى ئەھۋاللار يوقۇرقىدىكىلەرگە قارىغاندا
 بوشراق بولىدۇ. ئۇيقۇسىزلىق ۋە قۇرۇق، قاتتىق يوتەل
 نىڭ بولۇشى بۇ خىلدىكى يۈرەك كېسەلىگە خاس ئالا-
 مەتتۇر. چۈنكى يۈرەك ۋە ئوپكىنىڭ مىزاجىدىمۇ قۇرۇق-
 لۇق غالىپ بولۇپ، نەملىكنىڭ يېتەرسىزلىكى كورىلىدۇ.
داۋاسى: ئارپا سۈيىگە بادام يېغى ئارىلاشتۇرۇپ
 بېرىلىدۇ. شېكەر قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ھول سوغاق

تاماقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇلىدۇ، يېڭى سېغىلغان سۇت بېرىش ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. بىنەپشە يېڭى^①، ئاق موم، قاپاق ئۇرۇغى، ھول يۇمغاقسۇت سۈيى، تەرخەمەك سۇلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ يانچىپ كۆكرەكنىڭ يۈرەك ئەتراپىغا سۈركۈلىدۇ.

يۈرەكنىڭ ھول مىزاجلىق كېسىلى

ئالامەتلىرى: تومۇر ھەركىتى يۇمشاق، ئاستا ۋە مۇختەلىپ بولىدۇ. روھى قوزغىلىش بەلگىلىرى تېز بارلىققا كېلىپ تېز ئۆزگۈرىدۇ. قۇرۇقلۇقتىن راھەت تاپىدۇ.

داۋاسى: ھوللۇك تاماقلارنى ئاز بېرىش بىلەن يۈرەككە قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈچى دورىلاردىن قەلەمپۇر، زەپە، بادرنەجبۇيا قاتارلىقلار بېرىلىدۇ، ھەسەل سالغان ئىسكەنجىۋىل، پىننە شەرىۋىتى ئىچكۈزۈلۈپ، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ھەبى سەبرە (4 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

2 - پەسىل: يۈرەك ئويناش (خاپقانى)

قەلب كېسىلى

يۈرەك قوزغىلىش (خاپقان) كېسەللىكلىرى — يۈرەككە يەتكەن تۇرلۇك زەرەرلىنىشلەر نەتىجىسىدە تىترەش ھەركىتى (ھەركىتى ئىختىلاجى) ئارقىلىق قوزغىلىشىدىن

^① بىنەپشە يېڭى: گۈل يېپىغىغا ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن تەييارلىنىدۇ.

پەيدا بولغان يۈرەكنىڭ تەۋرىشىدىن ئىبارەت. خاپقان كېلىپ چىقىش سەۋەپلىرى ئاساسىدا 8 تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان خاپقان

بۇ تۈردىكى خاپقانىڭ ئالامەتلىرى ۋە داۋالاش ئۇسۇللىرى يوقۇرىدا سۆزلەنگەن يۈرەكنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىرىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

قان قېيىش (ئىمتىلائي خۇن) دىن بولغان خاپقان

قان گەرچە ئوفۇنەتسىز بولسىمۇ يۈرەك تومۇرلىرىدا راۋان ئاقماي قېيىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: قان ماددىسى غالىپلىق ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تومۇر ھەركىتى يوغان ۋە ئېسىلغان ھالدا، سۇيىدۇك قويۇق ۋە قىزىل رەڭلىك بولىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىرى ئېغىرلىشىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: چەپ قول باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش، ئەگەر قان ئېلىشقا بولمايدىغان ئەھۋاللار بولسا، پاخالچەك ياكى ئارقا تەرەپ ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا ھىجامەت قويۇش لازىم. قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. گۆشىز تاماق، پىشلاق قاتارلىقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش لازىم. مەنىنى چىقىرىش تەدبىرلىرىنى قىلىش ۋە مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 1 - پەسلىدىكى چارلارنى قوشۇمچە ئېلىپ بېرىش لازىم. ئەگەر كېسەل - نىڭ بەدىنى بەك ئاجىز بولسا ئوتكۇر سوغاق دورىلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

يۈرەك تومۇرلىرىغا سەپرا قۇيۇلۇشتىن بولغان خاپقان

ئالامەتى: سەۋەپسىز غەمكىن بولۇش، دائىم
كوڭۇلسىزلىك ئىچىدە تۇرغانلىق ھىس قىلىش، ئۇيقۇ-
سىزلىق ۋە تەشنىلىقنىڭ زىيادە بولۇشىدەك بەلگىلەر بولۇپ،
يۈرەك قىزىپ تۇرغانلىق سېزىلىدۇ. يۈرەك تىستىرەپ
تۇرىدۇ. ئەمما ئادەتتە سەپرا سەۋىيىسى بىلەن بۇ خىل
ئەھۋال بولمايدۇ.

داۋاسى: سەپرانى قانئومۇردىن چىقىرىش ئۇچۇن،
مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بىلەن پىشە شەرۋىتى ۋە
تەمرى ھىندىنى قايناق سۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ھارارەت بولسا مۇۋاپىق تەدبىر
قىلىنىدۇ. قاتتىق ھارارەت نەتىجىسىدىكى يۈرەكتە
ئىششىق پەيدا بولۇش خەۋپى بولسا، 1 پۇڭ قۇش
ئۇزۇمى (يەبرۇج)، 1 پۇڭ كاپۇ، 1 پۇڭ ئىپار،
زەپەرلەرنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ بىر دانە ماش ئېغىرلىغىدا
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يۈرەكنىڭ ھارارىتى بەك زىيادە
بولسا، نېپىز كوينەكنى سەندەل ئەرەقى بىلەن بىر قانچە
قېتىم نەمدەپ قۇرۇتۇپ، يۈرەككە تىگىپ تۇرىدىغان
قىسمىنى بىر ئاز گۇلاپ بىلەن نەم قىلىپ كەيگۈزۈپ
قويۇش كېرەك. ياكى قىزىل گۈل، تاباشىردىن بىر
مىسقالدىن، يۇمغاقسۇت ئۇرۇغىدىن 2 مىسقال، كاپۇردىن

$\frac{1}{2}$ پۇڭ ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئالما ياكى ئانار شە-
2

ۋىتى بىلەن كۈنىگە بىر قېتىم بېرىلىدۇ. ھەم مەۋە شەرۋىتى (شەرۋىتى فەۋاكە) (15 - نۇسخە) بېرىش مۇمكىن،

بەلغەم ماددىسىدىن بولغان خاپقان (خاپقانى بەلغەمى)

بەلغەم ماددىسىنىڭ يۈرەك غىلاپىغا ① ياكى يۈرەك تومۇرلىرى ئىچىگە چۈشۈشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. يۈرەك غىلىپى ئىچىگە چۈشكەن ماددا سۇيۇقلۇق ۋە يەل بولۇپ، يۈرەك تومۇرلىرىغا چۈشكىنى قويۇق توسالغۇ (سۇدە) بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: نەپەس قىيىنلىشىش بىلەن تومۇر ھەركىتى يۇمشاق بولىدۇ. بەزىدە ئاغرىق ھۇشسىزلىق كېتىدىغاندەك بولۇپ قالىدۇ. ئاغرىق يۈرىكىنىڭ سۇغا چىلىشىپ تۇرغانلىقىنى ھىس قىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئىستەمخىقۇن (16 - نۇسخە) بىلەن ئايارەج پەي-قارانى (11 - نۇسخە) قوشۇپ بېرىش كېرەك. ھەببى قوقىيا (17 - نۇسخە) بېرىلسىمۇ بولىدۇ، بەزىلەر ئايا-رەج لوغازيا ياكى بەيادرتۇس (بەيادى تۇس) بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ، ئەگەر قەي قىلىش ئاسان بولسا قەي قىلدۇرۇپ بەلغەمنى تازىلاش لازىم. ئۇندىن كېيىن داۋا-ئۆلمىشكى تەلخ (81 - نۇسخە) بېرىلىپ، يۈرەكنى قۇۋۋەت-

① غىلاپ: يۈرەك ئىتراپىنى ئوراپ تۇرغۇچى نېپىز پەردە.

لەندۇرۇش كېرەك. ئۇشدارى لۇئۇۋى (8 - نۇسخە) بەرسىمۇ بولىدۇ. ئۇندىن باشقا يۈرەككە ئىسسىقلىق بەرگۈچى دورىلارنى يۈرەك ئۈستىگە چېپىش مەسىلەن، قۇست، سۇنبۇل، سەئىدى، دارچىن، سوكلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سو - قۇپ رەيھان سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ يۈرەك ئۈستىگە چېپىش كېرەك.

5. يۈرەك تومۇرلىرىغا سەۋدا قويۇلۇشتىن بولغان

خاپقان

سەۋدا خىلىتلارنىڭ لېيى بولغانلىقى ئۈچۈن تومۇرلارغا قويۇلسا توسالغۇ ھاسىل قىلىپ، يۈرەكنىڭ ساپ ھاۋا (ھاۋايى نەسىمى) بىلەن تەمىنلىنىشى ۋە بۇخارات - لارنىڭ چىقىپ كېتىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. يۈرەك بۇ توسقۇنلۇقنى دەپى قىلىش ئۈچۈن كۈچەپ ھەركەتلەن - گەنلىكتىن، تىترەش قوزغىلىش كېلىپ چىقىدۇ؛ ياكى ھاۋايى نەسىمى يېتىشمەسلىك سەۋىيىدىن يۈرەك ئېغىپ ھەركەت قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: دائىم يۈرەك ئېغىپ (پۇلاڭلاپ) تۇرىدۇ. تومۇر ھەركىتى قاتتىق بولىدۇ. كېسەلدە قورقۇش ۋە ئەندىشە، ئورۇنسىز خىيالار پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: بۇ كېسەلنىڭ داۋاسى مالىخولىيانىڭ داۋاسى بىلەن ئوخشاش. بەلغەم بىلەن سەۋدانىڭ ئاز - لاش ئالامەتلىرى بولسا، بەلغەم ۋە ساۋدانى تازىلاش ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ. توربۇت، ئەپتىمۇن،

غارىقۇن، ئۈستۈخۇددۇس، كابىل ھېلىسىنىڭ پۇستى ھەر
 بىرى 3 مىسقالدىن، ئايارەج پەيقارا $4\frac{1}{2}$ مىسقال،
 ئۇدى ھىندى $1\frac{1}{2}$ مىسقال. دورىلارنى سوقۇپ، ئەل-
 گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئايارەجنى ئېرىتىپ شۇنىڭ بىلەن
 ھەب قىلىنىدۇ. ھەر كۈنى كەچتە 2 مىسقالدىن بېرىل-
 دۇ. ئەگەر خاس سەۋادىدىن بولسا ھەببى شەبىيار (2 - 8 -
 نۇسخە) بېرىلىدۇ. يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن خې-
 مىرى ئەۋرىشىم (23 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

كوپ قان يوقىتىش ۋە ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچار بولىشىدىن بولغان خاپقان

ئاياللار توغۇتتىن كېيىن ياكى ھېيىز سەۋىيىسى بى-
 لەن كوپ قان يوقىتىش، ئەلەردە ھەر خىل يوللار بى-
 لەن قان ئېقىش ۋە قاتتىق سۈرگە ئىچىپ كوپ ئىچ-
 سۇرۇپ كېتىش، يىمەك - ئىچمەكنىڭ ناچار بولىشىدىن
 قان ئازلىق كېلىپ چىقىش قاتارلىق سەۋەپلەر يۈرەكنى
 زەئىپلەشتۈرىدۇ. زەئىپلىكنى يېڭىپ كېتىش ئۈچۈن ئاجىز-
 لىغان يۈرەكنىڭ ھەركىتى تىتىرىگەن ھالەتتە بولۇپ،
 خاپقان پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيىنى يوقىتىش، ئۇندىن
 كېيىن قان ھاسىل قىلغۇچى تەدبىر - چارىلارنى قىل-
 ىش لازىم. مەسىلەن، چالا پىشۇرۇلغان توخۇم سېرىغى،
 نوخۇت سېلىنغان ئۇچار قاناتلار شورپىسى بېرىلىدۇ. يۇ-
 قۇرىدا كورسىتىلگەن يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار

تاللاپ بېرىلىدۇ. ئاياللارنىڭ ھېيىرىنى تەڭشەش چارد-
لىرى قىلىنىدۇ. جىنىسى ئالاقىنى چەكلەش لازىم.

**يۈرەكنىڭ سەزگۈ ئەسەپلىرىنىڭ قوزغۇلىشچان بولۇپ
قېلىشىدىن بولغان خاپقان**

غەزەپلىنىش، خوشلۇق ياكى كۈتۈلمىگەن خەۋەرنى
ئاڭلاش بىلەن كېسەلنىڭ يۈرىكى تىترەپ سالىدۇ. ھەتتا
ئىسسىق ۋە سوغاقلىق تەسىراتلار مۇشۇنداق ئەھۋاللارنى
پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەۋىيىنى تۈگىتىش بىلەن روھنى كۈچ-
لەندۈرگۈچى چارىلارنى قىلىش لازىم. تامىغىغا پاقلاشنىڭ
كاللا گۆشى ۋە ھەرسە ① بېرىلىدۇ. يۈرەكنى كۈچلەندۈر-
رۇش ئۈچۈن كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ، 1 - پەسىلدە كۈر-
ستىلىگەن قۇۋۋەت دورىلىرىدىن بىرىنى تاللاپ بېرىش لازىم.

**باشقا ئەزالاردىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ يۈرەككە
تەسىرىدىن بولغان خاپقان**

بەدەندىكى ھەر خىل ئۆزگىرىشلەر، جۈملىدىن ئە-
زالاردىكى زەرەرلىنىشلەر يۈرەككە ئوخشاش بولمىغان دە-
رىجىدە تەسىر قىلىپ، خاپقانىنى پەيدا قىلىدۇ.

(1) مىڭە كېسەللىكلىرى، قاتتىق باش ئاغرىشلار
يۈرەككە تەسىر قىلىدۇ. نەتىجىدە يۈرەك ھەرىكىتىدە تىترەش-
نى شەكىللەندۈرىدۇ. ئۇندىن باشقا جىگەر مەئدە قاتار-

① ھەرسە: گوشنى ھالۋىدەك يۇمشاق پىشۇرۇپ تەييارلىنىپ

دىغان بىر خىل غىزا

لىق ئەزالارنىڭ كېسەللىكلىرىمۇ شۇنداق تەسىر كۆرسىتىدۇ.
(2) زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ چېقىشى بىلەنمۇ
خاپقان كېلىپ چېقىشى مۇمكىن.

داۋاسى: شىرىكچىلىكى بار بولغان ئەزالاردىكى كې-
سەللىكلەرنىڭ داۋاسى ئاساس قىلىش بىلەن يۈرەكنى
قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنى مۇۋاپىق تاللاپ قوشۇمچە
بېرىش لازىم. ئەمما شىرىك ئەزانى ئايرىشتا خاتاغا يول
قويماسلىق لازىم.

تايلىنىپ كېتىش (غەششى)

غەششى يۈرەكنىڭ ھىس ۋە ئىرادە ئەسەپلىرىنىڭ
ئۆز پائالىيىتىدىن قېلىشى بىلەن كېلىپ چىقىدىغان ئېغىر
ھالدۇر. مەزكۇر ئەسەپلەر يۈرەكتىكى روھنىڭ پۈتۈن بە-
دەنگە قۇۋۋەت بېرىشىنى تەڭشەپ تۇرغاشقا بۇلارنىڭ زەرەر-
لىنىشى ھۇشسىزلىقنى كەلتۈرىدۇ. ھۇشسىزلىقنى كەلتۈرگۈ-
چى سەۋەپلەر: روھنىڭ تارقاپ كېتىشى، روھ بىلەن تاش-
قى ساپ ھاۋا ئالمىشىشنىڭ توسىلىشىدىن ئىبارەت.

(1) روھنىڭ تارقاپ كېتىشى — (1) داۋاملىق ئۆتكۈر
ئىچى سۇرۇش ياكى كۆپ مىقداردا قان كېتىش؛ (2) ھەد-
دىدىن ئارتۇق خوشاللىق ياكى لەززەتلىنىش بىلەن كې-
سەل ھۇشىدىن كېتىش؛ (3) قاتتىق ئاغرىش؛ (4) زەھەر-
لىك دورىلارنىڭ تەسىرى، مەسىلەن، سەڭگىيا، ئاق پارپى
قاتارلىقلار ئايلىنىپ كېتىشكە سەۋەپچى بولىدۇ.

(2) روھنىڭ توسىلىپ قېلىشى — (1) ئۆتكۈر تەسىر-

لىك يىمەك - ئىچمەكلەرنى ھەددىدىن ئارتۇق ئىستىمال قىلىش، مەسىلەن، ھاراق، مەيزاپلارنى كۆپ ئىچىش، (2) تۇيۇقسىز پەيدا بولغان قورقۇنۇش، ۋەھشەت ۋە غەم، (3) ھەر خىل زەھەرلىك بۇس - بۇخاراتلار، (4) يۈرەك مىزاجىنىڭ ئۆتكۈر بۇزۇلۇشى، (5) مىڭە، ئۆپكە قاتارلىق ئەزالارغا يەتكەن زەھەرنىڭ روھقا تەسىر قىلىشى ۋە يۈرەكنىڭ ئۆزى ياكى غىلاپىدىكى ياللۇغلىنىشلار.

ئالامەتلىرى: ھۇشىدىن كېتىش ئالدىدا، تومۇر كىچىك، ئىنچىكە سالىدۇ، رەڭگى ئۆزگىرىدۇ (تاتىرىدۇ)، كۆز ئالمىسىنىڭ ھەركەتلىنىشى ناچارلىشىپ كۆز ئالدىدا بىر نىمە ئۇچۇپ يۈرگەندەك كۆرىنىدۇ، بىر ئاز سوغاق تەرلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن ھۇشىدىن كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاغرىقنىڭ رەڭگى توپىرەڭ، پۇت - قوللىرى سوۋۇپ كەتكەن، نەپەس ئېلىشى كىچىك ۋە ئاستا بولىدۇ. تومۇر ھەركىتى ئاجىز ۋە ئاستا بولۇپ، بارغانسېرى پۇتۇن بەدەن سوۋۇپ كېتىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئۆلۈم بىلەن ئاياغلىشىدۇ. يۈرەك ئويناش ئېغىر ئۆتكەندىمۇ ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. ئايلىنىپ كېتىشنىڭ تەكرارلىنىپ تۇرۇشى يامان ئاقىۋەتلىك تۇر. مىڭگە قان چۇشۇش (سەكتە) بىلەن ئايلىنىپ كېتىش (غەشى) نىڭ پەرقى شۇكى، سەكتەدىن كېيىن پۇتۇنلەي ئاۋاز چىقمايدۇ. ئەمما ئايلىنىپ كەتكەن ئاغرىقتىن ئاۋاز چىقىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ئايلىنىپ كەتكۈچىلەرنى پۇتۇنلەي ھۇش-

سىز ھالەتتە ياكى بىر ئاز ھۇشيار ئۇچرىتىشىمىز مۇمكىن، ھوشىمىز بولغاندا، ئەگەر سەۋىيىنى بىلىشكە ئۇلگۈرسەك، ئۇنى دەپنى قىلىش، بولمىسا كۈچنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ ھۇشنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ياردەم بېرىشىمىز كېرەك. يەنى مۇناسىۋەتلىك سەۋەپلەرگە قارىمۇ - قارشى تەسىر قىلىدىغان دورىلارنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش، يۇتقۇنچاققا تامغۇزۇش لازىم. بۇنداق چاغدا ئاغرىقنىڭ مىزاجىغا دىققەت قىلىش زورۇر. ئۇنداق بولمىغاندا قىلىنغان تەدبىر پايدا بەرمەيدۇ. مەسىلەن، (1) كېسەلنىڭ مىزاجى ئىسسىق بولسا، كاپۇر، ئاق سەندەل، گۈلاپ، تەرخەمەك سۈيى، خاڭگا سۈيى قاتارلىقلارغا بىر ئاز ئىپار قوشۇپ پۇرۇتۇش لازىم. چۈنكى ئىپار تەبىئى ئىسسىقلىققا مەدەت بېرىدۇ. سوغاق گۈلاپنى يۇتقۇنچاققا تامغۇزۇش، كۆك رىڭگە سوغاق سۇ پۇركەش كېرەك. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن خاپقان كېسىلىدە سۈزلەنگەن سەندەل سۈيىدە نەملەنگەن كۆيىنەك كەيگۈزۈش لازىم. ئەگەر كېسەل ھۇشيار ھالەتتە بولسا قېتىق - دۇغ ئىچكۈزۈش لازىم.

(2) كېسەلنىڭ مىزاجى سوغاق بولسا ھۇشسىز ھالەتتە ئىپار، ئەنبەر، رەيھان، لاجىندانە، قەلەمپۇر، دارچىن، زەپەر قاتارلىقلارنى پۇرۇتۇش لازىم. يېرىم مىسقال داۋا - ئىلمىشكى، يېرىم پۇڭ ئىپارنى ئازراق رەيھان سۈيى بىلەن ئېرىتىپ، يۇتقۇنچاققا تېمىتىش لازىم. ئەگەر ئاي - لىنىپ كېتىشنىڭ سەۋىيى ئاچ قېلىش، قاتتىق ئىچ سۇ -

رۇش، تومۇردىن كوپ قان ئېلىش، جاراھەتلەردىن كوپ قان ئېقىپ كېتىشىلەردىن بولسا سوغاق سۇ، گۇلاپ قاتارلىق - لارنى كۆكرەككە قويۇشقا بولمايدۇ. بەلكى توۋەندىكىلەر - دىن بىرىنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش لازىم: توخۇ گۆشى كاۋىپى، ئوتقا سېلىپ بىر ئاز پىشۇرۇلغان ئالما ياكى بىيە، بۇغداينىڭ ئىسسىق نېنى قاتارلىقلارنى پۇرۇتۇش؛ گۆش سۈيىگە گۇلاپ بىلەن ئازراق ھاراق قوشۇپ گالغا تامغۇزۇش كېرەك. مەيدە ئۇستىنى ئىسسىق مايلا بىلەن ياغلاپ بېرىش لازىم.

3) ئايلىنىپ كېتىش. كوپ تەرلەش بىلەن باش - لانغان بولسا، گۇلاپ، سوغاق سۇ قاتارلىقلار بىلەن كېسەل - نىڭ بەدىنىنى سۇرتىدۇ. ئەگەر تەرلەش يەنە داۋام قىلىۋاتقان بولسا ھەبۇل ئاسنىڭ قۇرۇتۇلغان يوپۇرمىغى، موزا، ئانار پوستىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈ - زۇپ، ئەزالارغا سېپىلىدۇ. ئالما، بىيە قاتارلىق مېۋىلەر - نىڭ سۈيى، گۆش شورپىسىغا پۇراقلىق دورىلارنى قوشۇپ يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش لازىم. ئەگەر ئايلىنىپ كېتىش - تىن بۇرۇن ياكى ئايلىنىپ كەتكەن ھالەتتە ھېق تۇتسا ئېغىزدىن نەرسە بېرىشنى توختىتىش ۋە قۇستۇرۇش تەد - بىرلىرىنى قىلىش كېرەك. گالغا توخۇ پېيى تىقىپ قۇس - تۇرسىمۇ بولىدۇ. كوندۇشقا ئوخشاش چۈشكۈرتكۈچى دو - رىلارنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش لازىم.

4) قاتتىق ئاغرىش سەۋىيىدىن ئايلىنىپ كېتىش: بۇ خىلدىكى ئاغرىقلاردا ئالدىنى ئېلىشقا بەك دىققەت

قىلىش لازىم. قاتتىق ئاغرىشنى پەسەيتىش تەدبىرلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا كۆرۈش كېرەك. يەنى ئۇچەي توسۇلىش (قو-لۇنچ) دىكى قاتتىق ئاغرىشلاردا فولۇنىيا (28 - نۇسخە) بېرىشكە بولىدۇ. زەھەرلىك ھاشارەتلەر چېقىش ياكى ھايۋانلار چېشىلەش تەسىرىدىن بولسا ياكى زەھەرلىك يىمەك - ئىچمەكلىكلەرنى ئىستىمال قىلىش بىلەن پەيدا بولغان بولسا مۇمكىن قەدەر قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن تەرياق ياكى ھايۋانلاردىن چىققان زەھەرگە قارشى تاشلار (پادى زەھەرلەر) ①نى، ئەگەر ھايۋانلاردىن چىققىنى بولمىسا، مەدەندىن ياسالغانلىرى ياكى كاندىن چىققانلىرى بولسىمۇ بولىدۇ. ئۇندىن باشقا تەدبىرىنى كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ قوللىنىش لازىم.

(5) روھى ھالەتنىڭ تەسىرى ياكى ئەسەپ (نېرۋ) سەۋىيىدىن بولغان ئايلىنىپ كېتىش: يۇقۇرىدا سۆزلىپ ئۆتۈلگەن خۇشپۇراق دورىلارنى پۇرۇتۇش، قول - پۇتلىرىنى سوغاق گۈلەپ بىلەن سۇرتۇش، بەدەننى ئىسسىق ساقلاش كېرەك. مەئدە قىسمىنى ئىسسىقلىق مايىلار مەسىلەن، قەلەمپۇر يېغى، ئارجىن يېغى، مەستىكى يېغى قاتارلىقلار بىلەن ياغلاش لازىم. بىر ئازدىن كېيىن ئاغرىق

① پادى زەھەر: زەھەر قايتۇرغۇچى دېگەن مەنادا بولۇپ، ئىت، كالا ۋە ئىشەك قاتارلىق ھايۋانلارنىڭ ئوت خالىتىسى، ئۇچەي ۋە ئاشقازان قاتارلىق ئىچكى ئەزالىرىدىن چىقىدىغان بىر خىل تاشتەك ماددا تىبابەتتە زەھەر قايتۇرغۇچى دورا سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ. ھايۋان ئۆلگەندىن كېيىن ئېلىنىدۇ.

نىڭ ئاغزىنى ئېچىپ بۇرنىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ئىھتىياتلىق بىلەن گۇلاپ ۋە مائۇللەھمىنى گالغا تامغۇزۇپ بېرىش كېرەك. قول - پۇت ۋە بېشىنى يەڭگىل دەرىجىدە مۇجۇپ تۇتۇش كېرەك. ئەگەر سوغاق پەسىلدە بولسا مەجۇنى پىلاپى بېرىلىدۇ.

6) باشقا ئەزالاردىكى ياللۇغلىنىشلار نەتىجىسىدىن ئايلىنىپ كېتىش: ئاغرىقنىڭ قول - پۇتلىرى تېگىلىدۇ ۋە ئىسسىق ئوتكۇزىلىدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللەر تۈپەيلىدىن بولسا سەۋىيىگە قاراپ چارە كورۇش لازىم. بالىياتقۇ بوغۇلۇش (ھىستېرىيە) سەۋىيى بىلەن بولغان ئايلىنىپ كېتىشلەردە خۇشپۇراق نەرسىلەرنى تېمىتىش مەنىنى قىلىنىدۇ. بەلكى سامساق، يانتاق چىچىكى، زاراڭزا چىچىكىنى پۇرۇتۇش بىلەن شۇ كېسەل بابىدا سۆزلەنگەن چارىلارنى قىلىش لازىم.

يۈرەك ئاغرىشلاردىن بولغان ئايلىنىپ كېتىشكە چارە قىلىش مەسىلىسىدە — سوغاق سۇ سىپىش ئومۇمى تەدبىردۇر. لېكىن قايسى جايغا سىپىش (ياكى پۇركۇش)، بۇ توغرىلۇق ئىختىلاپ مەۋجۇت. ئەمما كۆپچىلىك يۈرەك ساھەسىگە پۇركۇشنى توغرا تاپمىغان. چۈنكى سوغاق سۇ پۇركۇشتىن مەقسەت كېسەلنى ھۇشغا كەلتۈرۈشتۇر. بۇنىڭ بىلەن روھ ۋە قان قوزغۇلۇپ تەبىئەتكە ئەگىشىدۇ. نەتىجىدە ھارارىتى غەرىزە يۈرەككە مەدەت بېرىپ ھىس كۈچلىنىدۇ. يۈرەك ساھەسىگە سىپىلگەندە ئەھۋال بۇنىڭ

ئەكسىچە بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن سۇلى
يۈزگە چېچىش كېرەك.

دىمەك يۈرەك مۇھىم ئەزا بولغىنى ئۈچۈن بۇنىڭ
ئاغرىقلىرىنى، جۈملىدىن ئايلىنىپ كېتىشىنى داۋالاشتا
بەك ئېھتىيات قىلىش كېرەك. داۋالاشتىن مەقسەت يۈ-
رەكنىڭ ئېتىدالىدىكى كۈچ قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش-
تىن ئىبارەت بولۇشى لازىم. تۆۋەندە تىبابەت دورىلىرى
ئىچىدە مۇھىم بولغان بىرقانچە يۈرەك دورىلىرىنى كۆر-
سىتىپ ئۆتىمىز:

موتىدىل دورىلار — ياقۇت فىرۇزە، ئالتۇن، كۈمۈش،
گازىۋان؛

ئىسقى دورىلار — درۇنەج ئەقىرەبى، ئىپار، ئەمبەر
(ئەنئەنىۋىي)، بۇزبۇغا (ئايلىنىش)، پىلە، زەپەر، بەھمەن، قەلەم -
پۇر، ئۇدى خام، بادىرەنجىبۇيا، بالەنگۇ، رەيھان چىنى ۋە
ئۇرۇغى، لىمون پوستى ۋە يوپۇرمىغى، چوڭ - كىچىك
قاقىلە، سازەنچى ھىندى، راسەن.

سوغاق دورىلار — مەرۋايىت، كەھرىبا، مارجان، كا-
پۇر، سەندەل، تاباشىر، گىلى مەختۇم، ئالما، يۇمىلاقسۇت.
مۇرەككەپ بېرىكمىلەردىن يۈرەك ئاغرىقلىرى ئۈچۈن ياخ-
شى ئۇنۇم بېرىدىغىنى مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتەندۇر.
بۇنىڭ بىرقانچە نۇسخىلىرى كورسەتىلدى، داۋالاش قائىدە-
دىلىرىگە ئاساسەن بىرنى تاللاپ بېرىش لازىم. چۈنكى
مۇپەررىھى ياقۇتىنىڭ نۇسخىسى تىبابەت كىتاپلىرىدا ھەرخىل
كورسەتىلگەن (9 - 84 - 85 - نۇسخىلارغا قارالسۇن).

دۇخانىيە

ئاغرىق يۈرەك ساھىبىدىن قانداقتۇ بىر بوس ياكى تۇتۇندەك نەرسىنىڭ يۇقۇرغا ئورلەپ كېتىۋاتقانلىقىنى ھىس قىلىدۇ. كېيىنچە روھى ئالامەتلىرى كورۇلۇشكە باشلايدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئاغرىق ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. **سەۋىيى:** بەدەندىكى خىلىتلارنىڭ كويىگەنلىگىدۇر. **داۋاسى:** مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن خىلىتلارنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن، ئالامەتلىرىگە قاراپ دورا بېرىش بىلەن مۇناسىپ تاماقلار بېرىلىدۇ. ئەگەر مۇنداق كېسەلنىڭ بۇرنى قانىسا ياكى ئارقا تەرەت ھەرخىل رەڭدە ياكى قارامتۇل كەلسە كېسەلدىن پات ساقىيىدۇ.

يۈرەك قۇلىغىنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى ئۇزۇنلىققەلپ)

“ئۇزۇنلىققەلپ” ئەرەبچە يۈرەك قۇلىغى دېگەن سۆز بولۇپ، يۈرەكنىڭ بەدەندىن كەلگەن قاننى قوبۇل قىلىدىغان ئورنىدۇر. بەزىلەر بۇنى يۈرەكنىڭ “غەزنىسى” دەپمۇ ئاتايدۇ. بۇ كېسەل كويىنچە ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىستىمىلىق كېسەللەردە ياكى تېز پەيدا بولغان ئېغىر كېسەللىكلەردە ھاسىل بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئاغرىق دائىم توش سۆڭىكى بويلاپ ئېغىرلىق ھىس قىلىدۇ، يۈرەكنىڭ كېڭىيىش ھەرىكىتى زور توسالغۇلارغا ئۇچرايدۇ. كېسەل ئارىلاپ

ئايلانغاندەك بولۇپ تۇرىدۇ. چىرايى توق سېرىق رەڭدە بولۇپ، كوزلىرى چەكچىيىپ قالىدۇ، بەدىنى ئۇرۇقلايدۇ. **داۋاسى:** ماددىنى يۇمشىتىش تەدبىرلىرىدىن — بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك، پىرسىياۋشان، بوغداي كىپىگىنى قاينىتىپ سۈيىنى كۆكرەككە قۇيۇش كېرەك. ماددىنى تارقىتىش ئۈچۈن ئارپا بېدىيان، ئەكىلىل مىلىك، زىغىر، يالپۇز، ئاق لەيلى يۇپۇرمىغى، بەسەي، زەپەرلەرنى سوقۇپ خېمىر قىلىپ قويۇلىدۇ. ئوزۇقلۇققا باي بولغان، ئاسان ھەزىم بولىدىغان تاماقلا بېرىلىدۇ. ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈر — گۇچى دورىلاردىن — داۋائىلىمىشكى، مۇپەررىھى ياقۇتى، شەرۋىتى ئەۋرىشىم ياكى خېمىرى ئەۋرىشىملەر (22 - 84، 86، 87 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ.

ئاقىۋەت جەھەتتىن ئالغاندا ياللۇغلىنىش يۈرەك غىلاپلىرىدا بولغان ئاغرىقلاردا خەتەرلىك ئانچە كۆپ ئەمەس. ئەمما ياللۇغلىنىش يۈرەكنىڭ قۇلاق قىسمىدا بولغاندا بەدەندىكى قاننىڭ ساپ ھاۋا بىلەن ئالماشتۇرۇش شىشى توسىلىپ، بەزىدە دەرھال ئۆلۈمگە ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلاردا بۇرۇندىن قارامتۇل قان كېلىش ئۆلۈم ئالدىدىكى ئالامەتلەردىن بىرىدۇر.

يۈرەكنىڭ سىقىلىشى (زىچىقتىل قەلپ)

بۇ كېسەلدە ئاغرىق يۈرەك ساھىبىسىدا سىقىلىش پەيدا بولۇپ ئايلىنىپ كېتىدۇ. ئاغزىدىن كۆپ مىقداردا كۆپۈك ۋە سۇ ئاقىدۇ.

سەۋىيى: يۈرەككە بىر ئاز سەۋدا ماددىنىڭ قۇيۇق-
لىشى بىلەن يۈرەك ئەسەپلىرى تارتىشىش ھالىتىگە كې-
لىش نەتىجىسىدە پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: بەدەننىڭ چوڭقۇر جايلىرىدىن سەۋدانى
چىقىرىش ئۈچۈن مۇۋاپىق سۇرگىلەر بېرىلىدۇ. جىگەر-
نىڭ مىزاجىنى تەڭشەش بىلەن يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈر-
گۈچى، مالىخۇلىيا كېسىلىنى داۋالىغۇچى تەدبىرلەر قىلى-
نىدۇ.

يۈرەك قېپىغا سۇ يىغىلىش

يۈرەكنى ئوراپ تۇرغۇچى غىلاپ ئىچىگە سۇ
يىغىلىدۇ. سۇنىڭ تەسىرى يۈرەككە يەتكەندە، يۈرەك بۇ
غەيرى تەبىئى ئەھۋالدىن زەرەرلىنىپ، تىترەپ (ئىختى-
لاجلىق) ھەركەت قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بەزىلەر بۇنى
تىترەشنىڭ بىر خىلى دەپ ئاتايدۇ.

ئالامەتلىرى: خاپقاندىكى ئالامەتلەردىن باشقا،
كېسەل يۈرەك ئەتراپىدا قانداقتۇر بىر ئېغىرلىق
ياكى يۈرۈڭى چوڭۇپ كېتىپ بارغاندەك ھىس قىلىدۇ،
نەپەس سىقىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سۇيۇقلۇقنى تارقىتىش
ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا ياكى ئايارەج لۇغازىيا (16 - 87 -
نۇسخىلار) بېرىلىدۇ، قىزىل گۈل، سۈمبۇل، زەپەر، باد-
رەنجىبۇيا، قەلەمپۇر، سەئدى كوپىلەرنى سوقۇپ، تۇخۇم
سېرىغى بىلەن يۈرەك ئەتراپىغا قويۇش لازىم.

VI ماقالا. ئەمچەك كېسەللەكلەرى

1 - پەسىل. سۇت چىقىرىشنىڭ بۇزۇلۇشى

سۇتنىڭ كېيىشى

بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللاردا سۇتنىڭ ئازىيىپ كېتىشى ئاساسەن قان ئازلىق سەۋىيىدىن بولىدۇ. چۈنكى سۇت قاندىن ھاسىل بولىدۇ. قاننىڭ ئازىيىپ كېتىشى ئۈچۈن تۆۋەندىكىلەر سەۋەپچى بولىدۇ:

(1) ھەددىدىن ئارتۇق قان ئېلىش ياكى ھېچ بىلەن قان كۆپ مېڭىپ كېتىش.

(2) ئوزۇقلۇنۇشنىڭ ناچار بولۇشى — ئىشتەينىڭ كەملىكى، تاماقنىڭ مىقدارى ئاز ۋە سۈپەت جەھەتتىن ناچار بولۇشى، مەئدە جىگەر قاتارلىق ھەزىم ئەزالىرىدىكى قۇۋۋەتنىڭ سۇس بولۇشى قاتارلىق ئەھۋاللار بىلەن قاننىڭ يېتەرلىك مىقداردا ھاسىل بولماسلىقى.

(3) روھى ھالەت ۋە ئەسەبى تەسىراتلاردا مەسەلەن غەم، قورقۇنۇچ ۋە روھى زەربە قاتارلىقلار قاننىڭ ھاسىل بولۇشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

(4) ئومۇمىي بەدەن مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى سۈت-

نىڭ يىتەرلىك مىقداردا پەيدا بولىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى يۇقۇرىدىكى سەۋەپلەردىن بىرىنىڭ مەۋجۇت بولىشى بىلەن ئەمچەكتىكى سۇت مىقدارىنىڭ ئاز بولىشىدىن ئىبارەتتۇر.

داۋاسى: سەۋىيىنى يوقىتىش بىلەن سەۋىيى قايتا ھاسىل بولىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. قان كوپەيتكۈچى تاماقلار بىلەن ئۇزۇقلاندۇرۇش كىپايە قىلىدۇ. بەزىدە يۇقۇرىدىكىنىڭ ئەكسىچە قان كوپ تۇرۇقلۇقمۇ سۇت ئازىيىپ كېتىدۇ. بەدەندە ھىچقانداق بۇزۇلۇش ئەھۋالى بولمىغان ھالدا قاندىن سۇتنىڭ ئايىرىلىپ چىقىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىمۇ مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەندە قان ئارتۇقلۇق بەلگىلىرى بولغىنى ھالدا سۇت كېمىيىپ كېتىدۇ. روھى جەھەتتە غەمكىنلىك، بالىسىغا مېھرى بولماسلىق ھاللار بولىدۇ.

داۋاسى: سۇتنى كوپەتكۈچى دورىلارنى بېرىش، قاننى بۇزىدىغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. مىڭگە قۇۋۋەت بەرگۈچى دورىلار قوشۇمچە بېرىلىدۇ.

خىلىتلار سەۋىيىدىن سۇتنىڭ ئازىيىشى

خىلىتلار سەۋىيىدىن بولغان سۇت ئازلىق، ئاساسەن قاننىڭ بۇزۇلىشى (چۈنكى بۇزۇق قاندىن سۇت ھاسىل بولمايدۇ) ۋە سەپرا، سەۋدا ياكى بەلغەمنىڭ كوپىلىگىدىن پەيدا

بولدۇ. بەزىدە ماددىلار ئارىلاشمىغان ھالدا مىزاجنىڭ بۇزۇلىشى بىلەنمۇ پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) سۇت، سۇيۇق، رەڭگى سېرىققا مايىل، سۇت يوللىرىدا ئېچىشىشى قاتارلىق بەلگىلەر كورۇ-لسە سەپرانىڭ غالىپلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(2) سۇتنىڭ رەڭگى ئاق، سۇدەك سۇيۇق، چۈچە-مەل تەملىك بولۇپ قانداقتۇ غەيرى پۇراق (بەلغەمدەك) بولسا بۇ بەلغەمدىن پەيدا بولغان سۇت ئازلىغىدۇر. (3) سۇت قويۇق، مىقدارى ناھايىتى ئاز، كوك رەڭلىك بولۇپ، ئەمچەكتىن تامغاندا خۇددى قىيامدەك سۇزۇلۇپ چۈشسە، بۇ سەۋدانىڭ ئالامىتى.

داۋاسى: خىلىتلارنى ئېنىقلاش بۇ خىل سۇت ئازلىغىنى داۋالاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئوتتەنكى ماقالىلاردا كورسىتىپ ئۆتۈلگەن چارىلار بۇيىچە خىلىتلارنى بەدەندىن چىقىرىش تەدبىرلىرىنى قىلىش بىلەن، شۇ خىلىتلارغا قارشى ھالدا ئۇزۇقلاندۇرۇش لازىم. مەسىلەن، سەپرادىن بولغان سۇت ئازلىقتا: ئارپا سۇيى، ئەينۇلا مۇرەبباسى، ئانار، لىمون شەرىۋىتى ۋە گۆش شورپىسى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان سۇت ئازلىقتا: سەۋزە ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيانلار چاي ئورنىدا بېرىلىدۇ. شورپىغا زىرە، پىننە ۋە ئارپا بېدىيان سېلىپ بېرىش لازىم. كىچىكلىك بۇغداي ئۇنى بىلەن ھەسەلدە كۈنجۇت يېغى ۋە ئازاق

شۇمىشە (شياڭدۇزا) سېلىپ ھالۋا تەييارلاپ بېرىش كېرەك.

سەۋدادىن بولغان سۇت ئازلىقتا: بۇغداي ئۇندۇر-
مىسى، ئاقلانغان نوخۇت، ئارپا، ئەنجۈر ۋە بادام بېرىد-
لىدۇ. ھەم سۇتلۇك قوينىڭ يىلىنى پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ.
ئەمما سۇت بەك قۇيۇق بولۇپ، ئەمچەكتىن چى-
قىش تەس بولسا، بىنەپشە، ئاق لەيلى ۋە ئارپا
قاتارلىقلارنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۇيىنى
ئىچىشكە ۋە قايناتقان نەرسىلەرنى سۇزۇپ ئەمچەك
ئۈستىگە قويۇشقا بېرىلىدۇ.

ماددىلار ئارىلاشمىغان ھالدا مىزاجنىڭ بۇزۇلىشى
بىلەن سۇتنىڭ كېمىيىپ كېتىشى، ئاساسەن ئايال مىزا-
جىنىڭ ئىسسىق ياكى سوغاقلىقى بىلەن پەيدا بولۇپ،
بەدەندە بۇلارغا خاس ئالامەتلەر بولىدۇ. مەسىلەن،
ئىسسىق بولغىنىدا — چىرايى قىزىل، تەشنىلىق زىيادە
بولىدۇ. سوغاققا بولسا — چىرايى ئاقارغان، كۆكۈش رەڭ-
دە، قول-پۇتلىرى سوغاق بولىدۇ. بۇنداق ھاللاردا مىزا-
جىنى ئۆزگەرتىش بىلەن يىمەك-ئەچمەكنى تەرتىپكە سېلىش
لازم. دورىلاردىن قان كۆپەيتىدىغان تۇدرى سەپىد ۋە
تۇدرى سۇرۇخ، كۆكنار ئۇرۇغىنى بېرىش لازىم. سۇتلۇك
قوي، ئۆچكە يىلىنلىرىنى پىشۇرۇپ بېرىش ۋە سۇيۇق
نەرسىلەرنى، مېۋىلەرنى كۆپرەك بېرىش كېرەك. كۆكتات-

لاردىن پالەكنىڭ مەنپەئەتى چوڭ، ئوندىن باشقا تەۋەندە تەجرىبىدىن ئۆتكەن بىرقانچە ئۇسخىلەر كورسەتىلدى. تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك.

(1) 1 مىقدار كۈنجۈتنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان ھالىغا كەلگەندىن كېيىن 3 ھەسسە ئۇزۇم شەرۋىتىگە ئارىلاشتۇرۇپ، بىردەم تازا مىجىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ سىقىپ سۈيىنى ئىچىشكە ۋە قالدۇق تىرىپلىرىنى ئەم - چەككە قويۇشقا بېرىلىدۇ.

(2) سەۋزە، پىياز، چامغۇر، لوبۇ ئۇرۇغى، سېرىق چىچەك، ئارپا بېدىيانلاردىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇم - شاق سوقۇپ، ئۇلارنى ئومۇمى ئېغىرلىغى بىلەن باراۋەر نوخۇتنى قورۇپ، سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ ھەركۈنى 5 مىس - قالدۇق كالا سۈتىگە قوشۇپ ئىچىلىدۇ. بۇ ناھايىتى تېزلا سۈتنى كۆپەيتىدۇ.

سۈتنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق كۆپىيىپ كېتىشى

سۈت مىقدارى ئۆز ئېتىدالىدىن كۆپىيىپ كېتىشى سالامەتلىك جەھەتتىن زەرەرلىك، چۈنكى بەدەن سۈس - لىشىدۇ. سۈتنىڭ كۆپ بولىشى قاننىڭ ئورۇنسز سەرىپ - ياتىنى ئاشۇرۇپ قان ئازلىق پەيدا قىلىدۇ. ئەمچەكتىكى زىيادە سۈت ئايالغا قانداقتۇر بىر خاتىرجەمسىزلىكنى كەلتۈرۈپ قويۇش بىلەن سۈتنىڭ سۈپىتى ئۆزگىرىدۇ. يەنە قو - يۇقىلىشىدۇ ياكى تەمى بۇزىلىدۇ. بۇ بالىغا زەرەر كەلتۈرىدۇ.

ئارتۇق سۇتنىڭ ئەمچەكتە تۇرۇپ قېلىشى، ئەمە -
 چەكنىڭ ھارارىتىنى ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ تەبىئى ھالىتىنى
 ئۆزگەرتىدۇ. يەنى قاتتىقلىشىدۇ ۋە ئېغىر ھاللاردا -
 ياللۇغلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. دىمەك سۇتنىڭ مىقدارى
 بەك كۆپ بولىشىنى ئۆز ۋاقتىدا داۋالاش ئانا ۋە بالىنىڭ
 سالامەتلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ئىش بولۇپ، ئۇنىڭ سە -
 ۋىبى سۇت كېمىيىپ قېلىشنىڭ ئەكسىدۇر. قان كۆپەيت -
 كۈچى تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش بىلەن سۇت
 بەك كۆپ بولسا، بۇنداقتا دورا قىلىش ھاجەتسىز.
 بەلكى تاماقنى تەرتىپكە سالسا بولىدۇ. باشقا سەۋەپلەر -
 دىن بولغاندا سىركە بىلەن ماشنى پىشۇرۇپ بېرىش، مە -
 دەستان، لوكنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سۇقۇپ
 تاسقاپ گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئەمچەك ئۈستىگە
 قويۇش؛ سۇتنى ۋاقتى - ۋاقتىدا سېغىپ تۇرۇش كېرەك.

2 - پەسىل: ئەمچەك ياللۇغى (ۋە رەمى پەستان)

ئەمچەك ياللۇغى باشقا ئەزالاردىكى ياللۇغلىنىشلارغا
 ئوخشاش سەۋەپلەردىن پەيدا بولۇش بىلەن بىللە، بالا
 ئېمىتىۋاتقان ئاياللاردا سۇتنىڭ تۇرۇپ قېلىشى سەۋەپ
 بولىدۇ. مەسىلەن، مىزاجنىڭ بەك ئىسسىقلىقى سەۋەپلىك
 سۇتنىڭ نەملىكى تۈگەپ قويۇقلىشىپ قالىدۇ، شۇنداقلا
 سوغاق مىزاج سۇتنى ئۆيتىدۇ. ياكى بوۋاق ئەمچەكنى
 ياخشى شورالماي، سۇت ئەمچەكتە تۇرۇپ قالىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئەمچەك چېڭقىلىپ قاتتىقلىشىپ قا-
لىدۇ. ئەمچەكنىڭ ئوزى ۋە پۈتۈن بىدەن قىزىيدۇ.
كوكسى قاتتىق ئاغرىيدۇ.

داۋاسى: يەڭگىل ھاللاردا ئەمچەككە ئىسسىق ئوت-
كۈزۈش لازىم. ئىت ئۇزۇسىنى يوپۇرمىغى بىلەن بىللە
سوقۇپ، گۈل يېغى ئارىلاشتۇرۇپ ئەمچەككە قويۇش كې-
رەك. ياللۇغلىنىش ئېغىر بولسا، قىزىق سۇنى ئىلمان
قىلىپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇش، بىنەپشە يېغى بىلەن
ياغلاش لازىم. ئەمچەك قىزارغان ۋە قاتتىقلاشقان بولسا،
سىركە بىلەن قايناقسۇنى ئارىلاشتۇرۇپ كالىنىڭ دوۋ-
ساق قېپىغا قاچىلاپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇش لازىم.
ئارپا ۋە پۇرچاق ئۇنىنى مۇغاس، تۇخۇم سېرىغى، ھول
يۇمغاقسۇت سۈيى، سېمىز ئوت سۈيىنى بىرلەشتۈرۈپ،
ئەمچەككە چېپىلىدۇ. ئىستىما بىر ئاز پەسلىگەندىن كې-
يىن — زىغىر، بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك، كۈنجۈتلەرنى بارا-
ۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ گۈل يېغى، ئېرىگەن
ئاق موم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ماي ھالىغا كەلتۈرۈپ،
ئەمچەككە سۈرتىلىدۇ. ئەگەر بۇ نەتىجە بەرمىسە، ئاق
لەيلى ئۇرۇغى، ھەمىشۋا ئۇرۇغى، زىغىرلەرنىڭ شىرىسىنى
چىقىرىپ چېپىش لازىم.

ئەگەر ياللۇغلىنىش سوغاقتىن بولسا—يەنى قىزىش،
قىزىرىش بولماي، ئىسسىغاندەك بولۇپ قاتتىق تۇرسا، ئاق
موم، گۈلى سۈسەن يېغى ۋە قۇستە ياغلارنى قوشۇپ

ياغلاش كېرەك. ياكى شۇمشە ئۇرۇغىنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلا-
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە بىلەن يۇغۇرۇپ، ئەمچەك
ئۈستىگە چېپىلىدۇ. سۈتى كۆپ بولغان ئاياللار دائىم
سۈتىنى سېغىپ تۇرۇشقا دىققەت قىلىش لازىم. ياللۇغلا-
نىش ئۇفۇنەت ھاسىل قىلىپ يىرىڭلايدۇ ھەتتا يىرىڭ
خالتىلىرىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ چاغدا ئەمچەكنىڭ ئىش-
شىغى تېخىمۇ چوڭىيىپ كېتىدۇ ۋە ئىچىگە يىرىڭ-
زەرداپ سۈيى يىغىلىدۇ. بۇ "رۇنبۇل" دەپ
ئاتىلىپ ئەمچەك كېسەللىكلىرى ئىچىدە خەتەرلىگىرەكتۇر.

داۋاسى: زىغىر، كۈنجۈت، سۈسەن يىلتىزى، قوي،
كالا، ئۆچكىنىڭ مىڭسى، كەپتەر مايىغى، نەترون، راتىنەج-
لەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ كالا يېغى، كۈن-
جۈت يېغى بىلەن ياغلاپ، ئەمچەك ئۈستىگە چېپىلىدۇ.
ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بولمىسا دەستكارە (ئوپىراتسىيە
قىلىپ) يىرىڭنى چىقىرىش كېرەك. نەشتەر ئىزى جاراھەت-
لەنسە ئېغىز، تىل جاراھەتلىرى بايانىدا كورسىتىلگەن
تەدبىرلەر قىلىنىدۇ. چۈنكى ئەمچەك، تىل ۋە ئېغىز
ئىچىگە ئوخشاش نازۇك ئەزا. بەزىبىر جەرراھلار ① تەج-
رىبىسىزلىكتىن نەشتەرنى يىرىڭ خالتىسىغا قەدەر سالماي،
خالتا ساقلىنىپ قالسا، يەنە يىرىڭ پەيدا قىلىدۇ،
شۇنىڭ ئۈچۈن نەشتەرنى چوڭقۇرراق سېلىش كېرەك.

① جەرراھ: تاشقى كېسەل دوختۇرى.

ئەمچەك كېسەللىكلىرى ئىچىدە يەنە “بەز ئەمچەك” يەنى ئەمچەكنىڭ قېتىپ قورۇلۇپ قېلىشى ياكى ھەددىدىن يوغان بولۇپ كېتىش قاتارلىق غەيرى تەبىئى ھاللارمۇ ئۇچرايدۇ. بەز ئەمچەكتە بىنەپشە يېغى، ئاق موم، تۇخۇم سېرىغى، سۇ مايلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ (ئېرىتىپ، قىزىتىپ) كالا ئوتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش لازىم. ئەمچەك بەك چوڭىيىپ كەتكەندە سېغىز (ياكى ساپال)، ئاقاقىيا قەلەي كۈشتىسىنى باراۋەردىن ئېلىپ، مىڭدىۋانە (بەزۇ - رۇلبەنجى) يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

VII ماقالا. مەيدە كېسەللەكلىرى

1 - پەسىل: مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللەكلىرى

1) خاس ئىسسىقلىقتىن مەيدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى

مەيدىنىڭ بۇزۇلۇشى بەدەندىكى مۇھىم ئەزالار مەسىلەن: جىگەر، مىڭە، يۈرەك قاتارلىقلارنىڭ پائالىيىتىگە زور تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مەيدە ئاغرىقلىرىدىن ياخشى تونۇپ توغرا بىر تەرەپ قىلىش لازىم.

سەۋەبى: ئىسسىق تاماقلار (تەبىئىي ئىسسىق بولغان يىمەكلىكلەر) نى كۆپ ئىستىمال قىلىش ۋە ئىسسىقلىق دورا-دەرمانلارنى كۆپ يىمىش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش قاتارلىق دائىملىق ئادەتلەر سەۋەب بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىز ئىچى قۇرۇق بولۇپ، ئۇسساپ تۇرىدۇ، ئىشتەي بولمايدۇ، ئاچچىق كىكىرىدۇ. ئۇچار قاناتلار گوشنى يىسە، چاي دورىلارنى ئىچسە مەيدىسى بۇزۇلىدۇ. ئىسسىق شارائىتتا ئىش قىلىشمۇ مەيدىسى بۇزۇلۇپ تۇرىدۇ. ئەمما قوناق، ئارپا قاتارلىقلارنى يىسە ئاسان سىڭىدۇ.

داۋاسى: مەۋە سۇلىرى بېرىلىدۇ. ئالما شەرۋىتى، ئانار شەرۋىتى، لىمون، گىلاس سۇلىرىنى بېرىش لازىم. كالا گۆشىگە ئاچچىق سۇ، يۇمىلاقسۇت قوشۇپ بېرىش پايدىلىق. ھەزىم قىلىشى بەك ناچار بولسا، ئىسكەنجىبىن سەپەرچىلى (بىيە ئىسكەنجىۋىلى) (88 - نۇسخە)، زىرەشكى شەرۋىتى (89 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھارارەت بولسا قېتىق سۆزىمىسى بېرىش كېرەك. مەيدە قۇۋۋىتى زەئىپ بولسا جەۋارش تەمرى ھىندى (90 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سەپرا ئېشىپ كېتىشتىن بولغان مەيدە بۇزۇلۇشى

سەپرا ماددىسى سەۋىبى بىلەن مەيدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىز ئاچچىق بولىدۇ، كوڭۇل ئاي-ئىيدۇ، بەزىدە قۇسىدۇ. قۇسۇق، ئارقا تەرەت ۋە سۇيۇكتە سەپرا ماددىسى (سېرىق ئاچچىق سۇيۇقلۇق) كۆپلەپ چىقىدۇ. تاماقتىن كېيىن ئاچچىق ياكى سېسىق كىكرىك چىقىدۇ. كىكرىش بىلەن ئېغىزدىن سېسىپ قالغان بېلىق پۇرىغى كېلىدۇ. مۇنداق كىشىلەر ياڭاق مېغىزى يەپ سالسا دەرھال سېسىق كىكرىدۇ. ئەگەر ئىسسىقلىق يۇقۇرى بولۇپ كەتسە ئېغىز مىسى تەملىك بولۇپ قالىدۇ. ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، تاماق سىڭىش دەسلەپتە ياخشى بولۇپ، بارغانسېرى ناچارلىشىدۇ. مەيدە بوش بولغاندا ئېغىزدىكى شولىگەي كۆپىيىدۇ، تاماق يىيىش بىلەن بۇ ھال توختاپ قالىدۇ.

ئەگەر مەيدە يەڭگىل بولۇپ، كوڭۇل ئاينىش، مەيدە كويگەندەك ئېچىشش، تەشئالىق بولسا بۇ ماددىنىڭ بەك سۇيۇقلىغىنى كورستىدۇ. ماددا زىيادە بولسا كوڭۇل ئاينىش ئېغىر بولىدۇ. ماددا ئاز بولسا، تاماق يىگەندىن كېيىن كوڭۇل ئاينىدۇ. ماددا ئاشقازان تېگىدە بولۇپ مەيدە تىۋىتلىرى ئۇنى ئوزىگە سىڭدۇرۇپ ئالمىغان بولسا، تاماق يەپ بىرەر سائەت ئۆتمىگىچە كوڭۇل ئاينىش بولمايدۇ، ئەگەر ماددىنى سىڭدۇرۇپ ئالغان بولسا قۇسۇش ياكى كوڭۇل ئاينىش داۋاملىق بولۇپ تۇرىدۇ. ئەمما قۇسۇق ياكى باشقا چېقىندىلىرىدا سەپرا بولمايدۇ. قالغان ئالامەتلىرى بولۇپ تۇرىدۇ. قۇسۇق قاتارلىق چېقىندىلىرىدا سەپرانىڭ ئەسەرى بولسا قۇسۇپ تۇرۇپ كوڭۇل ئاينىش پەسەيمىسە — بۇ مەيدە تىۋىتلىرى ماددىنىڭ بىر قىسمىنى شىمرىپ، بىر قىسمىنى شىمرمىگەنلىگىدۇر. قۇرۇق كوڭۇل ئاينىش بىلەن قۇسۇش ئالمىشىپ تۇرسا — بۇ ماددىنىڭ مەيدە ئىچىگە باشقا ئەزالاردىن كېلىپ قۇيۇلۇشىنىڭ ئالامىتىدۇر.

كوڭۇل ئاينىش بىلەن قۇسۇش بىللە كەلسە، ماددا مەيدىنىڭ ئوزىدە پەيدا بولغانلىق ئالامىتىدۇر. تەشنا — لىقنىڭ كوپلىگى ماددىنىڭ ئىسسىقلىغىدىن ياكى ئۇ شورغا ئايلانغانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ. تەشئالىق سوغاق سۇ ئىچىش بىلەن پەسەيسە، بۇ ماددىنىڭ ئىسسىقلىغىنىڭ، قايناقسۇ ئىچىش بىلەن پەس بولسا، ماددا شورلىغىنىڭ

بەلگۈسىدۇر. مەيدە مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىغىنى بىلىش ئۈچۈن مۇنۇ سىناقنىڭ ئەھمىيىتى بار: كېسەلگە ئارپا نېنى بېرىلگەندە سېسىق كىكىرىش بولسا، بۇ مەيدە مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىغىنىڭ ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ.

داۋاسى: مەيدىنىڭ بۇ خىلدىكى ئاغرىقلىرىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن يۇقۇرقى سوزلەنگەن ئالامەتلەر ئاساسىدا ماددىنىڭ مەيدىنىڭ ئوزىدە ھاسىل بولۇۋاتقانلىقى ياكى باشقا ئەزالاردىن كېلىۋاتقانلىغىنى ئايرىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا داۋالاش نەتىجىلىك بولىدۇ. ئەگەر ماددىنىڭ مەيدىدە پەيدا بولغانلىقى مەلۇم بولسا قەي قىلدۇرۇش ياكى سۈرگە بېرىش بىلەن تازىلاش؛ قايسى چارە كېسەلگە ئېغىر كەلمەسە شۇنى قىلىش لازىم. تازىلاشتىن كېيىن مەيدىنىڭ مىزاجىغا قاراپ قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنى بېرىش كېرەك. قەي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىسكەنجىۋىل بىلەن ئىلىمان سۇنى كۆپرەك ئىچىرىش كىپايە قىلىدۇ. قالغان تەدبىرلەر قۇرۇق ھو بايانىدا تەپسىلى سوزلەندى.

بەزى ئاغرىقلاردا مەيدە بوش قالغان ۋاقىتلاردا ماددا سىڭىدۇ. مۇنداق كىشىلەر تاماق يېيىش ۋاقتىدىن ئوتتۇپ كەتسە چىداپ تۇرالمىدۇ. ھەتتا بەزىلەر ئۇزاق-راق ئاچ قالسا ھۇشىدىن كېتىپ قالىدۇ. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا ئەتىگەندە — ئانار شەرۋىتى، لىمون شەرۋىتى، زىرىخ شەرۋىتىدىن بىرىنى بېرىش لازىم ھەم قوسىغى

ئېچىش ئالدىدىلا بىر نەرسە يەۋىلىشنى تەكىتلەش لازىم. يەنە بەزىبىر ئاغرىقلار تاماقنى يەپ بولغاندىن كېيىن قەي قىلىمسا تاقەت قىلالمايدۇ. بۇنداقلارغا قەي قىلىپ بولغاندىن كېيىن يۇقۇرقى شەۋەتلەردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ. ئەگەر ماددىنى مەيدە تىۋىتلىرى سىڭدۇرۇپ ئالغان بولسا، ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) نى تازىلاش ئۈچۈن بېرىش لازىم. خاس سەبەرنى بېرىش ئايارەجىدىن ئەۋزەلرەك، ئىسكەنجىۋىل بىلەن بەرگەندە تېخىمۇ ياخشى. ئاغرىقنىڭ ئىشتىيى ناچار بولۇپ، ھو كۈچلۈك بولسا، ئايارەجنىڭ تەركىۋىدىكى زەپەر ئورنىغا قىزىل گۈل سېلىش لازىم، ماددىنىڭ سەۋىيىدىن ئىسكەنلىگى ئېنىق بولغان ھالدا جالنىۋىس تەكلىپ قىلغان شەۋىتى ئەپسەنتىن (91 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر 2 دانە ئارپا مىقداردىكى سوقمونىيانى سوقۇپ قېتىق ياكى دوغ بىلەن تازا تەمىنى چىقىرىپ بېرىلسە، بۇ خىلدىكى مەيدە ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەتى ياخشى. مەيدىنى ماددىدىن تازىلاش ئۈچۈن، ئەڭ ياخشى ئۇسۇل — قېتىققا بىرئاز شېكەر ئارد — لاشتۇرۇپ بېرىپ ئارقىدىن 25 مىسقال ئىسكەنجىۋىلنى سۇ قوشماستىن ئىچكۈزۈپ ئىككى سائەتكىچە سۇ ئىچ — مەسلىكىنى بۇيرۇش كېرەك.

سەپرانىڭ جىگەردىن كەلگەنلىگى مەلۇم بولسا، (بەدەندە سەپرانىڭ غالىپلىغى كورۇلسە) ئاغرىقنىڭ ئو — مۇمى ئەھۋالىغا قاراپ ئىمكانىيەت يار بەرسە باسلىق

تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم. قان ئالغاندىن كېيىن سۈزمە ئاستىغا ئېقىپ چۈشكەن قېتىقنىڭ سۈزۈك سۈيى (مائۇل جىبىن) نى بېرىش لازىم ياكى شەرۋىتى ئەپسەنە - تىن (91 - 181 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مەيدىنىڭ ماددىسىز ھول ئىسسىق ۋە قۇرۇق ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: (1) قۇرۇق ئىسسىقتىن بولسا - تەشئالىق قاتتىق. تىل قۇرۇق ۋە بەدەنلىرى ئورۇق كېلىدۇ، قەۋزىيەت بولىدۇ. بۇ خىلدىكىلەرنى داۋالاش ئاساسەن مەيدىنىڭ مىزاجىنى سوۋۇتۇپ، ھوللۇك يەتكۈ - زۇشتىن ئىبارەت بولۇشى كېرەك. مەسىلەن، كالا سۈتى، ئارپا سۈيى، ئارپا تالقىنىغا بادام يېغى، شېكەر قوشۇپ بېرىلىدۇ. مەيدە قىسمىغا ئاق سەندەل، ئالما يوپۇرماقلى - رنى سوقۇپ قويۇش كېرەك.

(2) ھول ئىسسىقتىن بولسا - يىگەن تاماقلرى مەيدىگە كىرگەندىن كېيىن دائىم بۇزۇلۇپ، ئېغىزدىن شولگەي ئېقىپ، سېسىق كىكىرىپ تۇرىدۇ. مەيدىدىن بۇس - بۇخاراتلار مىڭىگە ئورلەيدۇ. داۋاسى ئىتتىرىپىل كەبىر (1 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مەيدىنىڭ سەۋدا ۋە قۇرۇق سوغاقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: ئىشتەي ياخشى بولسىمۇ، تاماقتىڭ ھەزىم بولۇشى ناچارلىشىدۇ. مەيدە تاماقتىن كېيىن دائىم ئېسىلغاندەك سېزىلىپ، قوساق كوپۇپ تۇرىدۇ. مەيدە

ئېچىشىدۇ؛ بەزىدە قەي قىلغاندا قۇسۇق شۇنداق چۇچىر - مەل بولىدۇكى، ئاغرىقنىڭ چىشلىرى قاماپ قالىدۇ. تال چوڭىيدۇ.

داۋاسى: مەيدىنى سەۋدا ماددىسىدىن تازىلاش ئۇچۇن، ئالدى بىلەن مەتبۇنى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بۇيرۇش، ھول ئىسسىق تاماق ۋە چاي دورىلىرىنى بېرىش لازىم. توخۇ شورپىسىغا نوقۇت سېلىپ بېرىش كېرەك. بۇ خىلدىكى مەيدە كېسىلىدە قەي قىلدۇرۇش پايدىسىز، چۈنكى سەۋدا ماددىسى قويۇق بولغانلىقتىن مەيدىنىڭ تېگىگە ئولتۇرۇۋېلىپ قەي بىلەن چىقمىدايدۇ. ھول سوغاقتىن بولسا، ئېغىزدىن شولگەي كۆپ كېلىدۇ. تاماق مەيدىدە ئۇزۇن تۇرمايلا ئۇچەيگە ئۆتۈپ كېتىدۇ. چوڭ تەرەت دائىم يۇمشاق كېلىدۇ. ھوللۇك يىمەكلىكلەردىن قاچىدۇ. قۇرۇق تاماقلار ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مەيدە مىزاجىنى ئۆزگەر - تىش ئۇچۇن ئىتتىرىپىل سەغىر بېرىلىدۇ. كېيىن جەۋارىش ئۇد I، II، جەۋارىش كۇمۇنى، مەجۇنى، پىلاپى قاتارلىق - لاردىن بىرىنى تاللاپ بېرىلسە بولىدۇ (49 - 83 - 92 - 93 - نۇسخىلار). بۇ نۇسخىلەرمۇ شۇ ماۋزۇلاردىكى مەيدە بۇزۇلىشىنىڭ كۆپچىلىگىگە ناھايىتى ئۈنۈملۈكتۇر.

2- پەسىل: مەيدە ئاغرىش (ۋە جىلمەئىدە)

مەيدىنىڭ ئاغرىشى، مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق زەرەرلىنىشلىرى بىلەنمۇ پەيدا بولىدۇ. بۇ ھەقتە 1- پەسىلدە سۆزلەپ ئوتۇلدى. تۈۋەندە مەيدىنىڭ مەيدىدىكى ياللۇغلىنىش (ۋەرەم) ۋە جاراھەتلەر سەۋىيىدىن، يەل سەۋىيىدىن، يىمەكلىكلەرنىڭ سۈپىتى ۋە مەيدە ئەسەپ (نېرۋا) لىرى سەۋەپلىك ئاغرىشىنى سۆزلەپ ئۆتىمىز. مەيدە ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرىدىكى ئاغرىش كېسەللىك ئالامىتى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئالاھىدە پەسىلدە سۆزلىنىدۇ.

مەيدىنىڭ يەلدىن ئاغرىشى

مەيدە ئىچىدە قويۇق يەل كۆپ بولغاندا يەل مەيدە ئىچىگە سىغماي، زەئىپ مەيدە پەردىلىرىدە تار- تىشىش، قورۇلۇش ئەھۋالى كېلىپ چىقىپ مەيدە ئاغرىدۇ. ئالامەتلىرى: كۆپ كىكىرىدۇ. بەزىدە ھىق تۇتىدۇ. قوساق كىرگىت گۆشلىرى تارتىشىشقا باشلايدۇ. تاماقتىن كېيىن چەپ تەرەپ قوساق تال ئەتراپىنى تۇتۇپ كۆر- گەندە قولغا يەلنىڭ ھەرىكىتى (غولدىرلاش) سېزىلىدۇ. ئاغرىش كۆپىنچە چەپ تەرەپتىن باشلىنىدۇ.

داۋاسى: كىسپەك، تېرىق، قوناق، تۇزلارنىڭ ئۆزىنى يالغۇز ياكى ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ قىزىتىپ، ئىسسىق ھالدا مەيدە ئۈستىگە قويۇلىدۇ. يىمىش ئۈچۈن جەۋارىش كۈمۈنى بېرىلىدۇ (4- نۇسخە). كوندۇر، زىرە، پىننە قاتارلىقلارنى دائىم ئېغىزغا سېلىپ چايناش

ۋە سۈيىنى يۇتۇش لازىم. لاچىندانىنى گولاپ بىلەن قاينىتىپ بېرىلىدۇ. بەلغەم ماددىسىنى تازىلىغاندىن كېيىن ھەزىمنى ياخشىلايدىغان دورىلار بېرىلسە ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

ئەبۇ ئەلى ئىبنىسىنا ئۆز تەجرىبىسىدە بۇ خىل مەيدە ئاغرىغىنى كىندىكىنىڭ ئوڭ - سول تەرىپىگە ھىجا - مەت قويۇش بىلەن داۋالىغاندا دەرھال ئاغرىق پەسەيگەن. ئىسكەنجىۋىلىنى بىر ئاز قىزىتىپ بېرىلسە، ئاغرىقنى تېزلا توختىتىدۇ. مەيدە ئۈستىگە سىرتتىن ئىسسىق ياغلاردىن - مەستىكى يېغى، دارچىن يېغى، قۇست يېغىدىن بىرنى سۈركەش لازىم. ئەگەر مەيدە يەل بىلەن تولغان بولسا ھوقنە ئارقىلىق تازىلىغاندىن كېيىن ھەببى سەكبىنەچ (94 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھوللۇك يىمەكلىكلەرنى ئاز بېرىش، غىزاسىغا دارچىن، زىرە، سامساق قوشۇپ بېرىش كېرەك.

بەزىدە ئاغرىشنىڭ سەۋىبى شور بەلغەم بولغانلىقى ئۈچۈن، سوغاق نەرسىلەرنى بەرگەندە، ئاغرىش پەسەيىش كورىلىدۇ. بۇ چاغدا ماددا ئىسسىق ئىكەن دەپ خاتا گۇمان تۇغۇلىدۇ. ياكى ئىسسىق نەرسىلەرنى بېرىش بىلەن ئاغرىق پەسەيىپ، ماددىنىڭ سوغاقلغىغا گۇمان تۇغۇلىدۇ. مۇنداق ۋاقىتلاردا ئەتراپلىق قىلىپ دورا بەلگىلەش لازىم.

تامماقتىن كېيىنلا ئاغرىش بولسا، قەي قىلىش ياخشى. ئەگەر ئاغرىش تاماقتىن كۆپ يىيىش بىلەن

مۇناسىۋەتلىك بولسا بىرقانچە كۈن تاماق مىقدارىنى ئاز-ئازدىن بىرقانچە ۋاقىت بېرىش لازىم. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا تاماق بەرگەندە مەيدىنىڭ مىزاج ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش ناھايىتى مۇھىم. مەيدىنى قۇۋۋەتلىە-دۇرۇش ئۈچۈن جەۋارىش جالىنىۋىس، نۇشدارى (3-8-نۇسخە) بېرىلىدۇ. پۇرچاق جىنىسلىق دانلار (ماش، لۇبىيا، سېرىق پۇرچاق)، يەللىك چاي (قارا چاي)لار مەيدە ئىچىدە يەل پەيدا قىلىدۇ. بەك ھوللۇك نەرسىلەر مەسەلمەن، ئالما، قوغۇن، تاۋۇز، قېتىق، ئارپا نېنىمۇ زەرەر قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ناچار يىمەكلىكلەر سەۋەپلىك مەيدە ئاغرىش

سۈپەت جەھەتتە مۇۋاپىق بولمىغان (قاتتىق، خام ۋە بۇزۇلغان) تاماقلارنى يىمىش بىلەنمۇ مەيدە ئاغرىيدۇ. ياكى مەيدىنىڭ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى ئاجىز بولۇشى بىلەن بۇ خىلدىكى تاماقلار مەيدىنى تېخىمۇ زەرەرلەپ ئاغرىشىنى پەيدا قىلىدۇ. مەيدىنىڭ ئاغرىغى ئاساسەن يەلنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە مەيدە پەردىلىرىنىڭ تارتىشە-ۋېلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى سەۋەپلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇشى بىلەن بىللە مەيدە ئۈستۈنكى قىسمى ئاغرىيدۇ. بولۇپمۇ تاماقتىن كېيىن مەيدىنى قىمىرلىتىپ ئاغرىتىدۇ.

داۋاسى: تاماق مەيدىنىڭ يۇقۇرقى قىسمىدا

بولسا قەي بىلەن، توۋەندە بولسا سۇرگە بىلەن چىقىرىش لازىم. ئۇندىن كېيىن مەيدىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ۋە ماددىدىن تازىلاش ئۈچۈن قۇرسى كوكەپ، قۇرسى ئەپسەنتىن (95 - 96 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ.

مەيدە ئەسەپلىرىنىڭ قوزغۇلىشىدىن مەيدە ئاغرىش

سەۋدانىڭ مەيدىگە چۈشۈشى، سوغاق سۇ ئىچىش ياكى روھى قوزغۇلۇشلار (غەم، ئەندىشە، تەسادىپى خەۋەر، روھى زەربىلەر) تۈپەيلىدىن مەيدە ئاغرىغى تۇتۇش. **ئالامەتلىرى:** سەۋدا مىزاجلىق كىشىلەردە كۆپرەك

ئۇچرايدۇ. بىرەر روھى ئامىل ياكى ئۆتكۈر تەسىر قىلغۇچى يىمەكلىك سەۋىيى بىلەن تۇيۇقسىز مەيدە ئاغرىپ كېتىدۇ. بۇ ھال بەزىدە تۇتقاقلىق شەكىلىنى ئالىدۇ. بەزىلەردە مالىخۇلىيا ئالامەتلىرى بىللە كېلىدۇ. بەزىلەردە ئەتىگەندە ناشتىدىن ئىلگىرى مەيدە بوش چاغدا ئاغرىيدۇ. مەئدە يەل بىلەن تولغان بولۇپ، كىكىرىش بىلەن ئاغ-رىق يەڭگىللىشىدۇ. بەدەندە سەپرانىڭ غالىپلىغى كوردىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدىنقىسىغا كۆكتار شەرۋىتى بېرىلىدۇ.

كالا - پاقالچەك بېرىلىدۇ. كېيىنكىسىگە ماددىنى تازىلەندۈرۈش كېيىن جەۋارىش جالىنۇس، قۇرسى ئەنسۇنلەردىن بېرىلىدۇ (3 - 95 - نۇسخىلەر). ئەگەر تىۋىپ ھوقنە قىلىشنى مۇۋاپىق كۆرسە ھوقنە قىلىسىمۇ بولىدۇ.

3 - پەسىل: ھەزىم كېسەللىكلىرى

تاماق سىڭىشنىڭ بۇزۇلۇشى

تاماق سىڭىشنىڭ بۇزۇلۇشى — ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى (زەئىپى ھەزىم). ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى (سۈڭىشلەزىم)، ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشى (توخۇمە)لەردىن ئىبارەت بولۇپ، سەۋىبى بىردۇر. سەۋەبىچى ئامىل ئاجىز بولسا ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى، ئوتتۇرىچە بولسا ھەزىم ئاجىزلىقىنى، كۈچلۈك بولسا، ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇلار ئىچىدە يامانراقى ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشىدۇر.

ھەزىمنىڭ ئاجىزلىغىدا: تاماق ماددىلىرى مەئدە ئىچىدە ئۇزۇن تۇرۇپ قالىدۇ. ئاغرىق مەئدەسىدە ئېغىرلىق ۋە چېڭقىلىش ھەس قىلىدۇ. كىكىرگەندە شۇ چاغدا يىگەن تاماقنىڭ پۇرىقى كېلىدۇ.

ھەزىم ئاجىزلاشقاندا، تاماقنىڭ بىر قىسمى سىڭىپ بىر قىسمى سىڭمەيدۇ. ھو (كوڭۇل ئايىنىش)، مەيدە ئاغرىش بىلەن چوڭ تەرەت كۆپلىگى ئاۋارە قىلىدۇ. كىكىرگەندە سېسىق لاۋىدەك پۇراپ ئاغرىق ئۈزى سەسكىنىدۇ. ئوزۇق-لۇقلار بەدەنگە تارقالمايدۇ. تارقالغاندىمۇ بەدەن ئېھتىياجىنىڭ ھوددىسىدىن چىقالمايدۇ. نەتىجىدە سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا)، قان ئازلىققا ئوخشاش بىر قاتار كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولىشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

ھەزىمىنىڭ پۇتۇنلەي بۇزۇلۇشىدا بولسا تاماق پۇتۇنلەي سىڭمەيدۇ ياكى تۈۋەنگە چۈشمەيدۇ، يا يېنىپ كەتمەيدۇ. بۇزۇق ماددا ھاسىل بولۇپ قەي قىلىشقا ياكى ئىچ سۇرۇشكە ئېلىپ بارىدۇ. ئاغرىق كىشى بەك مېھرىبان بولىدۇ ھەمدە يۇقۇرىدا سۆزلەنگەن كېسەللىكلەرگە دۇچار قىلىدۇ.

سەۋىيى: ھەزىم قىلىش بۇزۇلۇشلارنىڭ سەۋىيى ئاساسەن مەيدە مىزاجىنىڭ ماددىسىز بۇزۇلۇشى ياكى خىلىتلار (بۇزۇق خىلىتلار) نىڭ مەيدە ئۆزىدە پەيدا بولىشى ھەم باشقا مۇناسىۋەتلىك ئەزالاردىن كېلىپ چۈشۈشىدىن ئىبارەت. ماددىسىز (سازەج) ۋە ماددىلىق بولغىنىنى پەرق قىلىش داۋالاش ئۈچۈن ناھايىتى زورۇر. ماددىسىز بولغىنىدا تاماقتىن كېيىن ئاغرىق مەيدىسىدە ئېغىرلىق ھېس قىلمايدۇ، قەي بىلەن چىقىرىۋېتىپ قۇتۇلىدۇ. ئېغىر ئەھۋالدىكىلەرنى داۋالاش تەس. ماددىلىق بولغىنى بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، تاماقتىن كېيىن مەيدە ئېغىرلىشىدۇ، قۇسۇق بىلەن بۇزۇق خىلىتلار چىقىدۇ. يەڭگىل غىزالارنىلا يىيەلەيدۇ.

مەيدىنىڭ كۈچى تارتىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى جا - زىيە)، تۇتۇش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى ماسكە)، ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى ھازىمە)، چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى داپىئە) دىگەندەك قۇۋۋەتلەردىن تەركىپ تاپىدۇ. ئۇلارنىڭ قايسى بىرى زەرەرلەنسە مەيدىدە يۇقۇرقىدەك بۇزۇلۇشلار كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن، تارتىش قۇۋۋىتى

تەسىرگە ئۇچرىسا ھەزىمىنىڭ ئاجىزلىغى، تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا، ھەزىمىنىڭ ناچارلىغى پەيدا بولىدۇ. ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى بىلەن چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى بۇ - زۇلسا، ھەزىمىنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشى كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: جەۋارش ئۇد، ئىترىپىل كەبىر ياكى ئىترىپىل سەغىر (93 - 1 - 5) بېرىلىدۇ. ئىچىشكە بىيە ئىسكەنجىۋىلى (ئىسكەنجىبىن سەپەر جىلى) بېرىپ، توخۇ تاشلىغىنىڭ ئىچكى سېرىق پەردىسىنى ئاجرىتىپ قۇرۇتقاندىن كېيىن، سوقۇپ خۇشپۇراق شەرۋەتلەر بىلەن بىللە قوشۇپ بېرىلىدۇ (مەسىلەن، ئالار، بەھى شەرۋەتلىرى)، سۇنبۇل، سەئدە كوپى، ئىزخىر، مەستىكىلەرنى سوقۇپ، بىر ئاز نارجىل يېغى بىلەن ياغلاپ سىرتتىن مەيدە ئۈستىگە قويۇلىدۇ. غىزاسى ئۇچۇن توخۇ گۆشىگە زەپەر، دارچىن، زىرە، پىننەلەرنى قوشۇپ بېرىش لازىم. قېتىق ۋە ئولاي، كەكلىك گۆشلىرى مەيدىنىڭ بۇ خىلىدىكى ئاغرىقلىرى ئۈچۈن مەنپەئەتلىك.

ئۆتكەن ماقالىلاردا سوزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك مەيدىنىڭ بۇزۇلۇشى بەدەندىكى ئاغرىقلارنىڭ ئانىسىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشىنى كوڭۇل قويۇپ داۋالاش بىلەن ئۈنىڭدىن ساقلىنىشىمىز ۋە تاماقنى تەرتىپلىك يېيىشىمىز لازىم. ئالدى بىلەن ئاسان سىڭىدىغان تاماقنى، كېيىن تەسەرەك سىڭىدىغانلىرىنى يېيىش كېرەك. توق قوساققا تاماق يېمەسلىك، قوساقنى ئاچۇرۇپ يېيىشنى ئادەت قىلىش، تاماقنى بەك تويۇپ كەتكەن يېمەسلىك

لازم. تاماقنىڭ ئارقىسىدىنلا دورا يېمەسلىك كېرەك. چۈنكى بەزى دورىلار تاماقنىڭ ھەزىم بولىشىغا تەسىر بېرىشى مۇمكىن. غىزادىن كېيىن بىر ئاز يەڭگىل ھەر-كەت قىلىش ھەزىم ئۈچۈن پايدىلىق. مەيدە ئىچىدە تاماقنىڭ بۇزۇلغىنى سېزىلسە ياكى غەيرى ھىسلار تۇيۇلسا دەرھال قۇسۇش ئۈچۈن چارە قىلىش لازىم. مەيدىنى تازىلاشنىڭ ئوبدان ئۇسۇلى قەي قىلىشتۇر. ئەگەر قەي قىلىش كېچىكىپ قالغان ياكى ئوڭايسىز بولسا گۈلقەن، جەۋارش، تەمرى ھىندى، جەۋارش شەھىرى يارانلارنى بېرىش يېتەرلىك. بەزىلەر جەۋارش سەپەرچىلى بېرىشنى توغرا كۆرىدۇ (90 - 97 - 98 - نۇسخىلار).

تارتىش قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئالما، لىمون، سەندەل شەرۋەتلىرى، دارچىن، زەپەر، زىرىلەر بىلەن پىشۇرۇلغان توخۇ گۆشلىرى ياخشى. تۇتۇش قۇۋۋىتىنى سوغاقلىققا مايىل قۇرۇق نەرسىلەر كۈچەيتىدۇ؛ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتىگە مۆتىدىل، ھول ۋە ئىسسىق نەرسىلەر مەدەت بېرىدۇ؛ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنى سوغاقلىققا مايىل ھوللۇك نەرسىلەر كۈچەيتىدۇ.

ئىشتەي تۇتۇلۇش

ئىشتەي (ئىشتەھا) نىڭ تۇتۇلۇشى يېنىك بولغاندا ئىشتەينىڭ كەم بولىشى، ئېغىر بولغاندا پۈتۈنلەي ئىشتەي تۇتۇلۇش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئۇلار سەۋەبچى ئامىلنىڭ كۈچلۈك، ئاجىزلىغىغا قاراپ پەرقلىنىدۇ.

ئالامەتلىرى ۋە داۋالاش:

1) مەيدە ئاغزىنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىرىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش: بۇنىڭدا مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللىرىدە كورۇلگەن ئالامەتلەر بولۇشتىن تاشقىرى، ئىشتەيمۇ تۇتۇلۇپ قالىدۇ.

داۋالاشتا — ئىسسىقتىن مىزاج بۇزۇلغاندا سوغاقلىق دورىلار بىلەن؛ سوغاقتىن مىزاج بۇزۇلغاندا ئىسسىقلىق دورىلار بىلەن داۋالاش ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. سامساق، پىننە قاتارلىقلارنى كوپرەك ئىستىمال قىلىش، قوناق ئۇنىنى قىزىتىپ مەيدىگە تېگىپ بېرىش كېرەك.

2) خىلىتلارنىڭ كوپىيىپ كېتىشىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش: بۇ خىل ئەھۋال سەپرادىن ياكى شور خىلىتلاردىن بولسا، مەيدە ئېچىشىپ ئاغرىش، قۇسۇش بىلەن بىللە ئىشتەي تۇتۇلۇش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇنداقتا ئالدى بىلەن مەيدىنى خىلىتتىن تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن قەي قىلدۇرۇش ياكى سەپرا سۈرگىسى بېرىلىدۇ؛ ئەگەر قويۇق بەلغەمدىن بولسا ئاغرىش، ئېچىشىش بولمايدۇ، بەلكى كوڭۇل ئايىنىش، قوساق كوپۇش ئەھۋاللىرى بولۇپ، كىكىرسە يېنىكىلەيدۇ. ئۇنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ماددىنى بوشىتىش ئۈچۈن قىچا، زاغۇن، بىخ كەبىر ۋە رۇمبېدىيانلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىگە بىرئاز ھەسەل بىلەن تۇز قوشۇپ ئېچىشكە بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ماددىنى چىقىرىش ئۈچۈن، سېرىق چىچەك

ئۇرۇغى، تۇرۇپ ئۇرۇغى، چۇچۇكبۇيا يىلتىزلىرىنى قاينى-
تىپ سۇيىگە بىر ئاز ھىندى تۇزى ۋە سىركە قوشۇپ
بېرىلسە قەي قىلىدۇ. ئەگەر قەي قىلىش مۇمكىن بولمىسا
سۇرگە دورىسى (مىزاج بۇزۇلۇشلۇق مەيدە كېسەللىكلىرىدە
كورسىتىلگەن) ۋە مەيدىنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى مۇناسىپ
دورىلارنى بېرىش لازىم.

(3) خام خىلىتلارنىڭ بەدەندە كوپىيىشىدىن ئىشتەي
تۇتۇلۇش: بۇ بەلغەمنىڭ خام بولۇشى بىلەن كوپىرەك
مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئەمگەك قىلماي دائىم دەم ئېلىپ
ياتقانلاردا ئىشتەينىڭ تۇتۇلۇشى كورىلىدۇ. بۇنداقلا
تاماقنى ئاز - ئازدىن يىيىش ۋە مونچىغا كىرىپ تۇرۇش،
مۇۋاپىق جىسمانى ھەركەتلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىش-
تىيى ئېچىلىدۇ.

(4) تېرە توشۇكلىرىنىڭ توسىلىشىدىن ئىشتەي
تۇتۇلۇش: تېرىنىڭ پاسكىنا ۋە كىر بولۇشى ياكى باشقا
سەۋەپلەردىن تەرىنىڭ چىقماستىلىقى بىلەن تەدرىجى
ئىشتەي تۇتۇلۇپ كېتىدۇ. مونچىغا كىرىپ تەرىلىنىش،
كۇچلۇك تەنھەركەت قىلىش، بەدەننى مۇجۇش، تەرلەتكۈچى
دورىلارنى قاينىتىپ ھورىغا ئولتۇرغۇزۇش قاتارلىق چاردا-
لارنى قىلىش، ئىسسىق ياغلار بىلەن بەدەننى ياغلاش
كېرەك.

(5) جىگەر زەئىپلىگىدىن ئىشتەي تۇتۇلۇش: جىگەر
زەئىپلىگى ياكى ئۈچەيدىن جىگەرگە ئوزۇقلۇقلارنى يەت-
-

كۆزىدىغان چاۋا قانتومۇرلىرىدا تۈسلىش پەيدا بولۇشتىن كېلىپ چىققان ئىشتەيسىزلىكلەردە كوڭۇل غىزا خالە - ماسلىق، كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلاش، چوڭ تەرەتنىڭ رەڭگى ھەرخىل بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللار كورۇلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلىغۇچى چارىلار قىلىنىدۇ (جىگەر كېسەللىكلىرىگە قاراڭ).

6) مەيدىگە سەۋدا چۈشۈشنىڭ بۇزۇلىشىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش: تالدا تۈسلىش بولغانلىقتىن ئىشتەينى قوزغاش ئۈچۈن كېرەك بولغان سەۋدا مەيدىگە كەلمەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن مۇنداق كىشىلەر "قۇسۇغۇم ئاچمايدۇ" دەپ زارلىنىدۇ، تال چوڭىيىدۇ. بۇ خىلدىكىلەرگە ئىسكەنجىبىن بۇزۇرى (100 - نۇسخە) بېرىلىدۇ، مۇمكىن بولسا قەي قىلىشنى تەۋسىيە قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن تۇرۇپ تۇرۇغى، زاغۇن، سېرىق چىچەك ئۇرۇقلىرىنى ھەسەل قوشقان سىركە سۈيى بىلەن بىللە بېرىلسە قەي قىلىدۇ. تالنىڭ چوڭىيىشىغا چارە قىلىنىدۇ (تال كېسەللىكلىرىگە قاراڭ).

7) مەيدە ئەسەپلىرى سەۋىبىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش: بۇ خىلدىكى ئىشتەي تۇتۇلۇشتا مەيدىنىڭ خىزمىتى بارغانسېرى ئاجىزلىشىپ كەتكەنلىگى سېزىلىدۇ. ئىشتەي تۇتۇلۇش بىلەن بىللە نېرۋا ئاجىزلىق ئالا - مەتلىرى، مالىخۇلىيا قاتارلىق روھى ئىزىلەڭگۈلۈك ئالا - مەتلىرى كورىلىدۇ. بۇنى ئايرىش ئۈچۈن ئاغرىققا چۈ - چىمەل نەرسىلەر بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىشتەي ئېچىلسا سەپرا -

دىن بولغىنى، ئەگەر ئىچىلمىسا مىڭدە كېسەللىك بار -
لىغىنى (زەئىپلىك بارلىغى) كورسىتىدۇ. بۇنداقلارغا مىڭنى
قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ (مىڭە كېسەللىكلىرىگە
قاراڭ).

يەپ تويماسلىق كېسەلى (شەھۋىتى كەلبى)

“شەھۋىتى كەلبى” دىگەن ئەرەپچە ئىت ئىشتىيى
دىگەنلىكتۇر. بۇنداق كېسەلگە دۇچار بولغان ئادەم ھەر
قانچە كۆپ تاماق يىسىمۇ تويمىيدۇ. ھەتتا يەيدىغان
بەرسىلەر ئالدىدا تۇرسىمۇ كىشىلەر بىلەن تالىشىپ ماجرا
قىلىدۇ.

سەۋەبى: (1) سوغاق ۋە قاتۇرغۇچى ماددىلار مەي -
دىنىڭ مىزاجىنى بۇزۇشى - تەشۋىشلىقنىڭ بولماسلىغى
مەيدىنىڭ كۆپۈپ تۇرۇشى بىلەن يۇقۇرقى ئالامەتلەر يۈز
بېرىدۇ. بۇنداقلارنى داۋالاشتا مەيدىنى قىزىتىشنى ئاساس
قىلىش كېرەك. مەسىلەن، جۈۋىنە، زىرە، رۇمبىدىيان،
مەستىكىلەرنى ئېغىزدا چايناپ تۇرۇپ سۈيىنى يۇتۇش
ھەم مەيدىگە سىرتتىن سۇمبۇل قايناتقان سۇغا جويۇز
سۇرۇپ چېپىش لازىم. جاۋارش جالىنۇس (3 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

(2) بەلغەم ئارىلاشقان سوغاقلىق: ئېغىزدىن شولىگەي
كۆپ چىقىدۇ. بۇنداقلارغا ئالدى بىلەن ھەببى قوقيا
(17 - نۇسخە) يا ھەببى ئايارەنج (7 - نۇسخە)دىن
كېيىن كورسىتىلگەن چارە قىلىنىدۇ.

(3) مەيدىگە سەۋدانىڭ كوپ قۇيۇلىشى: مەيدە بوشىغاندا قاتتىق ئېچىش مەيدە ئېغىزىدا كويۇشۇش ئالامىتى بولۇپ، تاماق يىيىش بىلەن پەسىيىدۇ. بۇ خىلدىكىلەرگە مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىپ تال ئۇستىگە ھىجامەت قويۇلىدۇ. چۈچمەل نەرسىلەردىن ساقلىنىش بىلەن قوي، كالىنىڭ بورەك ياكى چاۋا يېغىنى يىيىش كېرەك. مەجۇناتلاردىن جەۋارشى نارمىشكى (99 - نۇسخە) يا مەجۇنى خۇبۇلەددى (100 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) مەيدىگە بەلغەم قۇيۇلىشى: كوپىنچە نەزلىدىن كېيىن نىزە ماددىسى مىڭدىن مەيدىنىڭ ئېغىزىغا قويۇلىدۇ. چۈچمەل كىكىرىك چىقىدۇ ۋە ئاغرىشتىن بۇرۇن زۇكام بىلەن ئاغزىغانلىق تارىخى بولىدۇ. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا ياكى ھەبى سەبرە (4 - 16 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. غىزاسىغا دارچىن، پىلىپىل، سوتتەر، زىرە سېلىپ توخۇ شورپىسى بېرىلىدۇ.

(5) ئۈچەيدە مەددە قۇرۇتلارنىڭ بولىشى: ئارقا تەرەتتىن مەددە چۈشىدۇ، يەپ توپمايدۇ. مۇنداق ھال-لاردا مەددىنى يوقىتىش بىلەن جاۋارشى نارمىشكى (100 - نۇسخە) بېرىش كېرەك.

كالا ئىشتەي (جۇئىلبەقەر)

“جۇئىلبەقەر” كالا ئىشتىيى دىگەنلىك بولۇپ، تىبابەتتە بولسا، پۈتۈن بەدەن ئوزۇقلۇققا مۇھتاج بولۇپ تۇرۇغلۇق كوڭۇل تاماق تارتماسلىق — قوساق ئاچماسلىق

ۋە تاماق خالىماسلىققا ئېيتىلىدۇ. سەۋىيى "يەپ تويماسلىق" كېسىلى بىلەن بىر خىل بولۇپ، سەۋەپ يەڭگىل بولسا يەپ تويماسلىق، ئېغىر بولسا "كالا ئىشتىيى" كېلىپ چىقىدۇ.

سەۋىيى: بۇ كېسەل قاتتىق سوغاقتا سەپەر قىلغۇ-چىلاردا، بولۇپمۇ ئاچ يۇرۇپ سەپەر قىلغۇچىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇرۇن ئۇزۇن ۋاقىت ئاچ قالغانلارمۇ بۇ كېسەلگە دۇچار بولۇپ قالىدۇ. سەۋەپلىرىگە قاراپ تو-ۋەندىكى 3 قىسىمغا بۆلىنىدۇ.

(1) قاتتىق سوغاقتىن مەيدىگە تەسىر قىلىشى بىلەن مەيدىنىڭ ھىس قىلغۇچى ئەسەپلىرىنىڭ قوزغىلىش ۋە جازىبە قۇۋۋەتلىرى يوقىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەن ئورۇقلاش، كۈندىن - كۈنگە ئەھۋالى ناچارلىشىش، تاماق يېمەسلىك قاتارلىق ھاللار بولۇپ، مەيدىنى تۇتۇپ كورگەندە مۇزدەك سوغاق سېزىلىدۇ. كېسەللىك ئۇزارغانسېرى ئاغرىق ئايلىنىپ كېتىدۇ-غان بولۇپ قالىدۇ.

(2) قويۇق بۇزۇق بەلغەم مەيدىگە چۈشۈشى بىلەن مەيدە ئېغىزىنى توشىۋالىدۇ. ئاغرىق كىشى قۇسىدۇ. قۇسقان نەرسىنى قويۇق شىلىملىق ئارىلاش بولۇپ غىزانى كۆرسە ئىختىيارسىز سەسكىنىدۇ.

(3) سەپرا ياكى سۇيۇق بەلغەمنىڭ مەيدە ئېغىزدىكى تىۋىتلەرگە سىڭىپ كېتىشى بىلەن مەيدە مىزاجىنى يوقىتىدۇ. ئىستىرخا (ئاجىزلىشىش) سەۋەپلىك قۇۋۋەتى

جازىبە يوقىلىدۇ. مەيدە بۇزۇلۇش ئالامەتلىرى بىلەن كېلىدۇ.

داۋاسى: بىرىنچى خىل سەۋەپتىن بولغىنىدا ئەگەر ھۇشسىزلىق بولسا، ئالدى بىلەن ئايلىنىپ كېتىش پە - سىلىدە سوزلەنگەن چارىلار بىلەن ھۇشغا كەلتۈرىلىدۇ. مەسىلەن، يۈزىگە سوغاق سۇ سېپىش، خۇشپۇراق نەرسە - لەرنى كويدۇرۇپ پۇرۇتۇش، پىشانە ۋە قۇلاق ئارقىسىدىكى تۈكلەرنى يۇلۇش كېرەك. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن گازى ۋىن، قىزىل گۈل ۋە بىدىمىشكى ئەرەقلىرىگە نان چىلاپ بېرىش، ئالما شەرىتىنى سۇ بىلەن ياكى نان بىلەن يېمىشكە بېرىش لازىم. ئۇندىن باشقا مىكىيان چۈجە - گۈشى، نوخۇت، زىرە، داچىن ئود ھىندىلار قوشۇپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. مەيدىنىڭ مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۇچۇن، تەر - ياقى مەئىدە، جەۋارشى بۇزۇرى (102 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2 ۋە 3) خىل سەۋەپلەر بولغىنىدا ماددىنى تازىلاپ چىقىرىش بىلەن مەئىدە قۇۋۋەتلىرى ئىندۇرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. چۈنكى ماددىنى تازىلىماستىن تۇرۇپ قۇۋۋەت - لەندۈرۈش چارىلىرىنى كورۇش نەتىجە بەرمەيدۇ.

ئاچلىقتىن ئايلىنىپ كېتىش (جۇئىلغەش)

بۇ كېسەل بىلەن ئاغرىغان كىشى قوسىغى ئاچ - قاندا غىزا كېچىكىپ قالسىمۇ ھۇشسىز كېتىدۇ.

سەۋىيى: مەيدە ئېغىز قىسمىنىڭ زەئىپلىگىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئادەتتىكى چاغلاردا تەشئالىق زىيادە بولۇپ، دائىم قەۋزىيەت بولىدۇ. ئاچ قالسا ئايلىنىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: ھۇشسىز ھالەتتە بولسا ئايلىنىپ كېتىش بابىدا سوزلەنگەن چارىلار قىلىنىدۇ. ئالما، ئانار شەر-ۋىتى (47 - 48 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاماقنى ئوز ۋاقتىدا يىيىش لازىم. ئەگەر بۇ كېسەل ئۇزۇن داۋام قىلسا سەرئىگە ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. بېرىلىدىغان دورىلار تەسىر جەھەتتە تېز بولۇشى كېرەك.

غەلىتى نەرسىلەرنى يىمىشكە مايلىق (فاسادىشەھۋەت)
ئاغرىق كىشىلەر ئادەتتە يىمەيدىغان نەرسىلەرگە ئامراق بولۇپ قالىدۇ. مەسىلەن، سېغىز توپا، گەژ، ساپال ۋە قوغۇشۇندەك نەرسىلەر يىمىشكە مايىل بولۇپ قالىدۇ. كوپىنچە ئاياللار ۋە بالىلاردا بولىدۇ.

سەۋىيى: مەدە قۇرۇتلارنىڭ بولۇشى: خىلىتلار بۇزۇلغان قىسمىنىڭ مەيدىدە توپىلىشىپ قېلىشى نەتىجە-سىدە ھاسىل بولىدۇ. مەيدە ئوزىدىكى بۇزۇلغان خىلىت-لارنىڭ ئەكسىدىكى نەرسىلەرنى تەلەپ قىلىدۇ.

داۋاسى: مەدە بولسا ئۇلارنى ئېنىقلاپ چۇشۇ-رۇۋېتىش، ئەگەر مۇمكىن بولسا ھەر ئايدا بىر قېتىم ھەسەل سۇيى، سېرىق چىچەك سۇيى، تۇرۇپ سۇيى، تۇز ۋە ئىسكەنجىۋىللىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىچكۈزۈپ قەي قىل-دۇرۇش ياكى مۇۋاپىق ھالدا سۈرگىلەرنى بېرىش لازىم.

ئەمما ھامىلدار ئاياللارغا بولسا بۇ چارىنى قىلىشقا بولمايدۇ. 3 ئايدىن كېيىن ئوزىچە ساقىيىپ كېتىدۇ. سۈرگە بېرىشتە — چىلان، گارىۋان، سەرپىستانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ چالا سوقۇپ يېتەرلىك سۇ بىلەن قاينىتىپ سۇ يىگە پۇنۇس ۋە تەرەنجىۋىلدىن 3 ھەسسە قوشۇپ ئېرىد. تىپ سۇزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن جەۋا-رىش مۇناسىپ، جەۋارىش مۇقەۋۋى مەئىدەلەردىن بىرىنى (102 - 103 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. تەجربە قىلغان تىۋىپلار ئۇچار قانالار گوشىنى كاۋاپ قىلىپ، سوڭەكلىرىنى چايناپ شۇمۇشكە بېرىلسە مەنپەئەتى كۆپ دەپ كۆرسىتىدۇ.

كۆپ ئۇسساش كېسىلى (ئەتمىش)

كۆپ ئۇسساش كېسىلى ھەقىقىي كۆپ ئۇسساش ۋە ساختا كۆپ ئۇسساش دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. ھەقىقىي كۆپ ئۇسساش — ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە ھوللۇكلەرنىڭ سەرپىياتىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن بەدەن سۇغا مۇھتاج بولىدۇ. مۇنداقتا سۇ، چاي ئىچىش كىپايە قىلىدۇ. ساختا ئۇسساش — مەئىدە شور بەلغەم ياكى سەۋدا يىغىلغانلىقتىن پەيدا بولۇپ، بەدەن مەزكۇر مەددىلەرنى يۇيۇش ئۈچۈن سۇ تەلەپ قىلىپ ئۇسساش كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما ھەر-قانچە كۆپ ئۇسسۇلۇق ئىچكەن بىلەنمۇ ئۇسسۇزلۇق پەسەي-مەيدۇ. ماددىلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ئېغىزنىڭ تەمى بۇزۇلىدۇ. بۇ خىلدىكى ئۇسسۇزلۇقنىڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى،

ئەگەر چىداپ تۇرسا بىر مەزگىلدىن كېيىن تەشئالىق ئۆزلىگىدىن يوقاپ كېتىدۇ. ئۇخلاپ قالسىمۇ تەشئالىق پەسىيدۇ.

سەۋىبى: ھەقىقى كوپ ئۇسساشنىڭ سەۋىبى ھەركەت، ھارارەتلىك شارائىت ياكى شور سۇ، ئۇزلۇق تاماقلارنى ئىستىمال قىلىش، ساختا ئۇسساشنىڭ سەۋىبى بولسا — مەئدە، ئوپكە، جىگەر، ئال قاتارلىق ئەزالاردىكى ھارا-رەنلىك ۋە قۇرۇقلۇق زەرەرلىنىشلەر ۋە بەدەندىكى قەن سىيىش (زىپابتۇس) كېسىلى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

داۋاسى: ھارارەت بولسا ئۇنىڭ قايسى ئەزادا ئىكەنلىگىنى بىلىش كېرەك. ئەگەر ئوپكە، يۈرەك ياكى بورەكلەردە بولسا خۇشبۇي ۋە سوغاق تەبىئەتلىك دورىلاردىن ئاق سەندەل، بىدىمىشك پۇرتىلىدۇ. مەئدە ۋە جىگەردە بولسا سوغاق شەرۋەتلەر بېرىش لازىم. سوغاق خىلىتلار (بەلغەم، سەۋدا) سەۋەپ بولسا، ئالدى بىلەن ئىسكەنجىبىن بىلەن ئىلمان سۇنى كوپىرەك ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش كېرەك. ئىچىشكە ئارپا بېدىيان سۇيى بېرىلىدۇ. سۈرگە بېرىش مۇۋاپىق كەلسە ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلسە بولىدۇ. غىزاسغا مىكيان گوشى، نوقۇت سۇيى، سامساقنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ بېرىلسە بولىدۇ. زىرە، بادام يېغى، شېكەرلەرنى كوپىرەك ئىستىمال قىلىش لازىم. شور بەلغەم سەۋەپچى بولسا ئارپا - بېدىيان سۇيىدىن باشقا ئىسسىقلىق نەرسە بېرىلمەيدۇ.

قاندا ھارارەت بولسا دورىلار بىلەن ئۇسۇزلۇق ئاسان پەسەيمەيدۇ. شۇڭا مەنى قىلىدىغان ھاللار بولمىسا قان ئېلىش كېرەك. قاتتىق ئىچ سۈرگەندە بولىدىغان تەشنىلىق ئۈچۈن شەرۋىتى زىرەشك (89 - نۇسخە)نى سوۋۇتۇلغان قايناقسۇغا تەڭشەپ بېرىش بەك ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. بەزىدە ئەفئائىلىنى ياكى پەرىپىيون ئىس - تىمال قىلغاندىمۇ تەشنىلىق يۈز بېرىدۇ. بۇنىڭغا سۈت، ئارپا سۈيى، خاڭگا سۈيى، بىنەپشە يېغى ۋە مەسكە ماي - لارنى ئارىلاشتۇرۇپ ياكى ئايرىم بىرىنى بېرىش مۇمكىن. قاننى كۆپ ئېلىش ياكى باشقا سەۋەپلەر بىلەن كۆپ قان كېتىش ئەتىجىسىدە پەيدا بولغان تەشنىلىقلاردا لىمون، ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە)، زەنجىۋىل مۇرابباسى قاتارلىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىش لازىم.

4 - پەسىل: ئاشقازان ياللۇغلىرى (ۋە رەمى مەيدە)

ئاشقازان ھۆكىمەت پەردە ياللۇغى (پەلغىمۇنى

مەيدە)

مەيدىنىڭ قان ۋە سەپرادىن بولغان ياللۇغى پەلغە - مۇنى مەيدە دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەيدە قاتتىق ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، قىزىتىدۇ، قاتتىق تەشنىلىق، قۇسۇش ۋە بىئاراملىق كېسەلنى ئازاپلايدۇ. ئىشتەي يوقۇلىدۇ. تىل، ئېغىز ئىچى قىزارغان ياكى سېرىققا مايىلىراق بولىدۇ. قول - پۇتلىرى

سوۋۇپ كېتىدۇ. ياللۇغلىنىش مەئىنىنىڭ پۈتۈن قىسمىدا بولسا، ئەھۋال تېخىمۇ تېغىر بولىدۇ. ياللۇغلىنىش مەئىنى ئالدىنقى قىسمىدا بولسا كىيىمنىڭ ئۈستىدە پۇلتىيىپ چىققان ئىشلىق روشەن كۆرىنىدۇ. كېسەل ئوڭدا ياتقاندا تېخىمۇ روشەن كۆرگىلى بولىدۇ. ئارقا تەرەپتە بولسا كۆرۈنمەسلىكى مۇمكىن. ئەمما ئاغرىق ئۆزى مەيدىسىدە چىقىلىش ۋە تۇگۇندەك بىر نەرسە بارلىغىنى ھېس قىلىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر قان ئېلىش مەنىسى قىلىدىغان

ئەھۋاللار بولسا، ئارقا تەرەپ ئىككى غول (تاغاق) ئوت-تۇرسىغا ھىجامەت قويۇلىدۇ. ياكى ۋەرەمنىڭ ئاشقازان ئارقىسىدا ئىكەنلىكى بىلىنسە، ئالدى تەرەپ مەيدە ئۈستىگە (مەيدە بار جايدىن يۇقۇرىراق) ھىجامەت قويۇلىدۇ. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئالدىنقى قىسمىدا بولسا، بەلگە (بۆرەك ئۈستىگە) ھىجامەت قويۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن ئانار سىقىپ بېرىلىدۇ ۋە نىلۇپەر، بىنەپشە، كاسىن ۋە كاسىن شىرد-سىنى كاشكاپ قىلىپ بېرىش كېرەك. ئاق سەندەل، مامىشا، سۇۋادان تېرەك يوپۇرمىغىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ مەيدىنىڭ ياللۇغلىنىش بار تەرەپىگە قويۇش لازىم. تاماق جەھەتتە ئارپا سۈيى بىلەن چەكلىنىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ چارىلاردىن 3 كۈن كېيىن، ئارپا ئۇنى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، قىزىل گۈللەرنى سوقۇپ گۈلاپ ياكى كاسىن سۈيىدە نەم قىلىپ مەيدە ئۈستىگە قويۇلسا مەدەد

نى تارقىتىدۇ. قەۋزىيەت بولسا خىيار شەنبەر، تەمىرى
ھىندى، كاسىن، بىنەپشلىرىنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قا -
راپ لازىم مىقداردا قوشۇپ قاينىتىپ بېرىشكە بولىدۇ.
ئەمما رەسمى سۈرگە بېرىش ياكى قەي قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ

بەلغەمدىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى

(ۋەرەمى مەيدە بەلغەمىيە)

ئالامەتلىرى: ھارارەت ئانچە يۇقۇرى بولمايدۇ.
ئېغىزدىن شولگەي كۆپ كېلىدۇ. ئاغرىش بىر قەدەر يەڭ -
گىل، ئىششىق يۇمشاق بولىدۇ. ئاغرىق مەيدە ساھەسىدە
كۆپكەنلىك ھىس قىلىدۇ. تىل قېلىن ئاق گەز باغلايدۇ،
رەڭگى ئاقۇش (بەزىلەرنىڭ پىكرىچە قوغۇشۇن رەڭلىك)
ئۆزى بوشاڭغۇ بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن، مائىل ئۇسۇل
(105 - نۇسخە) بېرىلگەندىن كېيىن تەرياقى ئەربەئە
ياكى مەسرىدوتۇس (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاماق مىق -
دارى ئاز - ئازدىن كۈنىگە بىر قانچە قېتىم بىرىلسە
بولىدۇ. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا بېرىدىغان غىزا - نوقۇت
سۈيى، كالىئەك بەسەي، قىزىلچا سېلىپ پۇشۇرۇلغان
مىكىيان شورپىسىدىن ئىبارەت بولۇشى لازىم. تال گۈلى،
سەئدى ھىندى، ئىزخىر ۋە سۈمبۇللارنى سوقۇپ، بىر ئاز
نەم قىلىپ سىرتتىن مەيدە ئۈستىگە چېپىش لازىم. ئە -
گەر سۈمبۇل يېغى بولسا ناھايىتى ياخشى.

سەۋدادىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى (ۋەرەمى مەيدە سەۋداۋىيە)

ئالامەتلىرى: ئىششىق قاتتىق بولۇپ نەپەس قىيىنلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كوگۇل ئاينىپ، تەبىئەت دائىم تۇتۇق، ئاغرىقنىڭ رەڭگى روھى قارامتۇل بولۇپ قالىدۇ. ئەسەبى ئالامەت- لەردىن كۆپ پىكىر قىلىش، يامان خىياللارنى قىلىشقا ئوخشاش ئەھۋاللار بولۇپ، ئورۇقلايدۇ. كوز ۋە ئېغىز ئىچى قۇرغاقلىشىدۇ.

داۋاسى: مىزاجىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ماددىنى پۇشۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. مەسىلەن، مىزاجى ئىسسىق ۋە ھارارەت بولسا، ئارپا بېدىيان ۋە چىڭسەي سۇيىگە خىيار شەنبەرنى ئېزىپ، سۇزۇپ ئىچكىۈزۈلىدۇ. بىر ئاز گۈلقەن بىلەن بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. بادام يېغىدىنمۇ بىر ئاز قوشۇش كېرەك. ئەگەر ھارارەت بولمىسا ئىنەك پىتى يېغى قوشۇلغان مائىل ئۇسۇل بىلەن ماددىنى پۇشۇرغاندىن كېيىن، تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا بېرىشكە بولىدۇ (16 - نۇسخە). شۇ نەرسىگە دىققەت قىلىش لازىمكى، ماددىنى پۇشۇرماي تۇرۇپ سۈرگە بېرىش زىيانلىق. تاشقى تەرەپتىن توۋەندىكى دورىلار بىلەن ماي تەييارلاپ مەيدە ئۈستىگە سۈركەش لازىم:

شۈمشە، سۈمبۇل، زىغىر، مەنسائىلە، بابۇنە، زاراڭزا مېغىزى، مۇقىل، ئەپسەنتىن، زەپەرلەرنى سوقۇپ كالىئەك

بەسەي سۈيى، توخۇ يېغى، كالا پاقالچەك ئىلىگى ۋە كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەئدە ئۈستىگە سۈرتىلىدۇ.

ئەگەر ئىششىق ئۇزۇنغا سۇزۇلغان بولسا قۇرسى سۈمبۇل بېرىلىدۇ (106 - نۇسخە)، بەزىبىر كېسەللىكلەردە (ئاشقازان راكىدا) مەئدە چوڭىيىپ، خۇددى مونەك بار - دەك بىلىنىدۇ. بۇلارنى مەئدە يالىۇغلىنىشلىرى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىق لازىم.

مەئدەنىڭ يىرىڭلىق جاراھىتى (دۈبەيلىتۈلمەئدە)

“دۈبەيلىتۈلمەئدە” مەئدەنىڭ يىرىڭلىق خالىتىسى دېگەن مەنادا بولۇپ، ئىسسىق جاراھەتلەر قاتارىدىكى مەئدەدە ھاسىل بولغان يىرىڭلىق زەرەرلىنىشتىن ئىبارەت. بۇ “خۇراج” دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما پەيدا بولۇپ، مەئدە ئاغرىپ يىدۇ، مەئدەنى تۇتۇپ كورگەندە ئىششىق ۋە قىزىق بىلىنىدۇ. يىرىڭ پېشقاندا لوقۇلداپ ئاغرىش پەسىيىپ قالىدۇ. يىرىڭ خالىتىسى ئېغىز ئالغاندا تۇيۇقسىز بەدەن جۇغۇلىداش، تىترەش بىلەن كۈڭلى ئايىنىپ يىرىڭ ئارىلاش قۇسىدۇ ياكى قوسىغى قاتتىق ئاغرىپ ئىچ سۇرۇش بىلەن قان - يىرىڭ چىقىدۇ، ئىششىق يانىدۇ.

داۋاسى: يىرىڭ خالىتىسىنىڭ ئېغىز ئالغانلىغى مەلۇم بولسا، مەئدەنى يىرىڭ ۋە زەرداپ سۇلاردىن تازىلاش ئۈچۈن ھەسەل ياكى شېكەرنى سۇ بىلەن تەڭشەپ

ئىچىشكە بېرىش ياكى كاسىن سۈيى بىلەن ئايپارەج پەيقارا بېرىش كېرەك. غىزاسىغا ئارپا سۈيى، قاينىتىلغان كىپەك سۈيى ياكى بۇغداي ئۇمىچى بېرىلىدۇ. جاراھەت ئورنىنى يېڭى گۆش بىلەن تولدۇرۇش ئۇچۇن، كۈندۈر، ئانار گۈلى، قىزىل گۈل، كەھرىبا، گىلى ئەرمىنى، خۇنىس-ياۋشان قاتارلىقلارنى يىرىگەرەك سوقۇپ يېمىشكە بېرىلىدۇ. بۇ چارىلاردىن كېيىن غىزاسىغا سېرىق چىچەك ۋە شۈمشە بىلەن پىشۇرۇلغان مىكىيان شورپىسى بېرىلسە بولىدۇ.

ئاشقازان يارىسى (قۇرۇھى مەئدە)

ئالامەتلەرى: سىركە، قىچا قاتارلىق ئوتكۇر نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغاندا مەئدىنىڭ ئاغرىغى كۈچىيىدۇ، كوڭلى ئاينىپ قۇسىدۇ. قۇسۇق ياكى تەرەتلىرىدە قان بولىدۇ، ئېغىز قۇرۇيدۇ، كىكىرىك كۆپ بولىدۇ. يارا مەئدىنىڭ ئېغىز تەرىپىدە بولسا ئاغرىش كۆكرەك-نىڭ توش سۈڭەك ئاستىدا سېزىلىدۇ. بەزىدە پۇت-قوللىرى سوۋۇپ كېتىدۇ. ئېغىز ھاللاردا نەپەس قىيىن-لىشىش ۋە بىھۇشلۇق قاتارلىق ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ. ئەگەر يارا مەئدىنىڭ ئاستىنقى تەرەپلىرىدە بولسا ئاغرىش كىندىك ئۈستىدە بولىدۇ. غىزا سىڭىپ بولغاندىن كېيىن ئاغرىش ئېغىر بولىدۇ. ئەمما مەئدە ئېغىزغا نىسبەتەن ئاغرىش يەڭگىلەرەك. يارا ھەز ئىككىلا جايدا بولسا كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەرنىڭ ھەر ئىككىسى مەۋجۇت بولىدۇ.

ئۈچەي بىلەن مەئدە ئاستىنقى قىسمىدىكى يارد -
نىڭ پەرقى شۇكى مەئىدىدىكى يارىنىڭ ئاغرىشى
كىندىك ئۈستىدە سېزىلسە ئۈچەيدىكى يارىنىڭ ئاغرىشى
كىندىكىنىڭ تۈۋەنكى تەرىپىدە بولىدۇ.

مەئدە بىلەن قىزىل ئوڭگەچتىكى يارىلارنىڭ پەرقى
قىزىل ئوڭگەچ يارىسىدا ئاغرىش تاماق يۇتۇش بىلەن
مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. دائىم ئارقا تەرەپ ئىككى غول
(تاغاق) ئوتتۇرىسى ئاغرىيدۇ.

داۋاسى: يارىنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدا ئەگەر
مۇۋاپىق كورۇلسە قان ئېلىشنى ئويلاپ بېقىش مۇمكىن.
ئۇندىن قالسا مەئىدىنىڭ يىرىڭلىق جاراھەتلىرىدىكى چار-
لار قىلىنسا بولىدۇ. مەئدە يارىلىرىغا قېتىق مەنپەئەتلىك،
بۇنىڭغا بىر ئاز تاباشىر، قىزىل گۈل ۋە قىمقۇنىنىڭ
ئۇرۇغى قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى.

ئەگەر يارا كونا بولسا ھەسەلنى گۈلەپ بىلەن
بېرىلىدۇ ۋە قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) يېمىشكە
بېرىلىدۇ. مەئدە يارىلىرىنى داۋالاش جەريانىدا ئىچى
قېتىپ قېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم. يارا بەك كونا بول-
مىسا ئارىلاپ ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىشكە
بولىدۇ. ياكى كاسىن شىرىسى بىلەن پۇنۇس، خىيار شەنە-
بەر بېرىلگىنى ياخشى. بەزى كېسەللەردە ئىچى سۇرۇپ
كېتىش ئەھۋاللىرى كورىلىدۇ. بۇنداقلارغا قۇرسى تاباشىر
(112 - نۇسخە) شەرۋىتى زىرەشكى، بىيە سۈيى بېرىلىدۇ.

ئاشقازان كوپۇش (نەفىخە مەئدە)

ئادەتتە قوساق كوپۇش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. سەۋەپ جەھەتتىن بۇ 3 كە بولىنىدۇ:

(2) مەئدە مىزاجىنىڭ سوغاقلىق تەرەپتىن بۇزۇلۇشى: مەئدىدىكى تەبىئى ھارارەت يەنى ھارارىتى غورىزە تۈۋەنلەپ كېتىپ، غىزانىڭ ھەزىم قىلىنىشى ناچارلىشىدۇ ۋە يەل ھاسىل بولۇپ مەئدىنى كوپتۇرۇپ قويدۇ.

(1) ناچار تاماق، چالا پىشقان ياكى يەللىك تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بولۇپمۇ ھول تەبىئەتلىك نەرسىلەر (شوخلا، چەيزە قاتارلىقلار) مەئدىدە سىڭىش جەريانىدا مەئدىنىڭ زەئىپلىگىدىن يەل پەيدا قىلىدۇ ياكى ئۆزى يەللىك بولغان نەرسىلەر مەسىلەن، ماش، پۇرچاق، ئارپا ۋە قوناقلىرىنى كۆپ ئىستىمال قىلىش بىلەن مەئدىدە يەل پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كورسىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرى بولۇش بىلەن قوساق كوپىدۇ.

داۋاسى: مەئدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان كېسەللىكلەرگە كورۇلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ، ھەم لاچىن دانىنى گۈلاپتا قاينىتىپ ئىچىشكە بېرىلسە مەنپەئەتى ياخشى، دورىلارنى ھەببى تانكار (204 - نۇسخە) نىڭ ئەھمىيىتى ياخشى.

كىمكىرىش ۋە ئەسەش

كىمكىرىش تەبىئى ۋە غەيرى دەپ بۆلۈنىدۇ.

تەبىئى بولغىنى مەئدە ئىچىدە ھەزىم جەريانىدا ھاسىل بولغان يەلنىڭ ئېغىزىدىن چىقىش ئاۋازىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن مەئدىدىكى ئېغىرلىق يېنىكلىشىدۇ. غەيرى تەبىئى بولغىنى مەئدىنىڭ ھەزىمى بۇزۇلۇپ بۇ-خاراتلارنىڭ ھاسىل بولىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، كىكىرىك چىقىپ تۇرسىمۇ مەئدىنىڭ چىڭلىغى يەنىلا بولۇپ تۇرىدۇ. چۈنكى يەل مەئدىدە پەيدا بولغانلىقتىن، يەل يەنە پەيدا بولۇپ تۇرىدۇ.

ئەسنەشمۇ غەيرى تەبىئى كىكىرىشكە ئوخشاش، مەئدە ھەزىم قىلالىمىغان تاماقلاردىن ھاسىل بولغان بۇخارات، يەللەرنىڭ باش تەرەپكە ئورلىشى بىلەن كېلىپ گەدەن گوشلىرىگە تەسىر قىلىدۇ. بۇ خىلدىكى يەللەرنىڭ ئەسلى تەبىئىتى سوغاق بولغانلىقتىن مەزكۇر گوشلەردە تارتىشقان ھالەت پەيدا بولىدۇ. بۇ ھال ئېغىزنىڭ كەڭ ئېچىلىشى — ئەسنەكتىن ئىبارەت.

داۋاسى: مەئدىنىڭ ھەزىمى ناچارلاشقاندا كورسە

تىلىگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ. مەئدىنى تازىلاش ۋە ھەزىمەتنى ياخشىلاشقا چارە قىلىنىدۇ. بېدىياننى يۇمشاق سوقۇپ گۈلگەن بىلەن بېرىلىدۇ. جۇۋىنىنى ھەسەل ياكى سىركە بىلەن يېمىشكە بېرىشنىڭ مەنپەئەتى چوڭ. ئەھۋالغا قاراپ ئىپار، مەستىكى، ئەپسەنتىن، سۇمبۇل، رۇمبېدىيان، ئىز-خىر، كەرەپشى ئۇرۇغى، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، كۈندۈر، تاغ زىرىسى، پىلىپىل، سامساقلارنى قاينىتىپ، بىر ئاز شېكەر سېلىپ سۈيىنى بېرىلىدۇ.

قۇسۇش (قەي) ۋە كوڭۇل ئاينىش (غەشيان)

قۇسۇش بىلەن كوڭۇل ئاينىش (ھو تۇتۇش) مەئدەنىڭ ھەركىتى بولۇپ، ئۇلار ئادەتتە بىللە كېلىدۇ (بەزىدە بىللە بولمايدىغان ئەھۋاللارمۇ بولۇپ تۇرىدۇ). بۇلار مەئدەنىڭ چىقىرىپ تاشلاش پائالىيىتى (ھەركىتى داپمەسى) دىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل پائالىيەت كۈچلۈك بولغاندا ماددە ھەركەتكە كېلىپ (قوزغۇلۇپ) قۇسۇش كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر ھەركەت كۈچسىز بولسا ماددە قوزغالماي قۇرۇق ھو تۇتىدۇ، نەپەس ئېلىشمۇ تېزلىشىدۇ ۋە بىماراملىق ھىس قىلىنىدۇ.

ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى: ماددە مەئدە ئۆزىدە بولغاندا كوڭۇل ئاينىش بىلەن قۇسۇش بىللە كېلىدۇ. ئەگەر باشقا ئەزالاردىن كەلگەن بولسا ھو بولمايدۇ. خىلىت ماددىسى سەپرا بولسا قۇسۇق بىلەن سېرىق سۇ (سەپرا) بىللە كېلىدۇ. بۇنداقتا ئىسكەنجىبىن بىلەن قايناقسۇ بېرىلىدۇ. ئەگەر قۇسۇقتا سەپرا بولمىسا سۈرگىلەردىن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)، سېرىق ھېلىلە سۈيى سوقمونىيا بىلەن بېرىلىدۇ. ئامىلە، تەمرى ھىندى، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ۋە تاباشىرلارنى بىللە قوشۇپ ياكى يالغۇزدىن بېرىلىدۇ. ماددىسى بەلغەم بولسا، قۇسۇق بىلەن ئاق بەلغەمدەك شىلىملىقلار چۈشىدۇ. بۇنىڭغا سېرىق چىچەك قايناتقان سۇغا ھەسەل بىلەن تەييارلانغان ئىسكەنجىبىن بېرىلىدۇ. بۇ مەنپەئەت قىلىمسا،

تۇرۇپ ئۇرغى ۋە قىچا قوشۇپ بېرىلىدۇ. مەئىدىنى قۇۋۋەت
لەندۈرۈش ئۈچۈن، ئۇدى ھىندى، قەلەمپۇر مەستىكى،
پىننەنىڭ ھەر بىرىنى 2 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق
سوقۇپ كۈندە ئىككى قېتىم بىر مىسقىلىغا بىر سەر گۈل
قەن قوشۇپ يىگۈزىلىدۇ، يەنە زەنجىۋىل ياكى ھېلىلە
مۇرابباسى بېرىلىدۇ. سەۋاددىن بولغاندا قۇسۇق ئاچچىق
ۋە بەك چۈچمەل تەملىك بولىدۇ. ھەتتا مۇنداق قۇسۇق
لارغا چىۋىنىمۇ قونمايدۇ. بۇنىڭغىمۇ يۇقۇرىدىكى چارلار
قىلىنىدۇ. جەۋارش ئۇد، جەۋارش مەستىكى، داۋائىلىشكى
شىرىن (22، 93، 92 - نۇسخە) دىن بىرىنى بېرىش مۇم
كىن. مەئىدە تېگىدىكى بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن توۋەن
دىكى ھەب تەييارلاپ بېرىلىدۇ. ئايارەنج پەيقارا 6 مىس
قال، پىننە، جويۇز، رۇمبىدىيان، جۇۋىنە، قەرەدمانە،
قەلەمپۇر 1 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە، سېرىق ھېلىلە،
قۇرسى گۈل، مەستىكى، نەمكى ھىندى 3 مىسقالدىن،
تۇربۇت 7 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ پىننە سۈيى بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇغىدا ھەب
قىلىنىدۇ. سايىدا قۇرۇتۇپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

كۈنىگە 1 - $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن بېرىلىدۇ ياكى قۇرسى

ئىلاۋىس (107 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

ئەگەر ماددا مەئىدىنىڭ ئۆزىدە بولماي بەلكى باشقا
ئەزادىن كەلگەن بولسا، ئانداقتا شۇ ئەزانى ماددىدىن

تازىلاش لازىم. بۇنداق ئەھۋال كۆپىنچە تەپ (كېزىك) ئاغرىقلىرىدا ئۇچرايدۇ. كېزىكنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا قاراپ ساقىيىدۇ ياكى ئېغىرلىشىدۇ. ئۇلارغا شەرتىي نىلۇپەر (75 - نۇسخە) پايدىلىق. كىندىك ئەتراپىغا ياكى ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا تىلماستىن ھىجامەت قويۇش، پۇت - قوللارنى مۇجۇپ تۇتۇش ۋە ئۇيىقا كەلتۈرۈشكە چارە قىلىش لازىم.

قۇسۇش ياكى كوڭلى ئاينىش، بۇزۇلغان تاماقلار - نى يېيىشتىن بولسا قۇستۇرۇش ياكى سۈرگە بېرىش چارە - لىرى بىلەن مەئىدىنى تازىلاش كىپايە قىلىدۇ. ئەگەر مەئىدە زەيىپ بولسا كورسىتىپ ئوتۇلگەن مەئىدىنى قۇۋەتلەندۈرگۈ - چى دورىلاردىن بىرىنى تاللاپ بېرىش لازىم. بەزىدە مەدە قۇرۇتلارمۇ كوڭۇل ئاينىش ۋە قوسۇشقا سەۋەبچى بولىشى مۇمكىن. بۇنداقلارنىڭ چوڭ تەرىتى بىلەن مەدەلىرىنىڭ چىقىشى، قۇسۇش ۋە كوڭۇل ئاينىشلار بىللە كېلىدۇ. بۇ خىلدىكىسى مەدەنى يوقىتىش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

قان قۇسۇش (قەي دەمەۋى)

سەۋەبى: (1) مەئىدە قانتومۇرلىرىنىڭ شىكەستىلىنى - شىدىن كۆپ مىقداردىكى قان (تومۇر ئېغىزى ئېچىلىپ قال - غانلىقتىن) مەئىدە ئىچىگە توپلىشىپ قالىدۇ. مەئىدىنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنىڭ تەسىرى ئاستىدا قۇسۇش يولى بىلەن سىرتقا چىقىرىلىدۇ (مەئىدە تومۇرلىرىنىڭ شىكەستىلىنىشى يىقىلىش ياكى سىرتقى زەربە؛ مەئىدە

ئىچىدىكى يارىلارنىڭ ئېچىلىپ قېلىشى؛ تومۇرلاردا تۈ-
تۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى؛ تومۇردا ماددىلارنىڭ
كەيپىيىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. (2) تال ياكى
جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى. (3) قىزىل ئوڭگەچ تومۇرلىرى-
نىڭ يۇقۇرقىدەك سەۋەپلەر بىلەن شىكەستلىنىشىدىن
ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرىنىڭ
بولۇشى بىلەن كېسەل كىشى ھەر خىل مىقدارلاردا قان
قۇسىدۇ.

داۋاسى: قان تولۇپ كېتىش سەۋەبىدىن قان
قۇسقاندا كېسەلنىڭ قول - پۇتلىرىنى چىڭ تېگىش ۋە
پاقالچەك قىسمىغا ھىجامەت قويۇش كېرەك. ئىچىشكە بىيە
سۈيىگە بىر ئازدىن ئانار گۈلى، كۈندۈر، ئاق سەندەل،
ئەرەپ يىلىمى، گىل ئەرمىنى قاتارلىقلارنى قوشۇپ بى-
رىلىدۇ. ئەگەر زەرەرلىنىش قىزىل ئوڭگەچتە بولسا يۇ-
قۇرىدىكى دورىلارنى ئالدىرىماستىن، ئاستا - ئاستا يۇتۇپ
بېرىش كېرەك. سېمىز ئوت ۋە پاقا يوپۇرماق سۈيى ياكى
قۇرسى كۈھلىي (108 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاشقى زەربە
ياكى يىقىلىشلار بىلەن قان قوسۇش بولسا ئىچكى
تەرەپتىن يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن دورىلار بېرىلگەندىن
تاشقىرى، ماش، مۇغاس، ئاقاقىيا، گىلى ئەرمىنى، سەبرە،
مۇرمەككىلەرنى سوقۇپ، ھەبىل ئاس سۈيى بىلەن قو-
شۇپ جاراھەت ئۈستىگە (كۆكەرگەن، ئىششىغان ياكى
باشقا ئىز قالغان جايغا) قويۇش لازىم.

مەئدە جاراھەتلىرىنىڭ قانىشى ياكى جىگەر، تال سەۋبىدىن بولغان قان قوشۇشلارغا، ئەسلى سەۋبىنى يوقىتىش بىلەن تۈۋەندىكى نۇسخىلاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.

(1) موزا، ئانارگۈلى 2 مىسقالدىن، ئەپيۇندىن بىر ئارپا مىقدارى ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ گازىۋان، باد-رەنجىبۇيا سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، قۇرس تەييارلاپ كۈندە ئەتىگەن ئاشتىدا بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

(2) بەزىلەر تال (ئۇزۇم) يوپۇرمىغىنى سىقىپ سۈيى ئىچىرىلسە قان قۇسقانغا پايدىسى ياخشى دەپ كۆرسىتىدۇ.

(3) قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە)

(4) كۈھلى (سۈرمە) قۇرسى (108 - نۇسخە) نى كۈنىگە بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

قان بۇرۇن ياكى باش تەرەپتىن چۇشۇپ مەئدە ئىچىدە يىغىلىپ كۆڭۈل ئاينىش بىلەن قوشۇپ چىقىرىلىشى مۇمكىن. مۇنداق چاغلاردا دىققەت بىلەن قاراپ، ئىلگىرى بۇرۇن قاناش ئەھۋاللىرىنىڭ بار-يوقلۇغىنى ئوبدان سۇرۇشتۇرۇش لازىم. بۇرۇن ئىچىدىكى قانلىق قەقەشلەر ياكى قاتتىق باش ئاغرىش بىلەن مېڭە غىدىقلىنىش ئالامەتلىرىنىڭ بولىشى، ئەمما مەئدىنىڭ ساغلام بولىشى بۇنىڭغا دىلىل بولالايدۇ. مۇنداق ھاللاردا سەۋەپ ئېنىق بولغاندىن كېيىن، باش كېسەللىكلىرى قىسمىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

ھىق تۇتۇش (پەۋاق)

ھىق تۇتۇش مەئدە گۆشلىرىنىڭ تارتىشىشى ۋە قېتىپ قېلىشى نەتىجىسىدىكى مۇرەككەپ ھەركەتتىن ئىبارەت. بۇ مەئدە ئېغىزىدا ۋە پۈتۈن مەئدە قىسمىدا يۈز بېرىدۇ. بەزىدە قىزىل ئۆگىگەچتىمۇ يۈز بېرىشى مۇمكىن. **ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى: (1)** مەئدە كۆپ مىقدار -

دىكى غەلىز تاماقلارنى كۈتسەرلەمەي، ھەركىتى مۇرەككەپ - لىشىپ، مەئدە ساھىبىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. مەئدە بۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھەركەت قىلىپ ھىق كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق ھاللاردا ئالدى بىلەن سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، تۇرۇپ ئۇرۇغى، تۇز ۋە ئىسكەنجىۋىل ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇپ مەئدىنى بوشىتىش كېرەك. ۋە مەئدىنى قۇۋ - ۋەتلىنىدۇرىدىغان دورىلار بېرىش، ئاسان ھەزىم بولىدىغان تاماقلارنى بۇيرۇش لازىم.

(2) مەئدە زەئىپلىكى تۈپەيلىدىن، يەللىك تاماق - لار يىيىش بىلەن مەئدە ۋە قىزىل ئۆگىگەچتە قويۇق يەل پەيدا بولىدۇ. بۇ يەلنىڭ چىقىش ئۈچۈن قىلغان ھەركەت - تىدە مەغلۇپ بولۇشى ھىق بولۇپ چىقىدۇ. مۇنداق ئاغ - رىقلاردا بۇرۇن مەئدە ئاجىزلىق ئالامەتلىرى بار بولىدۇ. بۇ كۆپىنچە بوۋاقلاردا ئۇچرايدۇ. زىرە، مەستىكى ۋە پىننەنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ ئېغىز ئىچىدە ئوبدان چايناپ تۇرۇپ ھاسىل بولغان سۇيۇقلۇق يۇتىلىدۇ. زەنجىۋىلنى شۇمۇش كىكەرتىپ، ھىقنى ساقايتىدۇ.

(3) ئۆتكۈر تەسىرلىك دورىلارنى (مەسىلەن، مەجۇ-نى پىلىپىل) ئىستىمال قىلىش نەتىجىسىدە مەئىدە ئۆت-كۈر غىدىقلىنىش يۈز بېرىپ ئاق، سېرىق ياكى قارام-تۇل كۆك رەڭدە قۇسىدۇ، ئىسكەنجىپىن بىلەن كۆپ ھىق داردا ئىلمان سۇ ئىچكۈرۈپ قۇستۇرۇش لازىم. مەئىدە-كى ئېچىشنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئىسپوغۇل لۇئابى، بىيە-لۇئابى بېرىلىدۇ. ئىچىشكە سۇت ۋە بادام يېغى قوشۇل-غان قايناقسۇ بېرىش لازىم.

(4) مەئىدە ئېغىزنى بەلغەم ماددىلارنىڭ توسىۋې-لىشى تۈپەيلىدىن ھەزىم بۇزۇلۇپ، چۈچمەل كىكىرىش ۋە ئېغىزدىن سۈكلىش قاتارلىق ئالامەتلەردىن كېيىن ھىق تۇتىدۇ. بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا بېرىش كېرەك. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا چۈشكۈرتكۈچى دورىلار ياخشى تەسىر قىلىدۇ.

(5) مەئىدە مىزاجىنىڭ سوۋۇپ كېتىشىدىن ھىق تۇتۇشى مۇمكىن. بۇنداقتا ئۇسسۇزلۇقنىڭ كەملىكى، ئىس-سىق نەرسىلەرنى خالاش، مەئىدەنىڭ زەئىپلىكى بولىدۇ. مەئىدەنى قىزىتىش ئۈچۈن چىڭسەي ئۇرۇغى، ياۋا سەۋزە ئۇرۇغى، زىرە، رۇمبىدىيان، زەنجىۋىل، پىننە، قۇندۇزقەرى، ياۋا پىياز قاتارلىقلارنى لازىم مىقداردا ئېلىپ ئىستىمال قىلىشقا بېرىلىدۇ.

ئاشقازاننىڭ يۆتكىلىشى (مۇتقەلىبى مەئىدە)

ئاشقازاننىڭ ئەسلىدىكى ئورنىدىن يۆتكىلىشى كو-

پىنچە ئۇنىڭ تەرۋەنگە چۇشۇشى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. بەزىدە يۇقۇرىغا تارتىلىشىمۇ مۇمكىن بۇ كرىپىنچە بويى ئىگىز، تېنى ئىنچىكە ئادەملەردە ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: تاماقنى يەپ بولغاندىن كېيىن، ھەزىم بولغان تاماقنى قۇسۇپ تاشلايدۇ. مەئدە ئېغىر ۋە ئىچىشىپ تۇرىدۇ. ئۇچەي توسىلىش (ئىلاۋۇس) نىڭ پەرقى شۇكى، ئۇچەي توسۇلغاندا تەرەت ماددىسى قەي بىلەن ئېغىز ئارقىلىق چىقىدۇ. ئەمما ئاشقازان يوتكەلگەندە تولۇق ھەزىم بولۇش ئالدىدىكى تاماق چىقىدۇ ۋە كىندىك ئەتراپلىرىدا داغرىق سېزىدۇ.

داۋامى: ھەزىمنى ياخشىلاش چارىلىرى قىلىنىدۇ. ۋە ئېچىشىشنى پەسەيتىش ئۈچۈن مېغىزلىق نەرسىلەرنى بېرىش كېرەك. باشقا دورىلاردىن ئۇچەي كېسەللىكلىرىدە سوزلەنگەن چارىلار قىلىنىشى مۇمكىن.

مەئدەنىڭ ئېچىشىشى

پىتىر نان، خام يېمىشلەرنى يېيىش بىلەن مەئدەدە خام سۇيۇقلۇق توختاپ قېلىپ، مەئدەنىڭ قىزىتىشى بىلەن چۈچمەل تەمگە كىرىپ قالىدۇ. بۇ چۈچمەل سۇيۇقلۇق مەئدە ئېغىزىنى ئېچىشتۈرۈپ كويگەندەك سېزىلىدۇ. سەۋدانىڭ كوپلىگىدىن بولسا ئېچىشىش ۋە كويۇش ئېغىر بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەئدە ئېچىشىپ كويگەندەك سېزىلىدۇ ۋە بۇنداق ئالامەتلەر قوساق ئاچقاندا يەڭگىلەپ

قالىدۇ. سەۋدادىن بولغان بولسا، مايلىق نەرسىلەرنى يى-
گەندە يېنىكلىشىدۇ.

داۋاسى: دورىلار بىلەن قەي قىلىدۇرۇش كېرەك.
ئۇندىن كېيىن ئىسكەنجىبىن بۇزۇرى (100 - نۇسخە) بې-
رىپ ھېلىلە ياكى ئامىلە مۇرابباسى بېرىلىدۇ.

مەئدە بوشىشىپ كېتەش

بۇ كېسەل پەيدا بولۇش سەۋەپلىرىگە قاراپ تو-
ۋەندىكىچە 2 خىل بولىدۇ:

(1) مەئدەگە كۆپ مىقداردىكى ھوللۇكنىڭ تەسىر
قىلىشى بىلەن مەئدەنىڭ پۈتۈن گەۋدىسى بوشىشىپ
كېتىدۇ. بۇنداق ھاللاردا ھەزىم بۇزۇلىدۇ، شۇنىڭدەك
ئاغرىقنىڭ كۆكرەك قىسمى ئالدىغا چىقىپ قالغان قىيا-
پەتتە بولىدۇ.

(2) مەئدەنى قوساق بوشلۇغىدا ھەر تەرەپكە تار-
تىپ تۇرغان تارمۇشلار بولۇپ، ئۇلار باغلىغۇچىلار
(رىباتلار) دەپ ئاتىلىدۇ. شۇنىڭ بىرىگە ھوللۇكنىڭ
تەسىر قىلىشى ياكى مىڭە-يۇلۇندىن پەيلەرگە كەلگۈچى
ئەسەپلەرنىڭ زەرەرلىنىشى ئارقىسىدا بۇلاردا بوشىشىپ
كېتىش ھادىسىسى كېلىپ چىقىدۇ. نەتىجىدە مەئدەنىڭ
قايسى تەرەپتىكى تارمۇشى زەرەرلەنگەن بولسا مەئدە
شۇ تەرەپكە ساڭگىلاپ قالىدۇ. ئاغرىققا شۇ تەرەپ
قوساق قىسمى ئېغىرلاشقاندا كىيىلىدۇ. مەسىلەن، ئال-
دى تەرەپكە ساڭگىلاپ كەتسە، كىيىندىك قىسمىدا ئېغىر-

لىق سېزىلىدۇ. ئارقا تەرەپكە چۇشۇپ كەتسە قوساق ئاستىنقى قىسمىدا ئېغىرلىق بىلىنىدۇ.

داۋاسى: بۇ ئىچكى ئەزالار پالچى ھىساپلان-
غانلىقتىن مىڭە كېسەللىكلىرى بابىدىكى ئىستىرخا كې-
سىلىدە كورسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. يەڭگىل ۋە ئا-
سان سىڭىدىغان غىزالارغا خۇشپۇراق دورىلارنى قوشۇپ
بېرىش لازىم.

(3) مەئدە گوشلىرىنىڭ ئىستىرخاسى: قاتتىق
قۇسۇش ۋە ھەرخىل سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن
مەئدىنىڭ زور دەرىجىدە زەرەرلىنىشى بىلەن كېلىپ
چىقىدۇ. بۇ مەئدە كېسەللىكلىرى ئىچىدە ئەڭ يامان
بىر كېسەلدىن ئىبارەت، ھەرقانچە ياخشى سىڭىدىغان
تاماملار بولسىمۇ ھەزىم بولمايدۇ. مەئدىنىڭ ھەزىم
قابىلىيىتى يوقىلىدۇ. ئارقا تەرەت دائىم قاتتىق كېلىدۇ.
ئەمما مەئدىدە ھېچقاندا ياللۇغلىنىش بولمايدۇ. ئاغرىق
كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلايدۇ. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا
جەۋارىش ئۇد، ئىترىپىل كەبىر (1 -، 93 - نۇسخىلار)
بېرىلىدۇ، مەئدە ئۈستىگە مەستىكى يېغى سۈركەپ تۇرۇ-
لىدۇ. غىزاسىغا كەكلىك، قىرغاۋۇل قاتارلىق ياۋا قۇش-
لار گوشى بېرىلىدۇ.

ئاشقازاننىڭ تارتىشىپ قېلىشى (تەشەننۇجى مەئدە)

قان تولۇش ياكى سۈرگە ئىچكۈزۈش نەتىجىسىدە
ۋە ئەسەپلەرنىڭ زەرەرلىنىشى تۈپەيلىدىن ئاشقازان

گوشى تارتىشىپ قالىدۇ. ئەگەر تارتىشىش مەئدە پەي-
لىرىدە بولسا، يىگەن تاماق ھەزىم بولماستىن تۇرۇپ
چىقىپ كېتىدۇ. مەئدە تارتىشىپ قالغانلىقتىن كېسەل
كشى ئالدىغا ئىگىلىپ قالىدۇ، ئاغرىش قاتتىق ئازاپلايدۇ.
داۋاسى: مىگە كېسەللىكلەرى بايانىدىكى تار-
تىشىش (تەشەننۇج) دە كورسەتىلگەن چارلار قىلىنىدۇ.
قۇرۇق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش بىلەن ئىچ سۇرۇش-
نىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم.
چۈنكى بۇ خىل ئەھۋاللار تارتىشىشنى كۈچلەندۈرۈپ
قويىدۇ.

مەئدەنىڭ قېتىپ قېلىشى

مەئدە ياللۇغلىرىدىن كېيىن، قويۇق سەۋدا خىلىتى
مەئدەنىڭ كىچىك پەي يىپىچىلىرىگە چۈشىدۇ. كۆپىنچە
مەئدە ئېغىز قىسمىدا ئۇچرايدۇ، بەزىدە ئومۇمى قىسمى-
دىمۇ بولىشى مۇمكىن. بۇ ھال مەئدەدە بىر خىل قې-
تىپ قېلىش پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىزدىن كۆپۈكتەك سۇ كېلىپ
تۇرىدۇ. ئاغرىق دۇم ياتالمايدۇ. يەرگە قاراپ ئىگىش-
كەندە مەئدەسى قاتتىق ئاغرىيدۇ، بىر لوقما تاماق يە-
سىمۇ ئاغرىيدۇ. ئاغرىق ئېغىر ياكى يەڭگىل بولىشى
زەرەرلىنىشنىڭ دەرىجىسىگە باغلىق. تاشقى تەرەپتىن
تۇتۇپ كورسە قاتتىقلىق ئېنىق بىلىنىدۇ.

داۋاسى: گوش بېرىش مەنىى قىلىنىدۇ. سۇي-

دۇك قىزىل ياكى سېرىق بولسا باسلىق توھۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. ئاق موم، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغىنى بىرلەشتۈرۈپ مەئدە ئۇستىگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر سۇيۇك ئاق بولۇپ، بەدەندە ھارارەت بولمىسا، بابونە، سۈمبۇل، بىنەپشە، ئىزخىر، شۇمشە، مۇقىل ۋە ئاچچىق بادام قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ، توخۇ يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ماي تەييارلاپ، مەئدە ئۇستى ياغلىنىدۇ. ئۇندىن باشقا قويۇق خىلىتنى تارقاتقۇچى چارلار قىلىنىدۇ.

مەئدە سەۋەپلىك ئىچ سۇرۇش (زەرەپ)

بۇ خىل كېسەلدە تاماق ماددىلىرى ھەزىم بولۇش ئالدىدا بەدەنگە تارقالماستىن، بەلكى ئىچ سۇرۇش بىلەن چىقىپ كېتىدۇ. بەزى تەۋىپلەر بۇ كېسەلنى مەي-دىنىڭ ئىسھالى دەپ ئاتىغان. يىگەن نەرسىلەر مەئىدە ئۇزۇن تۇرماستىنلا تەرەت بىلەن چىقىپ كېتىدۇ. كۈ-نىگە نەچچە قېتىم تاماق يىگەن بولسا شۇنچە قېتىم ئىچى سۇرىدۇ. بۇ كېسەل سەۋەپلىرىگە قاراپ تۆۋەندى-كىچە بىر قانچە تۈرلەرگە بولىنىدۇ:

(1) مەئىدىنىڭ ماددىسىز ھىزاجى بۇزۇلۇش ياكى ماددى سەۋەپلىرىدىن زەرەرلىنىشى: بۇنىڭدا مەئدە ھىزا-جىنىڭ بۇزۇلۇشى دېگەن پەسىلدە كىرىستىلىگەن ئالامەت-لەردىن باشقا ئىچ سۇرۇشمۇ بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىسىز بولغان تۈرىدە مەئىدە-نى قىزىتىش ۋە نەملىكتىن قۇرۇتۇش تەدبىرلىرى كۈ-

رۇلۇپ مەجۇنى جاۋارش كۇمۇنى، جەۋارش ئۇد ۋە مەجۇنى پىلىپىل (49 - 92 - 93 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.

(2) ماددى سەۋەپتىن بولغان تۇرىدە: ئەگەر بەلغەمدىن بولسا (كېسەلنىڭ چىرايى ئاق بولىدۇ، ئېغىزىدىن سۇ ئاقىدۇ ۋە باشقا ئالامەتلەر بولىدۇ)، ئالدى بىلەن بىر نەچچە قېتىم كورسىتىپ ئوتۇلگەن چارىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇش، ئۇندىن كېيىن جەۋارش كۇندۇر، جەۋارش جالىنۇس، جەۋارش خەرنۇپ (3 - 109 - 110 - نۇسخە) لەردىن بىرى بېرىلىدۇ. سەپرادىن بولسا كۆپىنچە تەپ كېسەللىكلىرىدىن كېيىن ياكى 2 - 3 كۈنلۈك بەز - گەكتىن كېيىن يۇقۇرقىدەك ئىچ سۇرۇش ئالامەتلىرى كۆرىنىدۇ. بەك ئىسسىقلىق تاماقلارنى يېمىش ياكى ھا - راقنى كۆپ ئىچىش بىلەنمۇ كېلىپ چىقىدۇ. كېسەلدە ھارارەت ۋە تەرەتتە سەپرا بولىدۇ.

داۋاسى: ئانار شەرۋىتى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. لازىم مىقداردا سېرىق ھېلىلىنى شېكەر بىلەن سوقۇپ بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2) مەئدە يارىسى ۋە تۇرلۇك مەئدە جاراھەتلىرى سەۋىبىدىن پەيدا بولىشى: كېسەلدە يارىنىڭ ئالامەتلىرى بىلەن (مەئدە يارىسىغا قاراڭ) ئىچى سۇرۇش بولىدۇ. غىزا يېمىش بىلەن قوساق ساھىسىدە (ئۇچەيدە) تولغا - مىمان ئاغرىش ۋە ئېچىشش يۈز بېرىپ، ئىچى سۇرۇپ كېتىدۇ، بەزىدە قۇسىدۇ، ھارارەتمۇ بولىدۇ.

داۋاسى: زەپەرسىز قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە)،
ھەبۇلئاس شەرۋىتى بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ.
(3) نەزلە سەۋىيىدىن پەيدا بولغىنى: بۇ مىڭدىن
بولغان ئىچ سۇرۇش (ئىسھال دىماغى) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
نەزلىدىن كېيىن ياكى نەزلە بىلەن ئاغرىغان كېسەلدە
مىڭدە ھاسىل بولغان نەزلىنىڭ سۇيۇقلۇق ماددىسى
يۇتقۇنچاققا چۇشۇپ، بۇ يەردىن مەئىدگە كېلىپ مەد-
دىنىڭ ھەزىم قىلىش پائالىيىتىنى بۇزۇپ ئىسھال پەيدا
قىلىدۇ. بۇنىڭدىكى مۇھىم ئالامەت ئاغرىشتىن بۇرۇن
قاتتىق زۇكام بىلەن ئاغرىغانلىق ۋە باشنى ئىگىز قو-
يۇپ ئۇخلىغاندىن كېيىن ئىچى سۇرۇپ كەتكەنلىك
تارىخى بولىدۇ (باشقا ئالامەتلەر ئۈچۈن زۇكام كې-
سىلىگە قاراڭ).

داۋاسى: بۇ خىلدىكى ئاغرىقلاردا ئىچ سۇرۇشنى
توختىتىش چارىلىرى پايدىسىز. ئالدى بىلەن نەزلىنى
توختىتىشقا تەدبىر قىلىش لازىم. مىڭنى ماددىدىن
تازىلاش ۋە قۇۋۋەتلەندۈرۈش كېرەك. ئانار گۈلى، كەتىرا،
سەمى ئەرەبى، رۇبى سۇس، زەپەر، ئوسارەيى سارەيى لەھىيە-
تۇتىمىسلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، شەرۋىتى خەشخاش
بىلەن بېرىلىدۇ ياكى بۇ قۇرس بېرىلسە نەزلىنى توختىتىدۇ:
قىزىل گۈل، سەمى ئەرەبى، خەشخاش، رۇبى
سۇس، ئىشاستە، كەتىرا، زەپەر، ئۇسۇڭ ئۇرۇغىنى ئىھ-
ۋالغا قاراپ ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ بىر ئاز سۇ بىلەن
خېمىر قىلىپ قۇرس تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە بىر مىسقال-

ددن يالغۇز ئۆزىنى ياكى شەرۋىتى زۇپا بىلەن بىللە
بېرىلىدۇ. نەزلە ساقايسا ئىچى توختايدۇ.

ۋابا (ھەيزە ۋابائى)

قاتتىق قۇسۇش ۋە ئىچ سۇرۇش بىلەن ئوتىدىغان
ئېغىر كېسەللىك بولۇپ يۇقۇملۇق كېسەل (ئەمرازى
سارىئە) لەردىن بىرى ھىساپلىنىدۇ.

سەۋىبى: ئۇفۇنەت سەۋىبىدىن پۇتۇن بەدەندىكى
ماددىلاردا بۇزۇلۇش يۈز بېرىپ پۇتۇن بەدەندىكى ئەزا-
لاردىن بۇزۇلغان ماددىلار مەئىدىگە قۇيۇلىدۇ. بەدەن
ئۆزىنىڭ چىقىرىپ تاشلىغۇچى قۇۋۋىتى (قۇۋۋەتى داپىەسى)
ئارقىلىق قەي قىلىش ۋە ئىچ سۇرۇش يولى بىلەن
ئۇنداق ماددىلارنى سىرتقا چىقىرىپ تاشلاشقا مەجبۇر
بولىدۇ.

بۇ كېسەل كۆپىنچە ياز كۈنلىرى ئۇچراپ، تېز
باشلىنىدىغان ۋە خەۋپ خەتتىكى كۆپرەك كېسەللىكدۇر.
كېسەلگە سەۋەپچى ماددىلارنىڭ تۈرىگە قاراپ،
ئۇ ھەقىقى ۋابا؛ سىپرانىڭ بۇزۇلىشىدىن بولغان ھەيزە؛
بەلغەمدىن بولغان ھەيزە ۋە بۇزۇلغان تاماقلارنى يېمىش
ئېغىر دەرىجىدە ھەزىم بۇزۇلۇشتىن بولغان ھەيزە دىگەن
تۈرلەرگە بۆلىنىپ، بىر قانچە ئورتاق ئالامەتلەردىن
تاشقىرى، ھەر قايسىسىدا ئۆزىگە خاس ئالامەت-
لەرمۇ كۆرۈلىدۇ.

ئالامەتلىرى:

1. ھەقىقىي ۋابانىڭ ئالامەتلىرى: ئاغرىق جىددى باشلىنىدۇ، جىددى قۇسۇش ۋە ئىچ سۇرۇش يۈز بېرىپ، كېسەل بىردەم-بىردەمدە قۇسۇپ، ئىچى سۇرۇپ تېز كۈندە ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ. تومۇر بىلگى بولمايدىغان دەرىجىگە چۈشۈپ قالىدۇ، تارتىشىش يۈز بېرىپ، پۈتۈن ئەزالىرى سوۋۇپ كېتىدۇ، بىوينىمۇ قېتىپ قالىدۇ. ئۇسۇزلۇق كۈچلۈك بولۇپ، ئېغىز ئىچى قۇرغاقلىشىدۇ، بۇرنى ئۇچلۇقلىنىپ، كوزى ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ، بەدەن قۇرۇپ، ئوزى ھۇشسىزلىنىپ ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ كېسەل گەرچە ئاشۇنداق دەھشەتلىك ئاغرىق بولسىمۇ، لېكىن ۋاقتىدا كوڭۇل قويۇپ داۋالسا ساقايتىۋېلىش مۇمكىن.

2. سەپرادىن بولغان ھەيزە كېسىلىدە يۇقۇرقە-لاردىن تاشقىرى، قۇسۇق ۋە تەرەتتە سەپرا ئارىلاشقان بولىدۇ، يەنى سېرىق سۇيۇقلۇق، چۈچۈمەل ياكى ئاچچىق تەملىك كېلىدۇ. كوڭۇل ئايىنىش بىلەن مەئدە ئۇچەي-مەردە ئېچىشىش بىللە كېلىدۇ.

3. بەلغەمدىن بولغان ھەيزە كېسىلىدە قۇسۇق ۋە تەرەتنىڭ رەڭگى ئاق (بەلغەم رەڭدە) كېلىدۇ، ئاق، شىلىمىش ئەرسلەر بولۇپ، ئېچىشىش ۋە كوڭۇل ئې-لىشىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

4. بۇزۇلغان يىمەكلىكلەرنى يىيىش بىلەن مەئدە

بۇزۇلۇشتىن بولغان ھەيزىدە، قۇسۇش ۋە ئىچ سۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا كىندىك ئەتراپىدا قاتتىق ئاغرىش ۋە تولغاق بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. قۇسۇش ئىچ سۇرۇشتىن جىقراق بولىدۇ، ئەسەبىي (نېرۋىلىك) ئالامەتلىرى روشەن كۆرىنىدۇ. بەزىلەردە بۇ كېسەل بىلەن ئاغرىشتىن بۇرۇن تاماق ھەزىم قىلىش بۇزۇلغانلىق ئالامەتلىرى (قوساق كۆپۈش، تاماق سىڭمەسلىكلەر) بولۇشى مۇمكىن. بۇ خىلدىكى ھەيزە بىر قازاندىن ئۇخشاش تاماقنى بىللە يىگەن بىر قانچە كىشى بىر ۋاقىتتا ئاغرىشتەك ئالاھىدىلىكلىرىگىمۇ ئىگە.

داۋاسى: (1) ماددىلارنى مەئىدىدىن تولۇق چىقىرىش ئۈچۈن كۆپ مىقداردا ئىسكەنجىبىن ۋە ئىسسىق سۇ بېرىش كېرەك.

(2) قۇسۇشنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئانار شەرۋىتى، لىمون شەرۋىتى ياكى پىننە قوشۇلغان ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تەمىرى ھىندى شەرۋىتى بېرىلىشىمۇ مۇمكىن.

(3) ئۇسسۇزلۇقنىڭ جىددىلىگىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئانار شەرۋىتىگە تاباشىر قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(4) ئىچ سۇرۇشكە قارىغاندا قۇسۇش كۈچلۈك بولسا، تەمىرى ھىندى سۈيى ياكى كاسىن سۈيىگە بىر ئاز مەھمۇدە قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن بىيە ۋە ئالما سۈيىگە ھەببۇل ئاس قوشۇپ بېرىش، سەندەل، ئانار گۈلى، قىزىل گۈل، بىيە بىر

ئاز كاپۇر، قومۇش يىلتىزىنىڭ كويدۇرۇلگەن كۇلا رەنى
سىركە بىلەن قوشۇپ، قوساق ئۈستىگە قويۇا-دۇ ياكى
لاتىنى گۇلاپقا چىلاپ قوساق ئۈستىگە يېپىپ قويۇلسۇن.
پۇت-قوللىرى سوۋۇپ كەتكەندە گىلى ئەرمىنىنى سىركە
بىلەن سۇرۇپ قول-پۇتلىرىغا سۇرتۇپ ئىسسىق يۈگەش
كېرەك. بۇلار بىلەنمۇ قۇسۇش ياكى ئىچ سۇرۇش توخ-
تىمىسا مەئدە ئۈستىگە ئوتلۇق ھىجامەت قويۇش بىلەن
خەشخاش سۈيىگە نىشاستە قوشۇپ ھوقنە قىلىش لازىم.

(5) ھۇشىدىن كەتكەندە قول-پۇت، باش ۋە
قۇلاقلىرىنى ئۇۋۇلاش-مۇجۇپ تۇتۇش كېرەك. مائۇللەھىيى
بىلەن بىر ئاز ئىپارنى ئېرىتىپ گالغا تامغۇزۇش كېرەك.
(6) تارتىشىپ قالغاندا ئىسسىق ياغلار بىلەن
ئەزانى ياغلاش ياكى لاتىدەك بىر نەرسىنى ماي بىلەن
مايلاپ قول-پۇتلارنىڭ گەۋدە تەرەپ قىسمىغا قويۇش
لازم.

ھەيۋە كېسىلىدە دەسلەپكى دەۋرلىرىدە غىزا بى-
رىلمەيدۇ. ئەھۋال ياخشىلانغانسىمۇ ئاز-ئازدىن يېنىك
تاماق بېرىشكە بولىدۇ. ئۇخلاش بۇ كېسەل ئۈچۈن بەك
پايدىلىق. ئۇيقۇسىزلىق بولسا ئۇخلىتىش چارىلىرىنى
قىلىش لازىم. باش-مىڭە كېسەللىرى بابىدا كورسىتىپ
ئوتۇلگەن دورىلارنى باشقا چېپىش ياكى بۇرۇنغا پۇرۇ-
تۇش كېرەك.

بۇزۇلغان تاماقلارنى يېمىش ياكى ھەزىمنىڭ

ئوتكۇر بۇزۇلشىدىن قۇسۇپ ئىچ سۇرۇش كېسىلىدە،
ئەگەر لازىم كەلسە ئىسكەنجىيىن بىلەن ھەسەل ۋە كوپ
مىقداردا سۇ ئىچكۈزۈپ تاكى مەئىدىدىكى سەۋەپچى ماددا
چىقىپ كەتكىچە قۇستۇرۇش، ئاندىن كېيىن قەينى توخ-
تەشش چارىلىرىنى قىلىش، مەسىلەن، قۇرسى ئود ياكى
راسەن (113 - 114 - نۇسخىلار) بېرىش كېرەك. كېسەل
بىر ئاز ياخشىلانمىغىچە تاماق بېرىلمەيدۇ. كېيىنچە رەك
ئۇچار قاناتلار گوشنى ئانار ياكى بىيە سۈيى بىلەن
چۈچىمەل قىلىپ بېرىشكە بولىدۇ. رۇمبېدىيان، زىرە،
مەستىكى، ئۇددى خاملارنى باراۋەردىن ئېلىپ، قاينىتىپ
سۈيىنى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر ماددىنى ئۇچەيدىن
چىقىرىۋېتىشنى مەقسەت قىلىنسا ئايارەنج پەيقارا (16 -
نۇسخە) بېرىلسە بولىدۇ. قۇرسى راسەن بۇ كېسەللىكتە
زور مەنپەئەتلىكتۇر.

VIII ماقالا. جىگەر كېسەللىكلىرى

1- پەسىل: جىگەرنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشۇق كېسەللىكلىرى

جىگەرنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشۇق كېسەللىكلىرى مەئدە ئاغرىقلىرىدەك ماددىسىز ياكى ماددىلار ئارىلاشقان ئىسسىق-سوغاق يا قۇرۇق زەرەرلىنىشلەردىن ئىبارەت. تۈۋەندە مىزاجنىڭ كەيپىياتى جەھەتتە بۇ 3 تۈرگە بۆلۈپ سۆزلىنىدۇ.

1. جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىق بۇزۇلۇشى

جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىق سەۋىيىدىن بولغان زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئۇسسۇزلۇق كۈچلۈك، تىلى قۇرغاق، ئېغىز ئىچى ئاچچىق ۋە ئىشتەي تۇتۇلغان بولىدۇ. بە-زىدە قەۋزىيەت بولۇشى ۋە سۇيدۇك كەلمەسلىكى مۇمكىن. تومۇر تېز، سۇيدۇك قىزىل بولۇپ قىزىق چىقىدۇ. جىگەر ئۇستىنى سىلاپ كۆرگەندە قىزىق سىزىلىدۇ. ۋە باسقاندا ئاغرىيدۇ. ماددىلاردىن قاننىڭ غالىبلىقى بولغاندا بەدەن ئېغىر، ئېغىزنىڭ نەمى تۈزلۈك بولىدۇ. سەپرا غالىپ

بولسا، كوز ئېقى ۋە بەدەنلىرى سېرىق رەڭدە بولۇپ،
كوڭلى ئاينىپ قۇسىدۇ. خۇسۇسەن مايلىق نەرسىلەرنى
يىگەندە كوڭۇل ئاينىيدۇ، ئىچى سۇرىدۇ. ئېغىر ھاللاردا
سۇيدۇك قارامتۇل رەڭدە كېلىدۇ. مالىخولىيادەك روھى
بەلگىلەر ۋە تېرە ئۈستىدە چالاشتەك قارا تەمرەتكىلەر
كورۇلىدۇ.

داۋاسى: ماددىلار ئارىلاشمىغان ھالدا بولسا
(غالىپ بولمىسا) سوغاقلق قىلىش كىپايە قىلىدۇ. مە-
سىلەن، ئىسكەنجىبىن ۋە سەندەل شەرۋىتى بېرىش ياكى
ئانار سۈيى، كاسىن ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى، سېمىز ئوت
ئۇرۇغى، نىلۇفەر ۋە ئىسپۇغۇللارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىش
لازم. ماددى بولغاندا ئۇلارنىڭ ئالامەتلىرىگە ئاساسەن
شۇ ماددىلارنى ھەيدەش، قاندىن بولسا ھىجامەت قويۇش
كېرەك. ئۇندىن كېيىن 115 - نۇسخىدىكى مەتبۇخ بېرىد-
لىدۇ. سەپرا غالىپ بولغاندا ھەيدەش ئۈچۈن قان
ئېلىش ھاجەتسىز، 115 - نۇسخىدىكى مەتبۇخ بېرىلسىلا
بولىدۇ. ئارپا، ماش، سەندەل سۇپارى، قىزىل گۈل،
خاڭگالارنى سوقۇپ، جىگەر ئۈستىگە قويۇش لازىم. ئەگەر
جىگەر ئۈستىدىكى قىزىقلىق زىيادە بولسا قېتىقتا
پىشۇرۇلغان دەريا سەرتانى بىلەن ئارپا ئۇنىنى بىر-
لەشتۈرۈپ جىگەرگە قويۇش كېرەك. ئەگەر قەۋزىيەت
بولسا سېرىق ھېلىلىنى قاينىتىپ، سۈيىدە خىيار شەنبەر
بىلەن تەرەنجۋىلىنى ئېرىتىپ، سوزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ
(بۇلارنى سۈرگىلەردە كورسەتكەن مىقدار بويىچە ئېلىنسا)

بولىدۇ). جىگەردە توسىلىش ئالامەتلىرى كورۇلسە شەر-
 ۋىتى دىنارى (56 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. جىگەر
 كېسەللىكلىرىدە كاسىن سۈيى بىلەن پۇنۇس، خىيارشەن-
 مەرنى ئېرىتىپ بېرىش ناھايىتى ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.
 ئوزۇقلىنىش جەھەتتىن ئىچىنى قاتۇرغۇچى نەرسىلەرنى
 بېرىشتىن ساقلىنىش، تامىغىغا زىرق، ئەينۇلا ۋە پالەك،
 تەمرى ھىندى قوشۇپ بېرىش، ئىلاجىبار گوش بەرمەس-
 لىك كېرەك. ئەگەر تەلەپ قىلسا توخۇ ياكى پاقلان
 گوشى بېرىلىدۇ. ئېغىر ھاللاردا سۇيدۇك قارامتۇل رەڭدە
 كېلىدۇ. بۇ جىگەرنىڭ زەئىپلىكى ۋە ئوفۇنەتنىڭ جىگەردە
 كوپلىگىنى كورسىتىدۇ.

2. جىگەر مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلشى

ئالامەتلىرى: ھارارەت ۋە جىگەر ساھەسىدە
 ئىسسىقلىق بولمايدۇ. كېسەلنىڭ چىرايى ئوزگەرگەن،
 ئاقۇش، بوشاڭ كەيپىياتتا بولىدۇ. تەشئالىق بولمايدۇ.
 تىل ۋە كالپۇكلىرى ئاق گەز باغلايدۇ. تومۇر سۇس ۋە
 ناچار ئۇرىدۇ. بەزىدە چىرايى قوغۇشۇن رەڭلىك بولۇپ
 قالىدۇ. ئەگەر بەلغەم ماددىسى غالىپ بولسا، قۇسۇقتا
 ئاق شىلمىش ئەسلىرى بولىدۇ. سۇيدۇك قويۇق كېلىدۇ.
 ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلىشىشى بايقىلىدۇ. كېسەل جىگەر
 ساھەسىدە يېقىمسىزلىق سېزىدۇ.

داۋاسى: ماددىسىز بولغاندا ئىسسىقلىق قىلىش
 يېتەرلىك. مەسىلەن، مەجۇنى ئاساناسىيا، داۋائىل كوركەم

(117-116 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ھەم ھەر كۈنى سەھەردە ئارپا بېدىيان ۋە ئىت ئۇزۇمىنى قاينىتىپ گۈلقەن ۋە ھەسەل بىلەن بېرىش لازىم. ئەپسەنتىن، سۈمبۇل، ئىزخىر، قۇست، سەلىخەلەرنى قىزىل گۈل ۋە زەپەر قوشۇپ گۈلى سوسەن يېغى بىلەن جىگەر ئۈستىگە قويۇش كېرەك. بەلغەم ماددىسىدىن بولغاندا تازىلاش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (13 - نۇسخە) ۋە ھەببى سەبرە، ئايارەج پەيقارا قاتارلىقلارنىڭ بىرى (16 - 4 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ. بىر مىسقال زۇپانى قاينىتىپ داۋائىل كوركەم بىلەن بېرىشمۇ پايدىلىق. بەزىلەرنىڭ تەجرىبىسىچە، بۇ خىلدىكى جىگەر كېسىلىگە ئىتىرىپىل سەغىر ياكى ئىتىر - پىل كەبىرى (1 - 5 - نۇسخە) ناھايىتى ئوبدان ئۈنۈم بېرىدۇ. ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش بەك كۆپ بولۇپ كەتكەندە، سۇيىدۇك تۇتۇلۇپ قېلىش ئەھۋاللىرى كۆردىلىدۇ، بۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىم. سەگەر ئىچى سۇ - رۇپ كەتسە سېپەندەن ئۇرۇغى رەيھان ئۇرۇغى، ئەرەپ يىلىمىدىن 3 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇرۇق دورىلارنى قورۇپ ئەرەپ يىلىمى بىلەن قوشۇپ سوقۇپ بېرىلىدۇ.

3. جىگەر مىزاجىنىڭ قۇرۇقلۇقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: پۈتۈن بەدەن ئۇرۇق ۋە تېرە قۇر - غاق بولىدۇ. تىل ۋە ئېغىز ئىچى دائىم قۇرۇپ تۇرىدۇ. تومۇر قاتتىق سالىدۇ، قان ئازلىق، قەۋزىيەت بولىدۇ. ماددىسى سەپرا بولۇپ، روھى ئالامەتلەردىن غەمكىنلىك،

خىمالچانلىق، يامان پىكىرلەردە بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرىلىدۇ. ھەزم قىلىش بۇزۇلۇپ، جىگەر ساھەسى تېلىپ ئاغرىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ماددىسىز بولغاندا ھوللۇك تەرەپتىكى چارىلار قىلىنىپ، شەرۋىتى نىلۇفەر، شەرۋىتى خەشخاشلار، كاسىن ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى بېرىلىدۇ. قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، بادام يېغى، ھوم ياغلىرىنى بىلەن پەشە يېغى بىلەن قوشۇپ جىگەر ئۈستىگە سۈركەش لازىم. غىزاسىغا كىچىك شىرىسىدە ناۋات ۋە بادام يېغى بىلەن ھالۋا تەييارلاپ بېرىش، قاپاق، پالەك، ئاقلىغان ئارپا ۋە سوڭەك يىلىگى بىلەن تاماق ئېتىپ بېرىش، ئەمما ھوللۇكنى ھەددىدىن ئارتۇق قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ماددى بولغانلىرىدا ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بەرگەندىن كېيىن يۇقۇرىدىكى چارىلار قىلىنىدۇ.

جىگەرنىڭ زەئىپلىگى (زەئىپلۈككە بەد)

جىگەرنىڭ تۇتۇش، چىقىرىپ تاشلاش، تارتىش ۋە ھەزم قىلىش قاتارلىق توت قۇۋۋىتىنىڭ زەرەرلىنىشى جىگەر زەئىپلىگىنى پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: سۈيدۈك رەڭگى گۆش يوغان سۈدەك (قىزغۇش) كېلىدۇ، بەدەن ئۇرۇقلاپ دەرمانسىزلىنىدۇ. ئىشتەي ئازىيىپ ئوڭ تەرەپ يىتىم قوۋۇرغا ئاستىدا

چىمىلداپ ئاغرىش سېزىلىدۇ. بۇ ھال كوپىنچە غىزادىن كېيىن يەنى ئوزۇق ماددىلىرىنىڭ جىگەرگە ئوتۇش ۋاقتى بىلەن توغرا كېلىدۇ. كېسەلنىڭ رەڭگى دەسلەپتە كۈشەرەك بولۇپ، بارغانسېرى سېرىق رەڭگە مايىللىشىدۇ. ئارقا تەرەت مىقدارى كۆپ، رەڭگى ئاق بولۇپ قالىدۇ. سۇيۇق ۋە تەرەت رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى ئاساسەن جىگەرنىڭ ھەزىم قىلىش ۋە شىمىرىش كۈچىنىڭ ئاجىز-لىغىدىن ئوزۇقلۇقلار بەدەنگە ياخشى ئۆزلەشمەي چىقىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. جىگەردىكى تۇتۇشنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن بەدەن كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلايدۇ. ۋە بوشاڭلىق پەيدا بولىدۇ. جىگەردىكى چىقىرىپ تاشلاش-نىڭ بۇزۇلۇشى كېرەكسىز ماددىلار جىگەردە ساقلىنىپ قېلىپ، قوساق ئېسىلىشتەك ھاللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. جىگەرنىڭ زەئىپلىكى، ئۇنىڭ توت قۇۋۋىتىنىڭ بىرقانچىسى ياكى ھەممىسىنىڭ بوزۇلۇشى بىلەن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. بۇنى كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەر بىلەن ئايرىپ چىقىش مۇمكىن.

سەۋىيى: جىگەرنىڭ زەئىپلىكى ئاساسەن مۇنۇ 3

خىل سەۋەپتىن كېلىپ چىقىدۇ.

(1) جىگەر مىزاجىنىڭ بوزۇلۇشى (1-پەسىلدە

كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەرنىڭ داۋام قىلىشى)،

(2) جىگەر تومۇرلىرىدىكى توسىلىش (سۇددە) ياكى

جىگەرنىڭ ياللۇغى.

(3) مۇناسىۋەتلىك ئەزالارنىڭ (مەئدە ۋە تالنىڭ) زەرەرلىنىشى جىگەرگە تەسىر قىلىش.

داۋاسى: (1) جىگەر مىزاجى بۇزۇلغان سەۋەبتىن بولغانلىرىدا يۇقۇرىدا كورستىلگەن چارلار قىلىنىدۇ.

(2) جىگەرنىڭ ياللۇغلىنىشى ياكى توسىلىشىدىن بولغانلىرىنىڭ داۋاسى ئاساسەن سەۋىيىنى بىر تەرەپ قىلىش (جىگەر توسىلىش ۋە جىگەر ياللۇغىغا قاراڭ).

(3) تال ۋە مەئدە سەۋىيى بىلەن بولغان جىگەر زەئىپلىگىدە مەئدە تالنى داۋالاش بىلەن بىللە جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدىغان دورىلارنى مەسىلەن، خۇشپۇراقلىق غىزا، دارچىن، ئىزخىر ۋە زەپەرگە ئوخشاش دورىلارنى بېرىش لازىم. جىگەرنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنىڭ زەئىپلىگى ئېغىر بولغانلاردا كونا كىتاپلارنىڭ كورسىتىشىچە ئوسلىم تومۇرىدىن قان ئېلىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. جىگەرنىڭ ھەزىم قۇۋۋىتىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن مەجۇنى سەنجىرىنا (33 - نۇسخە) نى يېمىشكە بېرىپ، سىرتتىن ياغلاش ئۈچۈن سەبرى، ئانار گۈلى، ئانار پوستى، لادەن، مەۋرۇر قاتارلىقلارنى يۇمشاق سو-قۇپ، گۈلاپ بىلەن ئەمدەپ جىگەر ئۈستىگە قويۇش؛ قۇرۇغۇچىلارنى بېرىشتە ئېھتىيات قىلىپ، توسالغۇنى ئېچىشقا دائىم دىققەت قىلىش لازىم. تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ زەئىپلىگىدە ئالما شەرىتى، بىيە شەرىتى بېرىلىپ، زىرە، ئۇد ۋە ئالىمنى قوشۇپ. سوقۇپ جىگەر ئۈستىگە

قويۇش كېرەك. جىگەرنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن مائىل جىسىپىن (181 - نۇسخە)، ئىسكەنجىۋىل ۋە ھېلىلە مۇرابباسى بېرىلىدۇ. غىزاسىغا چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىغى ياخشى. ئادەتتە غىزاغا دارچىن، قارىمۇچ، پىلىپىل ۋە زەنجىۋىل سېلىپ بېرىش لازىم.

2 - پەسىل: جىگەردىكى توسىلىش (سۇددىلىكە بەد)

جىگەر توسىلىش — جىگەرنىڭ ئۆز تومۇرلىرىدىكى توسىلىش ياكى ماسارىقا تومۇرىدىكى توسىلىشلاردىن ئىبارەت. ئالامىتى ۋە داۋاسى جەھەتتىن بىر بىردىن پەرقلىنىدۇ.

1. جىگەر ئۆز تومۇرلىرىدىكى توسىلىش

سەۋىيى: جىگەرنىڭ ھەرخىل جاراھەتلىرىدىن كېيىن جىگەر تومۇرلىرىنىڭ تارتۇقلىشىپ قېلىشى؛ جىگەرنىڭ ياللۇغلىنىشى؛ جىگەر تومۇرلىرى ئىچىگە ھەرخىل شىرەلاش، قويۇق ۋە قاتتىق ماددىلارنىڭ ئولتۇرۇپ قېلىشى. توسىلىشنىڭ بۇ خىل سەۋەپلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، تاتلىق ۋە غەلىز تاماقلاردىن كېيىن كۈچلۈك تەن ھەركەت قىلىش، ھاراق ۋە مۇسەللەسلەرنى كۆپ ئىچىش، قۇرغۇچى نەرسىلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بۇزۇلغان يىمەكلىكلەرنى يېمىش بىلەنمۇ توسىلىش

كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. بەزىلەر جىگەر تومۇرلىرىدا -
نىڭ تۇغما تار بولۇشىنى بىر سەۋەپ دەپ كۆر-
سىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: قان ئازلىق ئالامەتلىرىنىڭ كۈندىن
كۈنگە زىيادە بولۇشى، رەڭگى ساغرىش ئالامەتلىرى
بىلەن بىللە تەرەت گۆش سۈيىدەك كېلىدۇ. جىگەر سا-
ھەسىدە ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش سىزىلىدۇ. توسىلىش
جىگەرنىڭ ئۈستۈنكى قىرلىرىدا بولسا ئېغىرلىق ۋە
ئاغرىش، جىگەر ئىششىقلارمۇ روشەن ئەمەس. توسىلىش
ئېغىر بولسا بەدەندە ئىششىق كۆرىلىشى مۇمكىن. سۈي-
دۇك مىقدارىمۇ ئازىيىدۇ. بۇ چاغدا نەپەس قىيىنلىشىش
ۋە ماددىلارنى ئۆزلەشتۈرۈش ناچارلىشىش ئالامەتلىرى
كېلىپ چىقىدۇ. كېسەلنىڭ رەڭگى ئاقۇش سېرىق بولىدۇ.
جىگەر ياللۇغى بىلەن جىگەر توسىلىشىنىڭ پەرقى شۇكى،
ياللۇغلىنىش قىزىتمىلىق ۋە ئاغرىش كۈچلۈك بولىدۇ.
ئەمما توسىلىش قىزىتمىسىز بولۇش بىلەن ئېغىرلىق
سېزىلىش كۈچلۈگرەك كېلىدۇ.

داۋاسى: توسالغۇ جىگەرنىڭ يۇقۇرقى قىرلىرىدا
بولۇپ، سۈيدۈك ئاز ۋە كېسەلنىڭ مىزاجى ئىسسىق
تەرەپتە بولسا، توۋەندىكى نۇسخە دورىلارنى ئىسكەنجىيىن
بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ.

نۇسخە: ئارپا بېدىيان، ئوغرى تىكەن، كاسىن
ئۇرۇغى ھەربىرى 4 مىسقالدىن، قوغۇن ئۇرۇغى 6 مىس-

قال، خاڭگا ئۇرۇغى 5 مىسقال. پىرسىياۋشان 3 مىسقال،
 ئىت ئۇزۇمى 6 مىسقال، كاسىن يىلتىزى بىر سەر،
 كاسىن ئۇرۇغى 4 مىسقال، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى
 4 مىسقال مەزكۈر دورىلارنى سوقۇپ 4 سائەت مىقدارى
 قايناقسۇغا چىلاپ ئاندىن كېيىن يېرىمى قالغىچە قاي-
 مىتىپ سۇزۇپ تەييارلاپ، جىگەر ئۇستىگە چېپىلىدۇ.
 جۇڭدە، ئەپسەنتىن، رەۋەن چىنىلەرنى سوقۇپ، چىڭسەي
 ياكى كاسىن سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ جىگەرگە چېپىشىمۇ
 مۇمكىن.

توسىلىش جىگەرنىڭ تۈۋەنكى تەرەپلىرىدە بولسا،
 كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ سۈرگە بېرىلىدۇ. بۇنىڭ تەر-
 كىۋىدىكى دورىلار سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە، سانا،
 پۇنۇس، ئىت ئۇزۇمى، ئامىلە، تەمرى ھىندى، تەرەنجە-
 ۋىل، كاسىن ئۇرۇغى ۋە يىلتىزىدىن ئىبارەت بولۇشى
 لازىم. ياكى مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ.
 جىگەردىكى توسىلىشنى ئېچىش ۋە سۈيىدۈك ھەيدەش
 ئۈچۈن، كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ مۆتىدىل ياكى ئىس-
 سىق خۇسۇسىيەتلىك ئىسكەنجىبىن بۇزۇرى (118 - 119 -
 نۇسخىلار) بېرىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

غىزالىنىش جەھەتتە، قاننى قويۇقلاشتۇرىدىغان،
 ناچار ھەزىم بولىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش،
 تېز ھەزىم بولىدىغان سويۇق تاماقلارنى بېرىش لازىم.

2. ماسارىقنىڭ توسىلىشى

ماسارىقا توسىلىشىغا ئۇنىڭدا ھاسىل بولغان ماددىلار سەۋەپ بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بىرىنچى پەسىلدە سوزلەندى.

ئالامەتلىرى: ماسارىقا ئورنىدا تارتىشقاندا ئاغ-رىش ۋە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. ئاغرىش مەئدە ساھەسىدىمۇ سېزىلىشى مۇمكىن. ئەمما جىگەردە ئىششىق ياكى مەد-دىنىڭ ئوزىدە بىرەر زەرەرلىنىش تاپقىلى بولمايدۇ. كېسەل بارغانسېرى ئورۇقلايدۇ. توسالغۇنىڭ ھاسىل بولىشى ئاستا داۋاملاشقاندا، بەدەن ئاجىزلاش كېيىنرەك پەيدا بولىشى مۇمكىن. ئەمما مەئدە ساغلام تۇرۇقلۇق ئوڭ تەرەپ قوساقنىڭ كىندىكىچە بولغان ئارىلىقىدىكى ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش بۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇ.

داۋاسى: جىگەر توسىلىشتا كورسىتىلگەن توسال-غۇلارنى ئاچقۇچى ۋە ماددىنى سۇيۇلدۇرغۇچى دورىلارنى تاللاپ بېرىش لازىم. مەسىلەن، ئىسكەنجىبىنىگە بېنىدىيان، كاسىن، ئوغرى تىكەن، قوغۇن ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى، سەۋزە ئۇرۇغىنى قوشۇپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

3. جىگەر كوپۇپ قېلىش

جىگەرگە ناچار ۋە يەللىك تاماقلارنىڭ يېلى پەيدا بولۇپ قېلىپ، قوساق توپىغاندىن كېيىن غىزا

ھەزىم بولۇپ كەتكەن چاغدا ئوڭ قوۋۇرغا ئاستىدا تار -
تىشقانداك ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش پەيدا بولۇۋالىدۇ. ئەمما
ئاغرىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ ھەم رەڭگى سارغايمايدۇ.
جىگەر ساھەسىدە يەل مېڭىپ يۈرگەندەك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: مەجۇنى جەۋارىش كۈمۈنى ۋە شەرۋىتى
دىنارى بېرىلىدۇ (49 - 120 - نۇسخە)، ھاجەتكە قاراپ
مۇۋاپىق سۈرگە بېرىلىدۇ. سوغاق سۇ ئىچمەسلىك، ئىچە -
دىغان ئۇسسۇلۇقىغا بېدىيان، كاسىن ۋە قىزىل گۈل
ئەرەقى بېرىلىدۇ. تۇز ۋە ئىسسىق كۈل ئېلىپ جىگەرگە
ئىسسىق ئوتكۈزۈش ۋە ئەتىگەندە مونچىغا چۈشۈش كېرەك.

4. جىگەر سانچىلىپ ئاغرىش (شەرقەتۈلكەبەد) ①

ئالامەتلىرى: كۆپىنچە سەھەردە ناشتىدىن ئىلگىرى،
قاتتىق ئەمگەك ياكى مەنچىدىن چىقىپلا سوغاق بىر
نەرسە ئىچسە، بىردىنلا ئوڭ تەرەپ قوۋۇرغا ئاستىدا
چىدىغۇسىز سانچىقىسىمان ئاغرىق پەيدا بولىدۇ. ئاغرىش -
نىڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى تېز باشلىنىدۇ ۋە تېز يوقىلىپ
كېتىدۇ. بۇنىڭغا سەل قارالسا ياكى خاتا گۇمان قىلىنسا
جىگەر ياللۇغى ياكى سۇلۇق ئىششىق كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
داۋاسى: ماتا ياكى بىر پارچە رەخنى قايناقسۇغا

چىلاپ، دەرھال جىگەر ساھەسىگە قويۇش لازىم. قايناق
① ئادەتتە جىگەر كېسەللىكلىرىنىڭ كۆپچىلىكىدە جىگەردە
ئاغرىش بولىدۇ. بۇ كېسەلنىڭ ئالامەتلىرىدىن بىرى سانچىلىپ
ئاغرىش بۇلاردىن پەرقلەندۈرۈلگەن.

سۇ ئىچكۈزىلىدۇ ۋە سۇمبۇل، مەستىكىلەرنى سوقۇپ، تۇخۇم سېرىغى بىلەن قوشۇپ ئاغرىق بار جايغا قويۇلىدۇ.

3 - پەسىل: جىگەر ئىششىقلىرى

1. جىگەرنىڭ ماددىلىق ئىششىغى

جىگەردىكى ئىششىق خىلىتلار (ماددىلار) سەۋبە - دىن بولسا بۇ ماددىلىق ئىششىق (ۋەرەمى ماددى) دەپ ئاتىلىدۇ. ئىششىق جىگەرنىڭ دوڭچىسى ياكى ئاستىنقى قىر قىسمىلىرىدا بولىشى مۇمكىن. ئەمما بەزىدە ھەر ئىككىلا قىسمىنىڭ ئىششىغىمۇ ئۇچرايدۇ. ئىششىقنىڭ قايسى جايدا ئىكەنلىكىنى توۋەندىكى ئالامەتلەردىن پەرقلەشكە بولىدۇ. مەسىلەن، ئىششىق جىگەر دوڭچىسىدە (يۇقۇرقى قىرلىرىدا) بولغاندا قاتتىق يوتەل، دەم تۇتۇلۇش بىلەن سۇيىدۇك توختايدۇ. جىگەر ئۈستىدە يېرىم ئايىسمان ئاغرىيدىغان دائىرە شەكىللىنىدۇ. ئەگەر ئىششىق جىگەرنىڭ توۋەنكى قىرىدا بولسا - كوڭلى ئايىنىش، سەپرا (سېرىق سۇ) قەي قىلىش، قول - پۇت سوۋۇپ كېتىش ۋە ھۇشسىزدىن كېتىش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ. ھەر ئىككىلا قىسمىدا يەنى پۈتۈن جىگەردە ئىششىق بولغاندا قايسى قىسمىنىڭ ئىششىغى كۈچلۈك بولسا، قارشى تەرەپنىڭ ئالامەتلىرى ئانچە روشەن بولمايدۇ. ئەمما ئەتراپلىق كۆرگەندە ئاز - دۇر - كوپتۇر تېپىلىشى مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: (1) قان ۋە سەپرادىن بولغان جىگەر ئىششىقلىرىدا ھارارەت، تەشنالىق، جىگەر ئەتراپىدا ئېغىرلىق سېزىلىش — ئىشتەي تۇتۇلۇش ۋە ئىششىقنىڭ بارغانسېرى تۈۋەنگە قاراپ راۋاجلانغانلىقى قاتارلىق ئور — تاق ئالامەتلەر بولىدۇ. قاندىن بولغاندا ئېغىرلىق كۈچ — لۈگرەك؛ سەپرادىن بولغاندا جىگەردە ئېچىش ۋە سېرىقلىق كۆپرەك بولىدۇ. بۇلار قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىششىقنىڭ ماددىلارغا خاس ئالامەتلىرىدىن ئىبارەتتۇر. ئەمما ئىششىقنىڭ جايلاشقان يېرىگە قاراپ، يۇقۇرقى ئومۇمىي ئالامەتلەر بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بولۇپمۇ بۇ تۈرىدە ئىششىقنىڭ مەئىدىگە بەرگەن تەسىرى كۈچلۈك بولغاچقا، ھەزىمنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن بىللە ھېق تۇتۇش روشەن ھالدا ئېغىر كېلىدۇ. كۆپ ھاللاردا، قەۋزىيەت ئېغىر بولغاندا چوڭ ئۇچەي ياللۇغى (قۇلۇنجى) دەپ خاتا گۇمان تۇغۇلىدۇ (چۈنكى ھو ۋە ھېق، ئۇچەي ئاغرىشى بولىدۇ). بۇ چاغدا قۇلۇنجىغا قارشى دورا بەر — گەندە ئېغىر ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما ئىششىق ماسارىقا تومۇرلىرىنى توسۇپ ئوزۇق ماددىلىرىنىڭ جە — گەرگە كېلىشى توسىلىپ قالغاندا، ئەكسىچە ئاغرىقنىڭ ئىچى سۈرۈپ كېتىدۇ. ئەبۇ ئەلى ئىبنىسىنانىڭ قارىشىچە جىگەر ئىششىقىدىكى ئىچ سۈرۈش ئاغرىقنىڭ ئاقىۋىتى ناچارلىغىنى كۆرسىتىدۇ. تومۇر ھەركىتى قاندىن بولغاندا چوڭ ۋە تېز، سەپرادىن بولغاندا كىچىك ۋە تېز بولىدۇ.

سەپرادىن بولغان ئاغرىقلارنىڭ سۇيىدۇكى يالقۇن رەڭلىك، قاندىن بولغانلاردا بولسا قىزغۇش رەڭدە كېلىدۇ.

داۋاسى: ئوككەل ۋە باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. قاننى كېسەلنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىغا قاراپ ئاز-ئازدىن بىرقانچە قېتىم ئېلىش لازىم. قان ئېلىپ بولغاندىن كېيىن، كاسىن، ئىت ئۇزۇمىنى قاينىتىپ سۇ-يىنى ئانار شەرۋىتى (47-نۇسخە) ۋە قەن بىلەن تەييارلىغان ئىسكەنجىبىنلەر بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ (سەپرادىن بولغانلىرىدا قان ئېلىنمايدۇ). ئانار شەرۋىتىنى يالغۇز ھالدا ياكى باشقا قورىغۇچى مەۋە سۇلىرى، مە-سىلەن، بىيە ۋە ئالما سۇلىرى بىلەن بىللە بېرىشكە بولىمايدۇ.

ئىششىق جىگەرنىڭ تۈۋەنكى قىسمىدا بولغاندا، سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى تەسىرگە ئىگە دورىلارنى بەرمەستىن ئىچىنى يۇمشاق تۇتۇشقا دىققەت قىلىش لازىم. ئەگەر قەۋزىيەت كۈچلۈك بىرىلسە، كاسىن ئۇرۇغى ۋە ئىت ئۇزۇ-مىنى قايناتقان سۇدا پۇنۇس، خىيارشەنبەرنى ئېرىتىپ سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. دورا مىقدارى كېسەل ئەھ-ۋالىغا قاراپ بولسا بېرىلسە ياكى ھوقنە قىلىسىمۇ بولىدۇ. ئىششىق جىگەرنىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدا بولغاندا، سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىش بىلەن تەرەتنىڭ ئېتىدالىدا بولۇشىغا دىققەت قىلىدۇ. ئارپا سۈيى ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابى بېرىلىدۇ.

سۈرۈشۈپ چۈشۈپ ئۇچۇن ئالدى بىلەن ئىششۇق قاتتۇر-
 غۇچى (راۋادىيات) لاردىن ئارپا ئۇنى، ئاق سەندەل كىپىگى،
 گۈلاپ، كاسىن سۈيى قاتارلىقلارنى باراۋەردىن ئېلىپ، جە-
 گەر ساھىسىگە چىپىلىدۇ. ئەگەر ئېچىشۇپ ئاغرىش كۈچلۈك
 بولسا، بۇ خىلدىكىلەرگە بىر ئاز كاپۇر قوشۇش كېرەك.
 ئۇندىن كېيىن تارقاققۇچى دورىلار (مۇھەللىلەر) نى چىپىش
 كېرەك. مەسىلەن، بابۇنە، ئەكىلىملىك، زىغىر، شۇمشە،
 ئەنجۈر، گۈل بىنەپشە قاتارلىقلارنى باراۋەر مىقداردا
 ئېلىپ، بىر ئاز نەمدەپ جىگەر ساھىسىگە چىپىلىدۇ،
 ئىچى سۈرۈپ كېتىش ئەھۋاللىرى بولسا، تۆۋەندىكى قۇرس
 دورىنى بېرىش كېرەك.

تاباشىر، قىزىلگۈل، زىرىخ ھەر بىرى 5 مىسقال
 دىن يۇيۇلغان لەك (لەكى مەغسۇل) 1 مىسقال. زىرا-
 ۋەن 1 مىسقال، زەپەر $\frac{1}{2}$ مىسقال، دورىلارنى يۈم-
 شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن بىر مەس-
 قالدىن قۇرس تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇپ، كۈنىگە بىر
 دانىنى ئانار شەۋىتى ياكى زىرىخ شەۋىتى (47 - 89 -
 بىلەن) بېرىلىدۇ.

(2) بەلغەم ماددىسى كۆپ بولغان جىگەر ئىششۇ-
 خىنىك ئالاھىدە ئالامىتى شۇكى، جىگەر ساھىسىنىڭ ئاغ-
 رىشىغا قارىغاندا، ئېغىرلاشقانلىق سېزىمى ئارتۇق بول-
 دۇ، رەڭگى ئاقۇش، تەرىتى دائىم ئاق، يۇمشاق كېلىدۇ.
 تەشەنلىق بولمايدۇ. ئاغرىق ئوزى ھارغۇنلىق ھەس

قىلىپ، روھى كەيپىياتى ئىزىلەڭگۈ بولىدۇ. ئىششىق جىگەرنىڭ يۇقۇرقى ياكى توۋەنكى قىسمىدا بولغانلىق ئالامەتلىرى (1) تارماقتىكى بىلەن ئوخشاش.

داۋاسى: ئىششىق جىگەرنىڭ يۇقۇرقى دوڭچىسىدە بولسا، سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلاردىن قىزىل گۈل، رۇم-بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى 3 مىسقال، ئارپا بېدىيان يىلتىزى، كاسىن يىلتىزى 5 مىسقالدىن، ئىزخىر، مەستىكى، جۇۋىنە، سۇمبۇللارنى 2 مىسقالدىن ئېلىپ چالا سۇقۇپ، ئېھتىياجغا لايىق سۇ بىلەن قاينىتىپ سۇزۇپ، ئوزنى يالغۇز ياكى ئىسكەنجىبىن بۇزۇرى بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىششىق ئاستىنقى قىسمىدا بولسا، ئايارەج پەيقارا (16-نۇسخە)دىن 1 مىسقال، غارىقۇندىن 1 مىسقالدىن قوشۇپ ھەب قىلىپ يىيىش-كە بېرىلىدۇ. ياخشىسى ھوقنە قىلىش لازىم. ياكى كەچ-تە ئايارەج بىلەن غارىقۇننى بىر مىسقالدىن بېرىپ ئەتىگەندە قۇرسى ئەپسەنتىن (128-نۇسخە) ياكى قۇر-سى رەۋەن (124-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) سەۋدا ماددىسى كۆپ بولغان جىگەر ئىششىق-غىدا سەپرانىڭ جىگەردە تۇتۇلۇپ قېلىشى بىلەن ئىششىق باشقا تۈردىكىلەرگە قارىغاندا قاتتىق بولۇپ، جىگەرنى سىرتتىن تۇتۇپ كۆرگەندە قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ. تەشەللىق بولمايدۇ. ئېغىز قۇرۇيدۇ، ھارارەت بەزىدە بار، بەزىدە يوق، بەدەن قارامتۇل سېسىق رەڭدە بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن، ھەر كۈنى ئارپابېدىيان، كاسىن ئۇرۇغى، چىڭسەي ئۇرۇغى، گازى ۋان ۋە ناۋاتلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ. سىرتتىن سۈركەشكە مۇم يېغى بېرىلىدۇ. ياكى تۈۋەندىكى تەركىپنى تەييارلاپ سىرتتىن جىگەر ساھەسىغا چېپىلىدۇ. شۇمشە، ئەنجۈر، مۇقىل، ئۇشەق، ئەكلىل مىلىك، ئاق سەندەل كىسپىگى، سۇمبۇل، ئاق موم، گۈل يېغى. ئاق مومنى گۈل يېغىدا بىر ئاز قىزىتىپ ئېرىتكەندىن كېيىن، قالغان دورىلارنى يوشاق سوقۇپ ياغ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. سەۋدانى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن بىلەن مەجۇنى نۇجاھ (121-125 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. بەزىلەر بىر ياشلىق توگە سۈتىنى قەن بىلەن بېرىشنى ياكى 3 مىسقالدىن سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە، بىر مىسقالدىن چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان ئېلىپ سوقۇپ، كۈنىگە بىر پىپالە سۇت بىلەن بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

(4) يىقىلىش ياكى ئۇرۇلۇش بىلەن بولغان جىگەر ئىششەكلىرىدا، دەرھال بىر ئاز قان ئېلىۋېتىش بىلەن، ئىسپۇغۇل لۇئابىغا بىر مىسقال گىلى ئەرمىنى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن رەۋەن، ئوردان، دارچىنلارنى بىر مىسقالدىن ئېلىپ، يوشاق سوقۇپ تالقانلاپ، بىر مىسقال تالقاننى شەۋىتى بىنەپشە (74 - نۇسخە) بىلەن

بېرىلىدۇ. ئەبۇئەلى ئىبىسنا ئوز تەجرىبىلىرىدە بۇ خىل
دىكى جىگەر ئىششىقلىرىدا زىراۋەن، گىلىئەرمەنى ۋە
ھەببۇلئاس ئىچكۈزۈشنىڭ ياخشى نەتىجە بەرگەنلىگىنى
يازغان. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن 122 - 123 - نۇسخى-
لاردىكى چېپىلىدىغان دورىلاردىن بىرى بېرىلىدۇ.

2. قورساق كىرگىت گۆشلىرىنىڭ ئىششىقى (ۋە رەمى ئەزلى بەتمى)

بۇ كېسەل جىگەر كېسەللىكلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك
ئەمەس، لېكىن كەيپىيات ۋە ئورنى جەھەتتىن جىگەر
ئىششىقلىرى بىلەن ئوخشاش بولغاچقا جىگەر
كېسەللىرى بىلەن، خۇسۇسەن جىگەر ئىششىقلىرى بىلەن
ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن (بولۇپمۇ قورساق ئوڭ
تەرەپ كىرگىت گۆشلىرىنىڭ ئىششىقىنى) ئالاھىدە بۇ
پەسىلدە تونۇشتۇرۇلدى. قورساقنىڭ ئاق كىرگىت گۆشلىرى
ئۇزۇنسىغا جايلاشقان بولۇپ، بۇلاردىكى ئىششىقمۇ
ئۇزۇنسىغا ئۇرۇنلىشىدۇ. بەزىدە بىر تەرىپى
توم، يەنە بىر تەرىپى ئىنچىكە خۇددى چاشقان
قویرۇغىدەك شەكىل پەيدا قىلىدۇ، ۋە سىرتتىن
روشن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ياكى قول بىلەن سىلاپ كۆر-
گەندە سېزىلىدۇ. ئىششىق ئوڭ تەرەپتە بولسا، ھارارەت
ۋە ئاغرىش جىگەر ئىششىقىنى ئەسلىتىدۇ. ئەمما جىگەر
ئىششىقى ئوڭ تەرەپ قورساق ئاستىدا يېرىم ئايىسىمان
ئاغرىشلىق دائىرە شەكىللىنىپ، باسقاندىلا بىلىنىدۇ. ۋە

جىگەر ئىششىغىنىنىڭ يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەن سۇي-
 دۇكتىكى ئوزگىرىش، ئىشتەي تۇتۇلۇش ۋە باشقا ئالا-
 مەتلىرى بار بولىدۇ، لېكىن قوساق كىرگىت گۆشلىرى
 ئىششىقلىرىدا جىگەر خىزمىتىگە ئائىت ئالامەتلەر بولمايدۇ.
داۋاسى: سۈرگە بېرىلىدۇ، ئۇندىن كېيىن شورب-
 غۇچى ۋە تارقاققۇچى دورىلارنى سىرتتىن چېپىلىدۇ.
 ماددىسى پىشقاندىن كېيىن ئەگەر يىرنىڭ يىغىلسا تىغ
 بىلەن يىرنىڭ چىقىرىلىدۇ. بۇ چارىلار كىچىكىپ قالسا
 ماددىنىڭ باشقا ئەزالارغا تارقاپ كېتىش ياكى يىرنىڭ
 خالىسى يېقىن ئەزالارغا ئېغىز ئېلىش خەۋپى بار،
 بۇ يامان ئاقىۋەتلەرگە سەۋەپ بولىدۇ.

3. جىگەرنىڭ يىرنىڭلىق ئىششىغى- (دۈبەيلە تۈلكە-۵۴)

جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقتىن بولغان ئىششىقلىرى تارقاپ
 كەتمەي ئۇزۇن تۇرۇپ قالغاندا، يىرنىڭلىق خالتىسىمان
 ئىششىقلارغا ئايلىنىدۇ، مەئىدىدىكى يىرنىڭلىق ئىششىقلار
 بىلەن ئوخشاش ئوزگىرىشلەرنى بېرىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرى قىزىتما، يۈز قىزىرىش،
 ئاغرىش، تەشنىلىقنىڭ كۈچلۈك بولۇشى، ئىشتەي تۇتۇ-
 لۇشلار كورۇلىدۇ، جىگەرنىڭ ئاغرىشى سانجىقسىمان
 بولۇپ، كېسەل ئوڭدا ياتقاندا ئاغرىش ئېغىرلىشىدۇ،
 بارغانسېرى ئۆپكە ۋە مەئىدىلەرگىمۇ تەسىر بېرىدۇ، كۆپىنچە
 چە ئۈچەي ياكى مەئىدىگە ئېغىز ئېلىپ يىرنىڭ چىقىدۇ،

داۋاسى: ئەگەر مەننى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار بولسا، قان ئېلىش، ھىجامەت قويۇش لازىم، مەدە ئۇچەي تەرەپكە مايىل بولسا بەگىل سۈرگە دورىلارنى بېرىش كېرەك، بورەككە مايىل بولسا، كورسىتىپ ئوتۇلگەن سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلاردىن بېرىلىدۇ، سىرتتىن جىگەر ئىششىغىدا كورسىتىلگەن ئىششىق ياندۇرغۇچى دورىلار چېپىلىدۇ، بۇ چاغدا تازىلاش مەقسىدى بىلەن قەن سۈيى، گۈلاپ ياكى ئىسكەنجىبىنلەرنى يالغۇز ياكى ئارپا سۈيى بىلەن ئىچكۈزىلىدۇ، تۈز ۋە ئەگرى خاڭگا ئۇرۇقلىرى، قوغۇن ئۇرۇغى، كوكنار شىرىلىرىنى چىلان ياكى نىلۇفەر شەرۋىتى بىلەن بېرىلىدۇ، جىگەرنىڭ ئەسلىگە كىلىشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، ئەت ئالدۇرىدىغان دورىلاردىن كۈن دۈر بىلەن خۇنسىپاۋشان، كاسىن ۋە چىڭسەي ئۇرۇقلەرنى ئىسكەنجىبىن، مائىل ئۇسۇللاردىن بىرى بىلەن بېرىلىدۇ.

4. جىگەرنىڭ تارتىشىشى (خەفەتۈلكە بەد)

بەدەن تېرىسى ياكى قاپاقنىڭ لىكىلداپ تارتىدۇ. دەك بىرخىل سېزىم جىگەردە سىزىلىدۇ. بۇ تىبابەتتە "خەفەتۈلكە بەد" دەپ ئاتىلىدۇ. جىگەردىكى تۇسالىغۇلار سەۋىيى بىلەن پەيدا بولىدىغان بىرخىل كېسەللىك بولۇپ ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەل كىشى جىگەر ساھەسىدە يۇقۇرىدا ئېيتىلىدەك بىر سېزىم سېزىش بىلەن تەڭ جىگەردە ئاغ

رىق ھىس قىلدۇ. جىگەرگە بىرنەرسە سانچىلغاندەك سېزدى-
لىدۇ، پىشانىسى تەرلەيدۇ، تېز پەيدا بولۇپ، تېز يوقاپ
كېتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا جىگەر توسىلىشىنىڭ بەزى بىر
ئالامەتلىرى بىللە كېلىدۇ.

داۋاسى: توسالغۇنى ئېچىش ئۈچۈن ئىسكەنجىبىن
بۇزورى مۆتىدىل (118 - نۇسخە) گە ئالاھىدە مامىران
چىنى، زەپەر، رەۋەن ۋە زىرىخلەرنى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
جىگەرنى خىلىتىلاردىن تازىلاش مەقسىدى بىلەن ئىزخىر،
بابۇنە، شاتەرە، ئەپسەنتىن ۋە غاپەسلەرنى مۇۋاپىق
مىقداردا قوشۇپ بېرىلىدۇ.

5. جىگەر (ئوتتە) تاش پەيدا بولۇش

جىگەردە تاشلارنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەپ
سەپرا (ئوت) يوللىرىدىكى توسالغۇلار تۇپەيلىدىن ئوت -
نىڭ ياخشى راۋان بولماي، تەدرىجى ئۇنىڭ تەركىپلە-
رى چۆكۈشتىن ئىبارەتتۇر. يەنە باشقا سەۋەپلىرى
بىرەر كىتە تاش پەيدا بولۇش سەۋەبى
بىلەن ئوخشاپ كېتىدۇ (بىرەر كېسىلىگە قاراڭ).

ئالامەتلىرى: تاماق مەئىدىدە تولۇق ھەزىم بول-
غاندىن كېيىن ھاسىل بولغان كەيلىس جىگەرگە شىمە-
رىلىپ ئۆتكەن چاغدا كوڭلى ئايىنىش بىلەن قەي قى-
لىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەڭ جىگەر ساھەسىدە قاتتىق
سانچىقسىمان بىر ئاغرىق سېزىلىدۇ. بۇ تۇتقاقلىق بو-

لۇپ، ئاغرىش بەزىدە يەڭگىل، بەزىدە ئېغىر بولىدۇ.
ئوڭ تەرەپ باسلىقتىن ئالغان قان تېگىدە قۇم تېپىلىدۇ.
داۋاسى: قوغۇن ئۇرۇغى، ئوغرى تىكەن، پىرسياۋشان،
چىڭسەي ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، بېدىيان يىلتىزى، كاسىن
يىلتىزى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.
تاشنى پارچىلاپ چىقىرىش ئۈچۈن بورەكتىكى تاشنى
چىقىرىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ (بورەكتىكى تاش، قۇم
كېسىلىگە قاراڭ).

6. جىگەر نىڭ كىچىكلىشىپ قېلىشى (ھىزالىكە بەد)

جىگەر ئوز ئەسلىدىكى ھالىدىن ئوزگىرىپ قېتىپ
كىچىكلىشىپ قالىدۇ. بۇ جىگەرنىڭ ياللىۇغلىنىشى ۋە
ھەرخىل زەرەرلىنىشلىرىنىڭ ئاقىۋىتىدۇر.

ئالامەتلىرى: جىگەر بار تەرەپتە ئېغىرلىق سېزىش،
سانجىقسىمان ئاغرىشلار كېلىپ چىقىدۇ. ھەزىم ناچار-
لىشىدۇ. كېسەل قانچە ياخشى ئوزۇقلانسىمۇ كۈندىن - كۈ-
نگە ئوزۇقلايدۇ، ئىچى سۇرۇپ تۇرىدىغان بولۇپ قالىدۇ.
داۋاسى: ئوزۇقلىنىش جەھەتتە مىقدارى ئاز،

قۇۋۋىتى كۆپ غىزالارنى مەسىلەن، قۇش گۆشلىرىنىڭ
شورپىسى - قاتارلىقلارنى بېرىش لازىم. يۇمشاققۇچى ۋە
تارقاتقۇچى دورىلارنى سىرتتىن چىپىلىنىدۇ. ئىچىدىن
بېرىدىغان دورىلارمۇ مۇشۇ ئاساستا بولۇپ، شەرۋىتى بۇ -
زۇرى (101 - نۇسخە)، مائىل ئۇسۇل (121 - نۇسخە)،
ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

7-جىگەر كېسىلى سەۋىيىدىن بولىدىغان ئىچى

سۇرۇشلەر

جىگەرنىڭ ھەرخىل زەرەرلىنىشلىرى تىۋىۋەندىكىچە بىرقانچە خىل ئىچى سۇرۇشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇلار ئالامەت ياكى داۋاسى جەھەتتىن، شۇ خىلدىكى جىگەر زەرەرلىنىشى بىلەن ئوخشاش بولغاننىڭ سىرتىدا، ئايرىم ھاللاردا مەلۇم ئالاھىدىلىكلىرىمۇ بولىدۇ.

(1) جىگەردىن بولغان يىرىڭلىق ئىچ سۇرۇش: جىگەرنىڭ يىرىڭلىق ئىششىغى ئۈچەيگە ئېغىز ئېلىش سەۋەپ بولىدۇ. بۇ چاغدا جىگەر يىرىڭلىق ئىششىغىنىڭ ئالامەتلىرى بولغاندىن تاشقىرى، ئىچى سۈرگەندە يىرىڭلىق تەرەت كېلىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال مەئىدىنىڭ يىرىڭلىق خالتىسىمان ئىششىغىدىمۇ كورۇلىدۇ. پەرقى شۇكى جىگەردىن بولغاندا تەرەت سېسىق پۇرايدۇ، مەئىدىدىن بولغاندا بەك سېسىق پۇرايدۇ، قوساق ئاغرىيدۇ. داۋاسى جىگەر يىرىڭلىق ئىششىغى بىلەن ئوخشاش.

(2) جىگەردىن بولغان گۆش يوغان سۈدەك ئىچ سۇرۇش: چوڭ تەرەت گۆش يوغان سۈدەك كېلىدۇ. سەۋىيى جىگەرنىڭ ئوزۇق ماددىلارنى شىمىرىش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلىشىدىن ئىبارەتتۇر. بۇ خىلدىكى ئىچ سۇرۇشنى ئەبوتئەلى ئىبنىسىنا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھۆكۇمالار قۇرۇق

ئۈزۈم ئۇرۇغى بىلەن داۋالاپ ساقايتقانلىقىنى يازغان. ئىچ سۇرۇشنى توختاتقۇچى باشقا دورىلار نەتىجە بەر - مەستىن ئۈزۈم ئۇرۇغى ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

3) جىگەردىن بولغان قانلىق ئىچ سۇرۇش: جىگەر سەۋىيىدىن قانتومۇرلارغا قان تولۇپ كېتىپ، ئۇچەي ئۇششاق تومۇرلىرى يېرىلىپ قان ئارىلاش ئىچ سۇرىدۇ. كۆرىلىدىغان چارىلار مۇنداق: ئاغرىقنىڭ قول - پۇت ۋە ئەمچەكلىرى تېگىلىدۇ. قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) دىكى دورىلارغا بىر مىسقال رەۋەن قوشۇپ تەييارلاپ پاقا يوپۇرماق ئۇرۇغى ۋە سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى بىلەن بېرىلىدۇ. غىزانى ئاز - ئاز مىقدار بىلەن بېرىش لازىم ۋە شەرۋىتى ئەنجىبار (72 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

بۇلاردىن باشقا يەنە جىگەردىكى سەپرا ۋە سەۋ - دانىڭ كوپىلىگى سەۋىيى بىلەن ئىچ سۇرۇشمۇ مۇمكىن. بۇ چاغدا تەرەتتە سەپرا ۋە سەۋداغا خاس ئالامەتلەر بىلەن بىللە جىگەرنىڭ شۇ خىلدىكى زەرەرلىنىشلىرى مەۋجۇت بولىدۇ. جىگەرنىڭ سەپرا ۋە سەۋدا سەۋەپلىك بولغان بۇزۇلۇشلىرىغا چارە كۆرۈلسە ئىچى سۇرۇشمۇ توختاپ قالىدۇ. بەزىلەر مەجۇنى پودىنە (126 - نۇسخە) بېرىشنى تەكلىپ قىلىدۇ.

جىگەر زەرەرلىنىشىدىن بولغان ئىچ سۇرۇشلەر بىلەن ئۇچەي زەرەرلىنىشىدىن بولغان ئىچ سۇرۇشنى توغرا پەرق ئەتمىگەندە داۋالاش توغرا بولماي كېسەل ئازاپلىنىپ

ناچار ئاقىۋەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن توۋەندىكى بىرقانچە جەھەتلىرىگە قاراپ پەرقلەش كېرەك. (1) ئومۇمەن جىگەردىن بولغانلىرىدا مەئدە ياكى ئۈچەيدە ئالاھىدە زەرەرلىنىش بولمايدۇ؛ مەئدىدىن بولغانلىرىدا جىگەر خىزمىتى ساغلام بولىدۇ.

(2) ئۈچەيدىن بولغان ئىچ سۈرۈشلەردە قوساقتا تولغاپ ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ، جىگەردىن بولغانلىرىدا ئاغرىش بولمايدۇ.

(3) جىگەر سەۋىيىدىن بولغان قانلىق ئىچ سۈرۈشتە يەل بولىدۇ، ھەمدە ئارىلاپ ئۈزلىگىدىن توختاپمۇ قالىدۇ. ئەمما ئۈچەي سەۋىيىدىن بولغاندا ئىچ سۈرۈش دورىسىز توختىمايدۇ.

(4) جىگەر سەۋىيىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ، كېسەل ئورۇقلاپ كېتىدۇ. ئۈچەيدىن بولغاندا مۇددەت قىسقا ۋە ئۆتكۈر بولىدۇ.

(5) جىگەردىن بولغان ئىچ سۈرۈشتە قان كەلگەندە سېسىق پۇرايدۇ ۋە تولغاق بولمايدۇ. قان ساپ ھالدا تامچىدەك كېلىدۇ. بەزىلەر بۇنى بوۋاسىر نەتىجىسىدىكى قاناش دەپ خاتا گۇمان قىلىدۇ. ئۈچەيدىن بولسا سېسىق بولمايدۇ ۋە تولغاپ ئاغرىيدۇ.

سۇلۇق ئەششىقلار

سۇ ئالىمىشىنىڭ بۇزۇلمىشى (سۇ ئىللىقۇنىيە)

بۇ پۈتۈن بەدەنلىك سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا)نىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىن ئىبارەت.

سەۋىيى: جىگەرنىڭ مىزاجى بۇزۇلۇش، جىگەر زەئىپلىكى ۋە ھەزىمنىڭ ئاجارلىقى؛ ئەمگەك قىلماسلىق؛ ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى.

ئالامەتلىرى: چىرايى ئاق سېرىق رەڭگە كىرىپ قالىدۇ. يۈز، قاپاقلار بىرنەرسى ئىششىيدۇ ۋە بوشىشىپ قالىدۇ. پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىدۇ، تاماق ھەزىم قىلىشى بۇزۇلىدۇ. كېيىنچە ئىششىق خېمىردەك يۇمشاق-لىشىپ قول - پۇتلارغىچە يېتىپ بارىدۇ. قوساق ئېسىلىدۇ، يەل بولىدۇ ۋە چوڭ تەرەت سانى كۆپىيىدۇ. چىش مۈلكلىرى ئاقىرىپ كالىپۇكلار جاراھەتلىنىدۇ (يېرىلىدۇ) تاماقتىن كېيىنلا تەرەت قىستايدۇ.

داۋالاش: دەسلەپكى دەۋرلىرىدە بەدەندە كېرەكسىز سۇيۇقلۇقنىڭ يىغىلىپ قالماستىكى ئۈچۈن ھەركەت قىلىش، يول مېڭىش قاتارلىق تەنھەرىكەتلەرنى قىلىش لازىم. بەدەننى ماددىدىن تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)، ھەببى غارىقۇن (62 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. شەرتى ئىچىدە ئەپسەنتىن II (127 - نۇسخە) نىڭ مەنپەئەتى زور. بۇلارنى بەرگەندىن كېيىن سۇيىدۇك ماڭدۇرغۇچى دورىلارنى بېرىش لازىم. توغرىغۇ، تۇز، گۈڭگۈرتلەرنى سالغان ئىسسىق سۇغا كىرىپ يۇيۇنۇش كېرەك. دائىملىق ئىچىش ئۈچۈن كاسىن ئەرەقى ۋە بېدىيان ئەرەقى بېرىلىدۇ. غىزاسى تاتلىق تەملىك بولىشى ۋە دارچىن، زەپەر، پىلىپىل ۋە مەستىكىلەرنى قوشۇپ بېرىش كېرەك. ھېيىزنىڭ توختاپ

قېلىشىدىن بولسا، مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار بولمىسا قان ئېلىش مۇمكىن. لېكىن قان ئالمىغان ياخشى. ماددىنى سۇرگۈچى دورىلاردىن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)، شەرۋىتى ئەپسەنتىن I (91 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ كېسەلگە يۇقۇرقى چارىلار بىلەن بىللە مەئىدىنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنىمۇ بېرىش كېرەك.

سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا)

ئىستىسقا دىگەن سوز پۇتۇن بەدەن سۇلۇق ئىش- شىغىنىڭ ئومۇمى ئاتالمىسى بولۇپ، بۇ بەزىبىر ئالاھىدە ئالامەتلىرىگە قاراپ گۆش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقاى لەھمى)، قىسقۇچى سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقاى زىققى) ۋە ناغراسىمان سۇلۇق ئىسسىق (ئىستىسقاى تەبەلى) دەپ 3 قىسىمغا بۆلىنىدۇ. گۆش سۇلۇق ئىششىقىدا ماددا بەدەننىڭ ئۆزە قىسمىدا بولسا، باشقا ئىككى خىلىدا ئىششىق چوڭقۇر قاتلاملاردا بولىدۇ.

سەۋىبى: سۇلۇق ئىششىقىنىڭ ئورتاق سەۋەپلىرى بار بولۇپ، توۋەندىكىچە بىرقانچە خىلغا مەركەزلىشىدۇ: (1) جىگەرنىڭ ئومۇمى زەئىپلىگى، جىگەر مىزا- جىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى.

(2) بەدەندىن كۆپ قان كېتىش ياكى ئادەتتە مېڭىپ تۇرغان قانلارنىڭ (مەسىلەن، ھېپىزنىڭ) توختاپ قېلىشى.

(3) جىگەرنىڭ خوشنا ئەزالىرى (يۈرەك، مەئدە،
قال ۋە ئۈپكە)دىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ جىگەر خىزمىتىگە
تەسىر بېرىشى.

(4) پۈتۈن بەدەنلىك ئىسسىق مىزاج بۇزۇلۇشلۇق
ئاغرىقلار

گوش سۇلۇق ئىششىغى (ئىستىسقايسى لەھمى)

ئالامەتلىرى: پۈتۈن بەدەن تونۇردىن چىققان
ئاندەك بوشاڭ ۋە كۆپۈشكەن بولۇپ، بارماق بىلەن
باسقاندا ئويمانلىشىپ ئۇزۇن ۋاقىتقىچە ئەسلىگە قايتمايدۇ.
باسقان جاينىڭ قېنى قاچىدۇ (ئاقىرىپ قالىدۇ).
تامانى ھەزەم قىلىش بۇزۇلىدۇ. ئېغىز ئىچى ئاچچىق
بولۇپ، ئادەتتە سۇيۇك ئاق، تەشئالىق كەم ۋە چوڭ
تەرەت راۋان بولىدۇ. ئەمما ھارارەت بىلەن بولغاندا
تەشئالىق كۈچلۈك ۋە سۇيۇك قىزىل كېلىدۇ. يىغىلغان
سۇيۇقلۇق شىرىلىك ۋە سوزۇلۇشچان بولىدۇ. بۇ ئالا-
مەتلەر جىگەرنىڭ زەرەرلىنىش دەرىجىسىگە قاراپ ئېغىر
ياكى يېنىك بولىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ئەسلى سەۋىيىنى يوقىتىش — مەسىلەن،
مەئدەدىن بولسا، قەي بىلەن ماددىنى تازىلاپ گۈلەن
بىلەن رۇمبىدىيان يىگۈزۈش كېرەك. جىگەرنىڭ مىزاجىنى
ئۆزگەرتىش، مەسىلەن، سوغاق تەرەپتە بولسا ئىسسىقلىققا
ئۆزگەرتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن داۋائىل كوركەم
(188 - نۇسخە)، تەرياق ئەربەئە (117 - نۇسخە)دىن

بىرىنى بېرىش مۇمكىن. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن جىگەر -
نىڭ سوغاق مىزاجلىق كېسەللىكىدە كورسىتىپ ئۆتۈلگەن
ئىسسىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما بەك ئىسسىق دورى -
لارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. سۈرگە دورىلار بېرىشكە
ھاجەت بولسا ھەبى رەۋەن (128 - نۇسخە) جىگەر
كېسىلى ۋە ئىستىسقا ئۈچۈن خاس دورىدۇر. ئىچىشكە
جۇۋىنە، رۇمبىدىيان سۈيى بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىستىسقا
ئىسسىقتىن بولۇپ قىزىتمىسى بولسا، ئالدى بىلەن، ھا -
زارەتنى پەسەيتىش چارىلىرىدىن جىگەر كېسەللىكىدە
كورسىتىلگەنلەر قىلىنىدۇ. كاسىن سۈيى بىلەن توگە
سۇتى ئىچكۈزىلىدۇ. تەجرىبىلەرگە قارىغاندا كاسىن ھول
يوپۇرمىغى سۈيىنىڭ بۇ جەھەتتە مەنپەئەتى بەك ياخشى.
بىنەپشە شەرۋىتى بېرىلسىمۇ بولىدۇ. يەنىل بولسا زۇپا
شەرۋىتى (10 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىششىقنى قايتۇرۇش
ئۈچۈن، داۋاملىق بېرىدىغان دورىلاردىن شەرۋىتى بۇزۇرى
II (130 - نۇسخە)غا ئىت ئۇزۇمى قوشۇپ تەييارلاپ
بېرىش كېرەك (شەرۋىتى بوزۇرنىڭ I سى سوغاقتىن
بولغان ئىستىسقاغا بېرىلىدۇ). ئىچىدىغان سۇنىڭ مىق -
دارىنى چەكلەش لازىم. ئەڭ ياخشىسى ئۇسسۇلۇقىغا ئارپا
بېدىيان ياكى كاسىنى ئەرەقلىرىنى بېرىش كېرەك. ئانار
بېرىش تەشۋالىقنى پەسەيتىپلا قالماستىن، بەلكى ئىستىس -
قاننىڭ ئوزىگىمۇ ناھايىتى پايدىلىق. بەزى رىۋايەتلەرگە
قارىغاندا، پەقەت ئانار بىلەنلا ئىستىسقا ساقىيىپ كەتكەن.
بەزىلەر كۈنىگە بىر مىسقال تەرياقى فارۇق (186 -

نۇسخە)، مائىل ئۇسۇل، (105 - نۇسخە) بىلەن بېرىشنى تەۋسىيە قىلغان. سۇيۇقلۇقنى شىمىرتىش ئۈچۈن، سىرت-تىن دورا چېپىش ياكى تەرلىتىپ چىقىرىش چارىلىرىنى ئويلاپ بېقىش كېرەك. مۇۋاپىق بولغانلىرىدىن بىرىنى تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. مەسىلەن، مۇنۇ دورىلاردىن بىرىنى قىلسا بولىدۇ:

(1) توغرىغۇ بىلەن بابۇنە يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ بەدەنگە سۈركەش كېرەك.

(2) تۇزنى يۇمشاق سوقۇپ، كالىنىڭ چاۋا يېغى، بادام يېغى، دارچىن، زىراۋەن، سەلىخە، قەسبۇسزەررە، گۈل سوسەن يېغىنى بىرىكتۈرۈپ ماي تەييارلاپ سۈر-كىلىدۇ.

(3) شۇمشە تالقىنى، كەپتەر مايىغى، كوپىگى دەريا، مەستىكىنى سىركىدە ئىزىپ پۇتۇن بەدەنگە چې-پىش كېرەك.

(4) كالا تېزىكى، قوي مايىغى، تال (ئۇزۇم) يا-غاچلىرىنىڭ كۈلى ۋە توغرىغۇلارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ سىركە بىلەن بەدەنگە سۇرتۇش كېرەك.

تەرلىتىش چارىلىرىدىن بىرىنى تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. مەسىلەن، قىزىق قۇمغا كومۇلۇش، ئاپتاپقا ئار-قىسىنى قىلىپ تۇرۇپ، پۇتۇن بەدەننى ياكى ئىششىق بار قىسمىنى كومۇش كېرەك. ئىسسىق مونچىدا تەرلىنىش (سۇ قۇيماسلىق لازىم)، شور سۇلۇق دەريالاردا چومۇلۇش

ياكى گۇڭگۇرتلۇك ئىسسىق بۇلاقلار (ئارشاڭ) دا يۇيۇنۇش كېرەك. يۇقۇرقلاردىن مەقسەت بەدەندىكى يىغىلىپ قالغان سۇنى چىقىرىپ تاشلاشتىن ئىبارەت.

قىسقۇچى سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقايسى زىققى)

بۇنىڭدا گوش سۇلۇق ئىششىغىغا قارىغاندا ئىششىق خېلى ئېغىر بولۇپ، نەپەس ئېلىشنى قىسىپ قويىدۇ. سەۋىيى: يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان ئومۇمى سەۋەپ-لەردىن تاشقىرى، بەدەننىڭ تارتىش ۋە چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋەتلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى ياكى ئۇلاردىن بىرىنىڭ زەئىپلىشىشى بىلەن كۆپ مىقداردا سۇ بەدەندە يىغىلىپ قالىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىششىق قوساقتا بەكرەك بولۇپ، قوساق خۇددى سۇ قاچىلانغان تۇلۇمدەك كۆپۈپ كېتىدۇ. قوساقنى ئۇرۇپ كۆرگەندە سۇنىڭ چالغۇنغان ئاۋازى ئاڭلىنىپ، قولغا دولقۇنى سېزىلىدۇ. ئوڭدا يېتىپ بىر تەرەپكە ئورۇلگەندە، بۇ خىل ئەھۋال كېسەلنىڭ ئۆزىگىمۇ سېزىلىدۇ. ئىششىق بەل، جىنىسى ئەزا، ئۇرۇقدانلارغىچە ھەتتا يۈز، قول، پۇتلارغىچە بارىدۇ. نەپەسلىنىش ئېغىر-لىشىدۇ. ھارارەت بولمىغاندا سۇيىدۇك ئاق كېلىدۇ. تەش-ئالىق بولمايدۇ. بەدەن رەڭگى ئاقارغان ھالدا بولۇپ، كېسەل بەدەننىڭ دائىم سوغاق بولۇشى بۇ خىلدىكى ئىستىسقاينىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. قىزىتما پەيدا بولۇپ قالسا، سۇيىدۇكنىڭ رەڭگى قىزىل، بەدەنلىرى قىزىق

بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. ئىششىقنى بارماق بىلەن باس-
قاندا ئويما نالانسىمۇ دەرھال يوقاپ كېتىدۇ ئالدىنقىسىدەك
ئۇزاق تۇرمايدۇ.

داۋاسى: ھارارەتنى پەسەيتىش ئۈچۈن، ئىسكەند-
جىبىن بىلەن كاسىن سۈيى بېرىلىدۇ. ئەگەر ھارارەت
بولمىسا، ھەسەل قوشقان ئىسكەنجىبىن ياكى شەرۋىتى
بۇزۇرى I (128 - نۇسخە) بېرىلىپ مىزاج تەڭشىلىدۇ.
ئىچىنى بوشتىتىش ئۈچۈن فۇنۇسنى قايناقسۇغا چىلاپ
تەمىنى چىقىرىپ، بادام يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ.

بەدەندىكى سۇيۇقلۇقنى تارقىتىش ۋە سۇيىدۇك
ھەيدەش ئۈچۈن مىزاجى ئىسسىق بولسا كەلكىلانەج I
(131 - نۇسخە)، سوغاق بولسا كەلكىلانەج II (132 -
نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۇيىدۇك ھەيدەش ئۈچۈن بۇ كېسەلگە
خاس دورىلاردىن قۇرسى مازەرىنۇن I (138 - نۇسخە)
ياكى قۇرسى مازەرىيون II (134 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
مەيلى قايسى خىلدىكى سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار
بولمىسۇن ئالماشتۇرۇپ بېرىش كېرەك. دائىم بىر خىل-
دىكىنى بېرىش بەزىدە ئۇنۇم بەرمەي قالىدۇ.

قايسى خىلدىكى ئىستىسقا بولمىسۇن، جىگەر مىزاجىنى
تەڭشەپ ۋە سۇيىدۇكنى ماڭدۇرۇپ (بەدەندىكى سۇيۇقلۇق
چىقىرىدىغان) دورىلارنى بەرگەندىن كېيىنلا جىگەرنى
قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان قۇرسى ئەنەبەر بارىس (135 - نۇسخە)
بېرىش كېرەك. ماددىسى كۈچلۈك بولمىسا، توگە

سۇتىنىڭ مەلۇم نەتىجىسى بار. غىزاسىغا تۇخۇم شورپە-سى، تۇرۇلغا گۆشى ۋە شورپىسى بېرىلىدۇ. بەزىلەر قوساقنى تىشىپ سۇ ئېلىش ۋە داغلاش چارىلىرىنىمۇ قوللىنىپ كۆرگەن. ئەمما خەتىرى كۆپ، نەتىجىسى ئاز. سۇ يەنە يىغىلىپ قالىدۇ.

ناغراسىمان سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقايسى تەبەلى)

سۇلۇق ئىششىق بىلەن بىللە تېرە ئاستىدا ھاۋامۇ بولغان سۇلۇق ئىششىقنى ناغراسىمان سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقايسى تەبەلى) دەپ ئاتىلىدۇ. مەئدە ھەزىمىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە جىگەر ئاغرىقلىرى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى سۇلۇق ئىششىقنى كەلتۈرسە، مەئدە ھەزىمىنىڭ بۇزۇلۇشى يەل پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىششىق قوساققا بولىدۇ. قوساقنىڭ شەكلى خۇددى پۈدىگەن تۈلۈمدەك بولۇپ قالىدۇ. ئەمما ئالدىنقىسىدەك ئېغىرلىق سېزىلمەيدۇ. قوساققا بەزىدە سانچىق ۋە چېڭقىلىش سېزىملىرى بولىدۇ. قور بىلەن قوساققا ئۇرۇپ كۆرگەندە دۇمباققەك ئاۋاز چىقىدۇ. كىندىكىنىڭ سىرتقا چىقىپ قېلىشى بۇ كېسەلدە ئالاھىدە بىر ئالامەت بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. بىرىنچى ۋە ئىككىنچى تۈرىدە بۇنداق ئالامەت بولمايدۇ.

داۋاسى: سۇيۇقلۇقلارنى بەدەندىن چىقىرىش ئۈچۈن كۆرسىتىپ ئوتۇلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ. بۇ جەھەتتە جىگەرنىڭ مىزاجىغا رىئايە قىلغان ھالدا چارە

قىلىش كېرەك. ئەمما ئىسسىقلىق بەك ئارتىق بولۇپ
 كەتمەسلىكى لازىم. چۈنكى مۇنداقنا ئۇسساش كېلىپ
 چىقىدۇ. كۈندۈز ۋە زېرىنى باراۋەر مىقدارلاردا ئېلىپ
 دائىم ئېغىزدا چايناپ تۇرۇپ سۈيىنى يۇتۇپ بېرىش،
 گۆش سۇلۇق ئىششىغىدا كورسىتىلگەن سىرتتىن چاپە-
 دىغان دورىلارنى قىلىش كېرەك. يەلنى تارقىتىش
 ئۈچۈن مەجۇنى سەنجىرىنا (33-نۇسخە) بېرىش بىلەن
 سۇزاپ يۈپۈرمىغى، ئادىراسمان، ئارپا بېدىيان، چىڭسەي
 ئۇرۇغى، توغرىغۇ، قارا شېكەرلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، كىچىك
 شامچىلارنى تەييارلاپ ئارقا يىلىغا تىقىپ قويۇش
 كېرەك. قالغان ئالامەتلىرىگە قاراپ گۆش سۇلۇق ئىش-
 شىغىدا كورسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. ناغراسمان
 سۇلۇق ئىششىق ئۇزۇنغا سوزۇلغاندا، ئىششىق قېتىپ
 قېلىپ، باشقا ئالامەتلەر بىرئاز يېنىكىلىشىدۇ. بۇنى
 تەبەلى ھەبىنى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ چاغدا ئومۇمى
 چارىلار بىلەن بىللە، يۇمشاققۇچى دورىلار ۋە بابۇنە،
 ئەكىلىل مىلىك، مەرزەنجۇش، سۇتتەر، سوزاپ ئۇرۇغى،
 قۇندۇز قەرى ۋە يۇلغۇن كۈلى قاتارلىقلارنى سوقۇپ
 ئارىلاشتۇرۇپ، سوزاپ سۈيى ۋە توگە سۇيدۈگى بىلەن
 ئەمدەپ قوساققا قويۇش كېرەك. ئىچىدىغان چېپىغا ئىت
 ئۇزۇمى، كاسىن ئۇرۇغى ۋە كاسىن يىلتىزىنى قاينىتىپ
 بېرىش لازىم. ئىچىنى بوشتىش ئۈچۈن توۋەندىكىلەر
 بېرىلسە بولىدۇ:

سانا 7 مىسقال، بىنەپشە، نىلۇفەر، كاسن ئۇرۇغى
 ھەربىرى 3 مىسقالدىن؛ سېرىق ھېلىلە، بەلىلە، ئامىلە
 ھەربىرى 5 مىسقالدىن؛ قۇرۇق ئۇزۇم 15 مىسقال؛
 قارا ئورۇك، چىلان 10 دانىدىن؛ سەرىستان 20 دانە؛
 فۇنۇس، خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل 10 مىسقالدىن
 ئېلىنىدۇ. فۇنۇس بىلەن تەرەنجىۋىلنى ئايرىم ھالدا
 قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ، باشقا دورىلارنى
 سوقۇپ قاينىتىپ، يۇقۇرقىلارنىڭ سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ
 سۇزۇپ يالغۇز ياكى ئىسكەنجىيىن بىلەن بېرىلىدۇ. بەزد-
 لەر بۇ خىلدىكى ئىستىسقاغا ھەببى سەككىنەج (4-9-
 نۇسخە) بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

سېرىق كېسەل (يەرقان)

سېرىق كېسەل (يەرقان) تىبابەتتە ساغۇش سېرىق
 كېسەل ۋە قارا سېرىق كېسەل دەپ 2 گە بۆلۈنىدۇ. ساغۇش
 سېرىق كېسەل جىگەر بىلەن ئوتنىڭ زەرەرلىشىدىن
 پەيدا بولسا، قارا سېرىق كېسەل كۆپىنچە تال كېسەل-
 لىكلىرى نەتىجىسىدە پەيدا بولۇپ، رەڭگى قارىغا مايىل
 توق سېرىق رەڭدە بولىدۇ. بۇلار يەنە ئالاھىدە ئالا-
 مەتلىرى ۋە سەۋەپلىرىنىڭ تۈرلىرىگە قاراپ بىر قانچە-
 گە بۆلىنىدۇ. تىۋەندە ئۇلارنىڭ ئالاھىدىلىرى ۋە
 داۋاسى ئايرىم سۆزلىنىدۇ.

1. ساغۇش سېرىق كېسەل (يەرقانى ئەسفەر)

1. سەپرادىن بولغان قىزىتمىلار بوهرانى سەۋىيى
 بىلەن سېرىقلىق چۈشىدۇ.

ئالامەتلىرى: سېرىقلىقنىڭ پەيدا بولۇشى بىرەر كۈنلىرىگە توغرا كېلىدۇ، كوڭلى ئاينىيدۇ، ئېغىزى ئاچچىق، ئىچى قاتقان، ئىچكى ئەزالاردا سانجىق بولىدۇ.

داۋاسى: كېسەلنى ئىسسىق سۇدا ئولتۇرغۇزۇش، ئىسكەنجىپىن ياكى يالغۇز كاسىن سۈيى بېرىش كىپايە قىلىدۇ.

2. جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشىدىن پەيدا بولىدۇ. بۇخىلدا سەپرائى غەيرى تەبىئى قانغا ئارىلىشىپ پۇتۇن بەدەنگە تارايىدۇ. شۇنىڭ بىلەن سېرىقلىق ئومۇمى بەدەنگە چۈشىدۇ. قەي قىلىش، كوز ۋە بەدەندىكى سېرىقلىق بەك ئېغىر بولىدۇ. سۈيىدۈك رەڭگى قارامتۇل كېلىدۇ. ئۈستىدىكى رۇسۇپ سېرىق بولىدۇ.

داۋاسى: جىگەردىكى قىزىتمىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئازار شەرۋىتى (47-نۇسخە) ۋە ئارپا سۈيى بېرىلىدۇ. جىگەر ۋە بەدەندىن سەپرائى چىقىرىش ئۈچۈن، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20-نۇسخە) گە مەھمۇدە (سۇقمۇندە-پا) قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن شەرۋىتى فەۋاكە (15-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3. مىزاجىنىڭ ھەددىدىن زىيادە ئىسسىقلىقى ۋە ھارارەت تەسىرىدىن ئوت قانغا ئارىلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قاندىكى ئوت مىقدارى ئېشىپ كېتىپ سېرىقلىق پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: تۇيۇقسىزلا پۈتۈن بەدەن ساغىرىپ

كېتىدۇ. سۇيۇكمۇ توساتتىن ساغىرىپ بارغانسېرى قارىغا مايىللىشىدۇ. جىگەردىكى زەرەرلىنىشتىن بولغان سېرىق چۈشۈشتىن شۇنىڭ بىلەن پەرقلەندىكى، جە - گەردىن بولغان سېرىق چۈشۈشتە سۇيۇك دەسلەپتە قىزىل بولۇپ، ئاستا - ئاستا سېرىقلىشىدۇ، بەدەندىكى سېرىقلىقمۇ بىردىنلا پەيدا بولماستىن، تەدرىجى پەيدا بولىدۇ. ئالدى بىلەن ئىشتەي تۇتۇلۇش قاتارلىق ھەزىم بۇزۇلۇش ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ. تەشۋالىق ئۆتكۈر بولىدۇ. ئەمما مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقىدىن بولغان سېرىق كېسەلدە بۇ بەلگىلەر بولمايدۇ.

داۋاسى: ئەينۇلا سۈيى، ئانار شەرۋىتى (47 -

نۇسخە)، كاسىن ئۇرىغىنىڭ شىرىسى، ئىسكەنجىبىن بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن تازىلاش ئۇچۇن سېرىق ھېلە - لىم، شاتەرە، ئەپسەنتىن، ئەينۇلا ۋە تەمرى ھىندى قاتارلىقلار قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

(4) ئوت خالىتىنىڭ ياللۇغى ياكى ئوت يوللە -

ردىكى توسىلىشلار سەۋىبى بىلەن بەدەندىكى ئوتنىڭ چىقىرىلىشى توسالغۇغا ئۇچراپ، بەدەندە ئوت مىقدارى ئېشىپ كېتىپ سېرىقلىق پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما، قەي ۋە تىل قۇرۇپ

گەز باغلاش قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن بىللە جىگەر ساھە -

سەدە ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش سېزىدۇ. جىگەر ياللۇغى بولسا جىگەر ياللۇغىغا تېگىشلىك ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: جىگەر ياللۇغى بىلەن ئوخشاش.

2. سېرىق كېسەل (يەرقانى سەنەدى)

بۇ خىلدىكى يەرقانىنىڭ ئاساسىي سەۋىيىسى سەۋدا - نىڭ قان تەركىۋىگە ئارىلىشىپ قېلىشى بولۇپ، بەدەن رەڭگى قاراۋەتۈل سېرىق رەڭگە كىرىدۇ. سۈيۈك ۋە تەرەتنىڭ رەڭگىمۇ قارىغا مايىل بولۇپ قالىدۇ. بىرىنچى قىسمىدا سوزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك، تال سەۋدانى ساقلايدىغان ئورۇن بولۇپ، كېرەك بولغاندا سەۋدا ماددىسىنى ئۆز يولى بىلەن مەئىدىگە چىقىرىپ ئىشتەي پەيدا قىلىدۇ ۋە ھەزىمگە ياردەم بېرىدۇ. دىمەك قارا سېرىق كېسەل ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا تالنىڭ زەرەر - لىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇنداقلا جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىكتۇر. چۈنكى سەۋدا ئەسلىدە جىگەردە ئىشلىنىپ چىقىپ تالغا بارىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قارا يەرقان تالنىڭ ۋە جىگەرنىڭ بىللە زەرەرلىنىشىدىن پەيدا بولىدۇ. قارا يەرقان سەۋەپ ۋە قىسمەن ئالامەتلىرىگە قاراپ تىۋەندىكىچە بولىنىدۇ:

(1). تالدىن مەئىدىگە سەۋدا بارىدىغان يولدا تو -

سالغۇ پەيدا بولغاندا تالدىكى سەۋدا سەرپ بولماي

توپاەشىپ جىگەرگە قايتىپ كېلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن جىگەردىكى سەۋدا مىقدارى ئېشىپ كېتىپ كۆپ مىقدار - دا سەۋدا قانغا ئارىلىشىدۇ - دە، ئەسلىدە قارامتۇل رەڭدە بولغان سەۋدا بەدەنگە غەيرى تەبىئى بىر رەڭ بېرىدۇ. ياكى جىگەردىن تالغا سەۋدا بارىدىغان يول توسىلىپ قېلىپ جىگەردىكى سەۋدا ئېشىپ كېتىپ، ئوخشاشلا قاندا سەۋدا ماددىسى كۆپىيىدۇ.

ئالامەتلىرى: قارامتۇل سېرىقلىق ئاستا - ئاستا يۈز بېرىدۇ. تالدىن مەئىدىگە بارىدىغان يول توسالسا، چەپ تەرەپ يۇقۇرقى قوساق قىسمىدا ئاغرىش ۋە قاداتى (سانجىق) بولىدۇ. جىگەردىن تالغا بارىدىغان يول توسۇلسا بۇ ئالامەتلىر ئۆڭ تەرەپتە بولىدۇ. ھەر ئىككىسىدە سەۋەپسىز بىردىنلا ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، سۈي - دۆڭ قارامتۇل كېلىدۇ.

داۋاسى: توسالغۇنى ئېچىش ئۈچۈن ئىسكەنجە - بىن بۇزۇرى (101 - نۇسخە) ۋە شەرۋىتى كۇشۇش (136 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇرسىغا پەس (137 - نۇسخە) ئومۇمەن جىگەر ۋە تالنىڭ توسىلىش خۇسۇسىيەتلىك كېسەللىكلىرىگە ناھايىتى ئۈنۈملۈكدۇر. ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن ئاخىرىدا مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىش ئۈچۈن كاسىن سۈيىگە ئىسكەنجىبىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. توخۇ گوشنى سىركە بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش كېرەك.

(2) كۈچلۈك ئىسسىقلىقنىڭ جىگەرگە بولغان تەسىرى ئاستىدا، غەيرى تەبىئى سەۋدا ھاسىل بولۇپ، قانغا ئۆتۈپ قارا سېرىق كېسەل پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: قارا سېرىق كېسەلنىڭ پەيدا بولۇشى — قىزىتما، نەپەس ئېلىشنىڭ قىيىنلىشىشى يۈز بېرىدۇ. ئاغرىقتا تۇرلۇك روھى ئالامەتلەر غەم، ئەندىشە قىلىش، قورقۇش ھەرخىل پىكىرلەر پەيدا بولىدۇ. سۈيى-دۈك ۋە تەرەت قارامتۇل رەڭدە كېلىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20- نۇسخە) بېرىلىدۇ. سوغاقلىق دورىلاردىن سىرتتىن سۈركەيدىغان دورا ياساپ سۈركىلىدۇ.

(3) تالنىڭ ئۆزىگە تارتىش قۇۋۋىتى ۋە تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشى سەۋىيىدىن قارا سېرىق كېسەل پەيدا بولىدۇ. چۈنكى تارتىش قۇۋۋىتى بۇزۇلغاندا تالنىڭ شىمىرىش كۈچى ناچارلىشىپ جىگەردىن كېلىدىغان سەۋدانى ئۆزىگە جەلپ قىلالمايدۇ. تۇتۇپ تۇرۇش كۈچى بۇزۇلسا، سەۋدانى ئۆزىدە تۇتۇپ تۇرۇشى بۇزۇلۇپ، سەۋدانىڭ قانغا چىقىشى بىلەن بۇ خىلدىكى يەرقان پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تالنىڭ زەئىپلىك ئالامەتلىرى ئۇزۇندىن بېرى بار بولىدۇ (تال كېسەللىگىگە قاراڭ). زېھنى توۋەن، گاراڭ بولۇپ قالىدۇ. كوز ئېقى ئاقىرىپ

كېتىدۇ. قۇسۇش ھەم ئىچ سۇرۇش بىلەن سەۋدا بىللە چىقىدۇ.

داۋاسى: تالنى كۈچلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى قىلىش كېرەك (تال كېسەللىكلىرىگە قاراڭ).

4) بوھران نەتىجىسىدە غەيرى تەبىئى ماددىلار سىرتقا چىقىدۇ. تال كېسەللىكلىرىنىڭ بوھران كۈنىدە رىدە كۆپلىگەن سەۋدا تال، جىگىرىدىن چىقىرىلىپ بەدەنگە قارارەك پەيدا قىلىدۇ ۋە سۇيۇك قارا بولىدۇ. ئەمما بۇ چاغدا ئاغرىقتا ئەسلى كېسەللىگىنىڭ بىر مۇنچە ئالامەتلىرى يەڭگىللىشىپ كېسەل راھەتلىنىپ قالىدۇ. بەدەننىڭ چىقىرىش كۈچىگە ياردەم بېرىش، تالنى كۈچەيتىش كېرەك، بوھراندىن بولغان ساغۇش سېرىق كېسەلدىكى چارىلارنى قىلسا بولىدۇ. مۇنچىغا چۇشۇش، بەدەنگە بابۇنە يېغى، سېرىق چىچەك يېغى ۋە چىقىرتما-ماق ياغلىرىنى سۈركەش كېرەك.

IX ماقالا. تال كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: تالنىڭ مىزاج ئوزگىرىشلىك

ئاغرىقلىرى

تالنىڭ مىزاجىدىكى غەيرى ئوزگىرىشلەر — تالدا ئىسسىقلىقنىڭ، سوغاقلۇق، نەملىك، قۇرۇقلۇق ۋە ھۆل ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ئىبارەتتۇر. بۇلاردا تال خىزمىتىنىڭ ئوخشاش بولمىغان ھالىدىكى بۇزۇلۇشلىرىدىن ئىبارەت ئورتاق ئالامەتلەردىن باشقا، يەنە ئۆزىگە خاس بولغان ئالاھىدە ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ ۋە ئۇلارغا مۇناسىپ داۋالاش چارىلىرى بار. ئۇلار تۆۋەندىكىچە:

تالدا ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشى: بۇنىڭدا بولىدىغان ئالامەتلەر سول تەرەپ يۇقۇرقى قوساق قىسمى ئېچىشىپ ئاغرىدۇ، تەشنىلىق بولىدۇ. سۇيۇك ۋە تەرىتىنىڭ رەڭگى قارامتۇل قىزىل رەڭگە كىرىپ قالىدۇ، تېنى قىزىيدۇ.

داۋاسى: سول تەرەپ ئۆسلىم تومۇرىدىن قان ئالغاندىن، كېيىن، ئىت ئۇزۇمى ۋە كاسىن سۇيى (كوك ھالىدىكىسى ياخشى) لىرىنى بېرىش لازىم. ماددىنى سۇ-

رۇپ چىقىرىش ئۇچۇرۇن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە)
بېرىش كېرەك. ئەگەر قىزىتما بولسا قۇرسى كاپۇر
(76 - نۇسخە) ياكى قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

تالدا سوغاقلاننىڭ ئېشىپ كېتىشى: بۇنىڭ ئالا-
مەتلىرى، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، توۋەن قىزىتما يۈز بېرىدۇ،
تەشئالىق بولمايدۇ، قوساقتا يەل كوپىيىپ قالىدۇ.
كىكىرىش كوپ بولىدۇ ھەم ئېغىزدىن دائىم سۇ كېلىپ
تۇرىدۇ. سول تەرەپ يۇقۇرقى قوساق قىسمىدا يېقىم-
سىزلىق سېزىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىبىن بۇزۇرى (ئىسسىق خۇ-
سۇسىيەتلىگى) ياكى قۇرسى بۇزۇرى (119 - 137 - نۇس-
خىلەر) بېرىلىدۇ. يىپىشكە گۈلچەن بېرىلىشى كېرەك.
تالنى قىزىتىدىغان دورىلار تال ساھەسىگە سىرتتىن
چىپىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئەنجۈر، قۇست، سىركە، سەدەپ،
بىخ كەبىر، ئوسقۇدرىيۇن، ئاچچىق باداملارنى سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن چىپىلىدۇ.

تالدا قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى: بۇنداق ھال-
لاردا تال قېتىپ قالغان بولۇپ، بەدەن ئورۇق ۋە
قۇرغاق كېلىدۇ. كېسەلنىڭ چىرىيمۇ قارامتۇل كوك
رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

داۋاسى: بەدەن نەملىگىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن
بىنەپشە شەرۋىتى (69 - نۇسخە)، نىلۇفەر شەرۋىتى (75 -

نۇسخە)، خەشخاش شەرۋىتى (74 - نۇسخە) دىن بىرىنى تاللاپ بېرىش كېرەك. ھول قاپاق، خاڭگا سۇلىرى بېرىلىدۇ. سېمىز ئوت ئۇرۇغى، قاپاق، قوغۇن، ئاق لەيلى ئۇرۇقلىرىنى چېقىپ مېغىزلىرىنىڭ شىرىسىنى ① چېقىرىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئايال سۈتىنى بىنەپشە يېغى بىلەن قوشۇپ تالغا سۈركەش لازىم. غىزاسىغا ھوللۇك تاماقلار، توخۇ گۆشى، پاخان گۆشى، قاپاق ئېشى بېرىلىدۇ. تالدا ھول ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشى: سول تەرەپ قوساق ساھەسى دائىم ئېچىشىپ تۇرىدۇ. ئېغىر - لىق ۋە سانجىقسىمان ئاغرىش سېزىلىدۇ، بەدەن رەڭگى كۆكۈش بولۇپ، بوشاڭ، ماغدۇرسىز كېلىدۇ. سۈيىدۈك بەزىدە قارامتۇل رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىبىن (118 - نۇسخە) تەركى - ۋىگە 3 مىسقال بىخ كەبىر قوشۇپ تەييارلاپ بېرىلىدۇ. قىزىل گۈل، يۇلغۇن مېۋىسى (داۋا)، مۇغاس، ئاق سەندەللىرىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ يۇلغۇن مە - ۋىسىنىڭ سۈيى بىلەن نەمدەپ تال ئۈستىگە چېپىلىدۇ.

① شىرە (لۇئاب) چېقىرىش ئۇسۇلى: تەييارلىغان مېغىز ۋە ئۇرۇق دورىلارنى چالا سوقۇپ كىچىك بىر خالىغا سېلىپ تىكىپ بولغاندىن كېيىن، پىيالىگە سېلىپ ئۈستىدىن بىر ئاز قايناقسۇ قۇيۇپ بىر پەس قويمىز. ئۇندىن كېيىن قوشۇق بە - لىن خالىنى بېسىپ مېغىزدا ئاق شىرە چىقىدۇ. بۇنى باشقا قاچىغا سۇزۇپ ئالىمىز. بۇنى تەكرار قىلىنىدۇ.

تالنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى تال)

تالنىڭ ياللۇغلىنىشىغا خىلىتلاردىن قان، سەپرا ۋە بەلغەمنىڭ غەيرى تەبىئى ئۆزگەرگەن ھالىتى سەۋەپ بولىدۇ.

(1) قاندىن بولغان تال ياللۇغى: بۇنىڭ مۇھىم ئالامىتى، تال ساھەسىدىكى ئاغرىش، ئېچىش بىلەن بىللە تەشۋىلىق بولىشى، قىزىتمىنىڭ ھەر 4 كۈندە بىر قېتىم كوتۇرۇلىشىدىن ئىبارەتتۇر. سۈيدۈك قارا كېلىدۇ، سول تەرەپ تال بار جايىنى قول بىلەن تۇتۇپ كۆرگەندە قىزىق بىلىنىدۇ. باسقاندا قاتتىق ئاغرىق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئىمكانىيەت بولسا سول تەرەپ باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم. ئۇندىن كېيىن پۇنۇس، تەمىرى ھىندى، كاسىن ۋە ئىت ئۆزىمىنى قاندا بويىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر قىزىتما بولسا قۇرسى كاپۇر (76- نۇسخە) ياكى قۇرسى تاباشىر (112- نۇسخە)نى شەۋىتى زىرىشك (89- نۇسخە)لەر بىلەن بېرىش لازىم. ياكى گۈل بىنەپشە، قىزىل گۈل، بىخ كە- بىر، تەمىرى ھىندى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى شىرىسى بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۇچۇن ئارپا ئۇنى، قىزىل گۈل، ئاق سەندەل، ھەمشىۋا، ئىت ئۆزۈمى، ئاقاقىيا، مامىشا، يۇمىلاقسۇتلەرنى سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تال ئۆزىگە قويۇشقا بېرىلىدۇ.

(2) بۇزۇلغان سەپرانىڭ تالدا يىغىلىپ قېلىشى-

دىن بولغان تال ياللۇغى: ئېچىش، ئاغرىش تالدا
ئېغىرلىق، بەدەندە قىزىتما ئېغىر بولىدۇ. پۈتۈن بەدەن
ساغرىپ كېيىنچە قارىغا ئۆزگىرىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى
ھېلىلە (38 - نۇسخە) ۋە ئىسكەنجىبىن (101 - نۇسخە)
لەرنى بېرىش كېرەك. ئىششنى قايتۇرغۇچىلاردىن رۇ -
سۇت، گىلى ئەرمىنى، ئەنجۇر، خىيارى شەنبەر، بۇغداي
كېيىگى، ئىت ئۇزۇمنى سىركە بىلەن بىللە سىرتتىن
چىپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. توۋەندىكى تالقان (سۇپۇپ)
يېيىشكە بېرىلىدۇ.

سەمغى ئەربى 1 مىسقال، قىزىل گۈل 2 مىسقال،
تاباشىر $1\frac{1}{2}$ مىسقال، ئاق سەندەل $1\frac{1}{2}$ مىسقال، كا -
سىن ئۇرۇغى 3 مىسقال، زىرىق 3 مىسقال، سېمىز ئوت
ئۇرۇغى، خاڭگا، تەرخەمەك، قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىز -
لىرى ھەربىرىنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەم سەۋبىدىن بولغان تال ياللۇغى: تال -
دىكى ئاغرىش كام بولىدۇ، لېكىن ئېغىرلىق سېزىدۇ.
تىلى ۋە بەدەن رەڭگى ئاق بولىدۇ، تەرەت بىلەن
سۇيىدۇك ئاق كېلىدۇ. كوزى ئالايمانەك بولۇپ كورۇنىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج
پەيقارا ۋە مەتبۇخى ھېلىلە (16 - 38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

ئۇندىن كېيىن تالنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئوردان قۇرسى ياكى قۇرسى بىخى كەبىر (139 - 140 - نۇسخە) لەرنى بېرىش مۇمكىن. مۇۋاپىق دورىلار ھەقنە قىلىنىدۇ. تال كېسەللىكلىرىدە كۆرسىتىلگەن دورىلار سىرتتىن چېپىلىدۇ.

تالنىڭ زەئىپلىگى

تالنىڭ زەئىپلىگى ئۇنىڭ تارتىش (قەبۇل قىلىش)، تۇتۇپ تۇرۇش ۋە چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋەتلىرىنىڭ ئاجىزلىغىدىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: تارتىش قۇۋۋىتى ئاجىزلاشقاندا ئىشتەي يوقۇلىدۇ، سەۋدا كېسەللىگىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا، كوڭۇل ئاينىش، قەي قىلىش ۋە ئىچى سۇرۇش يۈز بېرىدۇ. بۇلار سەۋ - دانىڭ ئالامەتلىرى (تەرەت ئاچچىق يامان پۇراقلىق، قارامتۇل رەڭلىك) بولىدۇ. ئەگەر چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا تال چوڭىيىدۇ. ئىشتەي بولمايدۇ.

داۋاسى: تالنى قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان ئوردان قۇرسى ياكى قۇرسى بىخ كەبىرلەر بېرىلىدۇ (139 - 140 - نۇسخە) لەر، سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن ئەپسەننىن، سۈمبۇل، يۇلغۇن ياپرىغى، قەرەد مانا، ئىزخىر، بىخ كەبىر، قىزىل گۈل، مۇقىللارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ سۇقۇپ، سىركە بىلەن نەمدەپ تال ئۈستىگە قويۇش كېرەك.

X قالا. ئۈچەي كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: ئۈچەيدىكى ھەزىمنىڭ بۇزۇلۇشلىرى

ئۈچەي تارىيىپ قېلىش (زەيقۇلئەمئا)

بۇ، ئۈچەينىڭ سىلىقلىشىپ قېلىشى بىلەن بولغان ئىچ سۇرۇش كېسىلىدىن ئىبارەتتۇر. يەنى مەئىدىدىن ئۈچەيگە كەلگەن تاماق ئۈچەيدە ھەزىم قىلىنماستىنلا چىقىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنى ئۈچەينىڭ تېپىلغاق سۇرۇش كېسىلى دەپمۇ ئاتايدۇ. سەۋەپلىرىگە قاراپ بۇ كېسەل تۆۋەندىكى بىر قانچىگە بۆلىنىدۇ.

بىرىنچى سەۋىيى: ئۈچەينىڭ ئىسسىقلىقى سەۋىيى بىلەن سەپرا ماددىسىنىڭ كۆپ بولۇشى ياكى ئۈچەي ئۈستۈنكى قەۋەتلىرىگە مۇدۇر (قاپارتما) لار چىقىشى تۈپەيلىدىن شىلىملىق سۇيۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: تاماقنىڭ مەئىدىدىن ئۈچەيگە كېلىشى بىلەنلا قوساقتا ئاغرىش ۋە ئېچىشش، چىشلىگەندەك سېزىلىش (سەپرا سەۋىيى بىلەن) پەيدا بولىدۇ. ھەزىم بولغان ۋە چالا ھەزىم بولغاندا تاماق قالدۇق.

لىرى بار بولغان سۇيۇق سېرىق سۇ ئارىلاش تەرەت كېلىدۇ. تەرەت چىقىش ۋاقتىدا سوۋىك ئېچىشىدۇ. كېسەل سوغاق سۇ ئېچىش بىلەن ئاغرىش يېنىكىلەشكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ. ئاغرىش سېزىلىدىغان جايى كىندىك ئۈستى ياكى ئىككى يان تەرىپى، بەزىدە كىندىك ئاستىدىن ئىبارەت. ئۈچەي قەۋىتىگە چىققان قاپارتمىلار ئىچ تەرەپتە ياكى تاشقى تەرەپتە بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر ئىچ تەرەپتە بولسا تەرەت زەرداپ سۇ ئارىلاش كېلىدۇ. تاشقى تەرەپتە بولسا ئۇنداق بولمايدۇ.

داۋاسى: توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ:

نوخۇت، ئارپا ئۇنى، گۈرۈچ ھەربىرى 5 مىسقالدىن. كوكىنار پوستى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ھەربىرى 3 مىسقالدىن، سەمىغى ئەرەبى، نىشاستە ھەربىرى 1 مىسقالدىن، گۈل يېغى 3 مىسقال، لازىم مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۇزۇپ، گۈل يېغىنى قوشۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ. رەبھان ئۇرۇغى، كىنۇچە ئۇرۇغى، پاقا يوپۇرمىغى ئۇرۇغى ھەربىرى 2 مىسقالدىن ئېلىپ، قاچىغا سېلىپ ئوت (چوغل) ئۈستىدە قويمىز. دورىلار تازا قىزىپ قورۇلغاندا ئۈستىگە بىر ئاز قايناقسۇ قويۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ئېلىپ، بىر مىسقالدىن كۈنىگە 1 - 2 قېتىم ئانار شەرىۋىتى (47 - نۇسخە)، خەشخاش شەرىۋىتى (69 - نۇسخە) دىن بىرى بىلەن بېرىلىدۇ.

سېرتتىن چېپىش ئۇچۇن — ئارپا ئۇنى، ئانار گۈلى، قىزىل گۈل ۋە ئاق سەندەللەرنى ئالما سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئەگەر قىزىتمىسى بولسا، قان ئېلىشنى ئويلاپ كورۇش مۇمكىن. كاسىن، سېمىز ئوت ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسى ۋە بىيە سۈيى بېرىلىدۇ. ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەرنى تاماق بىلەن بېرىشنى چەكلەش كېرەك.

ئىككىنچى سەۋىيى: خىلىتلارنىڭ كېرەكسىز سۇ-يۇقلۇقلىرى ئۈچەي پەردىلىرىگە يىغىلىپ ئۈچەي تاملاردىن سىلىقلاشتۇرۇپ قويىدۇ. بۇ ئۈچەينىڭ تۇتۇپ تۇرۇش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ ئىچ سۇرۇش پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپلىگەن شىلىمىشقى سۇيۇقلۇق

ئارىلاشقان ۋە ھەزىم بولمىغان تاماق ماددىلىرى بولغان تەرەت كېلىدۇ. ئەگەر ماددىلار كۈچلۈك بولسا ئۇنىڭ ئالامەتلىرى بىللە بولىدۇ. مەسىلەن، سەپرا بولسا ئېچىم-شىش، قاندىن بولسا، قىزىتما قىرىشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ ئەھۋال بەزىدە مەئىدە يىغىلىپ قالغان كېرەكسىز سۇ-يۇقلۇق سەۋىيىدىن بولىشىمۇ مۇمكىن.

داۋاسى: مۇۋاپىق دورىلار بىلەن قەي قىلدۇ-رۇش ياكى سۈرگە بېرىش بىلەن كېرەكسىز سۇيۇقلۇقنى چىقىرىپ تاشلاش كېرەك. سۈرگە ئۇچۇن مۇنۇ دورىلارنى بېرىش لازىم: سېرىق ھېلىلە پوستى 2 مىسقال، سۇماق، ھەببۇلئاس، موزا ھەربىرىنى 1 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقانلاپ كۈنىگە 1 - 2 قېتىم 2 مىس-

قالدىن بېرىلىدۇ. ياكى ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بەرسىمۇ بولىدۇ. ماددىنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن سۇيۇپ رۇمان (111 - نۇسخە) ۋە قۇرسى گۈلنار (140 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇلاردىن كېيىن ئۈچەينىڭ تۇتۇش كۈچىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ خىل ئاغرىقلارنى دەسلەپتە بىرەر كۈن ئاچ قويۇش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. كېيىنچە پاقالچەك گوشى ياكى توخۇ گوشى بېرىشكە بولىدۇ. ئەگەر قىزىتمىسى بولسا گوش ياغ بېرىشكە بولمايدۇ.

3) ئومۇمىي بەدەن پالچى ياكى ئۈچەي ئوزىنىڭ پالەچلىنىشى تۈپەيلىدىن ئۈچەينىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى بۇ - زۇلۇپ تاماق ماددىلىرى ئۈچەيدە تۇرماستىنلا مېڭىپ كېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەنلىك پالەچلىك ئالا - مەتلىرىنىڭ بولۇشى ياكى ئۈچەيگە يەل تولۇپ قوساق كۆپىدۇ.

داۋاسى: پالەچنى داۋالاش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ (ئىستىرخا ۋە پالەچكە قاراڭ).

2 - پەسىل: ئىچ سۇرۇش (ئىسھال) لار

ئىچ سۇرۇش توغرىسىدا مەئدە ۋە جىگەر كېسەل - لىكلىرى بايانىدا توختىلىپ ئۆتكەن بولساقمۇ، بۇ

پەسلىدىكى ئىچ سۇرۇش ئۇچەينىڭ زەرەرلىنىشى ئاسا-
سىدىكى ئىچ سۇرۇشلەردىن ئىبارەت بولۇپ، سەۋەپ ۋە
ئالامەتلىرىگە قاراپ 4 قىسىمغا بۆلىنىدۇ:

قانلىق ئىچ سۇرۇش (ئىسھال دەمەۋى)

قانلىق ئىچ سۇرۇشنى ئۇچەينىڭ قەۋەتلىرى سو-
يۇلۇشى بىلەن بولغان قانلىق ئىچ سۇرۇش ۋە ئۇچەي
قان تومۇرلىرىنىڭ شىكەستلىنىشى بىلەن بولغان قانلىق
ئىچ سۇرۇش دەپ 2 چوڭ قىسىمغا بۆلىنىدۇ. توۋەندە
بۇلارنى ئايرىم - ئايرىم سوزلەيمىز.

1. ئۇچەينىڭ ئىچكى يۈزى سويۇلۇشتىن بولغان
قانلىق ئىچ سۇرۇش (سەھەج): سەپرانىڭ ئۇچەيگە قۇيۇ-
لىشى بىلەن ئۇچەي يۈزىنىڭ نېپىز قەۋەتلىرى كويۇپ
سويۇلىدۇ. ياكى بەلغەم ئۇچەيگە چۈشۈشى (نەزلە ماددى-
سىنىڭ ئۇچەيگە قۇيۇلىشى) بىلەنمۇ بۇ ئىسھال كېلىپ
چىقىدۇ. زەھەرلىك دورىلار سەۋدا ۋە قاتتىق تەرەتمۇ
ئۇچەي يۈزىنى زەخمىلەيدۇ.

1) سەپرا ئۇچەيگە قۇيۇلغاندا بولىدىغان ئالامەتلەر:
ئالدى بىلەن ئۇچەيدە ئېچىنىش بىلەن بىللە تولغا-
سىمان ئاغرىش پەيدا بولىدۇ. كېيىن ئىچ سۇرىدۇ، تە-
رەتتە ئالدى بىلەن قويۇق شىلىملىق نەرسە كېلىدۇ.
كېيىنچە بۇنىڭغا قان قوشۇلىدۇ. ئۇچەينىڭ زەرەرلىنىشى
يۇقۇرقى تەرەپتە بولسا، ئاغرىش، قىزىق سېزىلىش، ئې-
چىنىش ۋە كويىگەندەك سېزىملەر كىندىك ئۈستىدە بى-

لىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئىنجىق ۋە تەشەنلىق يامان بولىدۇ. ئەگەر زەرەرلىنىش ئۈچەينىڭ ئاستىنقى قىسمىدا بولسا، ئالدى بىلەن قان ۋە بەلغەمدەك نەرسىلەر كېلىپ، كېيىن تەرەت كېلىدۇ. ئاغرىش، تولغاپ ئاغرىش قاتارلىق سېزىملەر كىندىك ئاستىدا بولىدۇ. زەرەرلىنىش چوڭ ئۈچەي (قۇلۇن ئۈچەي) دە بولسا تەرەتتە قان بىلەن پوتىلىدەك نەرسىلەر ئانچە كۆپ بولمايدۇ ۋە ياغ ئارىلاشمىغان كېلىدۇ. ئەمما ئىنچىكە ئۈچەيدە بولغاندا بۇ نەرسىلەر كۆپ بولۇپلا قالماستىن، ياغ ئارىلاشقان بولىدۇ. ئۈچەي يۈزى سويۇلۇشنىڭ بۇ خىلدىكىسى ئېغىر ئوتىدۇ. ئۈچەي تېشىلىپ كېتىش ھادىسىلىرىمۇ كۆرۈلەدۇ. ئۇنداقتا ئولۇمگە ئېلىپ بارىدۇ.

(2) شور بەلغەمدىن بولغان ئۈچەي ئىچكى يۈزى سويۇلۇشنىڭ ئالامەتلىرى: قوساقنىڭ تاتىلانغاندەك ئاغرىشى ۋە ئېچىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، تەرەت بىلەن قان ۋە قويۇق بەلغەمدەك نەرسىلەر كۆپ كېلىدۇ. ئىچ سۇرۇش ئالدىدا كۆپ يەل ماڭىدۇ. تولغاقسىمان ئاغرىق بار جايدا ئېغىرلىق ھېس قىلىنىدۇ. ئاغرىش بىرلا جايدا بولىدۇ، يۆتكەلمەيدۇ. نەزلە ياكى زۇكام بىلەن ئاغرىغان ھالدا ياكى زۇكامدىن ساقايغان مەزگىلدە يۈز بېرىدۇ. بۇ خىلدىكى سەھەجمۇ ئۈچەينى يارا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: يېنىك ھاللاردا ئانار شەرۋىتى، لىمون

شەرۋىتى قاتارلىق چۇچىمەل شەرۋەتلەردىن بېرىلىدۇ. ماددا كۆپ بولسا، ئالدى بىلەن ماددىنى چىقىرىش چارىلىرىنى قىلىپ بولغاندىن كېيىنلا قاتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىش كېرەك. ماددىنى سۇرۇش ئۈچۈن مەتبۇخى خىيار شەنبەر (54 - نۇسخە) ياكى مەتبۇخى تەمىرى ھىندى (115 - نۇسخە) بېرىلگەندىن كېيىن، ئىسپۇغۇل لۇئابى بېرىش شەرت. ئۇندىن كېيىن قاتۇرغۇچى دورىلاردىن بېرىلىدۇ. مەسىلەن، ئىسپۇغۇل، رەيھان ئۇرۇغى، چوڭ پاقا يوپۇرماق ئۇرۇغى، سەمىغى ئەرەبى، گىل ئەرەمىنى 15 مىسقالدىن، كوكئار ئۇرۇغى 10 مىسقال، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، نىشاستە ھەر بىرى 7 مىسقالدىن ئېلىنىپ، ئۇرۇق دورىلار (ئىسپۇغۇل، رەيھان، چوڭ پاقا يوپۇرمىغى ئۇرۇغىدىن باشقىسى) نى ئالدى بىلەن يۇمشاق ئوتتا قورۇپ، ھەممە دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قىلىپ 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ. ياكى توۋەندە كۆرسىتىلگەن دورىلارنى ھوقنە قىلىشىمۇ بولىدۇ (ئىسپۇغۇلنى سوقۇش مەنى قىلىنىدۇ).

نۇسخە: سەمىغى ئەرەبى، نىشاستە، خۇنسىياۋشان، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سىققان سۈيى، كويدۇرۇلگەن قەغەز، كويدۇرۇلگەن سەدەپ، قەلەي كۈشتىسى، تۇخۇم سېرىغى (خام) ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، گۈرۈچ، ئارپا، ماش، ئانار گۈلى، ئانار پوستى ھەر بىرى 4 مىسقالدىن يېمەكلىك مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، ماتا ئارقىلىق

سۇزۇپ سىقىپ، سۇيىنى قائىدە بويىچە ھوقنە قىلىش كېرەك. ئەگەر ئاغرىش بەك كۈچلۈك بولسا، بېرىلىدىغان تالقان دورىلارغا بىر فۇڭ مىقدارىدا ئەپيۇن قوشۇپ بېرىشكە بولىدۇ. بەزىلەر ئەپيۇن بېرىشكە توغرا كەلسە دورىلار تەركىبىگە قۇندۇز قەرى ۋە زەپەر قوشۇپ بەر-مىسە زەھەرلەيدۇ — دېگەن كوز قاراشلارنى ئورتىغا قوي-غان. تاماق جەھەتتىن گۆش، شېكەر ۋە ياغلىق نەرسە-لەر بېرىلمەيدۇ. ئەمما ئۇچار قاناتلار گۆشى بېرىشكە بولىدۇ.

3) سەۋدادىن ئۈچەي ئىچكى يۈزىنىڭ سويۇلۇ-شى: سەۋدانىڭ ئۈچەيگە قۇيۇلىشىمۇ بۇ خىلدىكى ئىچ سۇرۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالامەتلىرى ئېچىش قاتتىق بولىدۇ. تەرەت قارامتۇل رەڭدە كېلىدۇ. بۇنىڭ ئالاھىدىلىكى شۈكى ئاغرىش، تارتىشىش (تەمەددۇد) بىلەن ئوتىدۇ. ئېغىر ھاللاردا بىھۇشلۇق يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: سەۋدا ھاسىل قىلىدىغان نەرسىلەرنى چەكلەش بىلەن ماددىنى تازىلاش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن خىپار شەنبەر ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئاغرىشنى پەسەيتىش ۋە ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن سۇپۇپى تىن (141-نۇسخە) بېرىلىدۇ، چۈشمەل نەرسىلەردىن ساقلىنىش لازىم. 4) قاتتىق تەرەتتىڭ ئۈچەي يۈزىنى زەخمىلەندۈرۈشى بىلەنمۇ قانلىق تەرەت كېلىشى مۇمكىن. بۇنىڭ

ئالامىتى شۇكى ئالدىدا قەۋزىيەت بولىدۇ. ئۇزاق ۋاقىت قۇرۇق نان ياكى باشقا قاتۇرغۇچى نەرسىلەرنى يىگەندىلىك تارىخى بولىدۇ. قان تەرەتكە ئارىلاشمىغان ھالدا كېلىدۇ. قاتتىق ئاغرىش ياكى باشقا تولغاق ئالامەتلىرى بولمايدۇ.

داۋاسى: ئۈچەي يوللىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئىسپۇغۇل ۋە بىيە ئۇرۇغىنىڭ شىرىلىرىنى بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ. بەزىلەر بۇ خىلدىكى كېسەللەردە سۈرگە بېرىپ خاتا قىلىدۇ. چۈنكى يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈش ئېھتىمالى بار.

(5) ئۆتكۈر تەسىرلىك ۋە زەھەرلىك دورىلارمۇ ئۈچەينىڭ يۈزىنى زەخمىلەپ قانلىق تەرەت ۋە قانلىق ئىچ سۇرۇش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن، زەرنىخ، نەشۇدۇر، گەجلەرنى ئىستىمال قىلغاندا يۇقۇردا سوزلەپ ئۆتۈلگەن قان تولغاقتەك ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ (بۇ دورىلار ھەققىدە زەھەرلىك دورىلار بابىدا تەپسىلى سۆزلىنىدۇ). مەزكۇر دورىلارنى يىگەنلىگىگە قاراپ پەرقلەنگىلى بولىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش، يېڭى سېغىلغان كالا سۈتى ئىچكۈزۈش كېرەك. بەزىدە كۈچلۈك سۈرگە دورىلارنى كۆپ مىقداردا ئىچىشمۇ ئۈچەي ئىچكى يۈزى سوزۇلۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مۇنداق چاغدا ئىسپۇغۇل ۋە بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇتاپلىرىغا سەمغى ئەرەبى

ۋە كەتسە قوشۇپ ئىچكىۋىلىدۇ. ھەم 142 - نۇسخىدىكى تالغان دورا بېرىلىدۇ. تومۇرنى ئوتتا قىزىتىپ، قېتىققا چىلاپ، شۇ قېتىقنى ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

2. ئۈچەي تاملاردىكى قانتومۇرلارنىڭ شىكەستىلە - مىشى تۇرلۇك جاراھەتلەر ياكى ئۈچەي ئىچكى يۈزىنىڭ سىيۇلۇشى چوڭقۇر بولۇش بىلەن تومۇرلار ئېچىلىپ، تەرەت بىلەن كۆپ مىقداردا قان كېلىدۇ. ئەمما قوساق تولىپ ئاغرىمايدۇ ھەم سۆڭەك بىۋاسىتە ئىسسىق بولمايدۇ.

داۋاسى: قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) نى شەھەر - ۋىتى ھەببۇل ئاس (74 - نۇسخە) ياكى شەرۋىتى ئەنجە - بار (72 - نۇسخە) بىلەن بېرىش كېرەك. گىل ئەرمىنى، ئانار پۈستى، موزىلارنى باراۋەردىن ئېلىپ، سوقۇپ، 72 - نۇسخىدىكى شەرىپەت بىلەن كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىش مۇمكىن. داۋاملىق قان كەلسە قوساققا ھىجامەت قويۇپ 4 سائەت تۇرغۇزۇش كېرەك.

يەرىڭلىق ئىچ سۇرۇش

تەرەت بىلەن يىرىڭنىڭ چىقىشى - ئۈچەي ئىچكى يۈزى سىيۇلۇش ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ، زەرەلەنگەن جاي ئوقۇنەت پەيدا قىلىشى ياكى ئۈچەيدىكى يىرىڭلىق جا - راھەتلەرنىڭ ئېغىز ئېلىشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئىچ سۈرگەندە تەرەت بىلەن يىرىڭ ئارىلاش زەرداپ سۇ كېلىشى، سەۋەپلەردىن بۇرۇن ئۈچەي

ئىچكى يۈزى سۈيۈلۈش كېسىلى بىلەن ئاغرىغانلىقى ياكى ئۈچەي جاراھەتلىرى ئالامەتلىرىنىڭ بولۇشى مۇھىم بەلگىسى ھېساپلىنىدۇ. تەرەت سېسىق پۇرىغىنىڭ يىرىڭغا خاس بولۇشى ئوفۇنەتنىڭ ئېغىرلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ئۈچەينى يىرىڭدىن تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ماش، ئارپا، سىماق، ئازار پوسەتنى قاينىتىپ سۈيىنى ھوقنە قىلىش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن يىرىڭ تازىلىنىپلا قالماستىن بەلكى ئۈچەيدىكى جاراھەتلىرىنىڭ ئىت ئېلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئەگەر يىرىڭ كۆپ ۋە ئوفۇنەت ئېغىرلىقى مەلۇم بولسا ماش، گۈرۈچ، ئارپا ئۇنى ۋە يېرىم مىسقال ئۈزۈم ئۇرۇغىنى قوشۇپ بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى قاينىتىپ تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ، قۇرسى زەرنىخ (143 - نۇسخە) قوشۇپ ئېرىتىپ ھوقنە قىلىنىدۇ. يىرىڭ كېلىش توختىغاندىن كېيىن، شورلۇق بەلغەمدىن ئۈچەي يۈزى سۈيۈلۈشتە كۆرسەتكەن ھوقنە قىلىنىدۇ.

بۇ كېسەلدە ئۈچەيدىن كەلگەن يىرىڭنى بەلغەم ماددىسى دەپ خاتا گۇمان تۇغۇلۇپ قېلىشى مۇمكىن. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆپكە سىل كېسىلىدە كۆرسىتىپ ئوتۇلگەن يىرىڭ بىلەن بەلغەمنى ئايرىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ ئېنىقلىغىلى بولىدۇ، سەپرا ياكى قان ماددىسى زىيادە بولسا قۇرسى زەرنىخ قوشۇلغان ھوقنەنى قىلىشقا بولمايدۇ. خاس بەلغەمدىن بولسىمۇ ئۇنى ئىشلەتمەسلىك

كېرەك (بۇنى تەرەتتىكى نەرسىنىڭ يىرىك ياكى بەلغەم ئىكەنلىكىنى بىلىش بىلەن بەلگىلەش كېرەك).

تولغاق (زەھىرە)

كېسەلنىڭ قوسىغى قاتتىق تولغاپ ئاغرىدۇ، ئىنجىق بولىدۇ ۋە پات-پات تەرەت قىستايدۇ. ئەمما تەرەتكە بارغاندا قۇرۇق ئىنجىق ۋە خېلى بىئاراملىقتىن ئاز مىقداردا شىلىملىق بەلغەمدەك نەرسە كېلىپ، ئالامەتلەر سەل يېنىكلىشىپ قالىدۇ. بارغانسېرى بۇ ھال تۇتقاقلىق شەكىل ئېلىپ تەكرارلىنىدۇ. تەرەت ئورنىغا ئازغىنە پوتلىدەك قان ئارىلاش بىر نەرسە كېلىدۇ. ئاغرىق يەڭگىلەشكەنسىرى تۇتقاقلىق ئارىلىغى ئۇزۇرۇپ تەرەت بىلەن ئازغىنە بەلغەمدەك نەرسە كېلىدۇ. بۇلار تولغاق كېسەلىدىكى ئومۇمىي ئالامەت-لەر بولۇپ، ئۇنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەپلەرگە قاراپ يەنە ئايرىم ئالامەتدە بەلگىلەرمۇ كورۇلىدۇ.

سەۋىيى: 1. چوڭ ئۇچەينىڭ ئىسسىقلىقتىن ياللۇغلىنىشى سەۋىيىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق كېسەلدە يۇقۇرقى ئالامەتلەر ئېغىر بولۇش بىلەن بىللە ئۇچەيدە تارتىشىش سېزىلىدۇ. ۋە پات-پات چوڭ تەرەتكە بارىدۇ. تەرەت كەلمەي ئازاپ تارتىدۇ. ئاغرىش بىلەن تەڭ قىزىتما پەيدا بولۇپ، قۇرۇق ھو ۋە بەزىدە سۇيىدۇك كەلمەسلىك كورۇلىدۇ.

2. سوڭغا ئۆتكۈر سوغاقلىق تەسىر قىلىشى نەتە-

جىسىدە چوڭ ئۇچەيدە ئىچكى تەرەپكە قاراپ قىسقىرىش پەيدا بولىدۇ. بۇنى كېسەل تەرەت قىستىدى دەپ ئويلاپ تەرەتكە بارسا قىسقارغان ئۇچەي تەرەتنى ماڭ-ھۇزماي ئىنجىقلاش نەتىجىسىدە ئۇچەينىڭ نېپىز قاتلىمى بىرئاز سۇيۇقلۇق بىلەن كېلىپ ئاغرىش ۋە قىسقىرىش يەڭگىلەشكەندەك بولىدۇ.

3. ئۇچەي ئىچىدە قېتىپ قالغان گەندە تۇرۇپ قالغاندا بەدەن ئۇنى كۈچەپ ھەيدەيدۇ. ئەمما گەندە قۇرۇق بولغىنى ئۈچۈن ماڭماي ئىنجىق كۈچى بىلەن ئۇچەيدىكى شىلىملىق نەرسىلەر كېلىدۇ. بۇ يالغان تولغاق (زەھىرە كاۋىپ) دەپ ئاتىلىدۇ. تەرەت بىلەن كۆپ يەل كېلىدۇ، قوساق غولىدۇرلايدۇ. تەرەت شىلىملىق ئارىلاش-قان قوناقتەك، پۇرچاقتەك قاتتىق گەندىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بۇنى بەزىلەر باشقا ئىچ سۇرۇشلەر بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قويۇپ، ئىچنى قاتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىپ خاتا داۋالاپ ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەلگە شىرىك سۇيۇقلۇق پەيدا قىلغۇچى دورىلاردىن ئىسپۇغۇل، بالەنگۇ قاتارلىق دورىلارنى سوقماستىن قاي-ناقسۇ بىلەن بىرئاز ئىچكۈزۈلىدۇ. ئەگەر تەرەت بىلەن بۇ دورىلار چىقسا ساختا تولغاق ئەمەس.

4. سەپرا ۋە سەۋدا نەتىجىسىدىن بولغانلىرىدا ئومۇمىي ئالامەتلەر بىلەن سۆڭىنىڭ ئېچىشى، تەشەلىق ۋە قوساقتا قىزىقلىق ھىس قىلىشلار بولۇپ، كېسەل سوغاقلىقتىن راھەتلىگەندەك بولىدۇ.

داۋاسى: تولغاقتىڭ داۋاسى كورسىتىلگەن سەۋەپ-
لىرىگە قاراپ ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەمما ئومۇمەن ئېلىپ
ئېيتقاندا بۇ كېسەلدە دورىلارنى شامچە شەكلى بىلەن
تەسىر قىلدۇرۇشنى ئاساس قىلىش كېرەك.

(1) چوڭ ئۆچەينىڭ ئىسسىقتىن بولغان ياللۇغ-
لىنىشىدا مەنى قىلىدىغان ھاللار بولمىسا كىمىدىك
ئاستىغا ھىجامەت قويۇش كېرەك. تاماق مىقدارىنى
ئازايتىش بىلەن، ماددىسىنى چىقىرىش، ئاغرىش ۋە
تارتىشىشنى پەسەيتىش ئۈچۈن كاسىن، شاتەرە، سېمىز
ئوت ئۇرۇغى ۋە چىلان قاتارلىقلارنى قاينىتىپ بېرىش
لازم. ئۇندىن كېيىن ئاق لەيلى گۈل، ھەمىشۋا گۈلى،
بىنەپشە، بابۇنە، كالىك بەسەي يوپۇرماقلىرىنى قاينىتىپ،
سۈيىنى ھوققە قىلىش كېرەك. توۋەندىكى دورىلار بىلەن
شامچە تەييارلاپ سوڭغا قويۇش كېرەك. ئەكىل مىلىك،
كالىك بەسەي يوپۇرمىغى، شۇمشە 3 مىسقالدىن، مۇقىل
يېرىم مىسقال، پىياز بىر دانە.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن پىيازنى ئوتقا
كەمۇپ پىشۇرۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن تازىلاپ يانچىپ،
سۈيىدە مۇقىلنى ئېرىتىپ، قالغان دورىلار يۇمشاق سۈ-
قۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا شامچە ياساپ
سوڭغا قويۇلىدۇ. ئەگەر مۇمكىن بولسا كېسەلنى بىر-
ئىككى قېتىم قەي قىلدۇرۇش كېرەك. ئەگەر ئۆچەيدە
ياللۇغلىنىش ئېغىر بولسا، ئالدى بىلەن ئۆچەي ياللۇغلىرى
قاتارىدا داۋالاپ كورۇش كېرەك.

(2) سۇڭغا ئۆتكۈر سوغا قلىق تەسىر قىلغاندا سۇڭغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، ئىسسىقلىق ياغلاردىن قۇست ياكى بابۇنە يېغى بىلەن سۇڭنى ياغلاش كېرەك. بابۇنە سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، ئەكىلىل مەلىكىلەرنى قاينىتىپ چوڭ داسقا ئېلىپ، كېسەلنى ئولتۇرغۇزۇلىدۇ.

(3) ئۇچەيدە قاتتىق گەندە تۇرۇۋالغاندا ئالدى بىلەن ئۇچەيدىكى قېتىپ قالغان تەرەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن، بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) گە خىيارى شەن-بەر شىرىسى (قايناقسۇدا ئېيرىتىپ سۇزۇلگەن خىيارى شەنبەر)، بادام يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئىلمان سۇ ياكى مۇۋاپىق باشقا دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىش ۋە قايناقسۇنى كوپرەك ئىچىش كېرەك.

(4) سەپرا ۋە سەۋدادىن بولغىنىدا ئىچىشكە ئازار شەرۋىتى، لىمۇن شەرۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھوقنە ئۈچۈن گۈل يېغى، گىل ئەرمىنى، قەلەي كۈشتىسى، شادىنج، ھۇمماز ئۇرۇغى، سېمىز ئۆت ئۇرۇقلىرىنىڭ قاينىتىلغان سۈيى بېرىلىدۇ. ھەم تۈۋەندىكى دورىلار بىلەن شامچە تەييارلاپ مەقۇدكە قويۇلىدۇ.

كوندۇر، روسۇت، سەمىغى ئەرەبى، ھەربىرى 2 مىسس-قال، زەپەر 2 مىسقال، ئەپيۇن بىر فۇڭ.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەپيۇننى بىر ئاز سۇ بىلەن ئېيرىتىپ، سۇقۇلغان دورىنى خېمىردەك قىلىپ، مۇۋاپىق چوڭلۇقتا شامچە تەييارلاپ، سايىدا قۇرۇتۇپ، گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ سۇڭغا تىقىپ قويۇلىدۇ.

بەزىدە مەئىدە بوش چاغلاردا چۇچىمەل نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغانلىقتىنمۇ تولغاق پەيدا بولىدۇ. بۇنداق-
لاردا ناۋات سالغان چاي بىلەن چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم
سېرىغى ۋە گىل ئەرمىنى، سەمغى ئەرەبى قوشۇپ بېرىلىدۇ.

ئۇچەيگە يەل تولۇش

ئادەتتە بۇ قوساق ئېسىلىش، قوساق كوپۇش دەپ
ئاتىلىدۇ. غەيرى تەبىئىي يەللەرنىڭ ئۇچەيدە توپىلىشىپ
قېلىشىدىن ئىبارەت.

سەۋىبى: يەل پەيدا قىلغۇچى تاماقلار مەسىلەن،
ئارپا ۋە پۇرچاق خىلىدىكىلەرنى كوپ ياكى داۋاملىق
ئىستىمال قىلىش، كالا، ئۆچكە ۋە كىيىك گۆشلىرىدەك
سىڭىشى تەس ۋە كۈچلۈك تاماقلارنى كوپ يىيىش،
ئۇچەينىڭ سوۋۇپ قېلىشى، بۇنىڭ سەۋىبى سوغاقلىقلارنى
كوپ ئىستىمال قىلىش، سوغاق سۇغا كوپ چومۇلۇش
قاتارلىقلار سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرى
بولۇش بىلەن بىللە، قوساق ئېسىلىش، يەل كېلىش ۋە
قوساق غولدىرلاشتىن ئىبارەت ئالامەتلەرمۇ بولىدۇ.
ئۇچەي سوۋۇپ كەتكەندە تاماقنى مۇۋاپىق ھالدا يەپ
تۇرسىمۇ بۇ ھال داۋام قىلىۋىرىدۇ. بەزىلەردە ئىچ سۇرۇش
بىللە كېلىدۇ.

داۋاسى: سەۋىبىنى يوقىتىش كېرەك. تاماقنى ئاز-
ئازدىن بېرىش، يىمىشكە مەجۇنى كۈمۈنى ياكى جاۋارش

پىلاپى (144 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىچ سۇرۇش بىلەن بولسا، جەۋارىش خەۋزى (145 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3. پەسىل: چوڭ ئۇچەي كېسەللىكلىرى (قۇلۇنجى)

چوڭ ئۇچەي كېسەللىكلىرى (قۇلۇنجى) دەپ تىبابەتتە چوڭ ئۇچەيدىكى ھەرخىل زەرەرلىنىشلەر كوز - دە تۇتۇلىدۇ. ئادەتتە قوساقنىڭ باشقا كېسەللىك ئالا - مەتلىرى بىلەن ئىزاھلاپ بولمايدىغان ئاغرىشلىرى يەنى قۇرۇق قوساق ئاغرىقلىرى، قۇلۇنجى، دەپ قىيىلىدۇ. قۇلۇنجى - كېسەللىكلىرى ئۆز ئىچىگە قوساق ئاغرىش، چوڭ ئۇچەينىڭ توسىلىشى ۋە مەدە قۇرۇتلار سەۋىيىدىن قوساقنىڭ ئاغرىشى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

قۇرۇق قوساق ئاغرىش (قۇلۇنجى)

چوڭ ئۇچەي بار يەرلەردە ئاغرىش سىزىلىپ قەۋزىيەت بولۇپ، تەرەت قىيىنلىق بىلەن كېلىدىغان ئەھۋالنى قۇلۇنجى - قۇرۇق قوساق ئاغرىش دەپ ئاتىلىدۇ. جالىنىۇس: "چوڭ ئۇچەي (قۇلۇن) قوساقنىڭ ھەممە يېرىگە باراۋەر كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاغرىشى پۈتۈن قوساق قىسمىدا سىزىلىشى مۇمكىن" دىگەن قۇلۇنجى كېسەلى سەۋەپلىرىگە قاراپ بىرقانچە قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. مەسىلەن، 1) قىيۇق غىزالار مەسىلەن، ھوردا پىشۇرۇلغان نان، گۈرۈچ تاماقللىرى ۋە سوغاق يەللىك

نەرسىلەر، ھول ئۇزۇم، شاپتۇل ۋە خاڭگا قاتارلىقلارنى داۋاملىق ياكى كۆپ مىقداردا يىيىش سەۋىيىسى بىلەن پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭدىكى ئالامەتلەر: قوساق كۆپىيىدۇ، يەل يۇرۇشىدۇ. قوساقتا ئاغرىش بولۇپ يىتەكلىپ تۇرىدۇ. بەزىدە ئىچ قېتىپ قالىدۇ. تەرەت قىيىنلىق بىلەن ماڭىدۇ. بەزىدە ئىچ سۇرۇش بىلەن كېلىدۇ، كۆڭۈل ئاينىيدۇ. (2) مالىخولىيا كېسىلىدە ئۇچرايدۇ. تۇيۇقسىز قوساق ئېسىلىش، چۈچمەل كىكىرىش كۆرىلىدۇ. ئەمما ئاغرىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. مالىخولىيانىڭ باشقا ئالامەتلىرى روشەن بولىدۇ.

(3) سەپىرا قۇلۇنىغا چۈشكەندە قوساق... تىكى ئاغرىش ئېچىشىش بىلەن بىللە بولىدۇ. تەبىرىتى سېرىق رەڭدە بولۇپ، سۆڭەك ئېچىشىدۇ، تەشەنلىق بولىدۇ. شور بەلغەمنىڭ چوڭ ئۇچەيگە چۈشۈشمۇ بۇ خىل ئاغرىق پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: قوساق ئاغرىشلاردا مەيلى قايسى سەۋەبتىن بولمىسۇن ئاۋال سۈرگە بېرىشكە بولمايدۇ. ھوقنە ياكى شامچىلا بىلەن تۈۋەنكى تەرەپ يولىنى ئاچقاندىن كېيىن، باشقا تەدبىرلەرنى كۆرۈش كېرەك.

1. تۈردىكى قۇلۇنىجىدا ئاۋال مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىش لازىم. ۋە مۇنۇ نۇسخىدىكى شامچىنى قويۇش كېرەك:

بۆرە ئەرمىنى: 10 مىسقال، شەھىمى ھەنزەل، مۇقىل،

سەككىزىنچە ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، سوقمۇنىيا $2\frac{1}{2}$ مىس

قال، قارا شېكەر 9 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
قارا شېكەر سۇيىدە خېمىر قىلىپ سېرىق ياغ ياكى
گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ، ئۇزۇنراق شامچە تەييارلاپ،
سايىدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. ھاجەت بولغاندا ئىشلىتىدۇ.
ئۇندىن كېيىن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە
جەۋارىشى شەھرىياران (97 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بىر كېچە -
كۈندۈزدىن كېيىن قېرى خوراز گۆشى شۇرپىسىغا دارچىن،
زەنجىۋىل، زىرە ۋە پىننە قوشۇپ بېرىلىدۇ. نوقۇت
سۈيى ئىچىرىلىدۇ. ئۇسسۇزلۇق ئۈچۈن بېدىيان سۈيى
ياكى ھەسەل سۈيى بېرىلسە ياخشى.

2. تۈردىكى قۇلۇنچىدا يەڭگىل ھوقنە دورىلىرى
بىلەن تەرەتنى بوشىتىپ، ئارقىدىن مەتبۇخى ئېچىتىپ
(53 - 20 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ (قالغان چارىلىرى
ھەققىدە مالىخولىياغا قارالسۇن).

3. تۈردىكى قۇلۇنچىدا - يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن
شامچە ياكى مۇۋاپىق دورىلار (تەركىبىدە تەمىرى ھىندى
بار بولغان دورىلار) ھوقنە قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن،
ئىسپۇغول، بىيە ئۇرۇغى ۋە بالەنگۇ لۇئاپلىرى بىلەن،
سېمىز ئوت ئۇرۇغى ۋە پاقا - يوپۇرمىغىنىڭ شىرىسى
بېرىلىدۇ. ۋە سەپرانى تازىلاش ئۈچۈن كاسىن ئۇرۇغى
ۋە ئىت ئۇزۇمى سۈيىگە خىيارى شەنبەرنى ئېرىتىپ،

سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر ھارارەت بولسا ئىسپۇ - غولنى (سوقماستىن) گۈللاپ ياكى ئانار سۈيىگە قوشۇپ بېرىلىدۇ.

ئۈچەي توسىلىش

تىبابەتتە چوڭ ئۈچەيدىكى توسىلىش قۇلۇنجى ئىلتۇا، ئىنچىكە ئۈچەيدىكى توسىلىش قۇلۇنجى ئىلاۋۇس ① دەپ ئاتىلىدۇ. ئۈچەينىڭ توسىلىشى سەۋەپ جەھەتتىن غەلىز بەلغەمدىن؛ غەلىز يەلدىن؛ چوڭ ئۈچەينىڭ ئىششىشىدىن؛ ئۈچەي تولىغىشىپ قېلىشتىن؛ قاتقان گەندىنىڭ تۇرۇپ قېلىشىدىن؛ غەيرى تەبىئى سەپرادىن؛ باشقا ئەزالاردىكى ئىششىقلارنىڭ ئۈچەينى بېسىشىدىن بولغان توسىلىشلار دەپ پەرقلەندۈرىلىدۇ. ئۈچەي ئىچىدە - نىڭ تۇغما تار بولۇشى ياكى تۇغۇلغاندىن كېيىنكى تۈرلۈك زەخمىلىنىشلەر بىلەن تارىيىپ قېلىشىمۇ توسىلىشقا سەۋەپچى بولىدۇ.

1) قويۇق بەلغەم سەۋىيى بىلەن ئۈچەي توسىلىش: قويۇق گەجىدەك بەلغەم ماددىسى تەرەتكە قوشۇلۇپ قارغۇ ئۈچەي (ئەنئەنە) نى توساپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: قاتتىق - قۇرۇق نەرسىلەرنى يىگەنلىك ۋە سېسىق كىكىرىش، تەرەتتە بەلغەمدەك نەرسىلەرنىڭ بولۇشى بۇ كېسەلنىڭ ئالدىدىكى ئەھۋاللاردىندۇر، ئۇندىن كېيىن ئىشتەي تۇتۇلىدۇ. ۋە كىندىك ئاستى چىڭقىلىدۇ.

① ئىلاۋۇس - ئەسلىدە لاتىنچە "ئىلىئوس" (ئۈچەي توسىلىش) تىن كەلگەن.

چوڭ تەرىتى ئاز - ئازدىن توختاپ قالىدۇ (تەرەت ماڭماي - دۇ)، قوساق كۆپىدۇ، چۈچمەل نەرسىلەرنى يىگۈسى كىلىدۇ، ئاغرىش قاتتىقلىشىدۇ، ئاغرىشنىڭ قاتتىق بولشىدىن كېسەل بارام بولىدۇ ۋە جىگەردە ھارارەت پەيدا بولۇشى بىلەن تەشنىلىق كۈچىيىپ، سۇيدۇك قىزىل رەڭدە كېلىدۇ. بەزىلەر بۇ ئەھۋالنى سەپرا نەتىجىسىدىكى ۋەزەم دەپ خاتا گۇمان قىلىدۇ. بۇ كېسەلدە سۇيدۇكنىڭ قىزىل بولۇشى ۋە تەشنىلىقنى دىققەت قىلىپ، باھا بەرمىگەندە خاتالىق تۇغۇلۇشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن غەلىز بەلغەم ۋە سەپرانىڭ باشقا ئالامەتلىرىنى ئىزدەپ ئېنىقلاش كېرەك.

داۋاسى: ئالدى بىلەن توۋەندىكى شامچە ۋە ھوقنەلەرنى قىلىپ ئۈچەي يولىنى ئېچىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن جەۋارىش شەھرىياران (97 - نۇسخە) گە شەھى مەنزەل، غارىقۇن قوشۇپ قايناقسۇ بىلەن كۈنىگە 4 مىسقال بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەرەتنىڭ مېڭىشى ئوڭايلىشىپ كوڭۇل ئاينىش ۋە قۇسۇش پەسىيىدۇ. ئەھ - ۋال ياخشىلانمىغىچە تاماق بېرىلمەيدۇ.

ھوقنە دورىلىرى: سىيادان، تۇخۇمەك ئۇزۇمىنى 15 مىسقالدىن ئېلىپ، چالا سوقۇپ يېتەرلىك مىقدار - ىدىكى سۇ بىلەن (3 چوڭ چىنە سۇ قالغىدەك) قاينىتىپ سۇزۇپ، ئۈستىگە قىزىلچا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى، كالىلەك بەسەي سۈيى، سېرىق ماي 7 مىسقال، بادام يېغى

4 مىسقالنى قوشۇپ ھەقنە قىلىنىدۇ. ھەقنە قىلىش سۈرئىتى ئوتتۇرا ھال بولغىنى ياخشى.

شامچە دورىسى: تەربۇت، شەھىمى ھەنزەل، ئەنزۇ-رۇت، تۇغرىغۇ، ئاق تۇز، قارا شېكەرنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، قارا شېكەرنى بىر ئاز سۇدا ئېرىتىپ، دورىلارنى يۇغۇرۇپ توملىغى ۋە ئۇزۇنلۇغى كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن باراۋەر شامچە ياساپ سېرىق ماي بىلەن مايلاپ مەقئەتكە قويۇلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن سىيادان، تۇخۇمەك ئۇزۇمنى 5 مىسقالدىن ئېلىپ سوقۇپ سېرىق ماي بىلەن قوساقتا قويۇش ياكى سېرىق چېچەك يېغى، قىچا يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ قوساقتا سۇۋاش كېرەك. ئەگەر بۇلارغا بىر ئازدىن ئەپيۇن بىلەن قۇندۇز قەرى قوشۇلسا تېخىمۇ ياخشى.

ئۈچەي تۈسلىش كۆپ ۋاقىتلاردا باشقا كېسەل-لەردىكى ئاغرىشلار مەسىلەن، قۇرۇق قوساق ئاغرىش، بورەك ئاغرىغى، بالىياتقۇ ئاغرىقلىرى، ۋە مەدە قۇرۇت-لىرى سەۋىبىدىن بولغان ئاغرىشلار دەپ خاتا گۇمان قىلىنىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كېسەللىكلەر بىلەن ئۈچەي تۈسلىشىنىڭ پەرقى تۆۋەندىكىچە:

(1) قوساق ساھەسىنىڭ باشقا ھەر قانداق ئاغرىق-لىرىدا مەيلى مەئدە ۋە ئۈچەيلەردە بولمىسۇن چوڭ تەرەت ئازدۇر-كۆپتۇر ماڭىدۇ. ۋە يەل يۇرۇشۇپ يېنىكلەيدۇ. ئەمما ئۈچەي تۈسلىشتا ئاغرىش ئېغىر

بولىدۇ، قوساق بارغانسېرى ئېسىلىدۇ، چوڭ تەرەت پۈتۈنلەي كەلمەيدۇ، كېسەل سوغاق تەرلەيدۇ، بەك بئارام بولۇپ، قۇسۇش كوپ ئازاپلايدۇ.

(2) بورەك ئاغرىقلىرىدا، ئاغرىشنىڭ باشلىنىشى بورەك بار جايدا يەنى بەل ساھەسىدە بولۇپ، پىچاق سانچىغاندەك ئاغرىيدۇ، يۈتكەلمەيدۇ. سۇيدۇك توختاش ياكى ئاز كېلىش ئالامەتلىرى ياكى بورەكتە تاش بار. لىغىنى بىلدۈرىدىغان باشقا ئالامەتلەر (بورەك ئاغرىقلىرىغا قاراڭ) بولىدۇ. ئۈچەي توسىلىشلاردا بەل ئاغرىشىمۇ مۇمكىن. ئەمما ئاغرىش بىر جايدا بولماستىن يۈتكىلىپ تۇرىدۇ. باشلىنىشتا ئوڭ تەرەپ بەل يۇقۇرقى قىسمىدىن باشلىنىدۇ.

(3) بالىياتقۇ (رەھىم) نىڭ ئاغرىشى ئادەتتە - توۋەندىكى قوساقتا - دوسۇن ئۈستىدە بولىدۇ ۋە ئالدى بىلەن بالىياتقۇغا خاس ئالامەتلىەر، ھېيىز توختاپ قېلىش بەلگىلىرى بولىدۇ (بالىياتقۇ ئاغرىقلىرىغا قاراڭ). (4) ئۈچەيدىكى مەدە قۇرۇتلار سەۋىبىدىن بولغان ئاغرىشلاردا كېسەلدىن مەدە - قۇرۇت چۈشكەنلىگىنى سوراپ، بىلگەندىن كېيىن گۇمان قالمايدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، قەي، ئاغرىش ۋە ئۈچەينىڭ كۆپىش بىلەن كېلىپ چىققان روشەن ھالدىكى ئېغىر قوساق ئېسىلىش، پاقالچەك گۆشلىرىنىڭ ئاغرىشى بىللە بولغاندا ئۈچەي تۈزىلىشىنى ئويلاش لازىم.

(2) قويۇق يەل (بادى غەلىز) دىن بولغان ئۇچەي توسىلىش، ئۇچەي قاتلاملىرى ياكى نېپىز پەردىلىرىگە چۈشكەن قويۇق يەل ئۇچەي يوللىرىنى توساپ قويىدۇ. ئالامەتلىرى: قوساقنىڭ ئاغرىشى بىرەر يەللەك سوغاق نەرسە (ھول يېمىش، ئورۇك، خاڭگالارنى يېمىش) بىلەن باشلىنىدۇ. قوساق ئېسىلىدۇ ۋە غولدۇر-لايدۇ. ئاغرىش بارغانسېرى ئېغىرلىشىدۇ. ئەگەر سەۋىيى يۇمشاق يەلدىن بولغان بولسا، قوساققا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش بىلەن كېسەللەك ئالامەتلىرى يەڭگىلەشىدۇ. ئەمما قويۇق يەلدە ئوخشاش تۇرىدۇ. بەزىدە ئۇچەينىڭ يەل تەپلاشقان جايى ئېنىق ھالدا كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: شامچە ۋە ھوققە بىلەن توسىلىشنى ئېچىش كېرەك. بۇ خىلدىكى توسىلىشتا تۆۋەندىكى نۇسخىلار بىرىلىدۇ:

شامچە نۇسخىسى: شەھىمى ھەنزەل 3 مىسقال، بۆرە ئەرمىنى، مۇقىل، جاۋۇشىر، سوزاپ، قارا شېكەر ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، قۇندۇز قەرى $\frac{1}{2}$ مىسقال. كورسىتىپ

ئوتۇلگەن ئۇسۇل بىلەن تەييارلاپ ئىشلىتىلىدۇ. ھوققە نۇسخىسى — سوزاپ، يالپۇز، بابۇنە ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، مەرزەنجۇش چىڭسەي ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئارپا بېدىيان، جۇۋىنە 2 مىسقالدىن، ئەنجۈر بەش دانە. تەييارلاش ئۇسۇلى دورىلارنى چالا سۇقۇپ 2 جىڭ مىقدارى سۇ بىلەن يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ، سۇزۇپ، بىر ئاز سېرىق ماي ئارىلاشتۇرۇپ

ھوققە قىلىنىدۇ. شاھچە ۋە ھوققەدىن كېيىن ئۇچەي يولى ئېچىلىپ، تەرەت ماڭغاندىن كېيىنمۇ يەنە ئاغرىش بولسا (مۇنداق ئاغرىش يەڭگىلەرەك بولىدۇ)، بۇ ئۇچەي-نىڭ سوۋۇپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇچەينى قىزىتىش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن قوناق ئۇنى ۋە تۇزنى قىزىتىپ قۇساققا قويۇش، سۇزاپ يېغى، ياسمەن يېغى بىلەن ياغلاش كېرەك. ھەم مەجۇنى كۇمۇنى، مەجۇنى پىلاي (49 - 144 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ، ھەسەل سۇيى بېرىلىدۇ.

(3) ئۇچەي ياللۇغى ۋە ئىششىقلىرى سەۋەبىدىن ئۇچەي توسىلىش: ئۇچەيدىكى ياللۇغلىنىش ۋە ئىششىقلىرى يولنى توساپ قويغاندا ئۇچەينىڭ توسىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما بولىدۇ، لوقۇلداپ ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، تەشئالىق ئېغىر بولىدۇ. توسىلىش ئالامەتلىرى ئاستا - ئاستا پەيدا بولۇپ، بارغانسېرى تەرەت كەلمەيدىغان دەرىجىسىگە يېتىپ بارىدۇ، سۇيىدۇكمۇ توختايدۇ.

داۋامى: توسىلىش ئالامەتلىرى روشەن بولمىغان چاغلاردا تەرەت يۇمشاق كېلىشىنىڭ ئامالىنى قىلىپ، تەرەت ئۇچەيدە توپلىشىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخىدىكى شەرۋەتنى كۈنىگە 3 قېتىم 3 قوشۇقتىن بېرىش لازىم. پۇنۇس، ئەينۇلا

ھەر بىرى 15 مىسقالدىن، خىيارى شەنبەر، سرخىشت ھەر بىرى 10 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى كاكىنەج ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، ئاق لەيلى، ئىزخىر 2 مىسقالدىن، ھەمشىۋا 3 مىسقال، گازىۋان 3 مىسقال، گۈل بىنەپشە 12 مىسقال، خەشخاش ئۇرۇغى 2 مىسقال، بادام مېغىزى (يەنىچىلىگەن) 15 دانە. يۇقۇرقىلارنى ئولچەپ ئېلىپ، سۇ قۇيۇپ ئادەتتىكى شەرۋەت تەييارلاش ئۇسۇلى بىلەن تەييارلىنىدۇ. ئەگەر ئانار سۈيى قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. توسىلىش ئالامەتلىرى روشەن بولغاندا (ئالامەتلىرى ئېغىر بولسا) ئالدى بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ.

ھوقنە ئۇسخىسى:

شۈمشە ئۇرۇغى، بابۇنە، زىغىر ھەر بىرى 5 مىسقال-دىن، ئارپا سۈيى ئىت ئۇزۇمى سۈيى، خىيارى شەنبەر (قايناقسۇدا ئېرىتكەن)، ھەر بىرى 15 مىسقال، چىلان 10 دانە، سەرپىستان 20 دانە، ئاق لەيلى ئۇرۇغى 3 مىسقال، ئىسپۇغۇل 15 مىسقال، خاڭگا ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى 4 مىسقالدىن، بىنەپشە يېغى 10 مىسقال، بادام يېغى 4 مىسقال. ئىسپۇغۇلنىڭ لۇئابىنى چىقىرىپ شۇ دورىلارغا قوشۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى چالا سوقۇپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۇزۇپ ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۈستىگە ياغ دورىلارنى قوشۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

ئىششىقنىڭ قان، سەپرا ۋە بەلغەمدىن بولۇشى كۆپرەك ئۇچرايدۇ، يۇقۇرقى چارىلار بىلەن ئۇچەي يەلنى ئاچقاندىن كېيىن ماددىسىغا قاراپ دورىلار بېرىلىدۇ ۋە چارە قىلىنىدۇ. قاندىن بولسا يۇقۇرقى چارىلەر يېتەرلىك. سەپرادىن بولغاندا شەرۋىتى بۇزۇرى ياكى شەرۋىتى بىنەپشىگە سۇقمۇنىيا، تەمرى ھىندى قوشۇپ بېرىلىدۇ (29، + 130، 74 - نۇسخىلار)، ئەگەر بەلغەم - دىن بولغان بولسا ھوقنە دورىلىرىغا بەلغەم ماددىسىنى تازىلىغۇچى دورىلارنى قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ ۋە مەجۇنى تۇرۇت (146 - نۇسخە) دىن كۈنىگە 5 مىسقال بېرىلىدۇ.

4) ئۇچەينىڭ تولغىشىپ قېلىشى: ئۇچەينىڭ تولغىشىپ چىكىلىشىپ قېلىشى، ئۇچەي چاۋا بېغىشلىرىنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ياكى قوساق يەردىسىنىڭ يىرتىلىشىدىن پەيدا بولغان بوشلۇققا ئۇچەي كىرىپ قىسىلىپ قېلىش قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن ئۇچەي تولغىشىپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ھال كۆپىنچە چۇقۇق (پەتەق) نىڭ ئۇرۇقدانغا چۇشۇشلىرىدە ئۇچرايدۇ. تىبابەتتە بۇ چۇقۇقتىن بولغان ئۇچەي توسەلمىش (قۇلۇنجى ئىلتىۋاتى پەتەقى) دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئەزەلدىن چۇقۇق كېسىلى بارلاردا تەسادىپى ھالدا ئۇرۇقدان خالتىسىغا ئۇچەي چۇشۇپ ئەكسىگە كەلمەيدۇ. خالتا چوڭىيىدۇ. قاتتىق ئاغرىش ئۇرۇقدان

خالتىسىدا يۇز بېرىپ ئۈچەي تۈسلىشىشنىڭ يۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئوتۇلگەن ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ياكى ئىگىز جايىدىن سەكرەش، ئېغىر نەرسە كۆتىرىش باناسى بىلەن قوساقتا قاتتىق ئاغرىش سېزىدۇ. بۇ بارغانسېرى ئېغىر - لىشىپ، تۈسلىشىشنىڭ بەلگىلىرى (قوساق قاتتىق ئاغرىش، قۇسۇش، قوساق ئېسىلىش، تەرەت ماڭماسلىق، قاتتىق بىئارام بولۇش) كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر تۈسلىشىش كىچىك ئۈچەيدە بولسا قۇسۇق بىلەن تەرەت ماددىسى چىقىدۇ. بۇ خىلدىكى تۈسلىشىشنى تىبابەتتە قۇلۇنجى ئىلاۋۇس دەپ ئاتايدۇ.

داۋاسى: ئاغرىقنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ قوساقنى ئاستا مۇجۇپ ئۈچەينى ئوز ئەكسىگە كەلتۈرۈش كېرەك. چۇقۇقنى ئاستالىق بىلەن جايىغا كىرگۈزۈش لازىم.

(5) قاتتىق تەرەتنىڭ تۇرۇپ قېلىشىدىن ئۈچەي تۈسلىشىش: تىبابەتتە قۇلۇنجى سەپىل دەپ ئاتىلىپ، تەرەتنىڭ قاتتىق قىسىملىرى قارغۇ ئۈچەيدە تۇرىدۇ - لىپ ئۈچەينى توساپ قويىدۇ.

سەۋەبى: قاتتىق نەرسىلەرنى كۆپ يېمەش؛ پارچە - پۇرات نەرسىلەرنى ھەددىدىن ئارتۇق يېمەش، ئۈچەيدىكى قۇرۇق ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشى بىلەن تەرەت ماددىسى ئۈچەيدە قېتىپ قېلىش؛ بەدەندىن كۆپ مىق - داردىكى سۇ چىقىپ كېتىپ (مەسىلەن كۆپ قۇسۇش، ئىچى سۇرۇش، قان كېتىش قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن)

ئۇچەيدە نەملىك ئازىيىپ، تاماق ماددىلىرىدىكى نەم-لىكنى بەدەن تارتىپ كېتىپ تەرەت قۇرۇپ قېلىش؛ ئۇچەينىڭ سېزىش قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش بىلەن تەرەت ئۇچەيدىن چىقىرىلماي تۇرۇپ قېلىپ، بارا-بارا قېتىپ ئۇچەينى تۈسۈپ قويۇش؛ ئۇچەي سىلىدىن بولغان ئاقما (ناسۇر) قاتارلىق جاراھەتلەر تۈپەيلىدىن گەندىنىڭ ئۇچەيدە تۇرۇپ قېلىشى؛ ئۇچەيدىكى مەددە قۇرۇت-لار پومىلىشىۋېلىپ ئۇچەيگە قاپلىشىپ قېلىش قاتارلىق سەۋەپلەر چوڭ تەرەتنى قاتۇرۇۋېتىپ، ئۇچەينى توساپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىلگىرى يۇقۇرقى سەۋەپلەردىن بىرى بارلىقى مەلۇم بولىدۇ ۋە ئۇچەي توسىلىشنىڭ كۆرسىتىپ ئوتۇلگەن ئومۇمىي ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئالامەتدە ئەھۋال شۇكى ھارارەت ۋە قىساق تېرىسىنىڭ ياقىراپ تۇرغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ھوقنە قىلىپ توسالغۇ ئىچىلىدۇ. ھوقنە نۇسخىسى: بىنەپشە، ئىت ئۇزۇمى، نىلۇپەر، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى، تەرخەمەك ئۇرۇغى، بابۇنە، ئارپا كىپىگى ھەر بىرى 7 مىسقال، چىلان 10 دانە، سەرپىستان 20 دانە، خىيارى شەنبەر 7 مىسقال، تەرەنجىۋىل 10 مىسقال، ئىسپۇغۇل (لۇئابى چىقىرىلىدۇ)، بىنەپشە يېغى، كۈنجۈت يېغى ھەر بىرى بىر سەردىن.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن دورىلارنى چالا سۇقۇپ،

يېتەرلىك مىقدارىدىكى سۇ بىلەن 2 چوڭ چىنە قال-
غىدەك قاينىتىپ ماتا ئارقىلىق سۇزۇپ سىقىپ، تەرەز-
جىۋىل بىلەن خىيارى شەنبەرنى سېلىپ، دورىلارنى يەنە
بىر قېتىم قىزىتىپ، قايتا سۇزۇپ ئۇستىگە ياغلارنى
قۇيۇپ ئىلمان ھالەتتە ھوقنە قىلىنىدۇ. زورۇر كەلسە
كۈنىگە بىر قېتىمدىن 2 - 3 كۈن داۋاملاشتۇرسىمۇ
بولىدۇ.

ھوقنەدىن كېيىن، ئەگەر ئۈچەيدە قىزىقلىق بول-
مىسا، توغرىغۇ، مەھمۇدە، شەھىمى ھەنزەللەرنى 3 مىسقال-
دىن ئېلىپ، بىر ئاز قەن بىلەن سوقۇپ كۈنىگە
مىسقالدىن بېرىش كېرەك. ئەگەر ئۈچەيدە قىزىقلىق
بولسا، مېۋە سۇلىرى (ئۇرۇك، شاپتۇل سۈيى) ياكى
بىنەپشە، ئانار شەرىۋىتى (47 - 74 - نۇسخىلەر) نى
بېرىش لازىم. تامىغىغا 2 كۈندىن كېيىن توخۇ شور-
پىسى بىلەن نوقۇت سۈيى بېرىلىدۇ. تەرەت داۋاملىق
يۇمشاق كېلىشى ئۈچۈن، گۈل بىنەپشە 9 مىسقال،
مەھمۇدە (سوقمۇنىيا) دىن 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق
سوقۇپ ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن قۇرس ياساپ، كۈنىگە
بىر دانىدىن بېرىپ تۇرۇش ياكى توۋەندىكى ھوقنەنى
كۈن ئارىلاپ قىلىش كېرەك: بىنەپشە 5 مىسقال، ئەن-
جۇر 10 دانە، تەرەنجىۋىل بىر سەر، چىلان 10 دانە،
بادام يېغى (گۈل يېغى بولسىمۇ بولىدۇ) بىنەپشە يېغى
بىر سەردىن. قائىدە بويىچە تەييارلاپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

ئۇچەي يولىنى ئېچىپ بولغاندىن كېيىن، سەۋدە-
لەر قايتا ھاسىل بولماسلىق ئامالىنى قىلىش، مەسىلەن
ئۇچەينىڭ سېزىش قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش مەۋجۇت بولسا
تەرياقى فارۇق (186 - نۇسخە) ياكى مەشدىرتۇس
(25 - نۇسخە) بېرىش كېرەك.

(6) يېقىن ئەزالاردىكى ياللۇغلىنىش ۋە ئىششىق
سەۋىيىدىن بولغان ئۇچەي توسىلىش: دوۋىساق، بورەك، جە-
گەر، تال قاتارلىقلارنىڭ ئىششىقى ئۇچەينى قىسمەن
ياكى پۈتۈنلەي توسوپ قويىدۇ. بۇنى تىبابەتتە شىرىك
ئەزا تۈپەيلىدىن بولغان ئۇچەي توسىلىش (قۇلۇنجى
مۇشتەرەكە) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كورسىتىلگەن خوشنا ئەزالار ئىششە-
نمىغا خاس بولغان ئالامەتلىر (مەزكۇر ئەزالارنىڭ ياللۇغ-
لىنىشلىرىغا قاراڭ) بار بولۇشى بىلەن ئۇچەي توسىلىش
بەلگىلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: باشقا ئۇچەي توسىلىشلاردا كورسىتىلگەن
شامچە ۋە ھوقنەلەرنى قوللىنىش كېرەك. مۇۋاپىق تاپقاندا
قەي قىلدۇرۇش چارىسىنى قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇنىڭ
ئۈچۈن كۆپ مىقداردىكى ئىلمان سۇ بىلەن كۈنجۈت
يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكىزۈش، ئاندىن كېيىن ئاساسىي
سەۋەپلىرىگە قارىتا ئىلاج قىلىپ، تەرەتنى يۇمشىتىش
چارىلىرىنى بىرلىكتە ئېلىپ بېرىش لازىم.

كويدۇرۇلگەن چاپان، بۇغا مۇڭگۈزى، قۇرۇ-

تۇلغان سازاڭ قۇرۇت ۋە ھوپۇپ گۆشىنى بىرلەشتۈرۈپ
يېمىشكە بېرىپ ئومۇمى ئۈچەي تۈسلىش كېسەللىكلىرىنى
داۋالىغان خاتىرىلەرمۇ بار.

چوڭ تەرەت كەلمەسلىك (ھەسرە)

چوڭ تەرەتنىڭ ئۇزۇن مۇددەت كەلمەسلىكى (قەۋ-
زىيەت) ھەسرە دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ قولۇنچىدىكى ئىچ
قېتىشتىن پەرقى شۇكى: بۇنىڭدا ئاغرىش قاتارلىق غەيرى
تەبىئى ھاللار بولمايدۇ، لېكىن بۇ ئەھۋال داۋام قىلسا
ئۈچەي تۈسلىش ياكى باشقا كېسەللەرگە سەۋەپچى بو-
لۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كېسەلگە ئالاھىدە
ئەھمىيەت بېرىپ داۋالاش لازىم.

داۋاسى: كېسەلنىڭ مىزاج ئەھۋالىغا قاراپ ئۈچەي
تۈسلىشتىكى چارىلارنى قوللىنىشقا بولىدۇ. ياكى مۇندۇ
نۇسخىدىكى شەرۋەت بېرىلىدۇ. ئەنجۈر، بىنەپشە، ئۇرۇقسىز
قۇرۇق ئۈزۈم، ئاقلىغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 1 سەردىن،
فۇنۇس، خىيارى شەنبەر 7 مىسقالدىن، بىستىپايەج، بادام
يېغى 2 مىسقالدىن، تەرەنجىۋىل 2 سەر.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل ۋە بادام
يېغىدىن باشقىلىرىنى چالا سۇقۇپ بىر كېچە يېتەرلىك
مىقداردىكى قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى سۇزۇپ ئۈستىگە
تەرەنجىۋىل سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. ئۇنىدىن كېيىن
خىيارى شەنبەرنى ئايرىم ھالدا ئازراق قايناقسۇ بىلەن
ئېرىتىپ، سۇزۇپ، بادام يېغىنى تەييار بولغان قىيام ئۈس-

تىگە قۇيۇپ ئەتە - ئاخشامدا 3 قوشۇقتىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

4 - پەسىل: ئۈچەي مەددە قۇرۇتلىرى

ئۈچەيدىكى مەددە قۇرۇتلار ئۇلارنىڭ شەكلىگە قاراپ يىلان مەددە (ھەيسات)، ياپىلاق مەددە (كەدۇدانە)، تۇتۇ مەددە دەپ پەرقلەندۈرىلىدۇ.

يىلان مەددە (ھەيات)

ئالامەتلىرى: ھەرخىل ئۇزۇنلۇقتىكى يىلاندەك يۇ - مىلاق ۋە ئۇزۇن قۇرۇتلار تەرەت بىلەن ياكى قۇسۇق بىلەن چۈشىدۇ. بۇ مەددىنىڭ تۇرۇش ۋە كۆپىيىش جايى ئىنچىكە ئۈچەيلەردىن ئىبارەت. قوساق تولغاقسىمان ئاغرىپ، كۆپكەن ھالدا بولىدۇ. تومۇر ھەركىتى سۇس بولۇپ، كېسەل ھورۇنلىشىپ، مەئىدە ئاغزىدا قىزىلىش ھىس قىلىدۇ. ۋە بىر نەرسە ماڭغانلىقىنى سېزىدۇ. بۇ ئەھۋال كۆپىنچە قوساق ئاچقاندا روشەن بىلىنىدۇ. دائىم ئىچى قاتىدۇ، قوسىقى ئېچىپلا تۇرىدۇ، كېچىلىرى ئۇيقىدا چىشلىرىنى غىچىرلىتىدۇ، كۈندۈزى ئېغىز ئىچى قۇرغاق بولۇپ، كېچىسى دائىم ئاغزىدىن شالى ئاقىدۇ. كىچىك بالىلاردا تارتىشىپ قېلىش ۋە ھۇشىدىن كىتىشلەرمۇ كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن 3 كۈن داۋاملىق يېڭى

ساققان سۇت ئىچكۈزۈپ 4 - كۈنى تۈۋەندىكى دورىلاردىن بىرى بېرىلىدۇ.

(1) بەرەڭگى كابىلى، سىرخیشت، تۇربۇت، قەنبىل ھەر بىرى 5 مىسقالدىن. تىرمىس، قىزىل لوبىيا، قۇستە تەلخى، ھەربىرى 7 مىسقالدىن، ئەمەن بىر سەر، ھىندى تۈزى بىر مىسقال. ئۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ تالغان تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(2) بەرەڭگى كابىلى 2 مىسقال، دەرەنە 1 مىسقال، ئۇرۇغسىز خورما 2 دانە، ئۇلارنىمۇ سوقۇپ تالغان تەييارلاپ ئاخشىمى ئۇخلاشتىن بۇرۇن ھەممىسىنى بىرلا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: (1) دورىلارنى سۇت بىلەن بېرىش لازىم. (2) دورىنى بېرىشتىن ئىلگىرى كېسەلنىڭ بۇرنىنى تېگىپ قويۇش كېرەك (مەقسەت دورىلارنىڭ پۇرىغىنى سەزدۈرمەسلىك).

ئەگەر دورىلارنى داۋاملىق ئىچەلمىسە ھوقنە ئار-قىلىق كىرگۈزۈش لازىم.

ھوقنە نۇسخىسى: سىيادان، قىزىل لوبىيا، بابۇنە 5 مىسقالدىن، ئەپسەنتىن 7 مىسقال، شاپتۇل غازىڭى بىر سىقىم. بۇلارنى 2 چوڭ چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ، بىر ئاز كۈنجۈت يېغى قوشۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ، مىزاجى ئىسسىق بولغانلارغا بەك ئىسسىق دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. ئۇنداقلارغا ئاچچىق ئانار-

نىڭ يىلتىزى ۋە قوۋزىغىنى بىر كېچەقا يىناقسۇغا چىلاپ
ئەتىسى تونۇرنىڭ قىزىغىدا پشۇرۇپ، سىقىپ سۇيىنى
3 كۈن بېرىلىدۇ.

شاپتۇل يوپۇرمىغى (كۆك يوپۇرمىغىنىڭ سۇيى
بولغىنى ياخشى) ۋە شاتۇتنىڭ قوۋزىغىنى قاينىتىپ
بېرىلىسىمۇ بولىدۇ.

شامچە نۇسخىسى: شەھىمى ھەنزەلدىن بىر مىسقال،
قەمبىلىدىن يېزىم مىسقالنى يۇمشاق سۇقۇپ، كالا ئوتى
بىلەن شامچە ياساپ، بىر ئاز كۈنجۈت يېغى بىلەن ياغلاپ
سوڭغا قويۇش لازىم. يۇقۇرقى نۇسخىلارنىڭ دورىلىرىنى
قاينىتىپ، قوساققا، كىندىك ئۈستىگە سىرتتىن قويىسىمۇ
ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

قاپاق ئۇرۇغى مەددە (كۇدۇدانە)

ئالامەتلىرى: قاپاق ئۇرۇغىدەك ياپىلاق ئاق مەددە
بوغۇملىرى تەرەت بىلەن، بەزىدە ئادەتتىكى چاغلاردا
تەرەتسىزمۇ چىقىدۇ. ئورنى چوڭ ئۇچەينىڭ يۇقۇرقى قىسمى -
لىرىدىن ئىبارەت. ئاغرىقنىڭ قوسىغى بەك ئاچىدۇ، ئاغزى
كېچىسى قۇرغاق بولىدۇ، بەزىدە تەرەت قارامتۇل كېلىدۇ.
داۋاسى: بۇ خىلدىكى مەددىنى چۈشۈرۈشتە ھوقنە
قىلىشنى ئاساس قىلىش لازىم. يىلان مەددە قىسمىدا
كورسىتىلگەن نۇسخىلاردىكى دورىلارنى نىسبەتەن كۈچ -
لۈگرەك قىلىپ بېرىش كېرەك. ھەر كۈنى ئاخشىمى سىركە
ئىچىپ يېتىش بەك تېز ئۈنۈم بېرىدۇ.

..... ھوققە نۇسخىسى — بەرەڭگى كابىلى، دەرەمەنە ھەر

بىرى $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن. نەمەكى ھىندى $\frac{1}{2}$ مىسقال،

تۇرۇت، شەھمە ھەنزەل بىر مىسقالدىن.

..... تەييارلاش ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى يىلان مەددىدىكى نۇسخە بىلەن ئوخشاش. ئەگەر شامچە قويماقچى بولساق يىلان مەددىدىكى شامچە نۇسخىسىنى ئىشلىتىش مۇمكىن. مەجۇنى قەمبىل (198 - نۇسخە) نىڭ تەسۋىرىمۇ ياخشى.

تۇتۇ مەدەدە

ئالامەتلەرى: كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا ئۇچرايدۇ. قىلدەك ئىنچىكە قۇرۇت تەرەت بىلەن ناھايىتى كۆپ ساندا چىقىدۇ. بالىنىڭ سوۋىسى بەك قىچىشىپ كېسەلنى ئازاپلايدۇ. قۇرۇتنىڭ ئورنى چوڭ ئۈچەينىڭ ئاستىنقى قىسمىدا بولىدۇ.

داۋاسى: شامچە قويۇش بىلەن ھوققە قىلىشنى ئاساس قىلىش كېرەك.

شامچە نۇسخىسى: قۇرۇق ئۈزۈم، ئاچچىق ئورۇك مېغىزى، تىپتۇل مېغىزى، قۇستى شېرىن ھەربىرى 5 مىسقالدىن يۇمشاق سوقۇپ مۇۋاپىق مىقداردا شامچە تەييارلاپ سوڭغا تىقىپ قويۇلىدۇ.

ھوققە نۇسخىسى: شەھى ھەنزىل، قەنتەرىون، نەمەكى ھىندى، ئاچچىق ئورۇك مېغىزى بىلەن شاكىلى، ئۇلار باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ قاينىتىپ سۇزۇپ قاننىدە بويىچە ھوققە قىلىنىدۇ.

ئەگەر سوڭ ئەتراپى يارىلانغان بولسا (ئاتىلاش ياكى قۇرۇتلارنىڭ زېدە قىلىشى بىلەن) شاپتۇل مېغىزىنى سوقۇپ چېپىش كېرەك. زىيىت يېغىنى كويدۇرۇپ سوڭىنى ئىسلاش بىلەن بۇ خىلدىكى مەددە قۇرۇتلار چىقىدۇ. بۇ چاغدا جۈپتەك ياكى باشقا نەرسە بىلەن قۇرۇتنى تازىلىۋېتىش كېرەك.

5 - پەسىل: سوڭ (مەقئەد) كېسەللىكلىرى

بوۋاسىر

بوۋاسىر — كۈتەننىڭ باشلىنىشىدىكى تومۇرلارنىڭ ئەمچەكسىمان پۇلتايغان ئۈسۈكچىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، سەۋىبى غەيرى تەبىئى سەۋدانىڭ تومۇرلاردا قېتىپ قېلىشىدىن ئىبارەت. بوۋاسىرنىڭ بەزىلىرى قانايدۇ، بەزىلىرى قانمايدۇ. قانايدىغانلىرى ئومىيا (قارغۇ) بوۋاسىر، قانمايدىغانلىرىنى ۋامىي (كۈزلىك) بوۋاسىر دەپ ئاتىلىدۇ. بوۋاسىرلارنىڭ شەكلىگە قاراپ تۈۋەندىكى بىرقانچە تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ.

(1) يىلتىز تارتقان كۈرچەتكە ئوخشايدۇ، كۈچەت-سىمان (نەخلى) دەپ ئاتىلىدۇ.

(2) ئۇزۇنچاق قاتتىق خۇددى خورمىغا ئوخشايدۇ، ئۇنى خورمىسىمان (تەمرى) دەپ ئاتىلىدۇ.

(3) يۇمىلاق ۋە يۇمشاق خۇددى ئۇرۇم دائىسىغا ئوخشايدۇ. ئۇلارنى ئۇزۇمسىمان (ئىنەبى) دەپ ئاتىلىدۇ.

(4) ئەنجۇردەك ياپىلاق شەكىلدە بولغىنى ئەنجۇر -
سىمان (تىنى) دەپ ئاتىلىدۇ.
(5) كىچىك پۇرچاقتەك قاتتىق بولىدىغىنى پۇر -
چاقسىمان (سۇلۇلى) دەپ ئاتىلىدۇ.
(6) ئۇزۇن ۋە يۇمشاق خۇددى ئۇژمىگە ئوخشايدىغىنى ئۇژمىسىمان (تۇتى) بوۋاسىر دەپ ئاتىلىدۇ.
قانايىدىغان بوۋاسىرلارنىڭ ئاغرىشى قانمايدىغانلىرىغا نىسبەتەن ئاز بولىدۇ. ئەمما داۋا قوبۇل قىلىشى تەس. كۈچەتسىمان ۋە ياپىلاق بوۋاسىرلار باشقا تۈرلىرىگە قارىغاندا ئېغىر ئۆتمىدۇ. ئاغرىش قاتتىق ۋە بىر نەرسە چىشلەنگەندەك سېزىلىشى قان بىلەن سەپرانىڭ غالىپلىغىنى، ئېغىرلىق بىلەن سانجىلىش ھىس قىلىشى قان ئۇيۇپ قالغانلىقىنىڭ ئالامەتلىرىدۇر.

داۋاسى: (1) ساغرا ۋە ئارقا تەرەپ ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا ھىجامەت قويۇش كېرەك. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. جىگەر ۋە تالنى ئىسلاھ قىلىش ۋە تەرەتنى نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن ھېلىلە مۇرابباسى، ئامىلە مۇرابباسى ۋە ئىتتىپاق سەغىر (5 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. توخۇ شورپىسىنى كۆكتات سالماي بېرىلىدۇ. قاننى قويۇقلاشتۇرغۇچى يىمەكلىكلەردىن مەسىلەن، كالا، كىيىك، ئۆدەك ۋە ئات گۆش، لىرىدىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ھەمدە سۈرلەنگەن گۆش، قېزا ۋە كۆكتاتلاردىن چەيزە، شوخلا، كۈدە، دانلىق ئاشلىقلاردىن ماشتىن پەرھىز قىلىش لازىم.

(2) يۇقۇرقى چارىلار بىلەن نەتىجە بولمىسا، قۇرۇ-
تۇش چارىلىرى بىلەن بوۋاسىر چۇشۇرلىدۇ. بۇ چارىلار
ئىسلاش ياكى سوڭغا، بوۋاسىر ئوسۇكچىسىگە چېپىشتىن
ئىبارەت.

(1) ئىسلاش ئۇسۇلى:

كېرەكلىك دورىلار — ئاس دەرەخ يوپۇرمىغى، جو-
يۇز، سەرۋە، چەيزە يوپۇرمىغى، بىخ كەبىر، موقىل، يىلان
پوستى، مۇرمەككى، شەھىمى ھەنزەللىرىنى لازىم مىقداردا
ئېلىپ، بىر داس تۈگە يېغىغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ يۇقۇرقى
دورىلار ئۈستىگە سېلىنىدۇ. داسنىڭ ئەتراپىنى مەھكەم
يۈگەپ ئۈستىدىن بىر ئوشۇك قالدۇرۇپ كېسەلنى شۇ
توشۇككە ئولتۇرغۇزۇلىدۇ ئەگەر كېسەل ئاقەت قىلالسا
ئۇزۇنراق ئىسلاش كېرەك. بۇ ئۇسۇل بوۋاسىرنى قۇرۇتۇپ
چۇشۇرۇشنىڭ ئۈنۈملۈك چارىسىدۇر.

(2) دورا بىلەن قانۇرۇس ئۇسۇلى:

ئانار پوستى، كۈندۈر، جۇپتى بەللۇت، جويۇز
سەبىرى ھەربىرى 5 مىسقالدىن، بىر سەرچە ئۈزۈم قاي-
نىتىلغان سۇ بىلەن دورىلارنى ئىزىپ ئۇماچتەك ھالەتكە
كەلتۈرۈپ، سوڭغا، بوۋاسىر ئوسۇكچىسىگە قويۇق چېپىش
كېرەك.

(3) ئىسلاشنىڭ يەنە بىر نۇسخىسى:

موقىل (كۆك رەڭلىك)، كۈندۈر، ئۇدى خام، بىخ
كەبىر ۋە ئادراسمان ئۇرۇغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ،

يۇقۇرقى ئىسلاش ئۇسۇلى بويىچە ئىسلاش كېرەك. ئاغرىش كۈچلۈك بولسا، قەلەي ئۇپىسى، ئاق موم ۋە گۈل يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك ئېغىر، چېقىلىش ۋە سانجىلىش بولسا بوۋاسىردىن قان ئاققۇزۇش لازىم كىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن — پىياز سۈيى، كالا ئوتى، قوي ئوتىنى بىرلەشتۈرۈپ پاختا ياكى يۇڭغا سۈركەپ سوغا قويۇش لازىم. ئەگەر ئاغرىق داۋاملىق كۈچىيىپ بارسا، توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلارنى چېپىش بىلەن ئاغرىق پەسىيدۇ.

ئەككىل مىلىك 3 مىسقال، ئەپيۇن بىر مىسقال، زەپەر يېرىم مىسقال، زىغىر 3 مىسقال، تۇخۇم سېرىغى بىر دانە، ئاق لەيلى 2 مىسقال، پىياز 5 مىسقال، مەئەسائىلە بىر مىسقال، كالا ئىلىگى، توگە ئىلىگى 5 مىسقالدىن. **تەييارلاش:** دورىلارنى سوقۇپ، ئىلىكلەرنى ئېرىتىپ قوشۇپ، تۇخۇم سېرىغىغا ئارىلاشتۇرۇپ سوغا چېپىشقا بېرىلىدۇ.

بوۋاسىر قاناپ كەتكەندە قاننى توختىتىش چاردا — لىرى: (ئا) قۇرىسى كەھرىبا (71 - نۇسخە)، مەجۇنى خۇبۇسۇلەددىن (100 - نۇسخە) لەردىن بىرىنى يېمەشكە ۋە شىافى كۈھلى (147 - نۇسخە) نى سوغا قويۇشقا بۇيرۇلىدۇ. ئىچىشكە ھەببى مۇقىل^① بېرىلىدۇ.

① قەۋزىيەت بولسا، ھەببى مۇقىلنىڭ I نۇسخىسى، ئىچ يۇمشاق كەلسە II - بېرىلىدۇ.

(ب) تۈۋەندىكى دورىلار بىلەن سوغنى يۇيۇش كېرەك. ئانار گۈلى، موزا، ھەببۇل ئاس، قىزىل گۈل تۈگۈنچىسى، ئاقاقىيالار باراۋەر مىقداردا ئېلىنىپ، قاينىتىپ قويۇق سۈيى بىلەن سوك يۇيۇشقا بېزىلىدۇ. ياكى ھەرە ھوكۇنىگى، مەدەستان ۋە ئۇپىلارنى قوشۇپ، سوغغا قويۇپ لاتىنىڭ ئوتتۇرىسىنى تېشىپ (تەرەت توشۇگى ئۈچۈن) تېگىپ قويۇش لازىم. ئەگەر بۇنىڭغا توشقان تۈكى قوشۇلسا ئۇنۇمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. يۇقۇرقىلار ئۇنۇم بەرمىگەندە دورا بىلەن قاتۇرۇپ چۈشۈرۈش ياكى ئەسۋاپ بىلەن كېسىش كېرەك. كېسىشنىڭ خەتىرى كۆپ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلاجىبار دورا بىلەن قاتۇرۇپ چۈشۈرۈش كېرەك. بۇنىڭ ئۇسۇلى تۈۋەندىكىچە:

ئۇسۇخە: سىماپ، نوشۇدۇر ھەر بىرى 3 سەردىن،

زەڭگەر $\frac{1}{2}$ 4 سەر، سۇ تەگمىگەن ھاك $\frac{1}{2}$ 4 سەر، كۈندۈر

11 سەر، سېرىق زەرنىخ 14 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى ئىزىپ تاكى سىماپ ئۈلگىچە ① سالاىە قىلىنىدۇ. كېيىن قۇرۇتۇپ، سىركە قوشۇپ يەنە ئىزىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئۇماچتەك ھالغا كەلگەندە قاچىغا ئېلىپ قويۇپ ساقلىنىدۇ.

① سىماپنىڭ ئۈلگىنى ئۇنىڭ باشقا دورىلارغا پۈتۈنلەي

ئارىلىشىپ كېتىپ كورۇنمەي قېلىشىدۇ — تەھرىر.

ئىشلەتمەش: ئالدى بىلەن ئارقا يولىنى تازىلاپ،
دورنىنى پەلەككۈچ بىلەن بوۋاسىر ئۈستىگە چېپىش كېرەك
(قويۇغراق چېپىلىدۇ).

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: (1) ئالدى بىلەن
بىر دانە بوۋاسىر پۈۋەكچىسىنى چۈشۈرۈپ بولغاندىن
كېيىن ئەھۋالغا قاراپ ئىككىنچىسىنى چۈشۈرىلىدۇ. ئەگەر
بىرىنچىسىگە نەتىجە بەرمىسە، باشقا چارە ئىزدەش كېرەك.

(2) كېسەلنىڭ يۈرىكىنى كۈچلەندۈرۈش ۋە ئاغرىشقا
چىداشلىق بېرەلىشى ئۈچۈن داۋائىل مىشكى ياكى مەجۇنى
مۇپەررىھى ياقۇتلىاردىن بىرىنى بېرىش كېرەك.

ئەسۋاپ بىلەن كېسىش ئۈچۈنمۇ ئالدى بىلەن
يۈرەكنى قۇۋۋەتلىنىدۇرگۈچى دورىلاردىن بېرىپ، بىر -
بىرلەپ كېسىپ، جاراھەت ئورنىغا قاتۇرغۇچى مەلھەملەر
سۈركەپ قويۇلىدۇ.

بوۋاسىرنىڭ "يەل بوۋاسىر" دەپ ئاتىلىدىغان
يەنە بىر تۈرى بار. ئۇنىڭ ئالاھىدە ئالامىتى شۇكى:
ئاغرىش خۇددى قولۇنچى ئاغرىشلىرىدەك بولۇپ، بەزىدە
ئاغرىق بەل ساھەسىگىچە يېتىپ بارىدۇ. بەزىدە تۈۋەنگە،
ئۇرۇقدان ۋە جىنىسى ئەزالارغىچە بارىدۇ. قوساق ئېسى-
لىش، يەل تولا مېڭىش ۋە قانلىق تەرەت قىلىش قا-
تارلىق بەلگىلىرى بولىدۇ. بۇ خىلدىكى بوۋاسىر كۆپىنچە
يىرىڭلىق ياللۇغلىنىش ۋە يىرىڭ ئاقىمىسىغا ئوزگىرىپ
كېتىدۇ. داۋالاشتا بۇ خىل بوۋاسىر سەۋدا سەۋىيىسى بىلەن

بولدىغانلىقى ئۈچۈن ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئىپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىپ ماددىنى تازىلىغاندىن كېيىن، يەلنى يوقاتقۇچى دورىلاردىن جەۋارشى شەھرىياران (97 - نۇسخە) ياكى مەجۇنى پىلاپى (143 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھەم بۇلارغا ماسلاشتۇرۇپ تۈۋەندىكى نۇسخە - لاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.

1. نۇسخە: بوزۇغا، دۇرۇنەج ئىقەرەبى، قارا ھېلىلە، شاترەنج ھىندى، ئاقىرقەرھە، قارىمۇچ، پىلىپىل، جۇسەي ئۇرۇغى، مۇقىل ھەر بىرى 4 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، جۇسەي ئۇرۇغى سۈيى بىلەن ھەب قىلىپ كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

2. نۇسخە: بىخ كەبىر 3 مىسقال، سوتتەر (ياپچان)

$\frac{1}{2}$ 1 مىسقالنى يۇمشاق سوقۇپ، جۇسەي سۈيى بىلەن ھەب قىلىپ كۈنىگە 2 مىسقالدىن يىمىشكە بېرىلىدۇ.

سوڭ يىرىڭلىق ئاقمىسى (ناسۇرى مەقئەد)

مەقئەد ئەتراپى بەزىلىرىنىڭ يىرىڭلىق ياللىغى بولۇپ، بەزىسى تىشىلىپ ئۈچەيگە ئۆتمىگەن ھالەتتە بولىدۇ. بەزىسى تىشىلىپ ئۈچەيگە ئۆتكەن ئاقما يول شەكىللەندۈرىدۇ.

بىرىنچى تۈرىنىڭ ئالامەتلىرى: سوڭ (ئارقا يول) ئەتراپىدا دائىم يىرىڭ ۋە زەرداپ ئېقىپ تۇرىدىغان جاراھەتلەر بولىدۇ. سوڭ ساھىسى سەزگۈچى ئەسەبلەر

كوپ ۋە كوپ ھەركەتلىنىپ تۇرىدىغان جاي بولغانلىقتىن،
ئاغرىشى زىيادە، ساقىيىشى قىيىن بىر كېسەلدۇر.

داۋاسى: يىرىك، زەرداپلارنى تازىلاپ چىقىرىپ
تۇرۇش بىلەن شىيافى غەرىپ (توۋەندىكى نۇسخە) تەييارلاپ،
دەل ناسۇر توشۇگىگە تامغۇزۇش كېرەك.
شىيافى غەرىپ نۇسخىسى:

مۇرمەككى، كۈندۈر، ئەنزۇرۇت، خۇلسياۋشان،
سۇرمە، زەمچى، ئانار گۈلى، زەڭگەر ھەر بىرى بىر مىس-
قالدىن. بۇ دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ گۈلەپ بىلەن
خېمىردەك قىلىپ شامچە تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇپ
ساقلىنىدۇ. كېرەك بولغاندا سۇ بىلەن ئېرىتىپ ئىشلىتىلىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەلنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ،
ساغرىسىغا ئىگىز بىر نەرسە قويۇپ تۇرۇپ ئېرىتىلگەن
دورنى جاراھەت توشۇگىگە تامغۇزۇپ، شۇ پېتى بىلەن
دورا قۇرۇپ بولغىچە ياتقۇزۇلىدۇ.

ئىككىنچى تۈرنىڭ ئالامەتلىرى: توشۇك چوڭ
ئۈچەيگە تۇتاشقانلىقتىن بەزىدە تەرەت ۋە يەل جاراھەت
توشۇكلىرىدىن چىقىدۇ. بۇنى ئېنىقلاش ئۈچۈن سوڭ
توشۇگىگە بىر نەرسە قويۇپ جاراھەت توشۇگىنى قول
بىلەن باسقاندا يەل ياكى تەرەتنىڭ چىقىۋاتقانلىغى
سېزىلىدۇ. بۇ جاراھەت چوڭ ئۈچەيگە ئۆتكەنلىك ۋە
تېشىلىگەنلىك ئالامىتى بولۇپ، دورىلارغا قارىغاندا دەس-
تىكارە (ئوپېراتسىيە) بىلەن داۋالاش ياخشىراق ئۈنۈم
بېرىدۇ.

سوڭ ياللۇغلىنىش (ۋەرەمى مەقئەد)

سەۋبى: ئىسسىق ماددىلار سەۋبىدىن بەزىدە سو -
غاق ماددىلار سەۋبىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) ئىسسىقتىن بولغانلىرى تۈرلۈك
ئىسسىق دورىلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، سۆڭىنىڭ
قىچىشىشلىرى ياكى سوڭ بوۋاسىرنى تىغ بىلەن كېسىش
ياكى قاتۇرۇشلار تۈپەيلىدىن پەيدا بولىشى مۇمكىن.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭدىكى ئالامەت ئاساسەن مەقئەدنىڭ
قاتتىق لوقۇلداپ ئاغرىشى ۋە سۇيىدۇكىنىڭ تېمىپ تۇرۇ -
شىدىن ئىبارەت. ئاغرىش ئاستا - ئاستا باشلىنىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن توققۇز كۈز ئۈستىگە ھىجا -
مەت قويۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن تىۋەندىكى دورى -
لاردىن بىرى تاللاپ بېرىلىدۇ.

(1) قەلەي تۈزى بىر سەر، گۈل يېغى 5 مىسقال،
ئاق موم بىر سەر، ئالدى بىلەن مومنى ئېرىتىپ، گۈل
يېغىنى قوشۇپ ئۈستىگە قەلەي تۈزىنى سېلىپ تازا
ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم تەييارلىنىدۇ.

(2) تۇخۇم ئېقى ۋە گۈل يېغىنى لازىم مىقداردا
ئىلىپ قوغۇشۇن ياكى چويۇن ھاۋانچىدا ئىزىپ سۇغىغا
سۈركىلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا، بۇنىڭغا
بىرئاز (بىر فۇڭ مىقدارىدا) ئەپيۇن قوشۇلسا بولىدۇ.

يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى، سۈۋۇق كەپپىياتلىق دو -

رىلارنى مەسىلەن رەيھان ئۇرۇغى، چىلان، ئەينۇلىلارنى قايىناقسۇغا چىلاپ، ئاۋات سېلىپ بېرىلىدۇ.

ماددىنى چىقىرىش ئۈچۈن قەي قىلدۇرۇلسا ياخشىراق. بەزىدە ماددىنىڭ قېتىپ قېلىشى بىلەن ۋەزەمدە قېتىش بارلىققا كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن تۈۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: ئەككىلىمىلىك، ئاق لەيلى، ئاقلاڭغان ماش، ئىت ئۇزۇمى يوپۇرمىقى، بىنەفشە ھەر بىرى بەش مىس - قالدىن، گۈل يېغى، بىنەفشە يېغى، تۇخۇم ئېقى، ھەممىسى يېغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قايىنىتىپ بىر پىيالىچە سۇ قالغاندا ئېلىپ، ئۈستىگە ياغ دورىلارنى قوشۇپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ ۋە لازىم بولغاندا مەقئەدكە سۈركىلىدۇ.

سوغاق ماددا (بەلغەمدىن) بولغان سوڭ ياللۇغلىرىدا ھارارەت بولمايدۇ. ئاغرىش نىسبەتەن ئاز بولۇپ، ئومۇمى بەدەندە بەلغەم غالىپلىق ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى پىشۇرۇش ۋە تارقىتىش ئۈچۈن ئۈدەك يېغى، تۇخۇم سېرىقى ۋە سېرىق گۈل يېغىغا زىننەت يېغى قوشۇپ سۈركىلىدۇ. ياكى مەنھەمى داخىلىيون (177 - نۇسخە) چېپىشقا بېرىلىدۇ. بۇ خىلدىكى كېسەل - لەرگە توخۇ تۇخۇمى سېرىغىنى يالغۇز ياكى قايىناقسۇ بىلەن يۈەشتىلىغان نانغا ئارىلاشتۇرۇپ سىڭىغا قويۇشنىڭ مەنپەئەتى بارلىقى تەجرىبىلەردىن ئۆتكەن.

سوڭ يېزىلىش

سەپرا ۋە ھارارەتنىڭ غالىپلىقى بىلەن خۇددى قول - پۇتلار يېزىلغانغا ئوخشاش سوڭ ئەتراپى قۇرۇپ يېزىلىدۇ. ئادەتتە خېلى كۆپ ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەندە قۇرۇق ئىسسىقلىقنىڭ ئالامەتلىرى بولۇپ، سوڭ يېزىلىدۇ. تەرەت قىلغاندا، يۇغاندا ئېچىشىدۇ.

داۋاسى: سىرتتىن مەلھەمى ئەببەز (ئاق مەلھەم) نى چېپىشقا ياكى مۇم ۋە قىروتى بىلەن ياغلاشقا بۇيرۇلىدۇ. ئەگەر داۋاملىق ئېچىشىش بولسا، بۇ سەپرانىڭ كۆپلىگى بولۇپ، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى خىيارى شەنبەر (54 - نۇسخە)، مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) ياكى بىنەپشە شەرۋىتىگە ئىسپۇغۇل لۇئابى قوشۇپ يېزىلىدۇ، ۋە يۇقۇرقى مەلھەملەرمۇ يېزىلىدۇ.

ئۇندىن باشقا، سوڭ ياللۇغلىرى ياكى بوۋاسىر سەۋىيىسى بىلەن، ۋە كۆپ قان يوقىتىش ياكى كۆپ ئىچى سۇرۇشتىن كېيىنمۇ سوڭنىڭ يېزىلىشى ئۇچرايدۇ. بۇنداقتا، سەۋىيىنى يوقىتىدىغان چارىلار بىلەن بىللە، يۇقۇردىكى چارىلارنىمۇ قوشۇمچە قوللىنىش كېرەك. تەرەت يۇمشاق كىلىشىگە دىققەت قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى ئەتىگەندە بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) گە بىيە ئۇ - رۇغى قوشۇپ يېزىلىدۇ. ئىچ سۇرۇپ كەتسە، قورغۇچى دورىلاردىن بىرىنى بېرىش كېرەك.

سوڭنىڭ پالەچاننىشى (ئەستىرخايى مەقەد)

سوڭنىڭ پالەچاننىشى سوڭ بىلەن ئۇرۇقدان ئوتتۇردى - سىدىكى پەي (شەرەج) نىڭ پالەچ بولشىدىن ئىبارەت. سەۋىيى: شەرەج پېينىڭ ئىچكى ياكى سىرتقى تەسىراتلار بىلەن زەرەرلىنىشى ياكى بوۋاسىر پۈۋەكچىلىرىنى كېسىۋالغاندا پەينىڭ زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت. بۇ 2 خىل سەۋەپ بىلەن كېلىپ چىققان سوڭ پالەچنى داۋالاش ئانچە ئوڭاي ئەمەس. بەزىلەردە مەزكۇر پەيگە ئىچكى تەرەپتىن مىزاج بۇزۇلۇشنىڭ تەسىر قىلىشى، تاشقى تەرەپتىن مۇز ياكى قار ئۈستىدە ئۇزاق ئولتۇرۇپ قېلىپ سوغاق ئوتۇشمۇ پالەچلىك كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى سەۋەپلەرنىڭ مەۋجۇتلىقى، سوڭ ئەتراپىنىڭ (بۇرەكنىڭ) بوشىشىپ كېتىشى بىلەن يەل ھەتتا چوڭ تەرەتنىڭ ئۈزۈلگىدىن چىقىپ كېتىشى، چوڭ تەرەت تۇتالما سىلىقلار كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى چىقىرىپ تاشلاش ۋە مىزاج - نى تۈزۈتۈش جەھەتتىن پالەچ بايانىدا كۆرسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. قۇست يېغى، قۇندۇز قەرى يېغى ۋە پەرفىيۇن ياغلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ، سوڭ ئەتراپى، شۇنىڭدەك شەرەج پېيى ئۈستىگە سۈرتۈش كېرەك. مېھرى گىيانى سۇ بىلەن تاشقا سۈرۈپ، سوڭغا چېپىشقا بېرىلىدۇ.

ئىترىپىل (5 - نۇسخە) ياكى ئىترىپىل مۇقىل (150 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سوڭ چىقىپ قېلىش (خۇرۇچى مەقئەد)

سەۋىيى: سوڭنى كۈتىرىپ تۇرغۇچى پەيلەر ئەمەس —
لىك ① تەسىرى بىلەن ياكى سوغاق تەسىرى بىلەن بوشىشىپ
كېتىپ، سوڭ تاشقىرىغا چىقىپ كېتىدۇ. بۇنىڭدا سوڭنىڭ
ئورۇلۇپ چىقىشى ئاسان بولۇپ، ئىچىگە كىرگۈزۈشمۇ
ئاسان. سوڭ ئىچكى گۈشلىرىنىڭ ئىشىشىپ قېلىشى بىلەنمۇ
سىرتقا چىقىپ قالىدۇ. بۇنداقتا سوڭنىڭ چىقىشمۇ قىيىن
شۇنداقلا كىرىپ كېتىشمۇ قىيىن.

ئالامەتلىرى: تەرەتتىن كېيىن ياكى ئىنجىقلاش
بانىسى بىلەن سوڭ سىرتقا چىقىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن چىقىپ قالغان سوڭنى
سەۋىرىچانلىق بىلەن ئىچىگە قايتۇرۇش لازىم. سوڭنى
ئىچىگە كىرگۈزۈشتە، ئالدى بىلەن بوشاشتۇرغۇچى دورى
لاردىن سۈركەپ بولغاندىن كېيىن، ئىچىگە كىرگۈزۈپ
قاتۇرغۇچى دورىلارنى سۈركەش كېرەك. مەسلەن.

(1) قىسمىدا — گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ، ئاندىن
كېيىن ئىچىگە كىرگۈزۈپ ئۈستىدىن ئۇپا، ئانار گۈلى،
موزا، زەمچە، سۈرمە، ئانار پوستى، كويىدۇرگەن سەدەپ،
ئاقاقىيا، پاقا يوپۇرمىغى، تۇزلارنى قوشۇپ، سوقۇپ سوڭ
غا قويۇپ مائادىن تەرەت چىقىدىغان توشۇك ئېچىپ
تېگىپ قويۇلىدۇ.

① نەملىك — بۇ يەردە مىزاجىدىكى ئومۇمى ھوللۇك كۈزدە
تۇتۇلىدۇ.

(2) قىسىمدا—ئاغرىقنى بىسەپشە، ئاق لەيلى، بابۇنە، چامغۇر، بەسەي قۇلىغى ۋە زىغىر قايناتقان سۇدا ئولتۇر-غۇزۇپ، سوڭ ئىچىگە كىرگۈزۈلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئۈستىدىن — سېرىق چىچەك يېغى، بابۇنە يېغى ۋە موم يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوڭغا سۇرتۇپ، ئۈستىدىن قاتۇر-غۇچى مەلھەم بىلەن ياغلاپ يۇقۇرىدا كورسەتكەندەك قىلىپ قويۇش ھەم ئارىلاپ شاھ بەللۇت، ياۋا ئانار گۈلى، قىزىل گۈل خەمىكى، بەرگى ئاس قاتارلىقلار قاينىتىلغان سۇ بىلەن نەمدەپ بېرىش كېرەك. جاراھەتلىنىش ئەھ-ۋاللىرى كورۇلسە سوڭ جاراھەتلىرىدە كورسىتىلگەن چارە-لارنى قىلىش كېرەك.

سوڭ يارىلىرى (قۇرۇھى مەقئەد)

سوڭ ئەتراپى ۋە بەزىدە ئىچكى قىسىملىرىدا بولىدىغان دائىم شەلۋەرەپ تۇرىدىغان جاراھەت.

داۋاسى: قۇرۇتقۇچى ۋە ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى سىرتتىن چېپىشقا بېرىلىدۇ. مەسىلەن، قوغۇشۇن كۈشتىسى، ئانار پوستى، ماش (ئاقلانغان) جۇپتى بەللۇت، جويۇز، سەبىرلەرنى يېتەرلىك سۇدا قاينىتىپ، سۈيى ئاز قالغاندا ئۈستىگە قوي يېغىدىن ئارىلاشتۇرۇپ ماي تەييارلاپ، سوڭغا چېپىشقا بېرىلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك بولسا بىر ئاز ئەپيۇن قوشۇش كېرەك.

سوڭ قىچىشىش

سەۋىيى: تۇتۇ قۇرۇت مەددىلەر، سەۋدا ۋە قىزىق قاننىڭ پەيدا بولىشى (بىۋاسىرنىڭ باشلىنىشىدا)، سەپرا ۋە شور بەلغەم.

ئالامەتلىرى: (1) تۇتۇ قۇرۇتلارنىڭ بولىشى بىلەن سوڭ ئەتراپى قىچىشىدۇ. كۆپىنچە كېچىلىرى چىدىغۇسىز ھالدا قىچىشىدۇ. بۇنداقتا تۇتۇ قۇرۇتنى يوقىتىش كىپايە قىلىدۇ، ئالاھىدە داۋالاش ھاجەتسىز. (2) سەۋدا، سەپرا ۋە شور بەلغەم سەۋىيى بىلەن بولغانلىرىدا مەزكۇر خىلىت-لارنىڭ ئالامەتلىرى بىلەن بىللە سوڭ ئېچىشىپ قىچىشىدۇ. داۋاسى: توققۇز كۈزگە ھىجامەت قويۇش كېرەك.

ماددىلارنى تازىلاش ئۇچۇن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (125 - نۇسخە) بېرىپ، تاماققا ھول سوغاق نەرسىلەر بېرىلىدۇ. مۇقىلنى ئۇرۇك مېغىزى يېغىدا سۇرۇپ چېپىش كېرەك. سوڭغا بىۋاسىرلاردا كورسىتىلگەن شامچىلارنىڭ ماددىلار-نى تازىلاش تەسىرى بارلىرىدىن بىرى ئىشلىتىلسە بولىدۇ.

XI ماقالا. بورەك كېسەللەكلىرى

1 - پەسىل: بورەكنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك ئاغرىقلىرى بورەك مىزاجىنىڭ ئىسقىتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: بورەك مىزاجى مەيلى ماددىسىز ياكى ماددا سەۋىيىسى بىلەن بۇزۇلسۇن ئومۇمەن بەدەن قىزىدۇ، تومۇر ھەرىكىتى تېز، تەشئالىق كۆپ بولىدۇ. سۇيىدۇك رەڭگى قىزىل ياكى سېرىق رەڭدە كېلىدۇ. بورەك ساھىبى - دە قىزىقلىق سېزىلىدۇ. كىچىك تەرەت تولا قىستاي - دۇ. يەنى سۇيىدۇكنى ئۇزۇن ساقلاشقا بولمايدۇ. سۇيىدۇك ئۈستىدە يىپتەك ئەيلىگەن دۇغ بولىدۇ. بۇ خىلدىكى بورەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى قەن سىيىش كېسلى (زىابىتۇس) گە ئايلىنىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ھول سوغاق نەرسىلەر بېرىشنى ئاساس قىلىش كېرەك، مەسىلەن، ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە)، زىرىق شەرۋىتى (89 - نۇسخە) ۋە خەشخاش شەرۋىتى (69 - نۇسخە) قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. قۇرسى تەبىئىي (112 - نۇسخە) نى ئۇسۇك ئۇرۇغى قوشۇلغان سەندەل شەرۋىتى بىلەن بېرىلىدۇ. بەزىلەر بىر ئاز كاپۇر قوشۇپ

بېرىشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. چۈنكى بۇ بورەكتىكى ھارا-
رەتنى ئالىدۇ (ئەمما كاپۇرنىڭ مىقدارى كوپ ئاز
بولسا جىنسى ئاجىزلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ). غىزاسى
ئۈچۈن ماش، پالەك قوشۇلغان تاماقلار بېرىش كېرەك.

قان سەۋىيىسى بىلەن بورەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى

بۇ خىلدىكى بۇزۇلۇش قاننىڭ كوپلىگى سەۋىيىدىن
بولىدۇ. بۇنىڭدىكى ئالامەت بەل، قول، پۇتلارنىڭ ئېغىر-
لىشىشى، بەلنىڭ تېلىپ ئاغرىشىدۇر.

داۋاسى: مىزاجنى ئۆزگەرتىش چارىلىرى كورۇلى-
دۇ. چىلان شەرۋىتى، كاسىن سۈيى بېرىلىدۇ (قالغان
چارىلار 1 - قىسىمغا قارالسۇن).

سەپراغالىپلىغى بولسا، ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلغانىدىكى
ئالامەتلەر كورۇلىدۇ. بەدەن ۋە سۈيىدۈكتە سەپرا ئالامەت-
لىرى بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن فۇنۇس، خىيارى شەنبەر،
تەمرى ھىندىلەرنى ئانار سۈيى، بىنەپشە شەرۋىتى ئېرىتىپ
سۇزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

بورەك مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: سۈيىدۈك رەڭگى ئاق، تۆمۈر ھەركىتى
سۇس ۋە بىدەنلىرى ئاق بولىدۇ. بەل تالىدۇ، بورەك
بار جاي (بەلنىڭ تۈۋەن قىسمى) سوغاق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەن،
مەجۇنى جەۋارىش كۇمۇنى (49 - نۇسخە) لەرنى بېدىيان
ئەرەقى بىلەن بېرىلىدۇ. زاراڭزا يېغى، ئاچچىق بادام

يېغى، پىستە ۋە قۇست يېغى بىلەن بورەك ساھەسىنى ياغلاش كېرەك. قۇشلارنىڭ گۆشى ۋە شورپىسىنى بېرىش لازىم. چۈچۈمەل تەملىك ۋە سوۋۇق نەرسىلەرنى يېمىش تىن پەرھىز قىلىش كېرەك.

بورەكنىڭ كىچىكلىشىپ كېتىشى

سەۋەبى: بورەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى؛ جىنىسى ئالاقىنى كۆپ قىلىش؛ دورا ئىچىپ كۆپلەپ سىيىش ياكى كۆپ ئىچ سۇرۇش.

ئالامەتلىرى: سۆيىدۈكنىڭ رەڭگى ئاق، سۈزۈك بولىدۇ. بەدەن ئورۇق بولۇپ، ئارقا مىڭىنى بويلاپ يۇقۇرىدىن تۆۋەنگە قاراپ ئاغرىش سىزىلىدۇ. جىنىسى كۈچى ئاجىزلىشىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋەبىنى يوقىتىش، ئۇندىن كېيىن بورەكنى سەمىرىتىش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن، بادام مېغىزى، پىستە مېغىزى، قىندۇق مېغىزى، ئارچىل (ئارىيل) مېغىزلىرىنى شېكەر قوشۇپ، سوقۇپ يېمىشكە بېرىلىدۇ. غىزاسىغا توخۇ ۋە ئۆدەك يېغى بېرىش، ياكى شۇ ياغلار بىلەن تاماق ياساپ بېرىش، ئىسسىق ھالدا بېرىش كېرەك. تەرەنجىۋىلىدىن 30 سەرنى تازىلاپ، 20 سەر كالا سۈتى ۋە بىر مىقدار ئاۋات بىلەن قىيام قىلىپ 2 سەر مىقداردىن يېمىشكە بېرىلىدۇ.

بۆرەك زەئىپلىگى (زەئىفى گۈردە)

بۆرەك زەئىپلىگى دىگىنىمىز: بۆرەكنىڭ سۇيىدۇك ئىشلەپچىقىرىش خىزمىتىنى تولۇق ئورۇنلىيالماسلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۆرەك زەئىپلىگى پەيدا بولىشى توۋەندىكى بىر قانچە سەۋەپلەرگە باغلىق.

سەۋىيى: بۆرەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى، بۆرەك يوللىرىدىكى ھەر خىل توسالغۇلار؛ بۆرەكنىڭ تاشقى زەخمىلەرگە ئۇچراپ زەرەرلىنىشى ياكى قوپال قاتناش ۋاسىتىلىرى (ياغاچ ھارۋا، سوكۇلداپ ماڭىدىغان ئات، ئۇلاقلار) نىڭ قاتتىق سىلىكىشى بىلەن زەرەرلىنىش قاتارلىقلار.

ئالامەتلىرى: بەلنىڭ بەلۋاغ باغلايدىغان جايى ئاغرىيدۇ، ئولتۇرۇش ۋە قوپۇش قىيىنلىشىدۇ، بەل تولىغاندا ئاغرىق تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ، جىنىسى كۈچى ئاجىزلىشىدۇ، سۇيىدۇك مىقدارى ئازىيىدۇ، سۇيىدۇك گۆش يوغان سۈدەك كېلىدۇ. سۇيىدۇك بىر ئاز تۇرغۇزۇلغاندا ئۈستىدە كۆپۈكسىمان لەيلىمە رۇسۇپ پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر بۆرەك مىزاجىنىڭ بوزۇلىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا سەۋىيىنى يوقىتىپ، مىزاجىنى تەڭشەش لازىم. ماددىلاردىن بولسا تازىلاش ۋە سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مۇناسىپ سۈرگە دورىلارنى بېرىش لازىم. ئىسسىق مىزاجىدىن بولغاندا، خۇنسىياۋشان، ئانار گۈلى، گىلى ئەرمىنى، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى، سەمفى ئەرمەيدىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، تالقان تەييارلاپ

بېرىلىدۇ. ئاق سەندەل، قىزىل گۈل گۈلابى، ئاقاقىيا، ھەببۇل ئاسلارغا سىركە قوشۇپ بەلگە سىرتتىن چېپىش لازىم. ئەگەر سوغاقتىن بولسا ئىسسىقلىق دورىلار قىلىنسا بولىدۇ. ئەمما بورەك زەئىپلىگىگە ئىسسىقلىق قىلىشتىن ئېھتىيات قىلىش لازىم. بورەكنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن مەجۇنى لۇبۇبى سەغىر (151 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كالا ياكى توگە سۈتلىرىنى يالغۇز ياكى ئانارگۈلى ۋە گىلى ئىرمىنى بىلەن بېرىلسە نەتىجىسى ياخشى. ئۈزۈم يوپۇرمىغىنى سىقىپ سۈيىگە تۈز تېمىتىپ 9 كۈن گۇدا بېرىلسە، بورەك زەئىپلىگىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. غىزاسىغا قۇرۇق ئۈزۈمنى قوي بورەك يېغى ۋە كالا، پاقالچەك گۆشلىرى بىلەن بېرىلىدۇ. سۈت ئاش ۋە بۇغداي، ئارپا شىرىلىرى بىلەن تەييارلانغان ئاشلارغا سىركە قوشۇپ چۈچمەل قىلىپ بېرىش لازىم.

بورەكنىڭ يەللىك ئاغرىشى (بادى گۈردە)

بورەك ئەتراپىدا پەيدا بولغان قويۇق يەل (بادى غەلىزە) نىڭ بورەك ئىچكى قىسمىغا تەسىر قىلىشى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەل ساھەسىدە ئېغىرلىق ۋە سانجىلىق ئاغرىش بولىدۇ. ئاغرىش تۇتقاقلىق تۈردە خۇددى تارتىشقاندىك بولۇپ كېسەلنى بەك ئازاپلايدۇ. ئېغىرلىق پۈتۈن بەل باغلىمى بويىچە سېزىلىدۇ. قوساق ئاچقاندا

ئاغرپ، تاماق ھەزىم بولغاندىن كېيىن يەڭگىلىشىپ قالىدۇ. ۋە سانچىلىش كەمرەك بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تارقاتقۇچى دورىلار بىلەن ھوق نە قىلىش لازىم. مەسىلەن سېرىق چىچەك، زىرە، سۇزاپ ئۇرۇغى، بابۇنىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇدا قاينىتىپ ھوقنە قىلىش، بۇ دورىلارنىڭ تىرىپلىرىنى بەل ئۈستىگە قويۇش ياكى قۇست يېغى بىلەن بەلنى باغلاپ بېرىش كېرەك. سۇزاپ يېغىغا ئاق لەيلى، بۇغداي كېپىكى، تۈزلەرنى قوشۇپ بەلگە تېگىپ قويۇش لازىم. ئارپا بېدە يان، سۇزاپ، قىزىل گۈل، رۇم-بېدىيان، بېدىيان يىلتىزى پوستى، بىخ كەبىر پوستىنى قاينىتىپ سۈيىگە ھەسەل سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. شەرۋىتى بۇزۇرى (130 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

بورەكنىڭ ئاغرىشى (ۋەجەلەكە بەد)

بورەك ئاغرىشى ئاساسەن بورەكنىڭ يەللىك ئاغرىشى ياكى بورەك زەئىپلىگىدىن پەيدا بولىدۇ. بورەكنىڭ ھەر خىل ياللۇغلىرى، يارىلىرىدا ئاغرىش مۇھىم ئالامەتلىرىدىن بىرىدۇر.

داۋاسى: بورەك ئاغرىشىنى پەسەيتىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىللە، ئاغرىش سەۋىيىنى داۋالاش چارىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن بابۇنە، سېرىق چىچەك، ئاق لەيلى، بەسەيلەرنى قاينىتىپ، سۈيى بىلەن بورەك ئۈستىنى (بەلنى) يۇيۇپ بېرىش كېرەك.

2 - پەسىل: بورەك ياللۇغلىرى (ۋەرەمى گۇردە)

بورەكنىڭ ماددىلىق ياللۇغلىنىشلىرى

بورەك ياللۇغلىنىش ئاساسى سەۋىيىسى ماددا بولغاندا، قان ۋە سەپرانىڭ قويۇقلىشىپ قېلىشى ھەمدە ئىسسىقلىق تەسىرى بىلەن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما، تەشنىلىق، باش ئاغرىش، ئۇيقۇسىزلىق بىلەن بەلنىڭ تېلىپ ئاغرىشى كۆرۈلىدۇ. سەپرادىن بولغاندا قۇسۇش، سۇيدۇك ئازىيىش، تەشنىلىق كۈچلۈك بولۇش بىلەن بىللە، سۇيدۇك رەڭگى ۋە بەدەن سېرىققا مايىل بولىدۇ. ئەگەر قاندىن بولسا، بەل ساھەسىدىكى ئېغىرلىق ۋە ئاغرىشنىڭ زىيادە بولۇشى بىلەن قان غالىپلىقىنىڭ باشقا ئالامەتلىرى بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ياللۇغلىنىش بىر تەرەپ بورەكتە ياكى ھەر ئىككى كىلا بورەكتە بولىشىمۇ، بورەكنىڭ مەلۇم قىسىملىرىدا، چوڭقۇر قاتلاملىرىدا ياكى ئۈستۈنكى پەردە ۋە سۇيدۇك چىقىرىش باش يولىدا بولۇشى مۇمكىن. بەزىدە بورەك بىلەن دوۋساق ئوتتۇرىسىدىكى يولدا بولغانلىقىمۇ ئۇچرايدۇ. مۇنداق ھاللاردا سۇيدۇك توختاپ قالىدۇ. ياللۇغلىنىش ئۆڭ بورەكتە بولسا، ئاغرىش جىگەرگە يېقىن جايىدا ئۈستۈنرەك تەرەپتە، سول تەرەپتىكى بورەكتە بولسا، ئاغرىش ئۈۋەنرەك جايىدا بولىدۇ. ياللۇغلىنىش بورەك پەردىسىدە بولسا ئاغرىش چىدىغۇسىز كۈچلۈك بولىدۇ.

بۇ مىڭە پەردىسىگە تەسىر بېرىپ، مىڭە پەردىسى غىدىغ-
لىنىش ئالامەتلىرى — ئەس - ھۇشىنى يىزىقتىش، باش
قاتتىق ئاغرىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قىزىتما تەرتىپ-
سىز بولىدۇ.

داۋاسى: سافىن ۋە باسلىقتىن قان ئېلىشنى ئوي-
لاپ بېقىش مۇمكىن. ئۇندىن كېيىنلا ئارپا سۈيى، ئىسپۇ-
غۇل لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابىنى بىنەپشە شەرۋىتى
(74 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ. بەلگە چېپىش ئۈچۈن
ئارپا ئۇنى، ئىت ئۇزۇمى، ئاق سەندەل، مامىشا، كاسىن
سۈيى، بىنەپشە يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ. ئەگەر
قەۋزىيەت بولسا، مەتبۇخى ھېلىلا (38 - نۇسخە) ياكى
فۇنۇس شىرىسىگە ئىسپۇغۇل ۋە بادام يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
بۆرەك ياللۇغلىرىدا كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ بىر-
دىنلا يەڭگىلەشكەنلىكى ماددا پىشقانلىق بەلگىسىدۇر.
بۇنداق چاغلاردا ماددىنى تازىلىغۇچى تەسىرگە ئىگە دو-
رىلارنى بەلگە چېپىلىدۇ. سۈيىدۈكتە يىرىك كورۇلسە،
سۈيىدۈك يوللىرىنى تازىلىغۇچى ۋە سۈيىدۈك راۋان قىل-
غۇچى دورىلارنى مەسىلەن، خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى،
قاياق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزلىرىدىن شىرە چىقىرىپ بېدىيان
سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ. ياكى بىنەپشە شەرۋىتى بىلەن
سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئېپ-
غىرلىق ۋە ئاغرىش تۈگىگەنلىكتىن يىرىك تازىلىنىپ
بولغانلىغى بىلىنىدۇ. بۇ چاغدا بۆرەكتىكى زەخمىنىڭ

ئەسلىگە كېلىشنى تېزلىتىش ئۈچۈن قۇرسى كاكىمەج (152 - نۇسخە) ۋە بىنادىق بۇزۇرى (153 - نۇسخە) بېرىلدى. ئەمما يەنىلا ئاغرىش ۋە ئېغىرلىق بولسا ئۇلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

ياللۇغلىنىشنىڭ سەۋىيىسى سوغاق خىلىتلاردىن بەلغەم ياكى سەۋدا بولسا ئاغرىشقا قارىغاندا بەلدە ئېغىرلىق ئارتۇق بولىدۇ. پۇت - قوللىرى كۈچسىزلىنىدۇ، سۈيى دۈك ئاز ۋە قويۇق كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بەزدە سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا) پەيدا بولىدۇ. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بىر قانچە كۈن قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ نەتىجىسى بولمىسا، جۈۋىنە، زىرىنىڭ ھەر بىرىنى 5 مىسقالدىن، مەستىكى 1 مىسقال، سەبە 2 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سۈيى قۇپ گۈلاپ سۈيى بىلەن ھەب تەييارلاپ كۈنىگە بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ. ھەر كۈنى ئەتىگەندە زىغىر، شۇمشە، خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى قاتارلىقلارنىڭ لۇتاپ ۋە شىرىسىنى چىقىرىپ ئىچكىۈزۈش كېرەك ياكى شەرۋىتى بىنەپشە (2 - نۇسخە) ۋە شەرۋىتى خەشخاش (69 - نۇسخە) دىن بىرىنى تاللاپ بېرىش كېرەك.

كېسەلنىڭ غىزاسىغا قۇش گۈشى شورپىسى ۋە نو-قۇت سۈيىگە زىرە، پىننە سېلىپ بېرىلىدۇ. تامىغى، نېنى تۈزىتىش بولمىشى شەرت. بورەكنىڭ ئاغرىشى بەزدە ئۈچەي تۈسۈش (قۇلۇنچى) ئاغرىقلىرى بىلەن ئارىلىشىپ كې-

تىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەللىكلەردە كورسىتىلگەن پەرق-
لەش جەدۋىلىگە ئاساسەن بىر تەرەپ قىلىش لازىم. يەنە
بىر مۇھىم ئايرىش ئۇسۇلى شۇكى: خاتا ھۆكۈم قىلىپ
بۆرەك ياللۇغىدا ھوققە قىلىنسا ئاغرىش ئېغىرلىشىپ كې-
تىدۇ. ئەمما قۇلىنچىدا ھوققەدىن كېيىن ئاغرىش يەڭگىل-
لىشىپ قالىدۇ.

بۆرەك يارىسى

دوۋساق جاراھەتلىرىنىڭ داۋامىدا بارلىققا كېلىدۇ.
ياكى خىلىتلار سەۋەپلىك ئۆز ئالدىغا پەيدا بولىدۇ.
ئالامەتلىرى: بەل ئاغرىدۇ، ئاغرىش سانچىلىغاندەك
(بۆرەك ساھەدە) سېزىلىدۇ. سۇيدۇك بىلەن يىرىمىڭ ياكى
يىرىڭدەك شىلىملىق نەرسىلەر كېلىدۇ. سۇيدۇك مىقدارى
جەھەتتىن ئالاھىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ. سۇيدۇك رەڭگى
قىزغۇش بولسىمۇ سىيگەندە قىيىنلىش بولمايدۇ. جاراھەت
بۆرەكنىڭ گۆش قىسمىدا بولسا ئاغرىش ئازىراق؛ پەردە
قىسمىدا بولسا ئاغرىش بىلەن ئېچىش ئېغىر
بولىدۇ. جاراھەت بۆرەك بىلەن جىگەر ئوتتۇرىسى-
دا بولسا، ئاغرىش ئارقا تەرەپ تاغاقچى تارقىلىپ با-
رىدۇ، بۆرەك بىلەن دوۋساق ئوتتۇرىسىدا پەيدا بولسا،
ئاغرىش ۋە سانچىلىش سۇيدۇك يولى ۋە جىنىسى ئەزا-
لارغىچە بارىدۇ. جاراھەت دوۋساق ياكى بۆرەكتە ئىكەن-
لىكىنى توۋەندىكىچە پەرقلەش كېرەك.

(1) جاراھەت دوۋساققا بولسا، سۇيدۇك ماڭغاندا

ئاغرىش ياكى سانچىلىش بولىدۇ. بورەكتە بولسا، سۈي-
دۈك چىقىرىشتا قىيىنلىق بولمايدۇ.

(2) دوساقتىكى جاراهەتتە يىرىك كۆپ بولۇپ،
سۈيىدۈك سېسىق پۇرايدۇ. بورەكتىكى جاراهەتتە يىرىك
مىقدارى ئاز، سۈيىدۈكتە پۇراق بولمايدۇ.

(3) جاراهەت دوساقتا بولغاندا پەقەت دوسۇن
ئۈستىدىلا ئاغرىش سېزىلىدۇ. ئەمما بورەكتىكى جاراهەتتە
يارىمنىڭ ئورنىغا قاراپ يۇقۇرى - تۆۋەنگە تارايدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن سۈرگە بېرىش-
كە بولمايدۇ. ئەمما قەۋزىيەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن يەڭ-
گىل سۈرگە بېرىش مۇمكىن. قەي قىلدۇرۇش پايدىلىق.
ئەگەر قىزىتما بولمىسا، بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىل-
تىزى، ئىزخىز، ئارپا بېدىيانلارنى قاينىتىپ سۈيىگە ھە-
سەل قوشۇپ بېرىلىدۇ. قىزىتما بولسا، خاڭگا، قوغۇن ئو-
رۇغىنىڭ شىرىسى ۋە زىغىرلۇ ئابىنى ھەسەل ياكى قەن
بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بورەك ساھىبىنى تاشقى تە-
رەپتىن يۇيۇش ئۈچۈن ئوغرى تىكەن، بابۇنە، پىرسياۋ-
شان ۋە ئەگرى خاڭگا ئۇرۇقلىرى قاينىتىپ بېرىلىدۇ.
ھەم مۇنۇ نۇسخىدىكى تالقاننى كۈنىگە 2 مىسقالدىن
2 سەر ھەسەل سۈيى بىلەن ئىچىدۇ.

نۇسخە: چىڭسەي ئۇرۇغى، كۈندۈر، ئارپا بېدىيان،
رۇمبېدىيان، زۇپا ھەر بېرىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ (مە-
رى گىيا، ئەپيۇنلەردىن ئاغرىقنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ قو-
-

شۇلسا بولىدۇ)، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلاپ كور-
 سەتمە بويىچە بېرىلىدۇ. ئۇندىن باشقا قۇرسى كاكىنەج
 (152 - نۇسخە) ۋە بىنادىق بۇزۇرى (153 - نۇسخە)
 لەر بورەك يارىلىرىدا ئۇنۇمى خىلى ياخشى دورىلاردور.
 غىزاسىغا تۇزسىز غىزالارنى بېرىش، جىنىسى ئالا-
 قىنى مەنئى قىلىش لازىم.

قەن سىيەش كېسىلى (زىياپەتۇس) ①

زىياپەتۇس كېسىلىدە ئاغرىق كىشى ئىچكەن سۇنى
 شۇ يېتى سۇيدۇك بىلەن چىقىرىدۇ. ئىچىلگەن سۇ بەدەن
 سەرىياتىنى يەنى ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرالمىدايدۇ. كېسەل كوپ
 ئۇسسايىدۇ، كوپ ئىچىدۇ ۋە كوپ سىيىدۇ. بۇ كېسەلنى
 "دۇلاپ" يەنى سۇ تارتىقچى دەپمۇ ئاتايدۇ.
 سەۋىيىگە قاراپ بۇ كېسەل تۆۋەندىكىچە 2 قىسىمغا بو-
 لىنىدۇ: 1 - قىسمى: بورەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقى بۇ-
 زۇلشى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ ئوزىگە تارتىش (جەزبە)
 قۇۋۋىتى ئېشىپ كېتىپ، تۇتۇش (ماسكە) قۇۋۋىتى تۈ-
 ۋەنلەپ كېتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بورەك سۇيدۇكىنى ئوزىدە
 تۇتۇپ تۇرالماي تېزلىكتە دوۋساققا ھايدايدۇ. ۋە بۇنىڭغا
 ئەگىشىپ جەزبە قۇۋۋىتى مەئدە ۋە جىگەردىن داۋاملىق
 سۇ تەلەپ قىلىدۇ (شىمىرىدۇ)، بۇنىڭ بىلەن تەشەلىق
 كېلىپ چىقىدۇ. ئىچىلگەن سۇ يەنە دەرھال بەدەن سىر-

① زىياپەتۇس: دوختۇرلۇقتا دىياپەت دەپ ئاتىلىدۇ.

نىغا چىقىپ كېتىدۇ. بەدەندە قىزىتما كورىلىدۇ، سۇيدۇك قىزىل بولىدۇ.

داۋاسى: بورەك مىزاجىنى (ئىسسىقلىقنى) تەڭشەش چارىلىرىنى قىلىش لازىم. ئانار شەرۋىتى، چۈچىمەل ئانار سۈيى ۋە لىمون شەرۋىتى (47 - نۇسخە) ئىچىشكە بېرىلىدۇ. دورىلاردىن قۇرىسى كاپۇر (76 - نۇسخە)، قۇرىسى تاباشىر (112 - نۇسخە) ۋە قۇرىسى زىياپىتۇس (154 - نۇسخە) لەر بېرىلىدۇ. ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش ئۈچۈن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى ۋە خاڭگا ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى، ئىس-پۇغۇل لۇئابى بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن بەلگە سۈركەش ئۈچۈن ئاق سەندەل، ئانار گۈلى، ئاقاقىيا، ئارپا شا-كالىرى سوقۇپ بېرىلىدۇ. غىزاسىغا قاتۇرغۇچى ۋە سو-غاق تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى بېرىش كېرەك. بەزىلەر باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىشنى مۇۋاپىق دەپ تونىغان.

2 - قىسمى: بورەك مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى ياكى پۇتۇن بەدەن مىزاجىدىكى سوغاق كەيپىياتلاردىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: جاراھەت بولماي، تەشئالىق كۈچ-لۈك بولۇش بۇ كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىگىدۇر. باشقا ئالا-مەتلىرى 1 - قىسمى بىلەن ئوخشاش.

داۋاسى: بورەكنى قىزىتىش ئۈچۈن مەشدىرتوس (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇست يېغىغا قۇندۇز قەرى، — ئاقاقىيالارنى قوشۇپ بەلگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر گۇڭ-

گۈرتلۈك ئارىشاڭغا چۈشسە مەنپەتى ناھايىتى ياخشى. مەجۇنى بەللۇت (155 - نۇسخە) بۇ خىلدىكى زىياستۇسقا پايدىلىق. ئەگەر ماددىلارنى تازىلاشقا ھاجەت بولسا، قەي قىلدۇرۇش كېرەك. تۇرۇپ (لوبۇ) ئۇرۇغىنى قاينىتىپ، سۈيىگە سىركە ۋە كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ قوشۇپ ئىچىرىلسە قەي قىلىدۇ.

بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش

بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش سەۋىيىسى بەدەندىكى خام قالغان سۇيۇقلۇق ماددىلارغا غەيرى تەبىئىي ھارارەتنىڭ، بۆرەكتىكى يىدىرنىڭ، قان ۋە شىلىملىق ماددىلارغا ھارارەتنىڭ تەسىر قىلىشى بىلەن تاش، قۇملار پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقىت كېرەك. كىچىك بالىلاردا ھەتتا ئەمچەكتىكى بالىلاردىمۇ ئۇچرايدۇ. بۇلاردىكى سەۋەپ ئانا سۈتىنىڭ بۇزۇلىشىدۇر.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن سۈيىدۈك قويۇق، ئەمما سۈزۈك بولىدۇ، بەلدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. بۇ ھال بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ ئاغرىق بېلىگە ئېغىر بىر ئىسسىق قويغاندەك سېزىدۇ، سۈيىدۈك سېرىق ياكى قىزىل رەڭدە، ئاغرىش توتقاقلىق ۋە ناھايىتى قاتتىق بولىدۇ. بۇنى بەزىدە ئۇچەي تۈسلىشىش ئاغرىقلىرى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قۇيۇشلار ئۇچرايدۇ (بۇ ئىككى كېسەلنى پەرق ئېتىش ئۇسۇلى قولۇنچىدا تەپسىلىي سۆزلەندى). ئاغرىش بەزىدە يۇقاپ كېتىشى ۋە يەنە بىردىنلا قوزغۇلۇپ قېلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: بەدەندىن ماددىنى تازىلاشتا قەي قىل-
 دۇرۇشنى ئاساس قىلىش لازىم. ئەگەر قان غالىپلىق ئا-
 لامەتلىرى بولسا قان ئالىسىمۇ بولىدۇ. داۋالاش جەريانىم-
 دا بولمىسۇن ياكى ساقايغاندىن كېيىن بولمىسۇن، كېسەل
 تاش پەيدا بولۇشقا سەۋەپ بولىدىغان نەرسىلەردىن پەر-
 ھىز قىلىش كېرەك. مەسىلەن، كەچتە تاماق يېيىش
 مەنى قىلىنىدۇ. سۇت، توگە گەۋشە ۋە ھەزىم بولىشى
 ناچار يىمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش لازىم. قەۋزىيەت
 بولسا مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھەۋقەنە قىلىش مۇمكىن
 ئەمما دورا مىقدارى ئازىراق بولىشى كېرەك. بولمىسا
 ئاغرىشنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئاغرىش بەك قاتتىق
 بولغاندا تەۋەندىكى دورىلارنى قاينىتىپ سۈيمدە كېسەلنى
 ئۆلتۈرۈش كېرەك:

سېرىق چىچەك، چىڭسەي، پالەك، پىرسىياۋشان،
 ھېلىلە، زاراڭزا، سېمىز ئوت، كۈنجۈت شېخى. بۇلارنى
 لازىم مىقداردا ئېلىپ كوپرەك سۇ بىلەن قاينىتىپ، چوڭ
 داسقا قۇيۇپ بىر ئاز ئىلمان بولغاندا كېسەلنى ئۆلتۈر-
 غۇزۇلىدۇ. ھەم بابونە يېغى ياكى بىنەپشە يېغى بىلەن
 بەل ئەتراپلىرىنى ياغلاپ بېرىش كېرەك.

بۆرەكتىكى تاشنى چۈشۈرۈش چارىسى — بۇ، دورى-
 لار بىلەن تاشنى پارچىلاپ سۇيدۇك بىلەن سۇيدۇك يول-
 لىرى ئارقىلىق چىقىرىشتىن ئىبارەت. مەجۇنى ئەقرەپ
 (چايان مەجۇنى) (156 - نۇسخە) 2 فۇڭدىن ۋە مە-

جۇنى ھەجەرل يەھۇد — (157 - نۇسخە) 2 مىسقالدىن ئېلىپ بېرلەشتۈرۈپ، كۈنىگە 2 قېتىمدىن بېرىلىدۇ. بۇ - جەرياندا سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى، كېسەلنىڭ مىزانىغا قاراپ يەنى كېسەل ئىسسىق مىزان بولسا سوغاق تەرەپتىكى دورىلار، ئەگەر سوغاق بولسا ئىسسىق تەرەپتىكى دورىلار بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار سۇيدۇك راۋان قىلىش تەسىرىگە ئىگە ھەم تاشنى پارچىلاپ چۈشۈرۈش كۈچىگە ئىگە. بۇلار تۆۋەندىكىچە:

(1) ئىسسىق تەرەپتىكى دورىلار — چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، رەسمى بېدىيان (ئارپا بېدىيان)، تاغ يال-پۇزى، سىيادان ۋە ھەلىيۇن ئۇرۇغى.

(2) سوغاق دورىلار — خاڭگا، تاۋۇز ۋە قاپاق ئۇ-رۇقلىرى، كاكىنەج.

(3) موتىدىل دورىلار — پىرسىياۋشان، ئوردان، قو-غۇن ئۇرۇغى.

سۇيدۇك راۋان قىلغۇچى دورىلارنى داۋاملىق بې-رىشكە بولمايدۇ، ئارىلاپ - ئارىلاپ بېرىش كېرەك.

3 - پەسىل: دوۋساق كېسەللىكلىرى

دوۋساق ياللۇغى (ۋەرەمى ماسانە)

دوۋساق ياللۇغىنىڭ سەۋىبى ئاساسەن بورەك يال-لۇغىنىڭ سەۋەپلىرى بىلەن ئوخشاش. ئەمما ئىسسىقلىق -

نىڭ تەسىر قىلىشى، بولۇپمۇ قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردە
كوپ ئۇچرايدۇ. تاشقى تەرەپتىن زەخمىلىنىش بىلەنمۇ
پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوسۇندا ئاغرىش ۋە چىڭقىلىش
سېزىلىدۇ. تەشئالىق، ھارارەت بولىدۇ. كېسەل جويلۇيدۇ.
تىل قارامتۇل گەز باغلايدۇ. سۇيدۇكنىڭ مېڭىشى بار.
غانسېرى قىيىنلىشىدۇ، تامچىلاپ كېلىدۇ. ھەتتا پۇتۇنلىي
توختاپ قالىدۇ. ياللۇغلىنىش ئېغىر بولغاندا چوڭ ئۇ-
چەينى بېسىپ قويۇش بىلەن چوڭ تەرەت ماڭمايدۇ.

داۋاسى: تەركىۋىگە خىيارى شەنبەر بىلەن ئىت
ئۇزۇمى قوشۇلغان سۇدا ھوقنە قىلىنىدۇ. ئەمما سۇيدۇك
ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بەلكى ئىششىق
قايتۇرىدىغان يەڭگىلەرەك دورىلارنى بېرىش كېرەك. فۇ-
ئۇس، ئىت ئۇزۇمى بىلەن تەرەنجىۋىلىنى بىنەپشە شە-
ۋىتى قوشۇپ بېرىش كېرەك. بىنەپشە، ھەمشىۋا، ئاق
لەيلى گۈلى، ئارپا ئۇنىنى كاسىن سۈيى ۋە ئىت ئۇزۇ-
مى سۈيى بىلەن دوۋساق ئۈستىگە تېگىلىدۇ. ئىششىقنىڭ
قېتىپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ەوم يېغى بىلەن دوۋساق
ئۈستىنى ياغلاش كېرەك. كېسەل باشلىنىپ بىر ھەپتە
ئۆتكەندىن كېيىن سوغاقلىق دورىلارنى توختىتىپ، ئىش-
شىقنى تارقاتقۇچى دورىلاردىن مۆتىدىل تەبىئەتتىكىلىرى،
بابۇنە زىغىر، پۇرچاق ئۇنىنى چېپىش لازىم. شۇنداق
قىلغاندا ماددا توپلىشىپ يىرىك ھاسىل بولماسلىقى
مۇمكىن. ئەگەر ماددا تارقاپ كەتمەي يىرىك ھاسىل

قىلىپ قالسا، ئۇ چاغدا ماددىنى پىشۇرۇپ ئېغىز ئال-
دۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن بىنەپشە، ئەكىل-
مىلىك، سېرىق چېچەك ئۇرۇغى، شۈمشلەرنى چالاراق
سوقۇپ ئارپا ئۇنى قوشۇپ، بىنەپشە سۈيى بىلەن نېمە-
دەپ دوساق ئۈستىگە ئىسسىغراق ھالەتتە قويۇلىدۇ.
ئۇندىن باشقا چارىلىرى بورەك ياللۇغى بىلەن ئوخشاش.
ئەگەر ئاغرىش بەك كۈچلۈك بولسا ئەپيۇن، زىغىر يېغى
ۋە بادام يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈركەش كېرەك. سۈي-
دۇك توشۇگىدىن ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە قاراقات سۈيىنى
تامغۇزۇش دوۋساق ياللۇغلىرىدا خېلى ياخشى نەتىجە
بېرىدۇ.

تاشقى زەخمىلىنىش بىلەن بولغان دوۋساق يال-
لۇغلىرىدا دوسۇن ئۈستىدە روشەن كوتىرىلىپ تۇرغان
ئىششىق بار بولۇپ، سۈيدۈك قىيىنلىق بىلەن ماڭىدۇ.
چوڭ تەرەت توختاپ قالىدۇ. بۇ چاغدا ئالدىراپلا سۈي-
دۈكنى تېز راۋان قىلىدىغان دورىلارنى بەرمەسلىك كېرەك.
ئىششىقنى قايتۇرغۇچى دورىلارغا قوشۇپ مۇۋاپىق ھالدا
بېرىشكە بولىدۇ. چېپىش ئۈچۈن بابۇنە، زىغىر، ئوشەق،
كالا ئىلىگى، مۇقىل، ياپچان يېغى بېرىپ، ئىچىشكە
خاڭدا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، ھەلىيۇن ئۇرۇغى، پىر-
سىياۋشان، فۇنۇس، خىيارى شەنبەر چىلانغان سۇغا با-
دام يېغى قوشۇپ جۇلاپ قىلىپ بېرىلىدۇ.

دوۋساق جاراھەتلىرى

سەۋەبى: قىزىق سەپرا ماددىسى دوۋساققا چۇشۇش بىلەن ئۇنىڭ نېپىز پەردىلىرىنى جاراھەتلەيدۇ. دوۋساق- تىكى قۇم- تاشلار سۈركۈلۈپ دوۋساقنى يارا قىلىدۇ. دوۋساق ياللۇغلىرى ئېغىرلىشىپ جاراھەتكە ئايلىنىدۇ.

ئالامەتلىرى: سۇيدۇك قىيىنلىق بىلەن چىقىدۇ، دوسۇن ئېچىشىدۇ، سۇيدۇك سېسىق پۇرايدۇ. سۇيدۇك ئىچىدە كىپەكتەك ئۇششاق رۇسۇپلار بولىدۇ. دوۋساق ئەسەبلەر بىلەن مۇرەككەپ تۈزۈلگەن ئەزا بولۇپ، سې- زىش ئەسەبلىرى نۇرغۇن. شۇنىڭ ئۈچۈن دوۋساق زە- رەلەنگەندە ئاغرىش چىدىغۇسىز دەرىجىدە كۈچلۈك بولىدۇ.

داۋاسى: دوۋساقنى تازىلاش ئۈچۈن ھەسەل ۋە شېكەر شەرۋەتلىرى بېرىلىدۇ. يىرىڭنى تامامەن چىقىرىش ئۈچۈن، شىافى ئەبىيەزنى ئېرىتىپ ياكى ئايالىنىڭ سۇ- تىنى سۇيدۇك توشۇگىدىن تامغۇزۇش كېرەك. دورىلاردىن يېيىش ئۈچۈن قۇرسى كەھربا (71 - نۇسخە) ۋە قۇرسى كاكىنەج (152 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر قىچىشىش بولسا، بىيە ئۇرۇغى لۇئابى، ئايال سۇتى، بادام يېغىنى ھوقنە ئەسۋاۋى ئارقىلىق سۇيدۇك توشۇگىدىن ھاڭغۇ- زۇش كېرەك. ياكى تىلىپ لوڭقا قويۇش كېرەك. غىزا- سىغا سېرىق پۇرچاق سۈيى، توخۇ گوشى، سۇت ئاش بېرىلىدۇ.

دوۋساقتا قان ئۇيۇپ قېلىش

قان سىيىش ياكى تاشقى زەخمىلىنىشتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوۋساق قاتتىق ئېچىشىدۇ. نەپەس قىيىنلىشىش، تىترەش، سوغاق تەر چىقىش بىلەن بىللە دوسۇن ئەتراپلىرى سۈۋۈپ كېتىدۇ. تومۇر ئىنچىكە سالىدۇ. ئېغىر بولغاندا ھۇشىدىن كېتىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىبىنىڭ ئوزۇنى يالغۇز ياكى تال (ئۇزۇم دەرىخى) نىڭ كۈلىنى قوشۇپ بېرىلىدۇ. قارا ئەمەن (بەرەنجاسىپ)، چىڭسەي ئۇرۇغى، لوپۇ ئۇرۇغىنى قاينىتىپ سۈيىنى يالغۇز ھالدا ياكى ئىسكەندەربېىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. توشقاننىڭ ئوغۇز سۈتى ۋە تال كۈلىنى بىرلەشتۈرۈپ سۇيىدۇك توشۇڭىدىن كىرگۈزۈلىدۇ. ھەم دوۋساق ئۈستىگە توكۇلىدۇ. بابۇنە يېغى سۇرتۇشمۇ ياخشى پايدا قىلىدۇ. باشقا چارلار نەتىجە بەرمىگەندە بۆرەك تېشى كېسىلىدە كۆرسىتىلگەن چاردارنى ئىجرا قىلىش مۇمكىن.

دوۋساق ئاغرىش (ۋە جەلەلسانە)

دوۋساقنىڭ ئاغرىشى: دوۋساق ياللۇغلىرى؛ دوۋساقنىڭ جاراھەتلىنىشى؛ دوۋساقتا تاش قېتىش؛ يەل؛ دوۋساق مىزاجىنىڭ ئىسسىق ياكى سوغاقتىن بۇزۇلىشى قاتارلىق ئەھۋاللاردا كۆرۈلىدۇ. توۋەندە دوۋساق مىزاجى بۇزۇلۇشتىن پەيدا بولغان ئاغرىش ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتۈلۈپ.

تىمىز. باشقىلىرى مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەردە سوز-
لەندى.

دوۋساقنىڭ ئىسسىقلىق سەۋىيىسىدىن ئاغرىشى:
سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى كۆپ ئىستىمال
قىلىش، بولۇپمۇ تېز تەسىر قىلىدىغان ئىسسىقلىق دو-
رىلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوسۇن ئۈستى ئاغرىيدۇ، ئېچىشىدۇ.
سۇيىدۇك قىزىق بولۇپ، كۆيدۈرۈپ كېلىدۇ.

داۋاسى: خاڭگا ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغى، تەرخە-
ھەك ئۇرۇغى، كاسىن ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ،
بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) ۋە خەشخاش شەرۋىتى
بىلەن (69 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ياكى ئارپا بېدىيان
بىلەن ئىسكەنجىبىن قوشۇپ بېرىلىشىمۇ بولىدۇ. تاشقى
تىرەپتىن ئاق سەندەل، ئارپا ئۇنى، ئىت ئۇزۇمى، كا-
سىن سۈيى قاتارلىقلارنى چېپىش، بىنەپشە يېغى، نىلۇ-
فەر يېغى ۋە قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغىنى سۇيىدۇك توشۇ-
گىدىن كىرگۈزۈش كېرەك. بىنەپشە، نىلۇفەر، ئاق لەيلى
ۋە ئىت ئۇزۇمىنى قاينىتىپ سۈيىنى دوسۇنغا قويۇش
كېرەك. غىزاسىغا پالەك، تۇخۇم سېرىغى، توخۇ گۆشىنى
ئانار سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

ئەگەر دوۋساقنىڭ مىزاجى سوغاقتىن بۇزۇلسا،
ئاغرىش نىسبەتەن يەڭگىل بولىدۇ. سۇيىدۇك ئاق كې-
لىدۇ. ھەددىدىن ئارتۇق سوغاق دورىلار، مەسىلەن، كا-

پۇر، يۇمغاقسۇت قاتارلىقلارنى ئىشلەتكەنلىك تارىخى بو-
لىدۇ. ئاغرىش بىلەن تەڭ كېسەل توڭۇپ تۇرۇپ خۇد-
دى سوغاق شامال باردەك سېزىدۇ.

داۋاسى: ئارپا بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، پىننە،
رۇمبېدىيان، سەۋزە ئۇرۇقلىرىنى باراۋەردىن ئېلىپ قاي-
ىتىپ سۇيىگە شەرىۋىتى دىنارى I (129 - نۇسخە) قوشۇپ
بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن سېرىق چىچەك يېغىغا بىرئاز
قۇندۇز قەرى، بىرئاز ھىڭ قوشۇپ سۈركەش كېرەك. يە-
مىشكە ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەن، ئىترىپىل سەغىر
(5 - نۇسخە)، ئەنجۈر مۇرابباسى بېرىلىدۇ.

بەزىبىر قىزىتمىلىق كېسەللەرنىڭ بوھران كۈنلىرى
ھەدەندىن ماددىلار چىقىرىلىشى بىلەن دوۋساققا كېلىپ
ئاغرىش پەيدا قىلىدۇ. بۇ چاغدا سۇيىدۇك راۋان قىلد-
ىغان دورىلارنى بېرىش كىپايە قىلىدۇ.

دوۋساق كوپۇپ قېلىش

دوۋساققا يەل ياكى يەل بىلەن سۇيۇقلۇقنىڭ تو-
لۇپ قېلىشى، دوۋساقنىڭ ئېسىلىشى يەنى كوپچۇپ قېلد-
ىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوۋساق چىڭقىلىدۇ ۋە ئېغىرلىق
ھەس قىلىدۇ. ئەگەر چىڭقىلىش بىلەن ئېغىرلىق بولماي
يوتكۇلۇپ تۇرسا بۇ - يەلنىڭ ئالامىتى؛ ئېغىرلىق ۋە
چىڭقىلىش بىللە بولۇپ، يوتكەلمەي تۇرسا، بۇ - سۇ-
يۇقلۇق ئارىلاش ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. خۇددى

دوۋساق ياللۇغلىنىشىدىكىدەك روشەن ئىششىق كۆرىلىدۇ.
ئەمما ئاغرىش بولمايدۇ.

داۋاسى: ئاۋال ئىچىشكە بىر ئاز ئەكىلمىلىك
يېغى ۋە ئىسسىق خۇسۇسىيەتلىك مائىل ئۇسۇل (121-
نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىشكە يالپۇز سۈيى بېرىلىدۇ. گۈلى
سوسان يېغى، مامشا، ھىكلارنى دوسۇن ئۇستىگە سۈركەش
ھەم سۇيدۇك توشۇگىدىن تامغۇزۇش كېرەك. زەپەر يې-
غىنى ئىچىش ياكى دوساققا سۈركەش ياخشى نەتىجە
بېرىدۇ. ئەگەر سۇيدۇك ئازىيىش، ياكى قىيىنلىق بىلەن
كېلىش ئەھۋاللىرى بولسا، بورەك كېسەللىرىدە كۆرسە-
تىلگەن چارلار قىلىنىدۇ.

دوساققا تاش تۇرۇپ قېلىش

بورەكتە پەيدا بولغان تاشلار دوساققا چۈشىدۇ.
ياكى بىرەكتىگە ئوخشاش سەۋەپلەر بىلەن دوۋساقنىڭ
ئۆزىدە قۇم تاشلار پەيدا بولۇش يەنى دوۋساققا يىغىلغان
سۇيدۇكتىكى ماددىلار مىزاج ئۆزگىرىش تەسىرى بىلەن
ئۆزگىرىدۇ (تاش، قۇمدەك قاتتىق ماددىلارغا ئايلىنىپ
قالىدۇ).

ئالامەتلىرى: كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.
ئاياللاردا ئەرلەرگە قارىغاندا ئاز كۆرىلىدۇ. چۈنكى ئا-
ياللار سۇيدۇك يولى ئەرلەرگە قارىغاندا ماددىلارنىڭ
چۆكۈشى ئۈچۈن قۇلايسىمىز. ئاغرىش دوۋساق ئەتراپىدا
بىردىنلا پەيدا بولىدۇ. بۇ بارغانسېرى جىنىسى ئەزا سا-

ھەسسىگە يېتىپ بارىدۇ. جىنسى ئەزا تۇۋى سىيگەندە قىچىشىدۇ ۋە ھەرىكەتكە كېلىدۇ. سۇيدۇك ئوبدان مېڭىپ تۇرۇپ بىردىنلا توختاپ قالىدۇ ياكى تامچىلاپ چىقىدۇ. بۇ تاش دوۋساق توشۇگىگە كېلىپ توسىلىپ قالغانلىقتىن بولۇپ، ئاغرىش مۇشۇ چاغدىلا قاتتىق بولىدۇ. تاش توشۇككە كەلمىگەندە ئادەتتە ئاغرىش بولمايدۇ. بەزى كېسەللەر سۇيدۇك كەلمەي ئازاپلانغاندا بىرلا ئورنىدىن تۇرسا ياكى يانغا، ئارقىغا ئاغدۇرۇلسا بىردىنلا سۇيدۇك ھېچبىر ئاغرىقسىز مېڭىپ كېتىدۇ. بۇ تاشنىڭ دوسۋاق توشۇگىدىن يىراقلاشقانلىقىدۇر. بورەكتە پەيدا بولغان تاشنىڭ رەڭگى سېرىق ياكى قىزىل بولىدۇ. دوساقتا پەيدا بولغان تاش ئاق ياكى قىزىل گۈلرەڭلىك كېلىدۇ.

داۋاسى: سوغاق مىزاجلىق كىشىلەردە پەيدا بولىدىغان تاش يوغان ھەتتا تۇخۇمدەك پەيدا بولغانلىقى ھەققىدە يازما خاتىرىلەر بار. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق كىشىلەرگە تاشنى پارچىلاپ چۈشۈرىدىغان دورىلار كۈچلۈگرەك ياساپ بېرىلىشى كېرەك. چايان يېغى (رەۋغىنى ئەقرەپ) (157 - نۇسخە) نى ئوغرى تىمكەن يېغى ۋە بابۇنە يېغى بىلەن بىللە كېسەلنىڭ پۇتلىرىنى كۈتەرتىپ ياتقۇزۇپ سۇيدۇك توشۇگىدىن تامغۇزۇش لازىم. يېمىش ئۈچۈن مەجۇنى مەشە دىرتۇس (25 - نۇسخە) ۋە سەنجىرىنا (33 - نۇسخە)

بېرىلىدۇ. بورەكتىكى تاش كېسىلىدە كورستىلگەن مە-
جۇنلەر (156 - 157 - نۇسخە) لەرنى بەرسىمۇ بولىدۇ.
ئەگەر بۇ چارە بىلەن ھەل بولمىسا دەستكارە بىلەن
دوۋساقنى يېرىپ تاش ئېلىنىدۇ.

سۇيدۇك كويگەندەك ئېچىشىپ كىلىش

سەۋىيى: بورەك ياكى دوۋساق ياللۇغى ۋە جاراهەت-
لىرىدە ئاغرىق سىيگەندە خۇددى كويگەندەك ئېچىشىدۇ.
بونى يۇقۇرىدا سوزلەپ ئوتتۇق. تۈۋەندە جىگەرلىك
زەرەرلىنىشى ۋە سەپرا سەۋىيى بىلەن بولىدىغان سۇيدۇك
ئېچىشىپ كىلىشىنى سوزلەيمىز.

ئالامەتلىرى: سۇيدۇكتە يىرنىڭ ياكى باشقا غەي-
رى نەرسىلەر بولمىسىمۇ، سىيگەندە كويۇپ ئېچىشىدۇ.
جىگەر زەرەرلىگەنلىك ياكى بەدەندە سەپرا غالىپلىق
ئالامەتلىرى ۋە ھارارەت بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپۇغۇل، بىيە ئۇرۇغى لۇئابى، سېمىز
ئوت ۋە خاڭگا، قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىلىرىنى شەر-
ۋىتى بىننەپشە (74 - نۇسخە) ياكى شەرۋىتى
خەشخاش (69 - نۇسخە) بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ. بىنادىق
بۇزۇرى (153 - نۇسخە) نى ئارپا سۈيى بىلەن
يېمىشكە بېرىلىدۇ. جىنىسى ئالاقە ۋە شورلۇق غىزالارنى
يېيىش مەنىنى قىلىنىدۇ. بۇ كېسەل ئەگەر ئوز ۋاقتىدا دا-
ۋالانمىسا دوۋساق ۋە بورەك جاراهەتلىرىگە ئايلىنىپ كې-
تىش ئېھتىمالى بار.

سۇيدۇك يوللىرىدىكى جاراھەتلەردىمۇ سۇيدۇك كويگەندەك ئېچىشىپ كېلىدۇ بۇ ھەقتە تەناسىل كېسەللىكلەر بابىدا سۆزلىنىدۇ.

سۇيدۇك تۇتۇلۇش (ئېھتىساسى بەۋل)

سۇيدۇك تۇتۇلۇپ قېلىش بورەك ياكى دوۋساقنىڭ ياللىغىلىنىشلىرى، ھەر خىل جاراھەتلىرى، تاش پەيدا بولۇش ياكى دوۋساققا قان ئۇيۇپ قېلىشلار تۈپەيلىدىن بولىدۇ. ئۇلارنىڭ سەۋەپ ۋە ئىلاجلىرى مەزكۇر كېسەللىكلەردە سۆزلەندى. بۇ يەردە يۇقۇرقىلاردىن باشقا، مەسىلەن، بورەك ۋە دوۋساق يوللىرىغا زىيادە گۆش ئۆسۈپ قېلىش، دوۋساق پەيلىرىنىڭ پالەچلىنىشى، خىلىتلار سەۋىيىدىن كېلىپ چىققان سۇيدۇك تۇتۇلۇشلار سۆزلىنىدۇ.

(1) سۇيدۇك يوللىرىغا زىيادە گۆش پەيدا بولۇش: جاراھەتلەردىن كېيىن سۇيدۇك يوللىرىدا تاتۇق قالغان ھالدا ساقىيىدۇ ياكى سۇيدۇك يوللىرىدا تەدرىجى ھالدا ئۆسمە ئۆسۈپ سۇيدۇك يوللىرىنى توساپ سۇيدۇك تۇتۇلۇش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. سەۋەپ كۈچلۈك بولغاندا سۇيدۇك پۈتۈنلەي توختايدۇ. ئەگەر ئاجىزراق بولسا سۇيدۇك تامچىلاپ كېلىدۇ. سۇيدۇك يوللىرىدا بۇ خىلدىكى توسالغۇ ئومۇمەن بورەك بىلەن دوۋساق ئارىلىغىدا ياكى دوۋساق بىلەن چىقىرىش يولى ئارىلىغىدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: بورەك بىلەن دوۋساق ئوتتۇرىسىدىكى

توسىلىشلاردا بەل ساھەسىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. سۇيدۇك كۈندىن - كۈنگە ئازىيىدۇ ۋە سۇيدۇك يوللىرىدا باشقا ئالامەتلەر مەسىلەن، سۇيدۇك قىيىنلىق بىلەن كېلىش، سۇيدۇك بىلەن قان يېرىك كېلىشلەر كورۇلىدۇ، ئەمما سۇيدۇك يولى ۋە بورەكتە تاش تۇرۇپ قېلىشنىڭ كور - سىتىپ ئوتۇلگەن ئالامەتلىرى بولمايدۇ. بۇ ئۇنىڭ مۇ - ھىم ئالامەتلىرىدۇر. ئاغرىقلار بۇ ئەھۋالنى ئۇڭايلىقچە سەزمەستىن، تىۋىپ ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈپ كورگەندىلا سېزىلىدۇ. ئەمما ئۆسمە گۆش - سۇيدۇك چىقىرىش يولىدا يەنى جىنسى ئەزادا بولغاندا، كېسەلنىڭ ئۆزىگە سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سۇيدۇك يوللىرىدا ياللىغۇ - لىنىش ۋە جاراھەت بار - يوقلۇغىنى ئوبدان قاراش لازىم. گۆش ئەگەر يۇقۇرقى سۇيدۇك يوللىرىدا ئۆسكەن بولسا، ئۇنىڭغا يۇمشاتقۇچى دورىلارنى ئىچكىۈزۈش ۋە شۇ دورىلار سۇيىدە ئولتۇرغۇزۇشتىن باشقا چارە يوق. (بورەك ۋە رەملىرىگە قاراڭ). بۇنىڭ نەتىجىسىمۇ ئانچە ياخشى ئەمەس. ئەگەر ئۆسكەن گۆش جىنسى ئەزانىڭ سۇيدۇك چىقىرىش يولىدا بولسا ھەم ئۇنىڭ بىردىن - بىر چارىسى جىنسى ئەزا تۈۋىدىن ئىككى ئورۇقدان ئارىلىغىدىن تىشىپ ئەنبۇپ (ئىچى كاۋاك كۇمۇشتىن ياسالغان نەيچە) قويۇلىدۇ. بۇ كېسەلنىڭ ھاياتىنى قۇت - قۇزۇپ قالىدۇ.

(2) دوۋساق پەيلىرىنىڭ پالەچلىنىشى، دوۋساقنىڭ

ھەيدەپ چىقىرىش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى — بۇنىڭدىن — كى ئالامەتلەر يۇقۇرقىدەك بولۇپ دوساق ئۇستىگە بار — ماق بىلەن چىكىپ كورگەندە سۇيدۇك جىنىسى يولىدىن تامچىلاپ چۈشىدۇ. قاناتىر^① كىرگۈزگەندە توسالغۇ ياكى كېسەلدە ئازاپلىنىش بولمايدۇ. دوۋساقنى ئۇۋۇلاپ بەرسە سۇيدۇك ماڭىدۇ.

داۋاسى: مۇرەككەپ ئىسسىق دورىلاردىن مەجۇنى مەشدرتۇس (25 - نۇسخە)، مەجۇنى بالادۇر (29 - نۇسخە)، تەرياق كەبىر ۋە ماددە تۇلھايات (18 - نۇسخە) لەردىن بىرىنى ياكى ھەممىسىنى مۇۋاپىق ھالدا بېرىش لازىم. بۇلارغا مەجۇنى سەنجىرىنا (33 - نۇسخە) قوشۇل — سىمۇ بولىدۇ. جويۇز يېغى ياكى قۇست يېغى ۋە سۇزاپ يېغىدىن قايسى بىرى بولسا ئۇنىڭغا دارچىن، سۇمبۇل، سەلىخە، قەلەمپۇر ۋە بەسباسەلەرنى باراۋەر مىقداردا سېلىپ قاي — نىتىپ دوۋساققا چېپىشقا بېرىلىدۇ.

3) دوۋساققا قورغۇچى نەرسىلەر ۋە قۇرۇقلۇقنىڭ ئارتۇق تەسىر قىلىشى: مەسىلەن، ئېغىر قىزىتمىلار، كۆپ ئىچى سۇرۇش (بۇ كىچىك بالىلاردا كۆپرەك بولىدۇ) بىلەنمۇ سۇيدۇك توختاپ قالىدۇ. مۇنداق ھاللاردا كۆر — سىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرى مەۋجۇت بولۇش بىلەن بىللە دوۋساق چىڭقىلىدۇ ۋە نەملىكتىن راھەتلەنگەنلىك ھېس قىلىدۇ.

① سۇيدۇك يولىنى تەكشۈرۈش ئەسۋابى.

داۋاسى: ئىسپۇغۇل ۋە بىيەلۇئابلىرىغا بىنەپشە شەرۋىتى ۋە گۈل يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئارپا سۈيىدە پالەكنى پىشۇرۇپ قاپاق ۋە بادام يېغى سېلىپ بېرىلىدۇ. ئاق لەيلى، بابۇنە ۋە زىغىرنى قاينىتىپ، سۈيى دۇسۇن - غا سىرتتىن قۇيۇلىدۇ.

(4) دوۋساق گۆشلىرىنىڭ تارتىشۋېلىشى (تەشەن - نۇچ) سەۋىبى بىلەنمۇ سۇيدۇك توختاپ قالىدۇ. بۇ دوۋساقنىڭ تاشقى تەرەپتىن زەخمىلىنىشى ياكى ماددىلار سەۋىبىدىن دوۋساق ئۈزىدە قىسقىرىشىنىڭ كۈچلۈكلىكى بىلەن توشۇكى قىسىلىپ قېلىپ، سۇيدۇك ماڭالمايدۇ. ياكى ئومۇمىي بەدەندىكى تارتىشۋېلىش كېسىلى سەۋەپ بولىدۇ. بۇنىڭغا تارتىشۋېلىش (تەشەننۇچ) كېسىلىدە كور - سىنىلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

(5) سۇيدۇك يوللىرىدىكى قاتتىق ئاغرىش ياكى باشقا بىرەر سەۋەپ بىلەن ئاغرىق سىيەلمەستىن، كۆپ مىقداردا سۇيدۇك دوۋساققا توپلىنىپ قالىدۇ. بۇ ھال ئۇزۇن داۋام قىلسا سۇيدۇك توختاپ قېلىش ئىھۋالى كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: شۇمشە، زاراڭزا، ئاق لەيلى ۋە بە - سەيلەرنى قاينىتىپ دوسۇنغا قويۇلىدۇ. دوسۇننى دىققەت بىلەن ئاستا ئۇۋۇلاپ بېرىش لازىم. ئالاھىدە داۋالاش ھاجەتسىز. سەۋىبىنى يوقىتىشقا ئىھمىيەت بېرىش لازىم. مۇنداق كىشىلەر سورۇنلاردا ئۇزۇن تۇرماسلىقى، سۇيدۇكنى ساقلىماي پات - پات سىيىپ تۇرۇشى كېرەك.

بۇلاردىن باشقا ئۈچەي، بالىياتقۇنىڭ ياللىغلىنىپ
ئىشىشى ۋە ئۇمۇرتقا (بەل ئۇمۇرتقىسى) سوڭەكلىرىدە -
نىڭ چىقىپ كېتىشى ياكى باشقا زەرەرلىنىشلەردىمۇ سۈيى -
دۈك تۇتۇلۇپ قالىدۇ. بۇلاردىكى ئالامەتلەر مەزكۇر سە -
ۋەپلەرنىڭ مەۋجۇتلىقى ۋە سۇيىدۈك كەمەسلىكتۇر. سەۋەپ -
لەرنى داۋالاش بىلەن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ.

سۇيىدۈك تامچىلاپ كېلىش (سىلىسۇل بەۋل)

سەۋىبى: خىلىتلاردىن سەپرا سەۋەپ بولىدۇ ياكى
دوۋساقنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ كېتىشتىن
بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپ سىيگىسى كېلىدۇ (قەدەمدە
بىر سىيىدۇ) ئەمما تەرەتكە بارسا بىر - ئىككى تامچە
سۇيىدۈك بىلەن توختايدۇ، ئېچىشىدۇ. جىنىسى ئالاقە بە -
لەن كۆپ شوغۇللانغۇچىلار ۋە ئىسسىقلىق دورا ۋە
غىزالارنى كۆپ ئىستىمال قىلغۇچىلاردا ئۇچرايدۇ. سۈيى -
دۈك قىزىل كېلىدۇ.

داۋاسى: سېمىز ئوت، قوغۇن، خاڭگا، كوكىنار،
قاپاق ۋە تەرخەمەك ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسى بېرىلىدۇ.
ھەم توۋەندىكى نۇسخىدىكى قۇرىسى ماسكە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: تاباشىر، يۇمىغاقسۇت ئۇرۇقى، پاقا
يوپۇرمىقى ئۇرۇقى، گىلى ئەرمىنى، ئاق سەندەل، ئانار
گۈلى، سەمىقى ئەرەبى ھەربىرىدىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ،
سوقۇپ سۇ بىلەن قۇرىس تەييارلاپ، كۈنىگە 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

بۇ ئەھۋال ئەگەر، دوۋساقنىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلىغىدىن بولسا سۇيدۇك ئاق كېلىدۇ. دوسۇن بو- شاشقان ھالدا بولۇپ، ئېچىش بولمايدۇ.

داۋاسى: ئىسسىق مەجۇناتلاردىن مەجۇنى مەشدىر تۇس (25 - نۇسخە)، ئىترىپىل كەبىر (1 - نۇسخە)، جەۋارىش كۇندۇر (109 - نۇسخە) ۋە سەنجىرىنا (33 - نۇسخە) لاردىن بىرىنى تاللاپ، مۇۋاپىق كەلگەنلىرى بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن ئىنەك پىتى يېغى، بادام يېغى ۋە مومىيالار بېرىلىدۇ.

سۇيدۇك تۇتالما سلىق (سەلىل بەۋل)

سۇيدۇك ئىختىيارسىز مېڭىپ كېتىشى سۇيدۇك تۇتالما سلىق دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ سەۋەپلىرىگە قاراپ تۆۋەندىكى بىر قانچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ:

(1) سوغا قلىق تەسىرى بىلەن دوسۇن پەيلىرى بوشىشىپ كېتىپ سۇيدۇك دوسۇنغا توپلانماستىن تۇرۇپ چىقىپ كېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەندە سوغاق مىزاجلىق ئالامەت- لىرى مەۋجۇت بولىدۇ. سۇيدۇك ئاق ۋە ئېچىش، ئاغرىش بولمايلا ئىختىيارسىز ھالدا چىقىپ كېتىدۇ. كۆپۈنچە سوغاقتىن بولغان كېسەللەردىن كېيىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: قورىغۇچى ۋە ئىسسىق دورىلاردىن كۈن- دۈر، مەستكى، سەئدى كوفى، خەلىنجانلار بېرىلىدۇ.

(باراۋەر مىقداردا ئېلىپ تالغان قىلىپ ياكى قاينىتىپ بېرىلىدۇ). بۇلارغا ئانارگۇلى، جۇپتى بەللۇت ۋە ھەببۇل ئاسلارنى تەڭ مىقداردا قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. (2) بەل ئۇمۇرتقىلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى ياكى دو- ساق پەيلىرىنىڭ ھەرخىل زەخمىلىنىشلىرى سەۋىيىسىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەلدىكى ۋە دوسۇندىكى زەرەرلىنىش روشەن بولۇپ، سۇيدۇك تۇتالمايدۇ.

داۋاسى: ئۇمۇرتقىلارنى ئۆز ئۆسلىگە كەلتۈرۈش، سەۋىيىنى يوقىتىش مۇمكىن بولسا داۋالىغىلى بولىدۇ، ئەكسىچە بولغاندا ساقىيىشى تەس، ھىجامەت قويۇش، مۇناسىپ دورىلارنى سىرتتىن چېپىش كېرەك.

(3) ئېسىق كەيپىياتلارنىڭ تەسىرى بىلەنمۇ سۇي- دۇك تۇتالما سلىق پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭدىكى ئاساسىي ئالامەت قىزىتما، سۇيدۇكنىڭ قىزىللىغى ۋە سۇيدۇك ساڭغاندا ئېچىشىش ياكى قىزىق سېزىلىشلەردىن ئىبارەت.

داۋاسى: تاباشىر، ئانارگۇلى، قىزىل گۈل، گىلى ئېرىمىنى، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى باراۋەر مىقداردا سوقۇپ، سېمىز ئوت سۈيى ياكى سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى قايناتقان سۇ بىلەن قۇرس تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 1 — 2 مىس- قالدىن يىيىشكە بېرىلىدۇ.

(4) دوۋساققا خوشنا ئەزالار مەسىلەن، بالىياتقۇ، چوڭ ئۇچەي ئىششىقلىرى دوۋساقنى بېسىپ قويۇشتىنمۇ

كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداقتا سەۋەپنى بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. سەۋەپ يوقىلىش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

كېچىسى سىيىپ يېتەش (بەۋلى بىلغىراش)

بۇ كېسەل كۆپىنچە گۈدەك بالىلاردا ئۇچرايدۇ. بەزىلىرى چوڭ بولغاندا ئۆزلىكىدىن ساقىيىپمۇ كېتىدۇ. دورا بىلەن داۋالاشقا قارىغاندا، ئادەتلەندۈرۈش بىلەن داۋالاش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. مەسىلەن، كېچىلىرى پات-پات ئويغىتىپ سىيگۈزۈش، كەچقۇرۇندا سۇيۇق تاقماق، چاي بەرمەسلىك ياخشى. ئەگەر مىزاجى سوغاق بولسا گۈلى سۇسەن يېغىغا بىر ئاز پەرپىيۇن قوشۇپ دوسۇنغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈل قەن يىپىشكە بېرىلىدۇ. ھەم مەجۇنى جەنتىيانا بېرىلىدۇ. **نۇسخە:** زىرە (سىركىگە چىلاپ سۇزۇپ قۇرۇتۇلغانى)، كۈندۈر، ھەببۇل ئاس 5 مىسقالدىن. ھەسەل 40 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتۈپ كۈزۈپ ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلاپ كۈندىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

قان سىيىش: (بەۋلىدەم)

سەۋەبى: بورەك قانتومۇرلىرىنىڭ يېرىلىشى (زە-خىملىنىش ياكى تومۇر دىۋارى چۇرۇكلەشكەندە قان مىقدارىنىڭ زىيادە بولىشىدىن)؛ جىگەر ۋە بورەك زەئىپلىكى نەتىجىسىدە سۇيىدۇكتىن قاننىڭ سۇزۇلۇپ چىقىشى يېتەر-سىز بولۇش، سۇيىدۇك يوللىرى (دوۋساق ۋە جىنىسى ئەزا)

دىكى زەخمىلىنىشلىرىدىن قان سىيىش كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: بورەك قانتومۇرلىرى يېرىلغاندا قان ساپ ھالدا كېلىدۇ. زەرەرلىنىشنىڭ چوڭ كىچىك - لىكىگە قاراپ مىقدارى ئاز ياكى كۆپ بولىدۇ. كېسەلدە تېز تەسىر قىلىدىغان دورىلار ئىستىمال قىلغانلىق ياكى بورەك زەخمىلىنىشلىك ئەھۋاللىرى بولۇپ، بەل ساھەسى ئاغرىپ تۇرىدۇ. جىگەر زەئىپلىكىدىن بولسا كېسەلدە ئالدى بىلەن جىگەر زەئىپلىك ئالامەتلىرى (جىگەر زەئىپلىك كېسەللىكىگە قاراڭ) بولىدۇ. سۇيۇك گۆش يوغان سۇدەك كېلىدۇ.

داۋاسى: قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە)، قۇرسى نەفسىدەم ياكى قۇرسى بەۋلىدەم (161 - نۇسخە) لەردىن بىرى يېرىلىدۇ. بورەك ۋە دوسۇن ساھىبلىرىغا سوغاق سۇ قويۇلىدۇ. گىلى ئەرمىنى، ئاقاقىيا، ئاق سەندەل، قىزىل گۈل، ھەمشىۋالارنى سوقۇپ، سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ بورەك ساھەسىگە چېپىشقا يېرىلىدۇ. جىگەرلىرىدىن بولسا، جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاش چارىلىرى قىلىنىدۇ (جىگەر كېسەللىرى بابىغا قاراڭ).

ئەگەر دوۋساق ياكى جىنىسى ئەزالاردىكى جاراھەت - لەر سەۋىبىدىن قان سىيىگەن بولسا، مەزكۇر ئەزالار ئاغرىش بىلەن بىللە، سۇيۇك سېسىق پۇرايدۇ، ئۇيۇل - ئۇيۇل قان چۇشىدۇ. بۇنداقتا قۇرسى كاكىنەج (152 - نۇسخە)، قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) ۋە كۇندۇر، گىلى ئېرمىنىلەر يېرىلىدۇ.

XII ماقالا. قوساق كىرگىت گۆشلىمە - رىنىڭ يىرتىلىشى

1 - پەسىل: چوقۇق (قېيىل) كېسەللىكلىرى

بىرەر سەۋەپتىن قوساق كىرگىت گۆش پەردىسى يىرتىلىپ ھاسىل بولغان كاۋاك جايغا ئىچكى ئەزالاردىن ئۇچەي ۋە چاۋىلار چۇشۇپ سىرتقا پىلتۇيۇپ چىقىشى ياكى يەل ۋە سۇ چۇشۇپ قېلىشىغا تىبابەتتە "قېيىل" كېسەلى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ پەيدا بولغان ئورنى ۋە چۇشكەن نەرسىگە قاراپ يەنە باشقا ناملار بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇچەينىڭ دوسۇن ساھىبىغا چۇشۇشى "پەتەق"، ئۇرۇقدان خالتىسىغا چۇشۇشى "قورۇ" دەپ ئېيتىلىدۇ.

پەتەق (چۇقۇق)

چات ئارىلىغىدىكى كىرگىت گۆش پەردىسى قات - تىق ئاۋاز بىلەن ۋاقىراش، ئېغىر نەرسە كۆتىرىش ياكى قاتتىق ئىنجىقلاش سەۋىبى بىلەن يىرتىلىپ كېتىدۇ. بۇ چاغدا چات ئارىلىغىدا بىر كاۋاك جاي ھاسىل بولۇپ قېلىپ، ئۇنىڭغا ئۇچەي، چاۋا ياكى يەل، سۇ چۇشۇۋات -

لىدۇ. نەتىجىدە چات (يىرىق) ئارىلىغىدا پۇلتۇيۇپ چى-
قىپ تۇرغان ئىششىق پەيدا بولىدۇ. بۇ خەلق ئارىسىدا
چوقۇق، پوداق دەپ، تىبابەتتە پەتەق دەپ ئاتىلىدۇ،
ئۇنىڭ توۋەندىكىچە بىرقانچە تۈرلىرى بار.

(1) ئۇچەي پەتەقى — يىرتىلغان جايغا ئۇچەي
چۇشىدۇ، ئىششىق ئاستا — ئاستا يوغىنايدۇ. يۇقۇرىغا
قايتۇرۇش قىيىن بولىدۇ. باسقاندا كوكىرايدۇ. بەزىدە
بۇ جايغا چۈشكەن ئۇچەي تولغىشىپ قېلىپ ياكى قە-
سىلىپ قېلىپ ئۇچەي توسىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ئۇچەينى ئىچىگە كىرگۈ-
زۇش كېرەك. ئەگەر قول بىلەن باسقاندا كىرىمىسە،
ئاغرىقنى بىرئاز ئىسسىق سۇغا ئولتۇرغۇزۇش ياكى بابونە
يېغىنى قىزىتىپ ياغلاش بىلەن ئاسان كىرىپ كېتىدۇ.
ئۇندىن كېيىن توۋەندىكى دورىلارنى پەتەق بار تەرەپكە
دوسۇندىن تارتىپ پۇتۇن چات ئارىلىغىغا سۈركەپ ماتا
بىلەن تېگىپ قويۇلىدۇ.

نۇسخە: مەستىكى رۇمى، ئەنزۇرۇت، كۇندۇر،
جويۇز، قارىغاي يوپۇرمىغى، ئاقاقىيا، گۈلنار، مۇرمەككى،
پىرسياۋشان، زەمچە، روسۇت، ئارچا مېۋىسى، سەبرى،
سوقۇتىرى 3 مىسقالدىن ئېلىپ سوقۇپ، بېلىق يېغىدىن
6 مىسقال قوشۇپ ياغ دورا تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ماتانى ئىت ئۇزۇمى سۈيى
بىلەن نەمدەپ، دورىنى كورسىتىلگەن جايلارغا سۈركە-

گەندىن كېيىن ماتا بىلەن تېگىپ پەتەق چىققان جايدىن -
 ھا چەمبەر سېلىپ قويۇش لازىم. كېسەلنى ھەركەت قىلدۇرۇش
 ئۈچۈن ئۇنىڭدا ياتقۇزۇلدى. ئەگەر كېسەل تاقەت قىلالايدىكەن
 لىسا قانچە ئۇزۇن ياتسا شۇنچە ياخشى. ھەركەت قىلدۇرۇش
 ئۈچۈن كەلگەندە ئاستا ھەركەتلىنىش لازىم. يەنىلىك
 تاماقلاردىن مەسىلەن، پۇرچاق جىنىسلىق دانلار، قازان
 ئېنى، قىيمىلىق تاماق، ئامۇت قاتارلىقلاردىن پەرھىز
 قىلىنىدۇ. قاتتىق ئاۋاز بىلەن سۆزلەش، ئىنجىقلاش،
 جىنىس ئالاقە مەنىنى قىلىنىدۇ. ھەر تاماقتىن كېيىن
 جەۋارىش كۈمۈنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. چاي ئورۇن -
 ئىدا رۇمبىدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، جۇۋىنە ۋە زەنجىۋىل
 قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

(2) چاۋا پەتەقى - بۇنىڭ ئالامىتى شۇكى باس -
 قاندا كوكىراش بولمايدۇ، قاتتىق بولىدۇ. ئىچىگە كىر -
 گۈزۈش قىيىن. چارىسى ئۈچەي پەتەقى بىلەن ئوخشاش.
 (3) يەل پەتەقى - سىرتقا چىقىشى تېز ۋە چوڭ -
 راق بولىدۇ. سىلىق باسقاندا ئاسانلا يوقاپ كېتىدۇ.
 ئەمما تولا كوكىرايدۇ.

داۋاسى: يەلنى سىڭدۇرگۈچى دورىلار مەسىلەن،
 جەۋارىش كۈمۈنى (49 - نۇسخە) يېمىشكە، پەنجى ئەنە -
 گۈشت، سۇزاپ، ئىگىر، پىننە، مەرزەنجۈش ۋە جۇۋىنە -
 لەرنى قاينىتىپ ئىچىشكە ۋە سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ئۈچەي
 پەتەقىدىكى تېگىش چارىسى بىلەن چەمبەر سېلىپ قو -
 يۇلىدۇ.

4) سۇلۇق پەتەق — بۇ ئۇرۇقدانغا چۈشىدۇ. تۇخۇم قېپىدا سۇنىڭ لىغىلداپ تۇرغانلىقى ۋە تېرىنىڭ سۇزۇكلىكى روشەن بىلىنىپ تۇرىدۇ. قىسقىچى سۇلۇق ئىششىق كېسىلىدە سوزلەنگەن چارىلار قوللىنىلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بولمىسا بەزلى ① بىلەن سۇ ئېلىنىدۇ. دۇ. سۇنىڭ قايتا يىغىلماسلىقى ئۈچۈن ئارپا ئۇنى بە- لىن كالا يۇڭى ئېلىشتۇرۇپ ئۇرۇقدانغا چېپىلىدۇ. سۇنى كوپ ئىچىش مەنىنى قىلىنىدۇ.

5) قاتتىق پەتەق — بۇ خىلدىكى پەتەق "قورۇ- لەھى" دىيىلىدۇ. ئۇرۇقدان خالتىسىغا قاتتىق قويۇق خىلىتلارنىڭ چۈشۈشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. كورۇنۇشتە ئۇرۇقدان ئىششىغاندەك تۇرسىمۇ، لېكىن ياللۇغلىنىشتىن ئەسەر بولمايدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بە- لىن ماددىنى تازىلاپ، يۇمشاتقۇچى دورىلاردىن يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئوتۇلگىنلەرنى تاللاپ سىرتتىن چېپىشقا بېرىلىدۇ.

قوساق پەتەقى

قوساقنىڭ كىرگىت گۈشلىرى ياكى تېرە ئاستىدە- كى پەردە (سەفاق) يۇقۇرىدا سوزلەنگەندەك سەۋەپلەردىن يىرتىلىپ كېتىدۇ. بۇ بەزىدە كىندىك ئاستىدا، بەزىدە كىندىك ئۈستىدە بولىدۇ. يىرتىلغان جايىدىن شۇنىڭ ① بەزلى: تىبابەتتە بوشلۇقلاردىن سۇ ئېلىش ئۈچۈن قوللى- نىلىدىغان ئەسۋاپ.

تېگىدىكى ئەزالار چىقىپ پۇلتۇيۇپ قوساق تېرىسىنى
كوتىرىپ تۇرىدۇ. بەزىدە بۇ جايغا يەل ۋە سۇمۇ كېلىپ
چۇشۇپ قالىدۇ. يەللىك نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلىش
ياكى ھەركەت سەۋىيىدىن ئىششىق تۇگۇنچە بارغانسېرى
چوڭىيىدۇ. بۇ ئەھۋال ئاياللاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: ئۈچەي پەتىغى بىلەن ئوخشاش.

يەل كىندىك

يېڭى تۇغۇلغان بالىلاردا كىندىكنى ياخشى بوغ-
ماسلىق، ئەمچەكتىكى بالىلاردا كۆپ يىغلاش بىلەن
كىندىك سىرتقا پۇلتۇيۇپ چىقىپ قالىدۇ. بەزىدە كىن-
دىك ئاستىدىن ئوشۇق گۆش ئۆسۈپ چىقىش بىلەن
پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ۋاقتى ئوتۇپ كەتسە داۋالاش قىيىن.

ئالدى بىلەن كىندىكنىڭ چىقىپ قېلىش سەۋەپلىرىنى
ئوبدان بىلىش لازىم. قوساق كىرگىت پەردىلىرىنىڭ
يىرتىلىشىدىن بولسا پەتەقلەردە كۆرسىتىلگەن تەدبىرلەر
قوللىنىدۇ. سۇ چۈشكەن ئالامەتلىرى بولسا قوساققا سۇ
چۇشۇش كېسىلىدە كۆرسىتىلگەن چارىلەر قىلىنىدۇ.

كىندىك ئاستىدىن گۆش ئۆسۈپ چىققان بولسا،
پۇلتايغان ئىششىق قاتتىق بولىدۇ، بىر ھالەتتە تۇرىدۇ،
باسقاندا كىرىپ كەتمەيدۇ، رەڭگى قارامتۇل ياكى بىنەپشە
رەڭگىدە بولىدۇ.

داۋاسى: كىندىك ئۈستىگە زۇلۇك قويۇلىدۇ ياكى
دەستكارە بىلەن داۋالىنىدۇ،

XIII ماقالا. قول - پۇت ۋە بەل كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: بەل - ئومۇرتقا كېسەللىكلىرى

1) ئومۇرتقا چىقىپ كېتىش (ھودە: 4)

بەل ئومۇرتقىلىرىنىڭ چىقىپ كېتىشى ئومۇرتقىنىڭ ئۆز بوغۇمىدىن ئوڭ ياكى سولغا تېپىپ (سۇرۇلۇپ) كېتىشى ئالدى - كەينىگە چىقىپ كېتىشىدىن ئىبارەت.

سەۋەبى: ئومۇرتقا (مەپسەل) لىرى ئەتراپىدىكى گۆش ۋە پەيلەرنىڭ ياللۇغلىنىشى؛ بوغۇم بوشلۇقلىرىغا قويۇق يەل تولۇۋېلىش، بوغۇمنى تۇتۇپ تۇرغۇچى چاندېرلارغا نەملىك سىڭىپ بوشىشىپ قېلىشى؛ ئومۇمىي بەدەن تارتىشىشنىڭ بەل گۆشلىرىگە بولغان زور تەسىرى؛ زەخمە - لىنىش - يىقىلىش، ئۇرۇلۇشلار.

ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى: 1) ياللۇغلىنىشتىن بولغانلىرىدا: ئومۇرتقىنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان ئاغرىشىغا بىردىنلا قىزىتما ئورلەش ۋە ئاغرىشنىڭ يامانلىشىشى قوشۇلۇپ كېلىدۇ، تومۇر ھەركىتى تېزلىشىدۇ، بەل ساھەسىدە ئېغىرلىق ۋە مىدىرلىغاندا قادىلىپ ئاغرىش يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: شۇمىشە ئۇرۇغى، زىغىرلۇتايى، ئوخۇ
يېغى، ئىلىك، بىنەپشە، ئاق لەيلەرنى ئىششىق پار
جايغا قويۇپ تېگىش كېرەك. خىيارى شەمبەر شىرىسىگە
بادام يېغى قوشۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ۋە ھوقنە قىلىپ
ئىدۇ، بۇلارنىڭ سىرتىدا، باشقا ئەزالارنىڭ ياللۇغلى-
نىشلىرىدا كۆرسىتىلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

(2) بوغۇم بوشلۇقلىرىدىكى يەل سەۋىيىدىن بول-
غاندا — (بۇنى تىبابەتتە “ھۇدە بە رىياھى فەرەس” دەپ
ئاتىلىدۇ)، بەل ئاغرىدۇ، ئاغرىش بويوندىن باشلاپ
تۆۋەنگە قاراپ يۆتكۈلۈپ تۇرىدۇ، ھارارەت ئورلىيدۇ،
بەل سىرتقا ئىگىلىگەن ھالدا بولىدۇ، ئېغىرلىق بولمايدۇ،
دەسلەپتە ئاغرىش ئېغىر بولۇپ، كېيىنچە پەسىيىپ قالىدۇ.

داۋاسى: مائىل ئۇسۇل (159 - نۇسخە) بىلەن
ھەببى مەنتىن (27 - نۇسخە) بېرىپ، ئارقىدىن بەلگە
ھىجامەت قويۇلىدۇ، سوتلەپ، بابۇنە يېغى ۋە پەرىپىيون
قاتارلىقلارنى ئارىلاشتۇرۇپ بەلگە چېپىپ تېگىلىدۇ.

(3) چاندىر باغلارغا ئەملىك تەسىر قىلىشتىن
بولغاندا يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەردىن باشقا،
زەرەلەنگەن جايغا ياغ دورىلارنى سۈركەپ قويسا تېرىگە
سىڭمەي شۇ پېتى قالىدۇ.

داۋاسى: 2 - قىسمىدا كۆرسىتىلگەن چارىلەر قىلىپ
ئىدۇ، ۋە چېپىش ئۈچۈن ئىسسىق كەيپىياتتىكى ياغلار-
دىن سۇزاپ يېغى، ئاقىرقەرھە يېغى بېرىلىدۇ.

4) تارتىشىش سەۋىيىدىن بولغاندا، ئومۇمىي بەدەن ياكى بەل ساھەسىدە تارتىشىش ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ. (چارىسى ئۈچۈن تارتىشىش "تەشەننۇچ" كېسىلى بابىغا قاراڭ).

5) سىرتقى زەخىملىنىشتىن بولغاندا سەۋەپنىڭ مەۋجۇتلىقى بىلەن بەلنىڭ قاتتىق ئاغرىشى بىللە بولىدۇ. ھارارەت ياكى باشقا ئەھۋاللار روشەن بولمايدۇ. بەلنىڭ ھەركىتى چەكلىنىدۇ.

داۋاسى: قوزغالغان ئومۇرتقا ئۈستىگە ئوت بىلەن ھىجامەت قويۇپ ئەكسىگە كەلتۈرۈش كىپايە قىلىدۇ، ئۇندىن كېيىن زىنقىرۇمى، موقۇل ۋە ئاقىرقەرھالەرنى باراۋەردىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بىر ئاز نەمەدەپ بەلگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

غول ئاغرىشى (ۋە جىمىلەپەرە)

غول يەنى ئىككى تاغاقىن بەلگىچە بولغان جاي-نىڭ ئاغرىشى كۆپ ئۇچرايدۇ، بۇ كېسەل سەۋەپ ۋە قىسمەن ئالامەتلىرىگە قاراپ توۋەندىكى بىرقانچە تۈر-لەرگە بۆلىنىدۇ.

1) مىزاجنىڭ ماددىلار سەۋىيىدىن ياكى ماددىسىز ھالدا بۇزۇلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كۆپىنچە سوغاقىن بولۇپ، مۇھىم ئالامەتلىرى غول ئاغرىيدۇ، ئېغىرلىق ھىس قىلىنىدۇ. سوغاق نەرسىلەر ياكى سوغاق ھاۋانىڭ تەسىرى ئاغرىشنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. ئەمما يول مېڭىش ياكى

باشقا ھەركەتلەر بىلەن ئاغرىش يەڭگىللىشىپ قالىدۇ.
ئۇزۇنغا سۇزۇلىدۇ.

داۋاسى: مىزاجىنى تەڭشەش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل
(159 - نۇسخە) بىلەن ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ. مەجۇن
دورلاردىن سەنجىرىنا (33 - نۇسخە) ۋە مەشدرتۇس
(25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. چېپىش ئۈچۈن قۇست يېغى،
بابۇنە يېغى، مۇقىل ئۆشەق، شۇمشە، ھەبۇلغارلارنى
زىغىرلۇتايى ۋە ئىنەك پىتى يېغى بىلەن غولغا سۈركەش-
كە بېرىلىدۇ. غىزاسىغا ئۇقۇت سۈيى ۋە قۇش گوشلىرى
بېرىلىدۇ.

(2) غول ساھەسىدىكى ئومۇرتقا گوش ۋە پەيلىرىگە
غەيرى تەبىئىي بەلغەم (خام بەلغەم) ياكى قويۇق يەل
كىلىشى بىلەن غول ئاغرىش پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: غولنىڭ ئاغرىشى ئاستا - ئاستا كېلىپ
چىقىدۇ. ۋاقىت ئۆتكەنسېرى ئاغرىش ئېغىرلىشىدۇ. بولۇپ
مۇ ھاياجانلىنىش ياكى روھى قوزغۇلۇش ۋە جىنسى
ئالاقىدىن كېيىن ئاغرىش كۈچىيىدۇ. ئادەتتە يەلكە ۋە
غول ئەتراپى دائىم ئېغىر سېزىلىدۇ. ئاغرىش ئېغىر بول-
غاندا كوزى قاراڭغۇلىشىدۇ، ئاغرىش يۈتكۈلۈپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن
ھەبى سۇرۇنجان (37 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قەي قىلدۇ-
رۇشنىڭ مەنپەئىتى زور. مۇنچىغا چۈشۈش، دەم ئېلىش
بىلەن بىللە، سىرتتىن گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى ۋە
ئاق لەيلىلەر چېپىشقا بېرىلىدۇ.

3) يۈرەك ئاجىزلىغى ياكى خوشنا ئەزالاردىكى زەزەرلىنىشلەر غول ئاغرىشىغا سەۋەپچى بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۈرەك زەئىپلىگىنىڭ ئالامەتلىرى مەۋجۇت بولىدۇ. كۆز ئاغرىغى بار كىشىلەردىمۇ غول ئاغرىش ئۇچرايدۇ. ئومۇمەن بۇ خىلدىكى غول ئاغرىشلار- دا ئەەرلەردە جىنسى قابىلىيەت تەۋەن بولىدۇ.

داۋاسى: يۈرەك ئاجىزلىغىنى داۋالاش (يۈرەك كېسەللىكلەرگە قاراڭ). ۋە باشقا سەۋەپلىرىنى ئۆز قائىدىسى بويىچە داۋالاش ھەمدە يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن ياغلار بىلەن ياغلاش مۇمكىن.

4) بالىياتقۇ زەزەرلىنىشى ۋە ھېپىزىنىڭ توختاپ قېلىش سەۋىيىسى بىلەنمۇ ئاياللاردا غول ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. بەزى ئاياللار ھېز مەزگىللىرىدە ئاغرىپ ھېپىز كۆرگەندىن كېيىن ساقىيىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: بالىياتقۇ كېسەللىگىنىڭ ئالامەتلىرىگە قاراپ تەدبىر قىلىش كېرەك. ئەگەر ھېپىز توختاپ قالغان ياكى قالايمىقانلاشقان بولسا مۇنۇ نۇسخىدىكى شەر- ۋەت بېرىلىدۇ:

نۇسخە: چىڭسەي ئۇرۇغى 1 مىسقال، شۇمشە، رۇمبىدىيان، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، جۇۋدە ھەرىسى 4 مىسقالدىن، خاڭگا، قوغۇن ئۇرۇغى ھەرىسى 4 مىسقالدىن، ئوردان 2 مىسقال، قەن 8 سەر. دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 جىڭ سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ ئەتىسى

$\frac{1}{2}$ قالغىدەك قاينىتىپ، ماتا ئارقىلىق سۇزۇلىدۇ. تىرىپ-
2

لىرىنى سىقىپ، سۈيگە قەن سېلىپ قىيام قىلىپ تەي-
يارلاپ بىر ھەپتىگىچە بىر پىيالىدىن كۈنىگە 2 - 1 قې-
تىم ئىچىدۇ.

بەل ئاغرىشى (ۋە جىمىخاسىرە)

غول ئاغرىشىنىڭ سەۋەپلىرى بەل ئاغرىغىنى كەلتۈرۈ-
شى مۇمكىن ئەمما كۆپىنچە بەلغەم ۋە يەل سەۋەپ بولىدۇ.
داۋاسى: ئالامەت ۋە سەۋەپلىرىگە قاراپ غول
ئاغرىشتىكى چارىلار قوللىنىلىدۇ. ھەم توۋەندىكى شامچە
قويۇلىدۇ.

نۇسخە: ئوشەق، رۇمبىدىيان، زەنجىۋىل، چىڭسەي
ئۇرۇغى، شەھى ھەنزەل، سورۇنجان، ماھى زەھرەج، مۇ-
قىللەرنىڭ ھەر بىرىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق
سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، چىڭسەي ئۇرۇغى قاينىتىل-
غان سۇ بىلەن شامچە تەييارلاپ، سايىدا قۇرۇتۇپ ساق-
لىنىدۇ. گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ كۈنىگە بىر قېتىم سوڭ-
غا تىقىپ قويۇلىدۇ.

2-پەسىل: سوڭەك ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرى

بۇ يەردە سوڭەك ۋە بوغۇملارنىڭ ئاغرىشلىرىلا سوز-
لىنىدۇ. ئۇلارنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى مۇناسىۋەتلىك
باپلاردا سوزلىنىدۇ.

تېبابەتتە سوڭەك بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىشى بوغۇم ئاغرىغى (ۋەجىئىلىمو پاسىل)، يانپاش بوغۇم ۋە يانپاش سوڭەكلەرنىڭ ئاغرىشى (ۋەجىئىلىۋەرەك)، يانپاش بوغۇم-دىن تارتىپ تاكى ھوشۇققىچە بولغان سوڭەك قىسمىنىڭ ئاغرىشى (ئەرقۇنىنىسا) ۋە ھوشۇقتىن تۈۋەنگىچە، تاپان، پەنجە بوغۇمى ۋە سوڭەكلىرىنىڭ ئاغرىشى نۇقرىس دەپ ئاتىلىدۇ. بۇلاردىن باشقا سوڭەك ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىنى ئودۇملاشتۇرۇپ "موپاسىل" دىگەن ئاتالغۇ بىلەن ئاتاش ئادەت بولۇپ قالغان.

بوغۇم ئاغرىغى (موپاسىل) ئىششىقلىق ياكى ئىششىقسىز بولىدۇ. ئىششىقسىز بولغىنى ياللۇغلىنىشتىن، ئىششىقلىق بولغىنى كوپىنچە ماددىلار سەۋىيىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما ئىششىق يىرىڭ يىغمايدۇ.

يۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن سوڭەك ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىنىڭ مەيلى قايسى تۈرى بولسۇن ئومۇمەن بىر قانچە ئورتاق سەۋەپلەرگە ئىگە. ھەم يەنە ئۆز ئالدىغا ئالاھىدە ئالاھىدىلىرىمۇ بار. تۈۋەندە ئومۇمى سەۋەپلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز.

1) ماددىلارنىڭ بوغۇم ياكى سوڭەكلەرگە، ئۇلار-نى ئوراپ تۇرغۇچى گوش ۋە پەيلەرگە چۈشۈشىدىن بولىدۇ. ئەمما ھەركەت چاندىرلىرىغا چۈشمەيدۇ (سىڭمەيدۇ). ئەگەر چاندىرلارغا سىڭىپ قالسا، ئۇنداقتا تارتىشىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2) بوغۇملارنىڭ زەئىپلىكى، بوشاپ قېلىشى ياكى شۇ ئەزا مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى بىلەن ماددىلار بوغۇملارغا كېلىپ يىغىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى كۆپ يەپ ئاز ھەر-كەت قىلىش تۈپەيلىدىن بەدەندىن چىقىپ كېتىشكە تېگىشلىك كېرەكسىز ماددىلار بوغۇملارغا چۈشىدۇ.

مەئىدىنىڭ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىش نەتىجىسىدە پىششىقلىغان خىلىتلار پەيدا بولۇپ بوغۇملارغا چۈشىدۇ.

تەرتىپسىز ئوزۇقلۇنۇش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش ۋە ئاچ قوساققا مونچىغا چۈشۈش ياكى ئىسسىق مەۋجىدىن چىقىپلا سوغاق سۇ ئىچىش بىلەن ماددا بوغۇملارغا چۈشىدۇ.

زۇكام نەزلىسى بوغۇملارغا چۈشىدۇ. ھېچنە توختاپ كەتكەن مەزگىلدە ئاياللاردا بولىدىغان ئۆزگىرىشلەرنىڭ بىرى شەكىلدە يۈز بېرىدۇ. قوللىنىلىدىغان كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا سۈرگە بېرىلسە، ماددىلار سىرتقا چىقىپ كېتەلمەي بوغۇملارغا چۈشىدۇ. ماددىسىز بولغان مۇپاسىللارنى ماددىسىز دەپمۇ بولمايدۇ، چۈنكى مەيلى يەل ياكى باشقا سەۋەپلەردىن بولغان مۇپاسىللاردا ئازدۇر - كۆپتۇر ماددا ئارىلاشقان ۋە ماددىلار يەككە، باشقا ماددىلار بىلەن قوشۇلغان بولىدۇ. بەلغەم بىلەن سەپرانىڭ قوشۇلۇشى كۆپرەك ئۇچرايدۇ. ئەمما بەلغەم، يەل، سەۋدانىڭ بىرىكىشىدىن پەيدا بولغانىنى كام ئۇچرايدۇ.

بوغۇملارنىڭ ئاغرىشى (ۋە جىلمو پاسىل)

بوغۇملار (سۆڭەكلەر بىر - بىرىگە تۇتاشقان ئورۇن) نىڭ ئاغرىشى يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەن ئورتاق سەۋەپلەردىن باشقا سەۋەپ ۋە ئالامەتلىرىگە ئاساسەن تۆۋەندىكىچە 6 تۈرگە بۆلىنىدۇ:

1) ماددىسىز مىزاج بۇزۇلۇشتىن - ئىسسىق - سوغاق، ھول - قۇرۇقلۇقنىڭ غالىپ بولىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان بوغۇم ئاغرىقى.

ئالامەتلىرى: بوغۇملاردىكى (ياكى زەرەرلەنگەن بوغۇمدىكى) ئاغرىش تەدرىجى ھالدا پەيدا بولىدۇ. ئېغىرلىق ۋە ئىششىق روشەن بولمايدۇ. سەۋىيىنىڭ كەيپىياتقا مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلىرى بولىدۇ. مەسىلەن، ئىسسىقلىقتىن بولسا بوغۇم قىزارغان ۋە تۇتۇپ كۆرگەندە بەدەننىڭ باشقا جايلىرىدىن قىزىق سېزىلىدۇ. سوغ ۋە ئەمدى بولغاندا، ئەسلىگە نىسبەتەن ئاقارغان ۋە سوغاق سېزىلىدۇ ۋە باشقىلار.

داۋاسى: مىزاجنى ئۆزگەرتىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. ئىسسىقلىقتىن بولسا سوغاقلىق قىلىنىدۇ. يەنى لى - مون شەرۋىتى ۋە ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۈرگە بېرىش ياكى قان ئېلىشقا بولمايدۇ. قۇرۇقلىق ئالامەتلىرى بولسا بادام يېغى، گۈل يېغى، قاپاق ئۇرۇغى ياغلار بىرى ياغلاشقا بېرىلىدۇ. سوغاقلىقتىن بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرىدا سوغاقتىن بولىدىغان ياللۇغ -

لىنىشلاردا كورسىتىپ ئوتۇلگەن ئىسسىقلىق دورىلار تال-
لاپ ئىشلىتىلىدۇ.

(2) ماددى سەۋەپلەردىن قان كۆپ بولۇشتىن پەيدا
بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: زەرەرلەنگەن بوغۇم روشەن ھالدا قە-
زارغان بولۇپ، پۇتۇن بەدەن قىزىيدۇ، لوقۇلداپ قاتتىق
ئاغرىيدۇ، بوغۇم ئۈستىدىكى تومۇرلار كۆپۈپ قالىدۇ. ئىش-
شىق يوغان ۋە سانچىلغاندەك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر مەنى قىلىدىغان ئەھۋاللار بولسا-
مىسا قارشى تەرەپ تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. ئاغرىش
قول بوغۇملىرىدا بولسا ئوككەل تومۇرىدىن، پۇتتا بولسا
ساقىن تومۇرىدىن ئاغرىقنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىغا قاراپ
بىر قېتىم ياكى بىر قانچە قېتىم ئاز-ئازدىن قان ئې-
لىشقا بولىدۇ. قان ئېلىش مەنى قىلىنسا ئاغرىش بار
جاينىڭ ئاستىغا ھىجامەت قويۇلىدۇ. 2 كۈن ئۆتكەندىن
كېيىن ئىسكەنجىبىنىگە سۇ قوشۇپ 2 مىسقال قوغۇن سا-
پىغى تالقىنى بىلەن ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ئەگەر
سۇرگە بېرىشكە توغرا كەلسە بىنەپشە، گازىۋان، چىلان،
سەرىستان ۋە ئىت ئۇزۇمى بىلەن جۇلاپ قىلىپ بېرى-
لىدۇ. مەلۇم ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ماددىنى تازىلاش
ئۈچۈن مەتبۇخى سورۇنجان (160 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
ھارارەت كۆپ بولسا، ئارپا سۈيى ياكى ئانار سۈيىگە
تەمرى ھىندى چىلاپ بېرىش مۇمكىن. ياكى ئىسكەنجە-

بىن بۇزۇرى (101 - نۇسخە) بەرسىمۇ بولىدۇ. ئاغرىق پەسەيتىش ۋە ئىششىقنى ياندۇرۇش ئۈچۈن (ئەگەر قىزىتما بولسا) ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل، پۈپەل، مامىشا، ئاقا-قىيالارنى ياراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمىغاقسۇت ياكى كاسىن سۈيى بىلەن ئاغرىق بار جايغا چېپىلىدۇ. ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا ئەپيۇندىن ئاز قوشۇش مۇمكىن. ئاغرىق بىر ئاز پەسەيگەندىن كېيىن ماددىنى يومىتىش ئۈچۈن بىنەپشە بىلەن ئاق لەيلىنى سوقۇپ (كوك ھالدىكىسى ياخشى) بوغۇم ئۈستىگە تېكىپ قويىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ماددىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن تىۋەندىكى دورا تەييارلاپ چېپىلىدۇ.

زىغىر، شۇمشە ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، بادام يېغى 3 مىسقال، ئاق موم 7 مىسقال، ئەكىلىل مىلىك، بابو-نە، گۈل يېغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. تەييارلاشتا ئال-دى بىلەن زىغىر بىلەن شۇمشىنىڭ شىرىسى ئېلىنىدۇ. ئەكىلىل مىلىك يۇمشاق سوقىلىدۇ، ياغ دورىلارنى ئوتتا بىر ئاز قىزىتىپ، موم سېلىپ ئېرىتىپ، ئۈستىگە لۇتاپ ۋە سوقۇلغان ئەكىلىل مىلىك، بابۇنلارنى سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(3) قان بىلەن سەپرا ياكى نۇقۇل سەپرا سەۋد-بىدىن بولغان بوغۇم ئاغرىقى.

ئالامەتلىرى: قاتتىق ئاغرىش ۋە ئېچىشىش بۇ تۈردىكى بوغۇم ئاغرىغىغا خاس ئالامەتتۇر. تومۇر ھەر-

كىتى تېز، بوغۇم ئۈستى سېرىققا مايىل قىزىل بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە سۇيىدۇك سارغىيمىش، كوڭۇل ئاينىش قاتارلىق ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كېسەل ئورۇق كىشىلەردە كوپرەك ئۇچرايدۇ. بۇنداق كىشىلەرنىڭ يۈرىكى ۋە بەدنىنى كۈچلەندۈرۈشكە ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك.

داۋاسى: مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. مۇمكىن قەدەر ئالاھىدە سۈرگە بەرمەسلىك كېرەك. تازىلىغاندىن كېيىن ئىسكەنجىيىن بېرىشنىڭ پايدىسى زور. ئەمما بەك چۇچىمەل بولۇپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. چېپىش ئۈچۈن ئىسپۇغۇلنى سىركە بىلەن ئېلىشتۇرۇپ ياكى خاڭگا سۈيى، قاپاق سۈيى، ھەمىشۋا سۈيى قاتارلىقلاردىن بىرى بېرىلىدۇ. ئاغرىشنى پەسەيتىش ئۈچۈن، سۈرۈنجاننى باراۋەر مىقداردىكى شېكەر قوشۇپ تالقان قىلىپ، كۈنىگە 3 مىسقالدىن سوغاقسۇ بېرىلىدۇ.

(4) بەلغەمدىن بولغان بوغۇم ئاغرىغى:

ئالامەتلىرى: بوغۇملاردا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. قاتتىق ئاغرىش ياكى قىزىتما بولمايدۇ. يۈرەك ھەرىكىتى ئاجىز، زەرەرلەنگەن بوغۇم ئىششىغان، سىرتى قوغۇشۇن رەڭلىك بولىدۇ. سوغاقلق تەسىر قىلغاندا ئاغرىش كۈچىيىدۇ، ئەمما قىزىتما پەسەيىپ قالىدۇ. ئۇندىن باشقا بەلغەمگە خاس باشقا ئالامەتلەرمۇ كورلىنىدۇ.

داۋاسى: ئاۋال قەي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ

ئۇچۇق سېرىق چىچەك ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاينىتىل-
خان سۇغا ھەسەل قوشۇپ ئىچكۈزىلىدۇ. قەي قىلدۇرۇش-
تىن مەقسەت بەلغەم ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاش-
لاشتىن ئىبارەت. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن نەتىجە كورۇلمىسە
بەلغەم پىشۇرۇش ئۈچۈن توت كۈن ئۇدا ھەسەل بىلەن
تەييارلىغان گۈلچەننى بېدىيان ئەرەقى بىلەن بېرىلىدۇ
ياكى 3 كۈن داۋاملىق مائىل ئۇسۇلغا ئىنەك پىتى يېغى
قوشۇپ 4 - كۈنى مەخسۇس مائىل ئۇسۇل (159 - نۇس-
خە) بېرىلىدۇ. ماددا پىشقاندىن كېيىن ھەبىي سورۇنجان
(37 - نۇسخە) ياكى ھەبىي مەنئىن (27 - نۇسخە) دىن
بىرى بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار بىر ھەپتە داۋاملىق بېرىلىپ،
بىر نەچچە كۈن ئۆتكۈزۈپ يەنە بىر نەچچە ھەپتە دا-
ۋاملىق بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى
ۋە خاڭگا ئۇرۇقلارنى قايناتقان سۇ بىلەن بىللە بېرىل-
سە مەنپەئەتى تېخىمۇ ياخشى. سىرتتىن ماددىلارنى تار-
قاتقۇچى دورا ئىشلىتىشنىڭ پايدىسى يوق. شۇنىڭ ئۇ-
چۇن بۇ خىلدىكى كېسەللەردە بوغۇم ئىششىغىنى قايتۇ-
رۇش ئۈچۈن بېرىلىدىغان سىرتقى دورىلارغا سەبەر، ئاق
لەيلى، بابۇنىلەر ۋە ئىنەك پىتى يېغى بېرىش يېتەرلىك.
شۇنى ئەستە تۇتۇش لازىمكى، بوغۇم ئاغرىقلىرىنىڭ قا-
سى خىلدىكىسى بولمىسۇن سورۇنجاننى ئېغىز ئارقىلىق
بېرىش ياكى سىرتتىن يالغۇز ھالدا ياكى باشقا دورىلار
بىلەن بىللە چېپىشنىڭ پايدىسى كۆپ، ئەمما مەئىدىنى

بۇزۇش ئېھتىمالى بولغانلىقى ئۈچۈن زەنجىۋىل بىلەن زىرە قوشۇپ بېرىلىدۇ ۋە بوغۇملارنى موم يېغى بىلەن ياغلاپ تۇرۇش كېرەك. چۈنكى سورۇنجان بوغۇملارنى قاتۇرۇپ قويىدۇ.

5) سەۋدا ماددىسىنىڭ بوغۇملارغا تەسىر قىلىش دىن بولغان بوغۇم ئاغرىقى:

ئالامەتلىرى: زەرەرلەنگەن بوغۇمدىكى ئىششىق قاتتىق بولسىمۇ، ئەمما ئاغرىش ياكى سانچىلىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. ئىششىقنىڭ رەڭگى كۆككە مايىل بولۇپ، كېسەلدە ئەسەبى (روھى) ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. تاماقتىكى كۆپ يەيدۇ. ئۆزى ئورۇق بولىدۇ. ھول نەرسىلەر دىن راھەتلىنىدۇ.

داۋاسى: سەۋدانى پىشۇرۇپ بولغاندىن ئۇنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىپ، ئاندىن مەجۇنى جەۋارىش كۇمۇنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىششىقنى يۇمشىتىش ۋە تارقىتىش ئۈچۈن بابۇنە، شۇمشە، زىغىر، مۇقىل، جاۋۇشىر، ئۇدخام، ئەنەجۇرلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ، قوي يېغى، زەيتۇن يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ سەل قىزىتىپ ئۈستىگە دورىلارنى سېلىپ، ماي دورا تەييارلاپ ئىششىغان بوغۇمغا سۈركەش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. ئەگەر تىۋەنكى نۇسخىدىكى ياغ دورىنى تەييارلاپ بەرسە بۇ خىلدىكى بوغۇم ئاغرىقلىرىدا مەنپەئەتتىكى بەك ياخشى.

نۇسخە: گۈل سوسەن يېغى، قۇست يېغى، ئىنەك پىتى يېغى، زاراڭزا يېغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن. قوي قۇيرۇق يېغى، توخۇ يېغى، ئودەك يېغى ھەر بىرى 2 سەردىن، ئاق موم 7 مىسقال، بابۇنە، مەرزەنجۇش، ھاشا، شۇمشە ھەر بىرى 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: ئۇسۇلى ئالدى بىلەن چوپ دورىلارنى بىر ئاز سۇدا قاينىتىپ، راسا تەمىنى چىقىرىپ ماتا ئارقىلىق سۇزۇپ، تىرىپىنى سىقىپ، سۈيىگە ياغ دورىلارنى سېلىپ سۇ تۈگەپ كەتكىچە قاينىتىلىدۇ. ئاندىن ئۈستىگە مومنى سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

(6) يەلدىن بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرىدا، ئاساسەن بوغۇمدىكى ئاغرىق يۈتكىلىپ تۇرىدۇ. ئىششىق يۇمشاق بولىدۇ، ھارارەت ئالامەتلىرى بولمايدۇ. يەللىك نەرسىلەرنى (مەسىلەن، ئارپا، كالا گوشى، كاۋا، ياڭيۇ قاتارلىقلار) ئىستىمال قىلسا ئاغرىق ئېغىرلىشىپ قالىدۇ.

داۋاسى: گۈلچەننى بېدىيان ئەرەقى بىلەن بېرىپ شەرۋىتى بۇزۇرى (130 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھەببى سۇرۇنجان (37 - نۇسخە) ياكى سۇيۇپى سورۇنجان (35 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن 5 - تۈردىكى ياغلاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.

بوغۇم ئاغرىقلىرىدا ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئاغرىق (بوغۇم ئاغرىقلىرى ۋە سوڭەكتىكى ئاغرىقلارنى) پەسەيتىدىغان توۋەندىكى دورىلار بار:

(1) سورۇنجان بىلەن ئاۋاتنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ كۈنىگە 3 مىسقالدىن سوغاق سۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

(2) ئۈچ مىسقال قۇرۇق يۇمىغاقسۇتنى باراۋەر مىقداردىكى شېكەر بىلەن سوقۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(3) 2 مىسقال ئاق كۆكنار ئۇرۇغىنى باراۋەر مىقداردىكى شېكەر بىلەن سوقۇپ بېرىلىدۇ.

(4) ئىسپۇغۇلنى قىزىق سۇ بىلەن تازا مېچىپ، گۈل يېغى ئارىلاشتۇرۇپ ئاغرىغان جايىغا سۈرتىلىدۇ.

(5) شۈمىشنى سىركىگە قوشۇپ، بوغۇم ئۈستىگە چېپىشقا بېرىلىدۇ.

يىلپاش بوغۇمى ۋە سۆڭەكلەر ئاغرىش (ۋە جەمئىيەتدە)

سەۋىيى: ئومۇمى مۇپاسىللار سەۋىيى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، بەزىدە تەسادىپى ھاللار، مەسىلەن، ئۇلاق-قا مىنىش، سەكرەش بانىسى بىلەن ئاغرىش باشلىنىپ كېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: يىلپاش تەرەپ بوغۇمىغا قوشۇلۇپ، بەزىدە پۈتۈن يىلپاش سۆڭەكلىرى ئاغرىپ كېتىدۇ. ماددا چوڭقۇر قاتلامدا بولغانلىقى ئۈچۈن تاشقى كۆرۈنۈشتە ئىششىق بولمايدۇ. سەۋەبچى ماددىلارغا قاراپ يەرلىك ۋە ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلىر كۆرىلىدۇ. مەسىلەن، قان غالىپلىقى بولسا، يەرلىك جاي ياكى پۈتۈن بەدەندە

قىزىتما بولىدۇ، قاتتىق ۋە سانچىلىپ ئاغرىيدۇ. يانپاش ئېغىر ۋە قىزىرىپ تۇرىدۇ. كېسەللىك ئۇزۇنغا سوزۇلسا ئەر قۇنىسىغا ئايلىنىدۇ.

داۋاسى: مەنى قىلىدىغان ھاللار بولمىسا ئاغرىق تەرەپتىن قان ئېلىش كېرەك. بولمىسا ھىجامەت قويۇل-سا بولىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چېپىشقا قاتۇرغۇچى دورىلار-نى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ھارارەت بولمىسا ئاغرىق پە-سەيتىش ئۈچۈن زىغىر، بابۇنە، سېرىق چېچەك ۋە ئىناق لەيلىلەرنى چېپىش كېرەك. ئەگەر ھارارەت بولسا قاننىڭ كوپلىگىدىن بولغان بوغۇم ئاغرىغىدا كورسىتىلگەن چار-لار قىلىنىدۇ. يېمىشكە ھەببى مەنتىن (27 - نۇسخە) بى-لەن ھەببى سورۇنجان (37 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇلار بىلەن نەتىجە ھاسىل بولمىسا گۇڭگۇرتلۇق ئارىشاڭلارغا چۈشۈش ۋە يانپاش بوغۇم ئۈستىنى داغلاش ① كېرەك. ياكى بوغۇمغا ئوتلۇق ھىجامەت قويۇش لازىم.

ھوشۇق ۋە تاپان سوڭەك بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىشى (نۇقرىس)

بۇ كېسەللىكتە ئاغرىش ھوشۇقتىن باشلىنىپ ئاياق تاپان سوڭەكلىرى ۋە بارماق بوغۇملىرىغىچە بارىدۇ. ھەتتا پاقالچەك تەرەپلەرگىمۇ مېڭىپ ئىشىشى مۇمكىن. قول -

① داغلاش: مەخسۇس 3 قىرلىق بىر تومۇر ئەسۋاپ بى-لۈپ ئوتتا قىزىتىپ تۇرۇپ كورسىتىلگەن جايغا يېقىلىدۇ.

بارماق سوڭىكى ۋە بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىپ ئىششىپ كېتىشىمۇ نۇقرىس دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ھوشۇق، قول بىلەيزۇك بوغۇملىرى ياكى ئاياق، ئاللىقان پەنچە سوڭىكلىرىدە چىدىغۇسىز ئاغرىش پەيدا بولۇپ، بوغۇم ئىششىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئاغرىش ۋە ئىششىق بوغۇملاردىن ئەتراپقا تارقىلىشىمۇ مۇمكىن. پۇت چوڭ بارمىغى ياكى قول باش بارمىغىغا چۈشسە ئاغرىش تېخىمۇ زىيادە بولىدۇ. بەزىلەر بۇ كېسەلنى ئاتا-بوۋىلاردىن مىراس قالىدۇ، دەپ قارايدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرىدىكىدەك داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەمما بۇ كېسەلگە سوغاقلق قوللىنىشقا بولمايدۇ، مىڭە ۋە يۈرەككە تەسىر بېرىدۇ. ئەگەر سوغاق دورىلارنى، ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى چاپقاندا باش قېيىش ياكى كوڭۇل ئايىنىپ يۈرەك سېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر يۈز بەرسە، بابۇنە ۋە ئاق لەيلى قايناتقان سۇ بىلەن بوغۇمنى يۇيۇش كېرەك.

3 - پەسىل: ئاياق قانتومۇرلىرى كېسەلى

ئاياق قانتومۇرلىرى كېسەلى پاقالچەك كوك تومۇرىنىڭ ئەگرى - بۈگرى كېڭىيىپ كېتىشى (داۋالى) ۋە ئاياقنىڭ پىل پۇتىدەك يوغۇناپ كېتىشى (دائىل پىل) كېسەللىكلىرىدىن ئىبارەتتۇر. ئۇلارنى توۋەندە ئايرىم - ئايرىم بايان قىلىمىز.

ئاياق كوك تومۇرىنىڭ ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىپ كېتىشى (داۋالى)

سەۋىبى: قاندىكى كويگەن سەۋدا ۋە قان ماددىسىنىڭ ئاياق تومۇرلىرىغا كېلىپ توكىلىشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. يۈك كوتەرگۈچى ھاممالار، ئۇزاق سەپەردە پىيادە ماڭغۇچىلار، يارىدارلار ۋە دائىم ئورە تۇرغۇچىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: ئاياقتا ئاغرىش تېلىش ۋە ئالامەتلىرى بولۇپ، تەدرىجى ھالدا قان تومۇرلار تېرىدىن كۆتىرىلىپ، چوڭ ئەگرى - بۇگرى كۆرۈنۈشكە كىرىپ قالىدۇ. پاقالچەك نىڭ شەكىلىنىمۇ بىر ئاز ئۆزگەرتىدۇ. تومۇرلار كېڭەيگەن ۋە كۆكەرگەن ھالدا بولىدۇ. ئۇزۇنغا سوزۇلسا داۋاسى مۇشكۈل.

داۋاسى: سەۋدا ۋە بەلغەم ماددىلىرىنى تازىلاش ئۈچۈن چارە قىلىش كېرەك. قەي قىلدۇرۇش ۋە ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) نى يالغۇز ياكى گىلى ئەر - مىنى قوشۇپ بېرىش كېرەك. سۈرگە بېرىپ بولغاندىن كېيىن پاقالچەكنى ماتا بىلەن بوشراق قىلىپ تېگىپ قويۇش لازىم. باشقا تەدبىرلەر دائىل پىل بىلەن ئوخشاش.

پىل پۇتى كېسىلى (دائىل پىل)

كېسەلنىڭ بىر ياكى ئىككىلا پۇتى خۇددى پىلنىڭ پۇتىدەك يوغىناپ كېتىدۇ. يۇقىرىدىكى قان تومۇر ئەگرىلى - شىپ كېڭىيىشتە ماددا قان تومۇرلاردا بولسا، بۇنىڭدا ماددا

قانتومۇردا، مېشەك گۆش ۋە تاپان گۆشلىرىدە بولىدۇ.

سەۋىيى: قويۇق غەيرى تەبىئى قان ۋە سەۋ -

دانىڭ پۇت تومۇرلىرى ۋە گۆشلىرىگە قۇيۇلۇشى؛ قويۇق بەلغەمنىڭ ئاياقلاردا يىغىلىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: پۇت ئىششىيدۇ، ئىششىق قاتتىق

بولۇپ، تۇتۇپ كورگەندە ئىسسىق سېزىلىدۇ. كېسەل

باشلىنىشىدا تېرە قىزغۇش رەڭدە بولۇپ، بارغانسېرى

مايسىرەڭگە ياكى قارامتۇل كوكۇش رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

پاقالچەك تېرىسى بۇزۇلۇپ، كېيىنچە يارىغا ئايلىنىدۇ.

ئەمما سەزگۈ ئەسەبلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى نەتىجىسىدە جارا -

ھەتلەنگەن جاي ئاغرىمايدۇ. بۇ پىل پۇتى كېسىلىنىڭ

ئالامەتلىرىدىن بىرىدۇر.

داۋاسى: قان ئېلىش ياخشى چارە ھىساپلىنىدۇ.

باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. سەۋدانى تازى -

لاش ئۇچۇن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سۇرگە ئۇچۇن ئىسسىق كەيپىياتلىق دورىلار بېرىشكە

بولمايدۇ. چېپىش ئۇچۇن ئاقاقىيا ۋە ئوسارە لەلەھىيەتتە -

تېمىلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سۇدا ئېرىتىپ چېپىش،

مېڭىشتىن ساقلىنىش كېرەك. دائىم پۇتىنى يۇقۇرى

قىلىپ يېتىشىنى ئادەتلىنىش لازىم. يول مېڭىشقا توغرا

كەلسە پۇتقا سەمغى ئەرەبى، موزا، داۋا، ئاقاقىيالارنى

چېپىپ، ئۇستىدىن ماتا بىلەن تېڭىپ قويۇپ مېڭىش

لازىم. ھەركەتتە پۇتقا ئېغىرلىق چۈشۈپ قېلىشتىن ساق
لىنىش كېرەك.

قويۇق بەلغەمدىن بولغان دائىل پىلدا ئىششىق
يۇمشاق ۋە سوغاق بولىدۇ، ئېغىرلىق بولمايدۇ.

داۋاسى: بىر - ئىككى قېتىم قەي قىلدۇرۇش
كېرەك. ئۇنىدىن كېيىن ھەر كۈنى سەھەردە ئىترىپىل
سەغىر (5 - نۇسخە) گە بىر مىسقال كۈندۈر، يېرىم مىس -
قال زەنجىۋىل قوشۇپ بېرىلىدۇ. بۇ كېسەلدە ئاغرىقنى
ئاچ قالدۇرۇش پايدىلىق. سىرتتىن چاپىدىغان باشقا
چارىلار يۇقۇرقى بىلەن ئوخشاش. بەزىلەر دائىل پىل
ئېغىر بولماي ھەركەتكە تەسىر بەرمىسە داۋالىماسلىقىنى
تەشەببۇس قىلىدۇ.

XIV ماقالا. قىزىتمىلار (تەپلەر)

1 - پەسىل: بىر كۈنلۈك قىزىتمىلار (تەپى يەۋمى)

بەدەندىكى ھارارەت قانداق ھاسىل بولىدۇ ۋە يۇ - رەك ھەرىكىتى ئارقىلىق بەدەننى ئوز ئېتىدالىدىكى ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەپ تۇرىدۇ. ھارارەتنىڭ ھەر خىل سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان غەيرى تەبىئى ھالىتى (يەنى "ھارارىتى غەرىبە" يۈرەكتىكى قۇۋۋەتلەر (روھ) بىلەن بىللە پۈتۈن بەدەن قىزىل تومۇر - لىرى ئارقىلىق ئەزالارغا تارقىلىپ، تەپ يەنى قىزىتما ھالىتىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇلار سەۋەپلىرىگە قاراپ كۈن - لىك قىزىتما (تەپى يەۋمى)، خىلىتلىك قىزىتما (تەپى خىلىتى) ۋە جۈدەتكۈچى قىزىتما (تەپى دىققى) دىگەن 3 چوڭ تۈرگە بۆلىنىدۇ. ئۇلار يەنە ئوز نوۋىتىدە بىر قانچە كىچىك تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ. بىز بۇ پە - سىلدە سوزالەيدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما 3 چوڭ ۋە 23 كىچىك تۈرگە بۆلىنىدۇ. توۋەندە ئۇلارنىڭ بەزى مۇھىملىرىنى كورسىتىمىز:

(1) تەبىئى قۇۋۋەت (قۇۋۋەيى تەبىئىيە - جىگەردىكى

قۇۋۋەت) نىڭ ھارارىتى غەربىيە بىلەن بىرىكىشىدىن بولىدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما. بۇنىڭدا ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلىشى، ئىسسىق تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، ئىچ سۇرۇش سەۋەپلىرى بىلەن قىزىتما ھاسىل بولىدۇ.

(2) ھاياتلىق قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى ھاياۋانى — يۈرەك — تىكى قۇۋۋەت) بىلەن ھارارىتى غەربىيەنىڭ بىرىكىشىدىن بولىدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما: غەم، قورقۇش، خۇشلۇق ۋە مونچىغا چۇشۇش سەۋەپلىرىدىن ھاسىل بولىدۇ.

(3) سېزىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى نەپسانى — مىڭە — دىكى قۇۋۋەت) بىلەن ھارارىتى غەربىيەنىڭ بىرىكىشىدىن بولىدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما: ئۇيقىسىزلىق، ۋەھىمە، تولا پىكىر — خىيال قىلىش تۈپەيلىدىن ھاسىل بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: بىر كۈنلۈك تەپتىكى بەدەن قىزىد — شىنى، بەزىلەردە بەدەننى تۇتۇپ كورۇش ئارقىلىق بىلگىلى بولمايدۇ. بەزىلەردە بولسا قولغا روشەن سېزىلىدۇ. قىزىتما ۋاقتى ئادەتتە بىر كۈندىن ئاشمايدۇ. بەزىدە 3 كۈنگە — چە داۋاملىشىدىغان قىزىتىلارمۇ بار. بىر كۈنلۈك تەپ قاتارىغا كىرىدۇ. كۆپ ۋاقىتلاردا تەپى يەۋمى باشقا تەپ لەرگە ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋاسى: بىر كۈنلۈك تەپلەرنى سەۋەپ ۋە ئالامەتلىرىگە (تومۇر ھەرىكىتى، سۇيدۇك رەڭگىگە) قاراپ سەۋەپنى يوقىتىشنى ئاساس قىلغان ھالدا داۋالىنىدۇ. قان كۆپلىگى سەۋەپ بولمىغانلىرىدا سۈرگە بېرىشنىڭ ھاجىتى

يوق. تەرلىنىش، مونچىغا چۈشۈش ۋە كېسەللىكلەرنىڭ ئۈزىدە سۈزلەپ ئۆتۈلگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

2 - پەسىل: خىمىيەلىك قىزىتمىلار (تەبىئىي خىمىيە ياكى ھۇمىيەتتىكى خىمىيە)

خىمىيەلىك قىزىتمىلار تۆت خىمىيە يەنى قان، سەپرا، سەۋدا ۋە بەلغەم سەۋىيىسىدىن پەيدا بولۇپ، ئۇلار بىر خىل خىمىيەلىك ياكى بىردىن ئوشۇق خىمىيەلىك تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. بىر خىمىيەلىك بولغىنى ئاددىي (مۇرەدد) قىزىتما ۋە كۆپ خىمىيەلىك بولغىنى مۇرەككەپ قىزىتما دەپ ئايرىلىدۇ. ئۇلار يەنە مىكروپىلۇق (ئۇفۇنەتلىك) ۋە مىكروپىسىز (ئۇفۇنەتسىز) قىزىتما دەپمۇ پەرقلىنىدۇ.

قان ماددىسىدىن بولغان قىزىتما (تەبىئىي دەمەۋى)

سەۋىيى: قان مىقدارىنىڭ ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىشى ياكى قاندا ئۇفۇنەت (مىكروپ) بولمىغان ھالدا ھارارەت نىڭ پەيدا بولۇشى؛ قاندا ئۇفۇنەت يەنى مىكروپ پەيدا بولۇشى.

ئالامەتلىرى: بەدەندە قان ئېشىپ كېتىش ئالامەتلىرى بولىدۇ. مەسىلەن، يۈز ۋە كۆز قىزىرىدۇ، قانتومۇرلار كۆپىدۇ، بۇرۇن ئىچى ۋە قاشلىرى قىچىشىپ تۇرىدۇ. تومۇر ھەركىتى چوڭ، توم، تېز بولىدۇ.

سۇيىدۇك قويۇق ۋە قىزىل رەڭدە كېلىدۇ. قىزىتما داۋاملىق بىر خىل بولۇپ، تەر چىقمايدۇ. ئۇفۇنەت بولسا بۇ ئالامەتلەرگە تەرەت ۋە سۇيىدۇكنىڭ سېسىق پۇراقلىق كېلىشى قوشۇلىدۇ ھەم بەدەنلىرى قۇرغاقلىشىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئەڭ تېز چارە باسلىق ياكى ئوكھەل تومۇرىدىن قان ئېلىشتىن ئىبارەتتۇر. بۇ كېسەلدە ماددىنى پىشۇرىشنى كۈتۈشنىڭ ھاجىتى يوق. كېسەللىكنىڭ 7 - كۈنلىرىگىچە، ئەگەر بوھران بولمىسا قان سېلىپ ئالغاندىن ياخشى چارە يوق. ئەگەر قان ئېلىشقا توغرا كەلمەيدىغان ھاللار بولسا غولنى تىلىپ لوڭقا (ھىجامەت) قويۇش لازىم. ئاغرىق گودەك بالا بولسا زۇلۇك سېلىپ قان ئېلىۋەتسە بولىدۇ. قاننى سوۋۇتۇش ئۈچۈن ھۇمماز، ئوتتۇج، لىمون سۇلىرى بېرىلىدۇ. ئەدەس (ئاچ قىزىل رەڭلىك پۇرچاق) نى سىركە بىلەن پىشۇرۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

ئۇفۇنەتلىك قىزىتمىدا، ئۇفۇنەت تومۇرىنىڭ سىرتىدا يەنى بىر ئەزادىكى ياللۇغلىنىش ياكى ئىششىق جاراھەتكە ئالاقىدار بولسا، ئۇنى قوشۇلغان قىزىتما (تەپى ئارىزى) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنداقتا سەۋەپ بولغان ياللۇغلىنىشنى ئىششىق جاراھەتنى ساقايتىش بىلەن قىزىتما قايتىدۇ. ئەگەر ئۇفۇنەت تومۇر ئىچىدە بولسا، قان ئالغاندا قاننىڭ قىيامى سۇيۇق ۋە سەپرا ئارىلاش چىقسا (سېرىققا مايىل بولسا)، چىلان شەرىۋىتى ۋە ئانار شەرىۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر قان قويۇق بولسا، ئاددى

ئىسكەنجىۋىل، كاسىن يىلتىزى ۋە چۇچۇكبۇيا يىلتىزى قاينىتىلغان سۇ بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن تەمىرى ھىندى ۋە ئەينۇلىنى قايناقسۇغا چىلاپ، تەمىنى چىقىرىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ ۋە شەۋىتى پىنەپشە (74 - نۇسخە) شەۋىتى خەشخاش (69 - نۇسخە) دىن بېرىلىدۇ. شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، بۇ خىلدىكى قىزىتمىلاردا دەرھال ھارارەت چۇشۇرگۇچى سوغاقلىق دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بۇنداق قىلغاندا بەلغەمدىن بولغان سەرسام پەيدا قىلىشى مۇمكىن، تەرەتنىڭ دائىم يۇمشاق كېلىشىگە دىققەت قىلىش لازىم. بوھراندىن كېيىنمۇ 2 سەر كاسىن سۇيىگە بىر يېرىم سەر ئىسكەنجىۋىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئەگەر كېسەلدە يوتەل بىللە بولسا چۇچىمەل دورىلارنى بەرمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭ ئورنىغا بىيە ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابلىرىنى بىنەپشە شەۋىتىگە قوشۇپ بەرسە بولىدۇ. ئەينۇلا سۇيى يوتەل قوزغىمايدۇ. بۇ خىلدىكى قىزىتمىلاردا يوتەل بولسىمۇ ئۇنى بېرىشكە بولىدۇ، دائىم ئىچىپ تۇرۇشقا چىلان سۇيى ياكى چىلان شەۋىتى بېرىلىدۇ.

سەپرادىن بولىدىغان قىزىتما (تەپى سەپراۋى)

سەپرادىن بولغان قىزىتما ئاددى ۋە مۇرەككەپ دەپ 2 تۈرگە بولىدۇ. ئاددىسى خاس سەپرادىن بولۇپ، مۇرەككەپى باشقا ماددا ئارىلاشقانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. **ئالامەتلىرى:** بەدەندە سەپرا غالىپلىغىدىن باشقا تۈۋەندىكىچە ئالامەتلىر كۆرىلىدۇ:

(1) ماددا تومۇر ئىچىدە بولسا، قىزىتما بىر كۈن بولۇپ، بىر كۈن بولمايدۇ (يوشۇرىنىدۇ) تىبابەتتە بۇنى "غەيىبى لازىمە" دەپ ئاتىلىدۇ. ئەگەر ماددا يۈرەككە يېقىنراق بىرەر تومۇرلاردا بولسا، ئومۇمى ئالامەتلەر ناھايىتى ئېغىر بولۇپ، بۇنىسى ئادەتتە كېزىك (تەپى مۇھرىقە) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پەرقى مۇنداق:

(1) تەپى مۇھرىقىدە (كېزىكتە) قىزىتما ۋە بەدەن-دىكى سانچىق غەيىبى لازىمىگە قارىغاندا زىيادە بولىدۇ.
(2) تەپى مۇھرىقىدە ئومۇمى بەدەن بوشىشىپ كېتىدۇ.

(3) تەپى مۇھرىقىدە تىنچسىزلىنىش، قۇرۇق ھو، ئەقلى-ھۇشى جايىدا بولماسلىق، جويلۇش (ھەزىيان)، تىل قارامتۇل گەز باغلاش، يۈرەك سېلىش ۋە ھۇشدىن كېتىش ئەھۋاللىرى كورۇلىدۇ. ئەمما غەيىبى لازىمىدە بۇ ئەھۋاللار بولمايدۇ.

(2) ماددا تومۇرنىڭ سىرتىدا بولسا، غەيىبى دائىرە-رە دەپ ئاتىلىپ، يەككە بولسا غەيىبى خالىس، باشقا ماددىلار مەسىلەن، بەلغەم قوشۇلۇپ كەلگەن بولسا، غەيىبى غەيىرى خالىسە دىيىلىدۇ. ئەگەر بەلغەم بىلەن بىرىكىشى مۇستەھكەم بولمىسا شەتروۇل غەيىپ دىيىلىدۇ. غەيىبى دائىرىدە قىزىتما بىر كۈن بولۇپ، بىر كۈن بولمايدۇ. غەيىرى خالىستى بىر كۈن قىزىتما ئېغىر بولسا، ئىككىمە-چى كۈنى يەڭگىل بولىدۇ. ئىككىسى بىرلەشكەندە قە-

زىتتا ھەر كۈنى بولىدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا شەتەرلۈ غەيىپ بەلغەم ۋە سەپرانىڭ بىرىكىشىدىن ئىبارەت مۇرەككەپ ماددىدىن تۇغۇلغان قىزىتتا بولۇپ، ماددىلارنىڭ ئۇقۇنەت ھاسىل قىلغان ئورنى باشقا بولىدۇ. خىلىتلار ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى قىزىتمىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ئايرىش مۇمكىن. چۈنكى قىزىتمىنىڭ ئۆزگىرىش ۋە ئالاھىدىلىكلىرى — ماددىنىڭ ئاز-كوپلىقى، قويۇق - سۇيۇقلۇقى، بىرىكىشىنىڭ مۇستەھكەم ياكى مۇستەھكەم ئەمەسلىكىگە باغلىق بولۇپ، چېكى مۇقىم ئەمەس. بەزىدە غەيىپى دائىرە بەلغەمى دائىمىگە ئارىلىشىپ كېتىدۇ. بۇ شەتەرلۈ غەيىپ خالىسە دىيىلىدۇ. ياكى غەيىپى لازىمە بەلغەمى دائىرەگە ئارىلىشىپ كېتىدۇ ۋە ھاكازا. بەزىدە بەلغەم سەپرادىن زىيادە (غالىپ) بولسا، بەزىدە ھەر ئىككىلا خىلىت باراۋەر بولىدۇ. روشەن بولغان خاسراق ئالامىتى شۇكى، قىزىتتا بىركۈن ئۇزۇنراق بولسا، ئەتىسى قىزىتتا ۋاقتى قىسقا ئەمما ھارەت ئۈستۈن ۋە بىئاراهلىق كۆپ بولىدۇ. بەلغەم غالىپ بولسا، قىزىتمىنىڭ نوۋىتى ئۇزۇنراق، جۇغۇلداس، بەدەن تېرىسى قورۇلۇش، ئەسەش بىلەن كېرىلىش ئازراق بولىدۇ. تومۇر ھەركىتى تەرتىپسىز، قۇل - پۇتلىرى سوغاق بولۇپ، تەسلىكتە ئىسسىيدۇ، سۇيدۇك ئاق كېلىدۇ. سەپرا غالىپ بولسا، قىزىتمىنىڭ تەكرارلىنىش ۋاقتى قىسقاراق، تەشلىق زىيادە بولىدۇ. تىترەش ۋە

توڭۇش كوپ بولۇپ، ئاسانلا ئىسسىپ كېتىدۇ. سۇيىدۇك رەڭلىك كېلىدۇ. ئەگەر سەپرا بىلەن بەلغەم تەڭ بولسا، ئالامەتلەرمۇ ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەپرا ماددىسىغا قارىتا سوغاقلق ۋە ھوللۇك تەدبىرلىرى قوللىنىلىدۇ. ئەگەر قەۋزىيەت بولسا سۈرگە بېرىش، ماددا پىشقان بولسا تازىلاش لازىم. ئەمما ماددا تومۇر ئىچىدە بولسا قاتتىق سوغاقلق قىلىشقا بولمايدۇ. بەلكى ماددىنى پىششۇرۇپ چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. قىزىتما ئەھۋالىغا قاراپ ئۇنى پەسەيتىش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. بولۇپمۇ كېزىكتە شۇنداق قىلىش زورۇر. دەسلەپكى چاغلاردا مونچىغا چۈشۈرۈشكە بولمايدۇ. ئەينىۋىلدىن 30 دانە، تەمىرى ھىندىدىن 1 سەر ئېلىپ، قايناقسۇغا چىلاپ، تەمىنى چىقىرىپ ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە ئارپا سۈيى بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ۋە لىمون شەرىۋىتى بىلەن سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى قوشۇپ بېرىلىدۇ. يۈرەكنىڭ قىزىقلىغىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئاق سەندەلنىڭ سىركە قوشۇپ چۈچەك مەل قىلىنغان شەرىۋىتى بېرىش لازىم. لاتىدەك بىر نەرسىنى سەندەل گۈلابى ۋە ئازراق كاپۇر قوشۇلغان سۇ بىلەن نەمدەپ كۆكرەككە قويۇش لازىم. ئەگەر ھارارەت بەك زىيادە بولسا قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. تەرەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن تەمىرى ھىندىنىڭ تەمى چىقىرىلغان سۇغا سىرخىشت قوشۇپ بېرىش كېرەك. ياكى

خىيارى شەنبەرنىڭ تەمى چىقىرىلغان سۇغا يېمىش سۇ-
لىرى قوشۇپ بىرىلسە بولىدۇ. ئەمما قاتتىق سۇرگە بې-
رىشتىن ساقلىنىش كېرەك. غىزا جەھەتتىن مىزاج كەي-
پىياتىغا مۇۋاپىق بولغان سوغاقلىق غىزالارنى بېرىش
مۇمكىن. ئەمما كېسەل كىشىنىڭ مەيلىگە قاراش مۇھىم.
قىزىتمىلاردا سۇرگە ئۈچۈن تەرەنجىۋىل بېرىشكە بولماي-
دۇ. چۈنكى تەرەنجىۋىل ھارارەت تەسىرى بىلەن ئوز-
گىرىپ سەپراۋى كەيپىياتلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن تەمى ھىندى ۋە ئەينۇلا سۇلىرىنى قو-
شۇپ ياكى ئۇنىڭ ئورنىغا سىرخىشت بېرىلىدۇ. ئومۇم-
لاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، قىزىتمىلارنى داۋالاشتا ماددى ياكى
ماددىسىزلىقى، مۇرەككەپ ياكى ئاددىلىقىنى نەزەرگە ئې-
لىپ تەدبىر قوللىنىش كېرەك.

سەپرادىن بولغان كېزىك (تەپى مۇھرىقە سەپراۋى)
ھەددىدىن كۆپ تەرلەپ كېتىش، ئېغىر دەرىجىدە بۇرۇن
قاناش، ئۇيقا بېسىش، نەپەس قىيىنلىشىش، تولا چۈش-
كۈرۈش ۋە ئايلىنىپ كېتىشتەك ئەھۋاللار بىلەن مۇرەك-
كەپلىشىدۇ. بۇنىڭغا ئوز ۋاقتىدا چارە قىلىش كېرەك.
ئەمما بوھران ۋاقتلىرىدا بولغان تەرلەش ۋە بۇرۇن
قاناشلار ئېتىدالدا بولسا، كېسەللىك ئالامەتلىرى يېنىك-
لىشىدۇ. بۇنى يۇقۇرقىلارغا ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىق
كېرەك. مۇرەككەپلىشىشلەرگە ئاغرىقنىڭ مىزاجى ۋە
كەيپىياتىغا قاراپ چارە قىلىش لازىم.

(1) كوپ تەرلەپ كەتكەندە كېسەل ماغدۇرسىزلىق-
نىدۇ. بۇ چاغدا ئۇستىدىكى كىيىملىرىنى يەڭگىلەشتۈر-
رۇش ۋە ئوي ھاۋاسىنى تەڭشەش كېرەك. ئەمما بە-
دەندىكى تەرلەر سۇرتۇپ تازىلانمايدۇ. ئوزى قۇرۇپ
كېتىشىگە يول قويۇلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بول-
مىسا سەمغى ئەرەبىنى ئىسسىقۇغۇل ۋە بىيە لۇتابلارغا
قوشۇپ بەدەنگە سۇرتىلىدۇ.

(2) بۇرۇن بەك قاناپ كەتسە، باش ۋە پىشانىگە
مۇز قويۇلىدۇ. پۇت، قول، ئەمچەكلەر تېگىلىدۇ ۋە بۇ-
رۇن قاناش كېسىلىدە سوزلەنگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

(3) ئۇيقا بېسىش، دائىم ئۇخلاش ئەھۋاللىرى
ئادەتتىن تاشقىرى بولسا، ھەر خىل چارىلار بىلەن يەنى
ئۇنىلۇك سوزلەش، شەپە قىلىش، قول - پۇتلىرىنى چىڭ
تېگىش ئارقىلىق ئۇخلاتماسلىق مۇمكىن.

(4) نەپەس قىيىنلىشىش، دەم سىقىش ئەھۋاللىرى
بولغاندا، كۆكرەككە بىنەپشە ۋە موم يېغى سۈركىلىدۇ
ياكى بىنەپشە، ئاق لەيلى، زاراڭزا مېغىزلىرىنى سوقۇپ
موم يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆكرەككە چېپىلىدۇ.

(5) چۈشكۈرۈك تولا كېلىپ زادى ئارام بەرمىسە
ئاغرىقنىڭ كوز، پىشانە، بۇرۇنلىرىنى ئۇۋۇلاش كېرەك.
كىكرەك پەيدا قىلىدىغان نەرسىلەرنى بېرىپ كىكىرتىش،
بىنەپشە يېغىنى بىر ئاز قىزىتىپ قۇلاق ئىچىگە بىر تامچە
تامغۇزۇش ياكى گەدەنگە ئىسسىق ئوتكۈزۈش لازىم.

6) ھۇشىدىن كەتكەندە سەندەل، كاپۇرلارنى پۇ-
رۇتۇش بىلەن ئايلىنىپ كېتىش كېسەللىكىدە سوزلەن-
گەن چارىلار قىلىنىدۇ. ئىسكەنجىۋىلىنى قايناقسۇغا تەڭ-
شەپ كېسەللىك بۇرنىنى بىردەم تۇتۇپ تۇرۇپ گېلىگە
قۇيۇلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئاغرىق ھۇشىغا كېلىپلا قالماستە-
ن، بەلكى مەئدە ئېغىزىغا توپلىشىۋالغان ماددا ئىس-
كەنجىۋىلىنىڭ ياردىمى بىلەن تۈۋەنگە چۈشۈپ تەرەت
بىلەن چىقىپ كېتىشى مۇمكىن.

مۇرەككەپ تەپلىرىدە قۇرسى گۈل II،I (2 16 -
163 - نۇسخىلەر) نىڭ ئالاھىدە نەتىجىسى كورۇلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان قىزىتما (تەپى بەلغەمى)

بەلغەمدىن بولىدىغان قىزىتمىنىڭ ماددىسى تومۇر
ئىچىدە ياكى سىرتىدا يەنى كاۋاك ئەزالاردىن ئۆپكە،
ئۇچەي، مەئىدىلەردە بولىدۇ. ماددا ئۇفۇنەتلىگەندە ئىز
باسىدىغان قىزىتما (تەپى ئائىبە)، ئايلىنىپ تېۋرىدىغان
قىزىتما (تەپى دائىرە)، دائىمى قىزىتما (تەپى مەۋازىيە)
لەر پەيدا بولىدۇ. يەنى قىزىتما نوۋىتى بىر كېچە
كۈندۈز بولۇپ، قىزىتما ئاياغلاشماي تۇرۇپ ئىككىنچى
دەۋرى باشلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تۈۋەندىكى ئالامەت-
لەرمۇ كورۇلىدۇ:

(1) سۇيۇكنىڭ رەڭگى كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى
چاغلىرىدا ئاق سۇزۇك بولۇپ، ئاخىرقى دەۋرلىرىدە
قىزىل ۋە قويۇققا ئايلىنىدۇ.

(2) تومۇر ھەركىتى سۇس، كىچىك ۋە مۇختەلپ بولۇپ، كېيىن بىر تۇتاش تومۇرغا ئايلىنىدۇ.

(3) تەشئالىق بولمايدۇ. ئەگەر تۇزلۇق بەلغەمدىن بولسا ياكى سەپرا ئارىلىشىپ قالسا، تەشئالىق پەيدا بولىدۇ. لېكىن سەپرادىن بولغان قىزىتمىدىكىدەك بولمايدۇ.

(4) قىزىتما ئالدىدا كوگۇل ئايىنىدۇ ۋە ھو تۇتىدۇ، ئىشتەي تۇتىلىدۇ. بۇ مەئدە ئاجىزلىقى پەيدا بولغانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(5) بەدەن رەڭگى كۆككە (قەلەي رەڭگىگە) مايىل بولۇپ، يۈز، قاپاقلىرى سۇلاشقان ۋە كۆپۈپ قالغاندەك كۆرۈنۈشكە كېلىدۇ. بەدەنمۇ بوشاشقان، كۆكرەك ۋە بىقىنلاردا سانچىقسىمان ئاغرىشلار بولىدۇ.

(6) سول تەرەپ قوساقنىڭ يۇقۇرقى قىسمىدا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ، تال چوڭىيىدۇ.

(7) ئېغىز ئىچى نەم بولۇپ، تەمسىز (ئاجچىق ئەمەس) بولۇپ قالىدۇ.

(8) قەي قىلغاندا ياكى ئىچى سۈرگەندە بەلغەم بىللە چىقىدۇ. ئادەتتە تەرىتى يۇمشاق بولىدۇ.

(9) تەر چىقىش كەم بولۇپ، تەرلىگەندە ھەممە ئەزا تەكشى تەرلىمەيدۇ. يەنى باشتىن - ئاياققىچە تەر

چىقماستىن باش تەرلىگەندە ئاياق تەرەپ تەرلىمەيدۇ، ئاياق تەرلىگەندە باش تەرەپ تەرلىمەيدۇ. پۇت - قوللىرى سىقىرايدۇ (بوھران بولغاندا تەر كۆپ چىقىدۇ).

(10!) قىزىتىش سەپرادىن بولغان قىزىتىمدەك ئېغىر
ئۆتمەيدۇ، ئەمما ياخشى داۋالانمىسا قىزىتما ئايلاپ سو-
زۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن.

(11) قىزىتما باشلىنىش ئالدىدىكى توڭۇش،
تىترەش، ئەسنەش ۋە كېرىلىشلەر ماددىنىڭ تۇرىگە قا-
راپ ھەر خىل بولىشى مۇمكىن. يەنى بەزىلىرىدە تو-
ڭۇش بىلەن تىترەش ناھايىتى قاتتىق بولىدۇ. مۇنداق
قىزىتما بەزىگەك (تەپى لەرزە) دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىدە
تىترەش ۋە توڭۇش ئازراق بولىدۇ.

(12) ئادەتتىكى چاغلاردا كېسەل كىشى ئوزىدە
قىزىتما بارلىغىنى سەزمەيدۇ. تىۋىپ كېسەلنىڭ بەدىنىگە
قوللىنى قويۇپ تۇرغاندىمۇ قىزىقلىق سەزمەيدۇ. ئەمما
ئۇزۇنراق تۇتۇپ تۇرغاندا ھارارەت بارلىغىنى ۋە قىزىت-
مىنىڭ "تېگى - تېگىدىن" چىقىۋاتقانلىغىنى سېزىدۇ.

داۋاسى: بىر ھەپتىگىچە ھەسەل بىلەن تەييار-
لانغان ئىسكەنجىۋىل ۋە ھەسەل سۈيىگە زۇپا قاينىتىل-
غان سۇ قوشۇپ بېرىلىدۇ. بىر ھەپتىدىن كېيىن ئىس-
كەنجىۋىلگە كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ قوشۇپ ئىچكۈزۈپ
قۇستۇرىلىدۇ. ئەگەر دىل قىزىتما باشلىنىش (بەزىگەك
تۇتۇش) ئالدىدا قەي قىلدۇرۇلسا، مەنپەئەتى بەك ياخ-
شى. خاس ئىسكەنجىۋىل بىلەن ئوبدان قۇسمىسا، تۇرۇپ
ياكى ئۇرۇغىنى قاينىتىپ ئىچكۈزىلىدۇ. ئارىلاپ - ئارد-
لاپ رۇمبىدىياننى سوقۇپ گۈلقەن بىلەن بېرىلىدۇ. بە-

زىمىدە بۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا زىرە، پىننە ۋە مەستىكى
 قوشۇلىدۇ. قەۋزىيەت بولسا، داۋائىل تۇرۇت (164 -
 نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇنى ھەر كۈنى ئاخشامدا بىر مىس-
 قالدىن بېرىلسە بولىدۇ. ئەگەر كۆپرەك بېرىش لازىم
 بولسا، 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ ۋە ئەتىسى سەھەردە 5
 مىسقال گۈلقەن يىگۈزۈپ ئاشتىدىن كېيىن بىر سەر
 ھەسەل بىلەن تەييارلىغان ئىسكەنجىۋىل بېرىلىدۇ. مىڭە
 زەئىپلىك ئالامەتلىرى مەسىلەن، باش ئاغرىش، باش
 قېيىش قاتارلىقلار بولسا ئىسكەنجىۋىل بېرىشكە بولماي-
 دۇ. بەلكى گۈلقەننى يالغۇز ياكى بېدىيان ئەرەقىگە
 قوشۇپ بېرىش كېرەك. بەلغەم سۈرگىسى بېرىپ تازى-
 لانغاندىن كېيىن، قۇرسى گۈل ۋە قۇرسى غاپەس بېرىد-
 ىلىدۇ. ئەگەر ئېھتىياج بولسا، سۈيدۈكنى ياخشىلاش ئۇ-
 چۇن مائىل ئۇسۇل بېرىش كېرەك. ئاندىن كېيىن بې-
 دىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىلتىزى، ئىزخىر 5 مىسقال-
 دىن، پىرسياۋشان 4 مىسقال، مەستىكى، چىڭسەي ئۇرۇغى
 2 مىسقالدىن ئېلىنىپ، ئۇلارنى 20 سەر سۇ بىلەن
 قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ بىر سەر گۈلقەن
 بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ. ماددا سۈرگىلىرىدىن كېيىن بەزى
 قۇۋۋەتلىك دورىلار يەنى تەرياقى فارۇق ياكى مەشدىرتۇس
 (25 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ. قارىمۇچ،
 قاقىلە ئۇرۇغى ۋە ناۋاتنىڭ ھەربىرىنى 3 مىسقالدىن
 ئېلىپ سوقۇپ يىپەشكە بېرىلسە بەزىگە (تەپى لەرزە)

نى داۋالاشتا زور ئۇنۇم بەرگەنلىكى توغرىسىدا خاتىرىدە -
 لەر بار. غىزاسى ئۈچۈن ئوقۇت خۇشپۇراق دورىلار بى -
 لىن پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. ئاقلىغان ماشىنا تەمسىغا
 زىرە، جۈسەي ۋە بىر ئاز سېرىق چېچەك سېلىپ بېرىد -
 لىدۇ. ئومۇمەن غىزاسىغا بەلغەمنى كەسكۈچى نەرسىلەر
 مەسىلەن، سىركە، دارچىن قاتارلىقلارنى قوشۇپ بېرىش
 لازىم. بەلغەمنى زىيادە قىلغۇچى سۇت ۋە بېلىق گوشە -
 دىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

سەۋدادىن بولغان قىزىتما (تەبىئىي سەۋداۋى)

سەۋدادىن بولىدىغان قىزىتما خۇددى باشقا قىزىت -
 مىلارغا ئوخشاش تومۇر ئىچىدە ۋە تومۇر سىرتىدا ئۇفۇ -
 نەتلەنگەن قىزىتما دەپ بولىدۇ. چۈنكى سەۋدا تومۇر
 ئىچىدە ئۇفۇنەتلەنگەندە (مىكروپ قوشۇلغاندا) قىزىتما
 يەڭگىل باشلىنىپ، ھەر 4 كۈندە بىر قىزىتما پەيدا
 بولىدۇ. بۇ توت كۈنلۈك قىزىتما (تەبىئىي رۇبىي) دەپ
 ئاتىلىدۇ. ئەگەر تومۇر سىرتىدا ئۇفۇنەتلەنسە قىزىتما
 قاتتىق باشلىنىپ ئايلىنىپ تۇرىدىغان توت كۈنلۈك قىزىتما
 (تەبىئىي رۇبىي دائىرە) دەپ ئاتىلىدۇ. يۇنان تىلىدا تىرىتا -
 ۋۇس يەنى قايتىلانما قىزىتما ① دىگەن ئاتالغۇ بىلەن
 ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كىتاپنىڭ بىرىنچى قىسمىدا سۆزلەپ
 ئوتۇلگىنىدەك غەيرى تەبىئىي سەۋدانىڭ پەيدا بولىشىغا
 ① قايتىلانما قىزىتما ئادەتتە "ئورە كىزىك" دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

خىلىتلارنىڭ كويۇشى سەۋەپ بولىدۇ. دىمەك غەيرى تەبىئى سەۋاددىن بولغان كېسەللەردە، جۈملىدىن سەۋاددىن بولمىدىغان قىزىتمىلاردا ئەسلى كويىگەن خىلىتنىڭ ئالامەتلىرىمۇ بىللە كېلىدۇ. مەسىلەن:

(1) سەپىرا كويۇشتىن پەيدا بولغان سەۋداۋى قىزىتمىلاردا ھارارەت ئۈستۈن، تومۇر ھەركىتى تېز، قاتتىق ۋە بىر تۇتاش، تەشنىلىق كۆپ بولۇپ، بەزى كىشىلەردە كوگۇل ئاينىشمۇ كۆرىلىدۇ.

(2) قانىنىڭ كويۇشىدىن بولغىنىدا — بەدەن كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلايدۇ، قارامتۇل رەڭگە كىرىدۇ. سۈيدۈك قىزىل، ئېغىز ئىچى تاتلىق بولىدۇ.

(3) بەلغەم كويىگەندىن كېيىن بولسا — سۈيدۈك ئاق ۋە قويۇق، قىزىتما ئېتىمالدا، تومۇر ھەركىتى ئاستا بولىدۇ، ئۇيىقىسىرايدۇ.

(4) سەۋدا كويۇشتىن بولسا — جويلۇش، قۇرقۇش قاتارلىق ئەھۋاللار بىلەن بىللە ھارارەت يۈز بېرىدۇ ۋە بەدەن قارامتۇل ياكى كۆك رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

سەۋداۋى قىزىتمىلارنىڭ تۆت كۈندە قايتىلىنىش دائىرىسىدىن (تەبى رۇبى دائىرە)دىن چىقىپ كەتكەنلىرى بەش كۈنلۈك قىزىتما (تەبى خەمىسە)، 7 كۈنلۈك قىزىتما (تەبى سەبئە)، 9 كۈنلۈك قىزىتما (تەبى تۇسسە) ۋە ھاكازا دەپ ئايرىلىدۇ. يەنى قىزىتمىنىڭ پەيدا بولۇش كۈن ئارىلىقلىرىغا ئاساسلىنىپ ئاتىلىدۇ.

داۋاسى: سەۋەپچى خىلىتلەرگە ئاساسەن داۋالاش

ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئالدى بىلەن ماددا پىشۇرۇلىدۇ، ئاندىن:

(1) قاننىڭ كويۇشىدىن بولغان سەۋداۋى قىزىت -

مىلاردا ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئىستېمۇن

(20 - نۇسخە) ۋە مائىل جىبىن بېرىلىدۇ. ياكى سەۋدانى

تازىلىغۇچى ئانچە ئىسسىق بولمىغان دورىلار مەسىلەن،

بىنەپشە، شاتەرە، سېرىق ھېلىلە، خىيارى شەنەبەر ۋە

تەرەنجىۋىلەر مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىنىپ، قائىدە بويىچە

قايىنىتىپ بېرىلسە بولىدۇ. ھارارەت زىيادە بولسا، ئىس -

كەنجىۋىل بىلەن كاسىن سۈيى بېرىش كېرەك. ئۇزاق

بولغان كېسەللەردە قىزىتما بولغان كۈنلەردە 5 مىسقال

گۈلقەن ئىسكەنجىۋىل بىلەن بىللە بېرىلىدۇ. كېسەل

باشلىنىپ 20 كۈن بولغاندىن كېيىن سۈرگە ئۈچۈن

مەتبۇخى ھېلىلە، مەتبۇخى شاتەرە (38 - نۇسخە) بېرىش

مۇمكىن. غىزاسىغا قۇش گۆشى شورپىسىغا ئوقۇت سېلىپ

ماش گۈرۈچ قىلىپ بېرىلىدۇ.

(2) بەلغەم ۋە سەۋدا كويۇشتىن بولغان قىزىتىمدا

ھەر ئەتىگەندە ھەسەل بىلەن تەييارلىغان گۈلقەندىن

بىر سەر، بېدىيان سۈيى $1\frac{1}{2}$ سەر، چىڭگەي ئۇرۇغى

سۈيىدىن بىر سەر ئېلىپ ئۇلارنى قوشۇپ بىر قايىنىتىپلا

ئىچىشكە بېرىلىدۇ. قىزىتما تۇتۇش ئۈستى كەلگەن كۈنى

ھارارەت باشلانغاندا سېرىق چىچەك ۋە لوبو ئۇرۇغىنى

سوقۇپ، ئىسكەنجىۋىل بىلەن بىللە بېرىپ قۇستۇرۇش كېرەك. قۇسۇپ بولغاندىن كېيىن، مەئىدىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن گۈلقەن بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ياز پەسلى بولسا ئىسكەنجىۋىل بۇزۇرى (101 - نۇسخە)، قىش كۈندە لىرىدە مەجۇنى فىلاپى (144 - نۇسخە)، مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە) بېرىپ، ماددا پىشقاندىن كېيىن، كۈچلۈك سۈرگىلەردىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)، ھەببى ئەپتىمۇن (14 - نۇسخە) ياكى ئەپتىمۇن سالغان ئىسكەندە جىۋىللەردىن بىرى بېرىلىدۇ. بۇ خىلدىكى قىزىتىملاردا تال ۋە جىگەرنىڭ قېتىپ قېلىشى ئۇچرايدۇ. بۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرسى زىرشك (شەرۋىتى زىرشك (89 - نۇسخە) بولسىمۇ بولىدۇ). قۇرسى غاپەس (165 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3) سەپرا كويۇشتىن بولغان قىزىتما — بۇ قىسمىدا كورلىدىغان چارلىر ھول - سوغاقلقتىن ئىبارەت بولىشى لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن كاسىن ئۇرۇغى، تۈز ۋە ئەگرى خاڭگا ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ ئىسكەنجىۋىل ياكى ئەينۇلا ۋە تەمرى ھىندى سۇلىرى بىلەن بېرىلىدۇ. ئارپا سۈيى، چىلان شەرۋىتى ۋە سېمىز ئوت شىرىسىنى قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر سۈرگە بېرىشكە ھاجەت بولسا بىنەپشە، ئەينۇلا، سەرپىستان، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، كاسىن ئۇرۇغىنى ئېھتىياجغا لايىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ سۈيىگە

خىيارى شەنبەر سېلىپ، ئىپرىگەندىن كېيىن سۇزۇپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يۇقۇرقى چارىلەردىن كېيىن مەتبۇخى
ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. غىزاسغا ماش گۇرۇچنى
چۇچىمەل قىلىپ بېرىش كېرەك. ئەگەر كېسەل بەك
زەئىپ بولسا قۇش گۈشلىرىنىڭ شورپىسى ۋە گۈشنى
بېرىش مۇمكىن.

جۇدەتكۈچى قىزىتما (تەپى دىق)

ھارارىتى غەرىبەنىڭ پەي، تومۇر سوۋگەكلەرگە
ۋە باشقۇرغۇچى ئەزا (ئەزايى رەئىسە)لارغا
تەسىر قىلىشى بىلەن ئۇلاردىكى 3 خىل سۇيۇقلۇقنى
زايا قىلىش نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان قاتتىق ئۇرۇقلاش
جۇدەتكۈچى قىزىتما دەپ ئاتىلىدۇ. تىبابەت ئىلىمىدە
بەدەندە 3 خىل سۇيۇقلۇق مەۋجۇت دەپ ھىساپلىنىپ
ئۇلارنىڭ بەدەندىكى ئەھمىيىتى تۆۋەندىكىچە ئىزاھلىنىدۇ.
بىرىنچى سۇيۇقلۇق: بەدەندىكى ئۇششاق قان تو-
مۇرلار ئارقىلىق پەي، ئەسەپ، سوۋگەكلەرگە تارقىلىپ
تۇرىدىغان سۇيۇقلۇق بولۇپ، بەدەندە ئوزۇق ماددىسى
يېتىشمىگەندە ئۇنىڭ ئورنىغا سەرپ بولۇپ ماددا ئالما-
شىش (مايە تەھەللۇل)نى ئورۇندايدۇ.
ئىككىنچى سۇيۇقلۇق — بەدەندىكى گۈش ۋە تېرىگە

① دىق: دىققىتى دىگەن سۆزدىن ئېلىنغان بولۇپ، سىزىپ
كەتكەن، نېپىزلىشىپ كەتكەن ۋە قاتتىق ئۇرۇقلاپ كەتكەن
دىگەن مەنانى بېرىپ سىل - تۇپىركۇلۇزنى ئىپادىلايدۇ.

ئارىلاشقان، تېخى قاتمىغان بىر خىل سۇيۇقلۇق. ئۇ ئەزالارنىڭ نەملىگىنى ساقلايدۇ. كۈچلۈك ھارارەت تەسىرى بىلەن تارقاپ كېتىپ ئورنىغا يېڭىسى كېلىپ تۇرىدۇ. ئۈچىنچى سۇيۇقلۇق — پەي تارامۇش، سوڭەكلەرگە ئارىلىشىپ كەتكەن سۇيۇقلۇق بولۇپ، مەزكۇر ئەزالارنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش خىزمىتىنى ئورۇنلايدۇ.

بىرىنچى سۇيۇقلۇق بەدەندىكى ئاساسىي سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئۇنىڭ ئارتۇقچە سەرپ بولۇپ كېتىشى باشقا سۇيۇقلۇقلارنىڭ سەرىپىياتىنى كۈچەيتىۋېتىدۇ. بۇ سەرپ بولۇش كۆپىنچە يۈرەك ئەتراپىدىن باشلىنىدۇ. بىرىنچى سۇيۇقلۇقنىڭ سەرپ بولۇشى جۈدە تېكۈچى قىزىتمىنىڭ باشلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، باشقا قىزىتمىلاردىن پەرق قىلىش قىيىن. بىرىنچى سۇيۇقلۇق تۈگەپ ئىككىنچى سەرپ بولۇشقا باشلىغاندا، جۈدە تېكۈچى قىزىتما 2 - دەۋرگە ئىرىگەن بولۇپ، كېسەل ئورۇنلاشقا باشلايدۇ. ئىككىنچىسى تۈگەپ، ئۈچىنچىنىڭ سەرپ بولۇشقا باشلىشى جۈدە تېكۈچى قىزىتمىنىڭ 3 - دەۋرى يەنى ئەڭ يامان دەۋرى ھېساپلىنىدۇ. چۈنكى بۇ دەۋردە كېسەل بەك ئورۇنلاپ كېتىدۇ، تېرىلەر چۈشىدۇ (كېپەكلىشىدۇ)، ھەتتا چاچ، تۈكلەرمۇ چۈشۈپ كېتىدۇ. كېسەل "بىر تېرە - بىر سوڭەك" دىن ئىبارەت بولۇپ، گۆش قالماي خۇددى ئۈلۈكتەك ھالغا كېلىپ قالىدۇ. داۋالاش قىيىن. سەۋەپلەرى: 1) ئوتتۇشتىكى سەۋەپلەر (ئەسۋابى

سابىقە) يەنى باشقا كېسەللەرنىڭ ئاقىۋىتى بولۇپ كېلىدۇ. مەسىلەن، كېزىك (تەپى مۇھرىقە)، ئىسسىقتىن بولغان كۆكرەك پەردىسىنىڭ ياللۇغى، بىر كۈنلۈك قىزىتما، بەلغەمدىن بولغان قىزىتما ئاشقازان، بورەك، ئوپكە ۋە جىگەر قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئىسسىقتىن بولغان ياللۇغ-لىرىنىڭ ئاسارتى بولۇپ كېلىدۇ. دىمەك بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارنى داۋالاشتا دىققەت قىلىمسا، جۈدەتكۈچى قىزىتماغا ئايلىنىپ قالىدۇ. ئۇفۇنەتلىك قىزىتما-مىلار بورەككە كۆپرەك تەسىر بەرگەنلىگى ئۈچۈن بۇ خىلدىكى قىزىتىملار ئاسانلا جۈدەتكۈچى قىزىتماغا ئايلىنىدۇ. كېسەل ئەھۋالىنىڭ ئېغىرلىغىغا ۋە ماغدىرىسىزلىغىغا قاراپ بەزى تىۋىپلار ئىسسىقلىق دورىلارنى (مەسىلەن، داۋائىلمۇشكى، مائۇل لەھمى) بېرىپ خاتا قىلىدۇ-دە، جۈدەتكۈچى قىزىتما كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) تاشقى سەۋەپلەر (ئەسبابىي بادىئە): غەم، قورقۇنچ، ئاچچىقلىنىش قاتارلىق نېرۋا پائالىيەتلىرى (ھەرىكەتلىك نەفسانى) ياكى ئارتۇقچە جاپا چېكىش، ئاچ قېلىش (بولۇپمۇ قۇرۇق ئىسسىق مىزاجلىقلار ئاچ قېلىش) تىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) تومۇر ھەرىكىتى قاتتىق، زەئىپ بىر تۇتاش بولىدۇ. قىزىتما بوش بولۇپ، سىرتتىن تۇتۇپ كۆرگەندە ئاسان بىلىنمەيدۇ. سۇيۇقنى ئىنچىكە-لىپ تەكشۈرۈپ كۆرگەندە ياغ تامچىلىرى بارلىغى بىلىدۇ.

نىدۇ. كېسەل ئورۇقلاشقا باشلىغاندىن كېيىن، ھارارەت كۆتىرىلىدۇ. تومۇر ھەركىتى توم ۋە كۈچلۈك بولۇشقا باشلايدۇ. بۇنداق چاغلاردا (ھازارەت ئۈستۈن بولغان چاغلاردا) بەزى كىشىلەر ئوزۇقلىنىشىنى چەكلەپ قويدۇ. مۇنداق قىلىش خاتا. ئۇلار جۈدە تىكۈچى قىزىتىمدا باشقا قىزىتىملاردەك قۇۋۋەتلىك غىزالار (ئوزۇقلۇققا باي تاماق - لار)نى بەرگەندە قىزىتما كۈچىيىپ كېتىدۇ دەپ قارايدۇ. ئەمما جۈدە تىكۈچى قىزىتىمدا ئۇنداق بولمايدۇ.

(2) جۈدە تىكۈچى قىزىتما ئىككىنچى دەۋرگە بارغاندا كوز ئالمىسى ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ. ۋە كوزدە قۇرۇق چاپاقلار پەيدا بولىدۇ. بەدەندىكى سۈڭەكلەرنىڭ قىرغاق - لىرى روشەن چىقىپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال بولۇپمۇ بەل ساھەسىدە كۆپرەك كۆرىنىدۇ. سۈڭەكسىز بوشلۇق جايلار تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىپ كېتىدۇ. پىشانە تېرىلىرى قورۇقلى - شىپ، قاپاقلرى ئېغىرلىشىپ كوزنى ئاچالماي قالىدۇ. بويۇن ئىنچىكىلىشىپ، قاڭشار ئۇچلۇق بولۇپ قالىدۇ.

(3) جۈدە تىكۈچى قىزىتما 3 - دەۋرگە كەلگەندە كېسەلنىڭ چېچى چۇشۇپ، تېرىلىرى كىپەكلىشىپ چۇ - شۇشكە باشلايدۇ. بەدەندە تېرە ۋە سۈڭەكتىن باشقا نەرسىنىڭ ئەسرى قالمايدۇ. بۇ ئۆلۈم ئالدىدىكى بەلگىدۇر. **داۋاسى:** جۈدە تىكۈچى قىزىتما ئىككىنچى ئېنىقلان -

غاندىن كېيىن دەرھال داۋالاشنى باشلاش، داۋالاش كېسەل بەدىنىنى ھوللەشتۈرۈش ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىشى لازىم.

(1) ئاق سەندەل گۈلابى، قىزىلگۈل گۈلابى، يۇمغاقسۇت سۇلىرى بىلەن نەملەنگەن لاتىا كېسەلنىڭ كۆكرىگىگە قويىلىدۇ. سېمىز ئوت يىرپۇرمىغى، ھەممىشۋا سۈيى، گۈل يېغى ۋە بىنەپشە يېغىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەك ۋە غولىغا قويىلىدۇ. ئەمما بۇلارنى ئىشلىتىشتە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراش لازىم. ئەگەر كېسەلدە تىترەش پەيدا بولسا نەمدەلگەن لاتىنى بىرئاز ئىستىپ قويۇش؛ قاپاق مېغىزىنىڭ يېغى، بىنەپشە يېغىنى غول، كەندىك، ئالغان، تاپان، بۇرۇن، قۇلاق ۋە سوڭغا سۈركەش كېرەك.

(2) سۇت، قېتىق بىلەن داۋالاش جۇدەتكۈچى قىزىتىدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. سۇت، قېتىق بېرىشتە تۈۋەندىكى بىر قانچە ئىشلارغا دىققەت قىلىش لازىم.

(1) جۇدەتكۈچى قىزىتىدىن باشقا قىزىتىلار بولماسلىقى كېرەك.

(2) ئاغرىقنىڭ بەدىنىدە ئۇفۇنەتلەنگەن باشقا خىلىتلارنىڭ بولماسلىقى كېرەك.

(3) كېسەلدە سۇت ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۇ - رۇپ كېتىدىغان ياكى مەئىدە سۇت ئۇيۇپ قېلىپ، پىشلاق بولۇپ قۇسىدىغان ئەھۋاللىرى بولماسلىقى كېرەك. شۇنىڭدەك كېسەلگە سۇت بەرگەندىن كېيىن سۈتنى ئۇ - يۇتىدىغان دورا ۋە تاماقلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

بېرىلىدىغان سۇت ئۆشكە ياكى ئىشەك سۈتىدىن بىرى بولسا بولىدۇ. ئىشەك سۈتى تەجرىبىدىن ئۆتكەن، سۇت بىلەن داۋالاشتىكى ئۇسۇل چارلار ۋە سۈتنىڭ

مىقدارى توغرىسىدا ئۆپكە سىلىنى داۋالاشتا تەپسىلىي سۆزلەنگەن، شۇنىڭغا قارالسا بولىدۇ. ئەگەر سۇت بەرگەندە بىرەر غەيرى ئەھۋاللار يۈز بەرسە، سۇت بېرىشنى توختىتىپ، تاۋۇز، تەرخەمەك ۋە سېمىز ئوت سۇلىرىنى ئىچى-كۈزۈش ياكى قۇرسى كافۇر بېرىش كېرەك. ھەم بىنەپشە شەرىتى بىلەن ئەينۇلا سۈيى بېرىپ تەرتىبىنى يۇمشىتىش ئارقىلىق سۈتنىڭ تەسىرىنى چىقىرىپ تاشلاش كېرەك.

قېتىق بەرگەندە ئەگەر ئۇفۇنەتلىنىش ئەھۋاللىرى بولسا توۋەندىكى قۇرس بىلەن بىللە بەرسە بولىدۇ:

تاباشىر 4 مىسقال، قىزىلگۈل 6 مىسقال، تۈز، ئەگرى تەرخەمەك ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزى، قاپاق مېغىزى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن، گىلى ئەرمىنى، كەھرىبا، ھەربىرى 2 مىسقالدىن، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن خېمىر قىلىپ، قۇرس ياساپ سايىدا قۇرۇتۇپ تەييارلاپ، بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(3) جۈدە تىكۇچى قىزىتمىنىڭ باشقا مۇرەككەپ دورىلىرى:

(1) ھەر كۈنى سەھەردە قۇرسى كافۇرنى شەرىتى خەشخاش (69 - 76 - نۇسخىلەر) ۋە تاتلىق ئانار سۈيى بېرىلىدۇ.

(2) كۈن چىققاندىن كېيىن سەرتان (قىسقۇچ پاڭا) كاشكاپىغا تاتلىق ئانار سۈيى قوشۇپ بېرىلىدۇ. 4 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن چىلان شەرىتى ياكى خەش-

خاش شەرۋىتىگە 20 مىسقال قۇرۇق ئۇزۇم قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(3) كەچتە ئىسپۇغۇل لۇئابى ياكى چىلان، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، شېكەر، بادام يېغى قاتارلىقلار بىلەن جۇ-لاپ بېرىلىدۇ.

سەرتان كاشكاپنىڭ نۇسخىسى: دەريا قىسقۇچ پاقىسى (سەرتانى نەھرى) نىڭ چىشىسىنى ئېلىپ، موڭگۇز ۋە پۇتلىرىنى كېسىپ تاشلىغاندىن كېيىن، تۇز ۋە كۈل بىلەن بىر قانچە قېتىم چايقاپ، سېسىق پۇراقلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، توغراپ ھول قاپاق سۈيى، ئارپا شىرىسى بىلەن پىشۇرۇپ، ئۈستىگە يانچىلىغان قاپاق مېغىزى بىلەن بادام مېغىزى سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇلارنىڭ مىقدارى چەكلەنمەيدۇ. كېسەلنىڭ خاھىشىغا قاراپ بەلگىلىسە بولىدۇ. سەرتاننىڭ ئۈستىگە يىڭنە سانجىغاندا ئاق سۈتتەك بىر نەرسە چىقسا ئۇ چىشى بولىدۇ.

(4) ئەگەر قەۋزىيەت بولماي تەرتى يۇمشاق بولسا، يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى قۇرسى خەشخاش (168 - نۇسخە)، قۇرسى مەرۋايىت (167 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇرسى مەرۋايىتىنى ئەھۋالغا قاراپ بەزىدە شەرۋىتى خەشخاش، ئىشەك سۈتى بىلەن ياكى سۈپۈپى سەرتان (سىل كېسەل - لىگىگە قاراڭ) دىن ئۈچ مىسقال قوشۇپ تەييارلاپ بېرىلىدۇ. ئىچى سۇرۇپ كەتكەن ھاللاردا توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: گىلى ئەرەبى 5 مىسقال، شاھ بەلىلۇت
(قۇرۇلغان)، ھۇمماز ئۇرۇغى، قىزىلگۈل ھەربىرى 4 مىس-
قالدىن، تاباشىر، قەھرىۋا 3 مىسقالدىن، ئۇرۇغىدىن تازى-
لانغان زىرىق 6 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىسپوغول لۇئابى بىلەن قۇرس
تەييارلاپ، ھەر كۈنى ئاخشامدا بىر مىسقالنى ئالما سۈيى
بىلەن بېرىلىدۇ. بەزى نۇسخىلاردا يۇقۇرقىغا سۈمبۇل،
سەرتان بىر مىسقالدىن، سەمغى ئەرەبى 3 مىسقال قوشۇپ
تەييارلاش تەكلىپ قىلىنىدۇ.

(5) يەڭگىل (تېز ھەزىم بولىدىغان) تاماقلارغا
تۇخۇم سېرىغى قوشۇپ بېرىش كېرەك. تۇرۇنچى، زەنجىۋىل،
شايتۇل مۇرايىيالىرى بېرىش مۇمكىن. گۆش سۈيى
(مائۇل لەھمى) ھەم غىزا ھەم داۋا سۈپىتىدە بېرىلىدۇ.
گۆش سۈيى (مائۇل لەھمى) تەييارلاش ئۇسۇلى:

ياش پاخلان گۆشىنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ
ئۇنىڭدىكى ياغلارنى ئېلىپ تاشلاپ خاس گۆش قالغاندا
يۇمشاق قىيما قىلىنىدۇ. قىيىمنى بىر پارچە ماتا ياكى
داكىدەك رەختىن ياسالغان خالتىغا ئېلىپ، پاكىز داستا
ئۈستىگە ئاز - ئازدىن ئىلماق سۇ قويۇپ مەجلىدۇ.
بۇنىڭدىن چىققان سۇ باشقا بىر قاچىغا يىغىلىدۇ. تاكى
گۆشنىڭ تەمى قالمىغىچە مەجلىش تەكرارلىنىدۇ. يىغىلغان
گۆش سۈيى كىچىك قازانغا قويۇلۇپ ئاستا ئوت بىلەن
قايىنىلىدۇ ۋە قايناش ئالدىدا ئۈستىگە يىغىلغان كۆپۈك

ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئۇزاق قاينىتىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق، قازان بىر - ئىككى ئورلەپ چىقسا يېتەرلىك. مۇشۇنىڭ بىلەن گوش سۈيى تەييارلىنىدۇ. بۇنىڭغا قوشىدىغان دورىلار كېسەل ئەھۋالى، مىزاجى ۋە بېرىدىغان كېسىلىگە قاراپ ھەر خىل بولىدۇ. جۈدە تىكۈچى قىزىتما ئۈچۈن بېرىلگەندە تۈز، قۇرۇق يۇمىغاقسۇت، زىرە، پىننە قوشۇلىدۇ (بەزى كىتاپلاردا گوش سۈيىنى كاۋاپتىن چىققان سۈنى يىغىۋېلىش ئارقىلىق تەييارلاش كورسەتىلىدۇ. ئەمەلىي تەجرىبىلەرگە قارىغاندا يۇقۇرىدىكى ئۇسول بىلەن تەييارلاش مۇۋاپىق).

3 - پەسىل: يۇقۇملۇق قىزىتمىلار (تەپى ۋابائى)

كىشىلەر ئارىسىدا كەڭ تارقىلىپ كېتىدىغان قىزىت - مىلىق يۇقۇملۇق ئاغرىقلار، يۇقۇملۇق قىزىتمىلار دېگەن ئومۇمىي نام بىلەن ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ دائىرىسىگە قىزىل، ياۋا چېچەك، ۋابا (خولېرا)، تائۇن (چۇما)، ئەسۈلىك كېزىك (تەپى ئەسپە) قاتارلىقلار كىرىدۇ. ئەمما كۆپچىلىك تىبابەت ئەسەرلىرىدە يۇقۇملۇق قىزىتما (تەپى ۋابائى) دېگەندە تارقىلىشى، ئولۇم بېرىشى تېز ۋە دەھشەتلىك بولغان تائۇن (چۇما) كېسىلى كوزدە تۇتىلىدۇ. يۇقۇملۇق قىزىتمىلارنى تارقىتىدىغان ۋاستىلار:

(1) مەھەللە ۋە ئۆي ئىچىدە نەرسىلەر سېسىپ چىرىگەندە ۋە ئېرىق - كۆلچەكلەردىكى تۇرغۇن سۇلار

ھاۋا ئىسىپ سېسىق پۇراق، ئۇفۇنەت (سېسىق پۇراق) جەراسىم (مىكرۇپ) پەيدا قىلىدۇ. ھاۋا داۋاملىق قىزىش بىلەن بۇ ئۇفۇنەتلەر ھاۋاغا تارلىشىپ، ئەتراپتىكى ھاۋانى بۇلغايدۇ. بۇ خىلدىكى ھاۋا نەپەسلىنىش ياكى باشقا ۋاستە (سۇ، يىمەك - ئىچمەك)لەر ئارقىلىق ئادەم بەدەنىگە كىرگەندە بەدىنىدىكى خىمىيەلىرىمۇ ئۇفۇنەتلەندۈرىدۇ (خۇسۇسەن تېنى ئاجىز، خىمىيە كۆپ كىشىلەرگە ئوڭاي يۇقىدۇ). بۇ خىلدىكى تارقىلىشچان قىزىتىلاردا يۈرەك - تىكى خىمىيەلەر ئاسان ۋە تېز ئۇفۇنەتلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۇقۇملۇق كېسەللەر تارقىلىپ ئادەملەر ئۈچۈن زور دەھشەت ۋە ئۆلۈم كەلتۈرىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئەتراپقا تارقاپ كېتىشىدە ساق كىشىلەرنىڭ كېسەللەرگە يېقىن مۇناسىۋەتتە بولۇشى مۇھىم ئورۇننى ئىگەللەيدۇ.

(2) يۇقۇملۇق قىزىتىلار ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە كۆپ تارقىلىدۇ. ياز كۈنلىرى ھاۋا بەك ئىسسىق، يامغۇر يېغىنلار كۆپ، ھاۋا بۇلۇتلۇق ۋە تۈتەك بولۇپ تۇرۇشى، شامال، بوراننىڭ كۆپ چىقىشى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر پەيدا بولۇپ تارقىلىشنىڭ ئەپلىك شارائىتىدىن ئىبارەت.

(3) ھەرخىل ھاشاراتلەر، مەسىلەن، پاشا، چىۋىن، بۇرگىلەر ۋە غاجىلىغۇچى ھايۋانلار جۈملىسىدىن چاشقانلارنىڭ كۆپىيىپ قېلىشىمۇ بۇ خىلدىكى يۇقۇملۇق قىزىتىلارنىڭ تارقىلىشىدا چوڭ رول ئوينايدۇ. بولۇپمۇ تائۇن (چۇما) كېسەلىدە چاشقانلار كۆپىيىپ قالدىغانلىقى ۋە

جايلاردا سۇغۇر ۋە چاشقان ئولۇكلىرىنىڭ كوپىيىپ قالدىغانلىقى توغرىلىق خاتىرىلەر بار. يۇقۇملۇق كېسەل-لەردىن تولغاق (ھەيزە) توغرىسىدا ئۇچەي كېسەللىكلىرىدە، ئەسۋىلىك كېزىك (تەپى ئەسۋە) توغرىسىدا خىلىتلاردىن بولىدىغان تەپلەردە سۆزلەندى. توۋەندە چېچەك، قىزىل، تائۇن^①لارنىڭ ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى سۆزلىتىدۇ.

تائۇن (چۇما) كېسەلى

ئالامەتلىرى: (1) كېسەللىنىشنىڭ دەسلەپلىك قاتتىق قىزىتما باشلىنىدۇ. قىزىتما كېچىلىرى بەكرەك بولىدۇ. (2) نەپەس ھەرىكىتى بۇزىلىدۇ. بەزىدە نەپەس قىيىنلىشىدۇ. بەزىدە كېسەل تىنىپ ئۆلگۈرتەلمەيدۇ. بەزىدە زاھايىتى چوڭ (چوڭقۇر) نەپەس ئالىدۇ. ئېغىر ھاللاردا كېسەلنىڭ چىقارغان نەپىسى بەك سېسىق پۇرايدۇ. بۇ ئولۇم ئالدىدىكى ئالامەتلىرىدىن بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. (3) تەرلەيدۇ، تەر سېسىق پۇراقلىق، يېپىشقاق چىقىدۇ.

(4) تومۇر ھەرىكىتى كىچىك ۋە بىر تۇتاش بولىدۇ. (5) سۈيدۈك قارامتۇل قىزىل رەڭدە بولۇپ، ئۆس-

① تىبابەتتە "تائۇن" دىگەندە چات، قولتۇق ۋە قۇلاق ئارقىسىدىكى چوڭ بەزلەرنىڭ يامان سۈپەتلىك ياللۇغلىنىشلىرى چۈشەنمەيدۇ. چۇما كېسەلى "تائۇنى ۋابائى" دىيىلىپ بەز چۇما-سىنى ئۆقتۈرىدۇ. لېكىن ئوقۇشقا ئاسان بولۇش ئۈچۈن بۇ كىتاپتا چۇما كېسەلى "تائۇن" دەپلا ئالدۇق - تەھرىر.

تىدىكى دۇغ قارا رەڭلىك كېلىدۇ. چوڭ تەرەت كوپۇكلۇك،
بەترەڭ ۋە بەك سېسىق بولۇپ، بەزىدە تەرەتتە قان
كېلىدۇ.

(6) تال چوڭىيىدۇ. بەزىدە سۇلۇق ئىششىق
(ئىستىسقا) يۈز بېرىدۇ.

(7) كوڭۇل ئايىنىش سەپرا (سېرىق ئاچچىقسۇ)
قۇسىدۇ. تاماق يېيىشنى خالىمايدۇ. مەئدە ۋە يۈرەك
ئەتراپلىرىدا ئاغرىش سېزىلىدۇ.

(8) تەشئالىق قاتتىق، ئېغىز ئىچى قۇرۇق بولۇپ
چىش تۈۋى ئېغىز ئىچى ئىششىيدۇ، قانايدۇ. ئۇيىقىسىزلىق،
جويلۇش ۋە ھۇشىدىن كېتىشلەر يۈز بېرىدۇ.

(9) بەدەنگە قىزىل ئەسۋىلەر چىقىپ قايىتىدۇ، يەنە
چىقىدۇ. كۆپ ھاللاردا قولىتۇق ۋە يىرىق بەزلىرى ئىش-
شىيدۇ، ئۇ تېرىدىن خېلى كۆتىرىلىپ تۇرغان چوڭ
قارامتۇل كۆك ياكى قىزغۇش رەڭلىك بولەيدەك ئىششىقتىن
ئىبارەت. ئۇ ناھايىتى ئاز ئېغىز ئالىدۇ.

(10) ئېغىر ھاللاردا قان قۇسىدۇ. كۆكرەكتە
سانچىقسىمان ئاغرىش پەيدا بولۇپ، كۆكرەك پەردە
ياللۇغى ۋە ئۆپكە ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ،
يوتەل پەيدا بولىدۇ. بەلغەم بەزىدە كۆك، قارامتۇل كۆك
ياكى قان - يىرىك ئارىلاش كېلىدۇ.

(11) ئاخىرقى مەزگىلىدە مېڭە پەردە ياللۇغىنىڭ
ئالامەتلىرى يۈز بېرىپ پۇت - قوللار تارتىشىش، گەژگە

قېتىپ قېلىش بىلەن بەدەنلىرى سوۋۇپ ئولۇپ كېتىدۇ. يۇقۇرقى ئالامەتلەر تائۇن (چۇما) يۇقتۇرۇپ ئالغان كېسەللەرنىڭ ھەممىسىدە بىردەك مەۋجۇت بولۇشى ياكى بىر قانچىسىلا بولۇشى مۇمكىن. ھەتتا ھىچقانداق قىزىتما ئالامەتلىرى بولماستىن تۇرۇپ كېسەل بىردىنلا ئاجىزلىشىپ ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋاسى: تائۇن (تائۇن ۋابائى) پەيدا بولغاندىن كېيىن (ساقلار ئاغرىق بار جايدىن يىراق بولۇش، يېقىن كەلمەسلىك كېرەك)، ئوي ئىچىنى ئۇفۇنەتتىن تازىلاش ئۈچۈن خۇشپۇراق نەرسىلەر بىلەن ئىسرىق سېلىش ۋە سىركە گۇلاپ چېچىش؛ چاشقان ۋە بۇرگىلەرنى يوقىتىش لازىم.

كېسەل يۇقتۇرۇپ ئالغان كىشىگە سۇرگە بېرىشكە ۋە قان ئېلىشقا بولمايدۇ. ھەر كۈنى سەھەردە قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) نى بىيە، ئالما، غورا سۇلىرى ياكى لىمون قاتارلىق مېۋە سۇلىرى بىلەن بېرىلىدۇ. ئەگەر بۇلار بولمىسا سىركە بىلەن سوۋۇتۇلغان گۇلاپ بېرىلىدۇ. شۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىمكى، بۇ كېسەلدە ئوسسۇلۇقنى ئاز بېرىش ۋە كېسەلنى ئاچ قويۇش خاتا. قۇشلارنىڭ گۆشىگە ئەينىۋلا، سۇماقلارنى قوشۇپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. كېسەل بار ئويگە كاپۇر، سەندەل ۋە گۇلاپلاردىن ئىبارەت پۇراقلىق ئېرىتمىلەرنى چېچىش ۋە خۇشپۇراق ئىسرىقلارنى كويدۇرۇش لازىم. ئەمما ئىسرىق كېسەلگە بەك يېقىن جايدا بولۇپ ئۇنىڭ نەپەس ئېلىشىغا دەخلى بەرمەسلىكى

كېرەك. كاپۇر، سەندەل ۋە گۇلاپنى شىشىدەك نەرسىگە ئېلىپ، كېسەلگە پات - پات پۇرۇتۇپ تۇرۇش، ئىپىز رەخلەرنى ئۇلاردا نەمدەپ كۆكرىگىگە يېپىش كېرەك. تارتىشىپ قېلىش ئەھۋاللىرى يۈز بەرگەندە كېسەلنى ئىسسىق يۈگەش لازىم. داۋالاشتىن ئاساسىي مەقسەت قىزىتمىنى چۈشۈرۈش ۋە يۈرەك، مىڭە قاتارلىق باشقۇر-غۇچى ئەزالارغا قۇۋۋەت بېرىشتىن ئىبارەت. كاپۇر، سەندەل، گۇلاپلار ۋە باشقا خۇشپۇراقلىق نەرسىلەر بۇ مەقسەتكە ناھايىتى ئۇيغۇن كېلىدۇ. يەنە كاسىن، ئىت ئۇزۇمى سۈيى قاتارلىقلارنى ئىسكەنجىۋىل بىلەن بېرىلىدۇ. سۇت، قېتىق ۋە بېلىق گۆشى قاتارلىق يىمەكلەر بېرىل-مەيدۇ. بەزىلەر ھەر قانداق گۆش بېرىشنى توغرا كور-مەيدۇ. ئەگەر بېرىش لازىم كەلسە سىركە بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش لازىم. كېسەلنىڭ ئۇمۇمى ئەھۋالى بىرئاز ياخ-شىلانغاندىن كېيىن تەرياقى فارۇق، مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە) بېرىش مۇمكىن. بەزىلەر ھىڭ، سەبرە، مۇرمەككى ۋە زەپەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ ھەسەلگە قوشۇپ يېسە مەنپەئەتى ياخشى دەپ قارايدۇ.

قىزىل (ھوسبە)

قىزىل كېسىلى بالىلار خۇسۇسەن بوۋاقلاردا كۆپ ئۇچرايدىغان قىزىتمىلىق يۇقۇملۇق كېسەللەرنىڭ بىرى بولۇپ، يىلنىڭ ھەر قانداق پەسلىدە پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ قىش ۋە ئەتىياز پەسلىلىرىدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن بۇرۇن قىچىشىپ، كوز ۋە بۇرۇندىن تولا سۇ ئاقىدۇ، چۈشكۈرىدۇ، كوز ئىچى قىزىيدۇ، باش ئاغرىپ پۈتۈن بەدەن ئېغىرلىشىدۇ، ئۇيىقىدا چۈچۈيدۇ، قىزىتما پەيدا بولىدۇ. كېسەل بەل ۋە غول ساھىلىرى ئاغرىشىدىن زارلىنىدۇ. تىنچىسىز ۋە بىئارام بولىدۇ. بالىلار بولسا تولا يىغلايدىغان بولۇپ قالىدۇ. يوتەل بولۇپ، سۇيۇق بەلغەم چىقىرىدۇ. بۇ ئەھۋاللار بىر قانچە كۈن داۋام قىلغاندىن كېيىن بەدەن تېرىسىگە قىزىل رەڭلىك ماش چوڭلىغىدا ئەسۋىلەر چىقىدۇ. سۈي-دۈڭى قىزىل بولۇپ، كوز، كاناي، ئۈپكە ۋە بوغۇملار زەرەرلىنىدۇ.

داۋاسى: كىچىك بالىلارنىڭ غولىغا زۇلۇك قويىد-لىدۇ. بىر ياشقا توشمىغانلارغا زۇلۇك قويۇشقا بولمايدۇ. ئەمما ئەسۋە چىقماستىن تۇرۇپ قان ئېلىش ياكى قاننى سوۋۇتىدىغان دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بەلكى بەدەن-نىڭ قىزىلىنى سىرتقا تەپتۈرۈپ چىقىرىشقا ياردەم قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەلنى ئىسسىق يۈگەش بىلەن ئوي ئىچىنى ئىسسىق تۇتۇش كېرەك ۋە چىلان شەرۋىتى ئىچكۈزۈش لازىم. قىزىل چىقىپ بولغاندىن كېيىن، ئاق سەندەل، گۈلاپ، كاپۇرلارنى پۇرىتىش، رەخنى نەمدەپ بەدىنىگە يېپىش چارىلىرى قىلىنىدۇ. ئارپا-بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمىگە قەن سېلىپ بېرىلىدۇ. كۆپ مىقداردا قايناقسۇ ئىچكۈزۈپ تۇرۇلىدۇ. ئەگەر قەۋ-زىيەت بولسا مۇۋاپىق يەڭگىل سۈرگىلەرنى بېرىش مۇمكىن.

ئەمما قىزىلىدىن كېيىن ئىچ سۇرۇپ كېتىش كېسەل بالا ئۇچۇن چوڭ خەتەر تۇغدۇرۇشى مۇمكىن. مۇنداق چاغلاردا ھەببۇل ئاس، سەمغى ئەرەبى ۋە گىلى ئەرمىنىلەر ياكى قۇرس تاباشىر (112 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر قان ئارىلاش ئىچ سۇرسە ئەنجىبار شەرۋىتى (72 - نۇسخە) بىلەن قۇرسى تاباشىر بېرىش كېرەك.

بەزىدە بۇرۇن قاناشلارمۇ ئۇچرايدۇ. ئازراق قان چىقسا زىيانلىق ئەمەس، ئەگەر بەك قاناپ كەتسە بۇرۇن قاناش كېسىلىدە كورسىتىپ ئوتۇلگەن چارلار قىلىنىدۇ. قىزىلىنىڭ چىقىش مۇددىتى 4 كۈندىن يۇقۇرى بولىدۇ. قىزىلىدىن كېيىن بۇرۇن، كاناي، ئوپكە، بوغۇملار - نىڭ زەرەرلىنىشى كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ ئۇچۇن قىزىل چىقىشى بىلەنلا بۇ ئەزالارنى ساقلاش ئۇچۇن توۋەندىكى چارلارنى قىلىش لازىم.

(1) بىر ئاز كاپۇرنى ئېرىتىپ بۇرۇنغا تامغۇزۇش، بۇرۇننى ئىسسىق سۇ بىلەن پاكىزلاپ، پۇتۇپ قالما - لىغىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئارقىدىن ھەببۇل ئاس يېغى بىلەن گۈل يېغى تامغۇزۇش كېرەك.

(2) ئانار سۈيىنى ئاز - ئازدىن ئىچكۈزۈپ تۇرۇش لازىم. سىماق، ئاقلا نغان ماش، قىزىلگۈللەرنى گۈلاپتا قاينىتىپ غار - غار قىلغۇزۇش كېرەك.

(3) قىزىلىدىن كېيىن ئوپكە زەرەرلەنگەنلىك ئالا - مەتلىرى يۈتەل ئېغىرلىشىش، ھارارەت كۈتىرىلىشتىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئۇچۇن مەسكە يېغى بىلەن ئانار شەر -

ۋىتى (4-نۇسخە)، ئىسپۇغۇل ۋە بىيە لۇئابلىرى
 ھەمدە توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورا تەييارلاپ بېرىلىدۇ:
 نۇسخە: قورۇلغان بادام مېغىزى بىر مىسقال
 قەن 3—4 مىسقال، ئىسپۇغۇل لۇئابى 2 مىسقال، سەمغى
 ئەرەبى، ئىشاستە، خاڭگا ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى
 3 مىسقال. سوقۇشقا تېگىشلىك دورىلارنى سوقۇپ،
 ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە ئازراق قىيام بىلەن يالايدىغان
 دورا (لۇتۇق) تەييارلىنىدۇ. 1-2 مىسقالدىن كۈنىگە
 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

7) بوغۇملاردا ئاغرىش ۋە ئېچىشىش يۈز بەرگەندە
 كاپۇر، سەندەل ۋە قىزىلگۈل قاتارلىقلارنى سوقۇپ سىركە
 قوشۇپ بوغۇملىرىغا تېگىپ قويۇش لازىم. غىزاسىغى
 ئارپا، ماش سۇلىرىغا ئازار، بىيە ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابى،
 لىرى ۋە قاپاق سېلىپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. ۋە ھول
 سوغاق غىزا بېرىلىدۇ. گال ئاغرىغاندا ۋە يوتەل كۆپ
 بولغاندا چۈچۈمەل نەرسىلەردىن ساقلىنىش كېرەك.

ياۋا چېچەك (جۇدرى)

ئالامەتلىرى: رەسمى چېچەك چىقىشتىن بۇرۇنقى
 ئالامەتلىرى قىزىل بىلەن ئوخشاش. ئەمما قىزىتمىنىڭ
 يۇقۇرى بولىشى ۋە كېسەلنىڭ ھۆشىدىن كېتىشى كۆپ
 ئۇچرايدۇ. ئەسۋىلەر قىزىلغا قارىغاندا چوڭراق ۋە
 رەڭگى توقراق چىقىپ، ئۇلار ئىچىگە ماددا يىغىلىپ
 ئۇفۇنەتلىنىپ يىرىڭلايدۇ ۋە سېرىق زەرداپ يىغىلىدۇ.

بۇ ھال تىبابەتتە يىرىڭلىق پۈۋەكچە "ئابىلە" دەپ ئاتىلىدۇ. پۈۋەكچىدىكى يىرىڭ ۋە زەرداپلار پىشقاندا كېسەلنىڭ ئەھۋالى يەنىمۇ ئېغىرلىشىدۇ. ئۇلار قۇرۇپ قەقەشلەنگەندە يېنىكلىشىدۇ. قەقەش چۈشكەندىن كېيىن ساقايماستاتۇق ئىز (چوقۇر) قالىدۇ. چېچەك كۆكرەك ۋە يۈز قىسمىغا، بۇرۇن ھەتتا كۆز ئىچىگىمۇ چىقىدۇ. بۇ قارغۇلۇق ۋە بۇرۇن پۇتۇپ قېلىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چېچەكنىڭ ئۇفۇنىتى باشقۇرغۇچى ئەزالاردىن بىرى ۋە يۈرەككە ئېغىر تەسىر بەرسە ئۆلۈم بىلەن ئاياغلىشىدۇ.

داۋاسى: ئومۇمى داۋاسى قىزىلغا ئوخشاش (قىزىل كېسىلىگە قارالسۇن) بۇرۇن، گال بولۇپمۇ كۆزنى ئاسراش چارىلىرىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. كۆزگە ئىسپاھان سۈرمىسىنى سىركە بىلەن ئېرىتىپ تامغۇزۇش چېچەكنىڭ كۆزىنى خاراپ قىلىشىدىن ساقلايدۇ.

قىزىل ۋە چېچەك تارقالغان چاغلاردا ئاغرىقلارغا چىلان شەرتى، ئىسپۇغۇل، بىيە لۇئابلىرىنى بېرىپ تۇرۇش كېرەك ۋە كېسەل بالىلارغا يېقىن يولاتماسلىق كېرەك.

4- پەسىل: بوھران ① ھەققىدە ئومۇمى چۈشەنچە.

"بوھران" كېسەللىك جەريانىدىكى بىر باسقۇچلۇق ئەھۋالدىن ئىبارەت. تىبابەت ئىلىمىگە ئاساسەن،

① بوھران — كىرىس دىكەنلىك بولىدۇ.

كېسەللىك بىلەن بەدەن ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشنىڭ 2 خىل نەتىجىسى بولىدۇ. يەنە بەدەن غالىپ كېلىپ، كېسەللىك مەغلۇپ بولۇپ، ئاغرىق ساقىيىدۇ. ياكى بەدەن مەغلۇپ بولۇپ، كېسەللىك غالىپ كېلىپ كېسەل ئولىدۇ ياكى ئومۇرلۇك مېيىپ بولۇپ قالىدۇ، يابولمىسا باشقا كېسەللىككە ئايلىنىپ قالىدۇ. شۇڭا بوھران يۈز بېرىدىغان كۈنلەر، ئۇنىڭدا كورلىدىغان ئالامەتلەر ۋە مۇناسىۋەتلىك چارىلارنى بىلىش تېۋىپ ئۇچۇن بەك مۇھىم. چۈنكى داۋالاشتا بۇ كۈنلەردە ماددىنى قوزغىتىدىغان چارىلار مەنئى قىلىنىدۇ.

بوھراننىڭ تۈرلىرى

(1) بەدەن كېسەل ئۈستىدىن غەلىبە قازىنىدۇ، سەۋەپچى ماددا پۈتۈنلەي بەدەندىن چىقىپ كېتىپ كېسەل ساقىيىدۇ. ياخشى بوھران (بوھرانى مەھمۇدە) دەپ ئاتىلىدۇ.

(2) كېسەل غالىپ كېلىپ، بەدەن يېڭىلىدۇ، كېسەل ئولىدۇ. بۇ تەتۈر بوھران (بوھرانى رەددى) دەپ ئېيتىلىدۇ.

ياخشى بوھران ئوز نوۋىتىدە توۋەندىكىچە تار-ماقلارغا بولىنىدۇ:

1. بەدەن غالىپ كېلىدۇ ئەمما ماددىلارنى

بىردىنلا سۇرۇپ چىقارماي ئاستا - ئاستا ۋە ئاز - ئازدىن چىقىرىپ تاشلايدۇ.

2. بەدەن باشتا غالىپ بولسىمۇ، روشەن بىلىدۇ - مەيدۇ. ماددىلارنى ئاز - ئازدىن چىقىرىپ، ئاخىرىدا بىرلا چىقىرىپ تاشلاپ كېسەللىكنى مەغلۇپ قىلىدۇ. بۇ ئىككى تۈرى تولۇقسىز بوھران (بوھرانى ئاقىس) دەپ ئاتىلىدۇ.

تەتۈر بوھرانمۇ توۋەندىكىچە خىلغا بولىدۇ.

1. كېسەللىك غالىپ بولسىمۇ، بوھران ياردىمى بىلەن بەدەننى بىراقلا ئاجىزلاشتۇرماي بەلكى تەدرىجى ھالدا ھالاك قىلىدۇ.

2. كېسەللىك غالىپلىق ئالامەتلىرى روشەن بولمايدۇ. كېسەللىك ئاخىرىدا بەدەننى بىرلا يېڭىپ ھالاك قىلىدۇ. 3. ماددىلارنىڭ بەدەندىكى ئەھۋالى مەلۇم بىر مۇددەتكىچە باراۋەر بولۇپ كېلىپ (بەدەننىڭ كۈچلۈك بولۇشى تۈپەيلىدىن)، كېيىنچە ماددا پىشالمىي، باشقۇر - غۇچى ئەزالارغا تەسىر بېرىپ كېسەللىك ئۇزۇنغا سوزىلىدۇ. دىغان كېسەللىككە ئۆزگىرىدۇ.

4. كېسەل ئۇزۇنغا سوزۇلۇش ياكى باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ بىراقلا قايتۇرۇشى بىلەن ماددا باشقا ساق ئەزالارغا توكىلىدۇ. بۇ كۈچكەن بوھران (بوھرانى ئىنتىقالى) دەپ ئاتىلىدۇ.

كىتاپنىڭ بىرىنچى قىسمىدا سۆزلەنگەندەك ھەرقانداق كېسەللىكنىڭ توۋەندىكىچە تۆت باسقۇچى بولىدۇ:

بىرىنچى كېسەللىك باشلىنىش دەۋرى بولۇپ، بەزىلەر بۇ دەۋر كېسەللىكنىڭ 3- كۈنىگىچە ئۆتكەن دەۋرى دەپ قارايدۇ. بۇ دەۋرىدە بوھران يۈز بەرسە، چوقۇم ئۇ تەتۈر بوھران بولۇپ، ئاغرىق كىشىنى ھالاك قىلىدۇ. چۈنكى بۇ مەزگىلدە بەدەننىڭ كۈچى تۈپەيلىدىن ئەمەس بەلكى كۈچلۈكلىگىدىن بوھران يۈز بېرىدۇ. ئىككىنچىسى كېسەللىك ئالامەتلىرى روشەنلەشكەن دەۋرى، ئۈچىنچىسى كېسەللىك ئالامەتلىرى ئېغىرلىشىپ بىرخىلدا توختىغان دەۋرى. بۇ دەۋردىكى بوھراننى ياخشى دىگىلىمۇ- يامان دىگىلىمۇ بولمايدۇ. تۆتىنچىسى كېسەللىك ئالامەتلىرى توۋەنلەشكە باشلىغان دەۋرى. بۇ دەۋردىكى بوھران ئەڭ ياخشى بوھرانىدۇر.

بوھران كۈنلىرى

قەدىمقى تىۋىپلەر ئۆزلىرىنىڭ ئۇزاق يىللىق كۈزىتىشلىرىگە ئاساسەن، قىزىتمىلىق كېسەللىرىدىكى بوھران كۈنلىرىنى تۆۋەندىكى 3 چوڭ تۈرگە ئايرىغان:

1. تولۇق بوھران كۈنلىرى كېسەللىكنىڭ 4، 7، 14، 20، 21، 24، 27، 31، 34، 37، 40- كۈنلىرى. بوھران ئارىلىغىدىكى كۈنلەر— كېسەللىكنىڭ 3، 5، 9، 11، 13، 17- نىچى كۈنلىرى. بۇ كۈنلەردە بوھران يۈز بېرىش مۇقىم ئەمەس.

2. تولۇقسىز بوھران (بوھرانى ئاقىس) بولىدىغان كۈنلەر. 6، 8، 10، 12، 15، 16، 18- كۈنلىرى.

بوھران ھىساپلانمايدىغان بوھران 22، 23، 25،
26، 28، 29، 30، 32، 33، 35، 36، 38، 39 -
كۈنلەردە يۈز بەرگەن بوھرانلار.

ئومۇمەن قىزىتمىلىق كېسەللەردە بوھران تاق
كۈنلىرى بولىدىغانلىقى كۈزىتىلگەن. ئەمما كۈن ئارىلاي-
دىغان قىزىتمىلاردا 11-14 كۈنلىرى بوھران بولىشى
مۇمكىن. 8- كۈنلىرىگىچە بولغان بوھران قاتتىق
ئوتىدۇ.

بوھران ئالامەتلىرى

بوھران — بۇرۇن قاناش، قوسۇش، ئىچى سۇرۇش،
سۇيدۇك بەك كۆپ كېلىش، تەرلەش قاتارلىق ئالامەتلەر
بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. بۇرۇن قاناش، ئىچى سۇرۇش ۋە قەي
قىلىش تولۇق بوھران ھىساپلىنىدۇ. تەرلەش ۋە سۇيدۇك
راۋان بولۇپ كېتىش بىلەن كەلگەن بوھران — تولۇق
بولمايدۇ. چۈنكى بۇنىڭدا ماددىنىڭ سۇيۇق قىسمى
چىقىپ، قاتتىق قىسىملىرى قېپقالىدۇ.

بەزى كېسەللىكلەرنىڭ ئالاھىدە بوھران شەكلى
بولىدۇ. مەسىلەن، بەزىگە ۋە ئىككى كۈنلۈك قىزىتىم-
لاردا بوھران تەرلەش ۋە ئىچى سۇرۇشلەر بىلەن
ئىپادىلىنىدۇ. ئەسۋىلىك كېزىك بوھرانى بۇرۇن قاناش
بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

مىگە پەردە ياللۇغىدا كۆپرەك تەرلەش ياكى
بۇرۇن قاناش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. توت كۈنلۈك قىزىتما

بوھرانى تەرلەش بىلەن، ئىچ سۇرۇش بىلەن
ئىپادىلىنىدۇ.

تەجرىبىلەرگە قارىغاندا بوھراننىڭ ياخشىسى
بۇرۇن قاناش، ئۇندىن قالسا ئىچ سۇرۇش، ئاندىن
قەي قىلىش، سۇيدۇك راۋان بولۇش، ئەڭ ئاخىرقىسى
تەرلەش بىلەن ئىپادىلانغانلىرى ھىساپلىنىدۇ.

بوھران ئالدىدىكى ئالامەتلەر

بوھران ئالدىدىكى ئالامەتلەر يەنى بوھراندىن
خەۋەر بەرگۈچى ئالامەتلەر ماددىلارنىڭ چىقىپ كېتىشى
ئۈچۈن ھەركەت قىلىشىدىن ئىبارەت. بوران كۈنلىرى
كېسەلنىڭ ئەسلىدىكى ئالامەتلىرىگە باش ئاغرىش، باش
قېپىش، ئىككى چېكىسى چىڭقىلىش، قۇلاق غۇڭۇلداش،
قۇلاق ئېغىرلىشىش، قوساق غولدۇرلاش، كوز خىرەلىشىش
قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

يۇقۇرقى ئالامەتلىرى كېسەلدە كورۇلگەندە بەدەنگە
ياردەم بېرىش بىلەن ماددىنىڭ چىقىرىلىشىغا دىققەت
قىلىنىدۇ. مەسىلەن، بوھران تەر بىلەن بولىدىغانلىق
ئالامەتلىرى بولسا كېسەلنى دورا، ھور بىلەن ياكى
قېلىن نەرسىلەر بىلەن ئوراش ئارقىلىق تەرلىتىش
كېرەك. بوھراننىڭ بۇرۇن قاناش بىلەن ئوتىدىغانلىق
ئالامەتلىرى كورۇلگەندە باشنى ئىسسىق تۇتۇش، باشقا
ئىسسىق سۇ قۇيۇش لازىم. ئاغرىقنىڭ مىزاجى ۋە
ئەھۋالىغا قاراپ قۇستۇرۇش، سۈرگە ۋە سۇيدۇك ھەي-

دېگۈچى دورىلارنى بېرىش لازىم. بوھراندا بۇرۇن قاناش بىلەن ئىچى سۇرۇش ھەددىدىن ئارتۇق بولۇپ كەتسە بۇنى توختىتىشقا توغرا كېلىدۇ.

بوغۇم، پۇت-قوللارغا ئاغرىش پەيدا بولۇپ قالسا ماددىنىڭ بۇ جايلارغا چۇشۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، بەدەننى تۇتۇپ ئۇۋىلاش، بوغۇملارنى تېگىش قاتارلىق چارىلار كورلىدۇ.

بوھران كۈنلىرىنى ھىساپلاشتا كېسەللىك چۇشتىن كېيىن باشلانغان بولسا بىركۇن ھىساپلاشقا بولمايدۇ. چۇشتىن بۇرۇنقىسى بىركۇن ھىساپلىنىدۇ. بوھران كۈنلىرىدە كېسەلنى ھەركەت قىلدۇرماسلىق، روھى جەھەتتىن ئارام بېرىش لازىم.

XV ماقالا. تاناسىل ئەزالار كېسەللىكلىرى

1- پەسىل: ئەرلەر تاناسىل ئەزا كېسەللىكلىرى

(جىنسى ئاجىزلىق زەئفى باھ)

جىنسى ئاجىزلىق — جىنسى قابىلىيەتنىڭ ئاجىزلىق - شىشى، جىنسى قابىلىيەتنىڭ پەقەت بولماسلىقى ۋە ئۇنىڭ يوقىلىشىدىن ئىبارەتتۇر. جىنسى ئىنتىلىشىنىڭ ئويغىنىد - شى ۋە ئەرلىك ئەزانىڭ ھەركەتكە كېلىشى تىبابەتتە ئومۇملاشتۇرۇپ "قۇۋۋەتى باھ" دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ قۇۋۋە - ۋەت جىنسى ئالاقە (جىمائى) ھەركىتى بىلەن ئىپادىلەنىدۇ. ئۇ، باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ شۇنىڭدەك پۈتۈن بەدەننىڭ ساغلاملىقىغا باغلىق. كىتائۇمىزنىڭ بىرىنچى قىسمىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، بەزىلەر باشقۇرغۇچى ئەزالار قاتارىغا جىنسى بەزىلەرنىمۇ قوشىدۇ. چۈنكى جىنسى بەزىلەر كىشىلەر سالامەتلىكىدە زور ئەھمىيەتكە ئىگە. مىگە، يۈرەك، جىگەرلەرنىڭ جىنسى بەزىلەر خىزمىتىگە زور مۇناسىۋىتى بار.

جىنسى ئاجىزلىق — جىنسى ئىنتىلىش (شەھۋەت) نىڭ بولماسلىقى ۋە جىنسى ئەزانىڭ ئىستىرخاسى (بوشىشىپ كېتىشى) دېگەن 2 چوڭ قىسمىغا بولىنىدۇ.

جىنىسى ئىنتىلىشنىڭ بولماسلىقى

بۇ سەۋەپ جەھەتتىن تۆۋەندىكىچە بىرقانچىغا بولىنىدۇ. (1) باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ كېسەللىنىشى ۋە - ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكىدىن بولغان تۇرى:

ئوزۇقلىنىشنىڭ يېتەرسىزلىكى ۋە بەدەننىڭ زەئىپ بولۇشى تۈپەيلىدىن قان ئازلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىپ مەنىنىڭ ئازىيىشىغا سەۋەپچى بولىدۇ. بۇنداقتا جىنىسى ئىنتىلىش يوقىلىدۇ. بۇ چاغدا بەدەن ئورۇق، ئاجىز، چىرايى سېرىق، تېرە قۇرغاق ۋە ئىشتەي تۇتۇلغان بولۇپ، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق ئىپادىلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: بەدەننى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن ئوزۇقلۇق - نۇشنى ياخشىلاش، قۇۋۋەتلىك غىزالارنى بېرىش، دەم ئېلىشنى مۇۋاپىقلاشتۇرۇش، بىرمەزگىل جىنىسى ئالاقىنى توختىتىش لازىم. دورىلاردىن لوبۇبى كەبىر (171 - نۇسخە) نىڭ مەنپەئىتى ياخشى.

(2) مەنى ئىشلەپچىقارغۇچى ئەزا - ئۇرۇقدان مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە زەرەرلىنىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان تۇرى:

بۇنداقتا جىنىسى ئالاقىدا مەنى ئاز ياكى بەك قويۇق چىقىدۇ. ھەتتا چىقىماسلىغىمۇ مۇمكىن.

داۋاسى: مىزاجنى ئىسلاھ قىلىش لازىم. ئەگەر قۇرۇقلۇق بەلگىلىرى بولسا، ھوللۇك چارىلار قىلىنىشى، مەسىلەن، غىزاسىغا سۇت، گۆش شورپىسى بېرىش،

مونچىغا پات-پات چۇشۇشكە بۇيرۇش كېرەك. زەنجىر-
 ۋىل مۇرابباسى مەنىنى كۆپەيتىش ئۈچۈن ناھايىتى
 مەنپەئەتلىك. تامىغى تەركىۋىدە ئوقۇت ۋە ئىسسىق
 دورىلاردىن كاۋاۋىچىن، دارچىن، خولىنجان قاتارلىقلار
 بولىشى لازىم. قۇشقاچ گوشنى كاۋاپ قىلىپ يىسە بولىدۇ.
 مەجۇناتلاردىن لوۋبى-كەبىر (171- نۇسخە) بېرىلىدۇ.
 كۈندە چالا پىشۇرۇلغان بەش دانە تۇخۇم سېرىغىغا
 يېرىم مىسقال ھىگنى قوشۇپ يىپىشكە بۇيرىلىدۇ. ئەگەر
 بەدەندە ئەمەلىك زىيادىلىق ئالامەتلىرى بولسا، ئۇنداقتا
 ئىتتىرىپىل كەبىر (1- نۇسخە)، ئىتتىرىپىل سەغىر
 (5- نۇسخە) ۋە مەجۇنى خۇبىسۇل ھەددىد (100-
 نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھوللۇك غىزالاردىن پەرھىز قىلىش
 كېرەك.

(3) مەنى ئىشلىنىشى ياخشى بولغان ھالدا غە-
 دىغلىنىش (دەغدىغە غە لەزىتى) بولماسلىقتىن كېلىپ
 چىقىدىغان تۇرى:

بۇخىل ئەھۋال قۇۋۋەتى باھنىڭ بولماسلىغىنى
 كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەپسۇن، كوكنار ئىستىمال قىلغۇ-
 چىلاردا ۋە نەشە چېكىدىغان بەگگىلەردە كۆپ ئۇچراي-
 دۇ. جىنسى ئالاقىدا لەززەت بولمايدۇ. مەنى كۆپ بول-
 سىمۇ قويۇق، سېرىق رەڭدە كېلىدۇ.

داۋاسى: ئىسسىق ۋە قوزغاتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ.
 مەجۇنى زەر ئۇنى، مەجۇنى بۇزۇرى (170- نۇسخە) ياكى

لوبۇبى كەبىردىن بىرى بېرىلىدۇ. ئوغرى تىكەن، زەنجىر-
ۋىللەرنى قاينىتىپ سۈيىگە سۇت ۋە ئاقىرقەرھە، نارچىل
قوشۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

(4) ئۇزۇن مۇددەت جىنسى ئالاقە قىلماسلىقتىن
كېلىپ چىقىدىغان تۇرى:

ئۇزاق مەزگىل جىنسى ئالاقىدا بولمىغان كىشىلەر
بىردىنلا جىنسى ئالاقىدە بولۇپ قالغاندا كېرەككە كەل-
مەيدۇ. ھەتتا ئېھتىلاممۇ بولمايدىغان ھالغا كېلىپ قالىدۇ.

داۋاسى: سوسەن يېغى، موم يېغى، كالا ئوتلىرى-
نى جىنسى ئەزا ۋە دوسۇنغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ئۇرۇق
دان خالتىسىغا ئاقىرقەرھە يېغىغا چىگىت يېغىنى قوشۇپ
سۇرتىلىدۇ.

(5) يۈرەك، مىڭە ۋە بورەكلەردىكى زەرەرلىنىشلەر-
دىن كېلىپ چىقىدىغان تۇرى:

مەزكۇر ئەزالار كېسەللەنگەنلىك ئالامەتلىرى بولۇش
بىلەن بىللە، جىنسى ئاجىزلىقمۇ كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.
بۇنداقتا سەۋەپ بولغان كېسەلگە چارە قىلىنسا كېپايە
قىلىدۇ.

جىنسى ئەزا بوشاپ پالەچلىنىشى (ئىستىرخاڭى زەكەر)

جىنسى ئەزا پەيلىرىنىڭ پالەچلىنىشى تۈپەيلىدىن
ئۇنىڭ بوشىشىپ كېتىشى جىنسى ئەزا ئىستىرخاسى دەپ
ئاتىلىدۇ. ئۇ، تۇغما بولۇشى مۇمكىن ۋە بەلدىن تۈۋەن-

كى ئەزالار پالەچلىگىنىڭ ئاقىۋىتى بولۇپ يۈز بېرىشى؛
جىنىسى ئەزا ۋە پەيلەرگە قاتتىق سوغاق ئوتۇپ كېتىش
ياكى بەلغەم ماددىسىنىڭ توكۇلۇشى؛ مىڭە ھەركەت ئە-
سەپلىرىنىڭ خىزمىتى بۇزۇلۇشلاردىن كېلىپ چىقىشىمۇ
مۇمكىن.

داۋاسى: پالەچ بابىدا كورسىتىپ ئوتكەن چارلار
قىلىنىدۇ.

مەنى تېز كېتىپ قېلىش (سۈرئەتى ئىنزال)
جىنىسى ئالاقە ئۈستىدە ھەتتا شەھۋەت قوزغالغان
چاغلاردا مەنىنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى تېز كېتىپ قېلىشى
"سۈرئەتى ئىنزال" دىيىلىپ، توۋەندىكىچە بىرقانچە سە-
ۋەپتىن كېلىپ چىقىدۇ.

1) مەنى ئىشلەش ۋە ساقلاش ئەزالىرىنىڭ تۈ-
تۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىشى، بۇنداقتا مەنى ئاق، سۇيۇق
سۈدەك سوغاق بولىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش بىلەن بەلغەم سۈرگىسى
بېرىلىدۇ. مەجۇنى خۇبىسۇلەھەدد (101 - نۇسخە)، سۈرگە
ئۇچۇن ئايارەج پەيىقارا (16 - نۇسخە) بېرىش مۇمكىن.
توۋەندىكى شەرۋەت (شەرۋىتى پەنجىنۇش) تەييارلاپ
بېرىلسە بولىدۇ:

نۇسخە: ئۈزۈم سۈيى 54 سەر، سۇماق، مە-وزا،
گۈلئار، قىزىل گۈل، كۈندۈر، سۈتتەر، سەئىدى كۈپى بىر
سەردىن؛ زەپەر، زەمچى بىر مىسقال. قائىدە بويىچە سىركە

بىلەن ئىشلەنگەن (مۇدەببەر قىلىنغان). تومۇرپوقى 3 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئۇزۇم سۈيى بىلەن

$\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ ماتار ئارقىلىق سۇزۇپ،

سقىپ، شىشە ياكى چىنە - قاچىلاردا ساقلىنىدۇ. كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 - 5 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(2) قاننىڭ كۆپلىگى ۋە مەنىنىڭ زىيادىلىكىدىن بولىدۇ. بونىڭدا جىنسى ئاجىزلىق ياكى جىنسى ئەزا پالەچلىگى بولماستىن پەقەت مەنى تېزلا مېڭىپ كېتىدۇ، بەزىلەر بۇنى بىر مەزگىل جىنسى ئالاقىدا بولماسلىق - تىنىمۇ كېلىپ چىقىدۇ، دەپ قارايدۇ.

داۋاسى: ئانار شەرۋىتى قاتارلىق قاننى تەڭشەيدىغان شەرۋەتلەر مەسىلەن، ئىسكەنجىۋىل (100 - نۇسخە) ۋە ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇۋۋەتلىك غىزالارنى بىر مەزگىل ئازراق ئىستىمال قىلىش، ئاچ - چىق - چۈچۈك نەرسىلەرنى كۆپرەك يېيىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. (3) مەنى تەركىبىدە سەپرا بولۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. جىنسى ئالاقىدىن لەززەتلىنمەي تۇرۇپلا مەنى مېڭىپ كېتىدۇ، بۇنىڭ مەخسۇس ئالامىتى شۇكى كەلگەن مەنى قىزىق بولۇپ جىنسى ئەزا يوللىرى ئېچىشىپ كۆپ گەندەك سېزىم بېرىدۇ، مەنى سېرىق كېلىدۇ.

داۋاسى: ھول سوغاقلق نەرسىلەرنى بېرىش

كېياپە قىلىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن شەرۋىتى خەشخاش (69-
نۇسخە)، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى، ماش گۈرۈچ-
لەر بېرىلىدۇ.

(4) باشقۇرغۇچى ئەزالاردىن بىرىنىڭ ئاجىزلىغى-
دىن بولىدۇ. بۇنىڭدا قۇۋۋىتى باھ ئاجىزلىق بىلەن
مەنى تېز كېتىپ قېلىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ خىل
ئەھۋاللار جىنىسى ئالاقە بىلەن كۆپ شۇغۇللانغان كىشى-
لەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ.

داۋاسى: جىنىسى ئاجىزلىقنى داۋالاش چارىلىرى
بويىچە داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

جىنىسى ھەۋەسىنىڭ كۆپ بولۇشى

مىڭە ۋە سەزگۈ ئەسەپلىرىنىڭ قوزغىلىشچانلىغىدىن
جىنىسى ئالاقىغا كۆپ بېرىلىپ كېتىش دەسلەپتە روشەن
كېسەللىك بەلگىلىرى بەرمىسىمۇ، بارا-بارا باشقۇرغۇچى
ئەزالارنى، شۇنىڭدەك باشقا ئەزالارنى زەرەرلەپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: جىنىسى ئالاقىدىن كېيىن يۈرەك
سېلىپ كېتىدۇ ۋە ئادەتتىكى چاغلاردا يۈرەك زەئىپلىك
ئالامەتلىرى بولىدۇ. مىڭىگە زەرەر يەتكەندە جىنىسى ئا-
لاقىدىن كېيىن باش قايمىدۇ. جىگەر، مەئىدىلەر زەرەرلەن-
سە ئىشتەي تۇتۇلۇپ كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلاش كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: جىنىسى ئالاقىنى مەنى قىلىش بىلەن
بىللە ئالامەتلىرىگە قاراپ زەرەرلەنگەن ئەزالار خىزمىتىنى
ئەسلىگە كەلتۈرۈش چارىلىرى قىلىنىدۇ. ئومۇمىي بەدەندى-

كى باشقا ئالامەتلىرىگە قاراپ، مەتبۇخى ئىپتىمۇن ۋە سەۋدانى سۈرگۈچى دورىلارنى بېرىش كېرەك.

قانلىق مەنى كېلىش (مەنىيىدەم)

بۇ خىل ئاغرىقتا جىنسى ئالاقىدا مەنى بىلەن بىللە قان كېلىدۇ. ياكى پۈتۈنلەي قان كېلىدۇ.

سەۋىيى: ئۇرۇقدان قانتومۇرلىرىنىڭ زەخمىلىنىشى ياكى مەنى ئىشلەش ئەزالىرىدىكى كېسەللىك ئوزگىرىشلىرى تۈپەيلىدىن مەنى ئورنىغا قان يىغىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: بورەك ۋە مۇناسىۋەتلىك ئەزالار خىزمىتىنى ياخشىلاش، ئاغرىش ۋە ياللۇغلىنىشلار بولسا مۇناسىپ چارىلارنى كورۇش كېرەك. مەنى ئىشلەپچىقىرىش ئەزالىرىدا كېسەللىك بولغان تەقدىردە ئاغرىش ۋە ياللۇغلىنىش ئىپادىلىرى بولماسلىقى مۇمكىن. مۇنداق چاغدا مەستكى يېغى بىلەن ئۇرۇقدان خالتىسىنى ياغلاشقا بۇيرىلىدۇ.

مەستكى يېغىنىڭ تەركىۋى ۋە ياساش ئۇسۇلى: 5 سەر مەستكىنى سوقۇپ، باراۋەر مىقداردا كۈنجۈت يېغى ياكى گۈل يېغى قۇيۇلغان شىشىگە سېلىپ، سۇ قۇيۇلغان قاچىدا تۇرغۇزۇپ قايىنىلىدۇ. مەستكى ئېرىپ ياغ بىلەن تامامەن ئارىلاشقاندا مەستكى يېغى تەييار بولىدۇ.

كۆپ ئېھتىلام بولۇش (كەسرەتى ئېھتىلام)

سەۋىيى: مەنى تېز كېتىش، جىنسى ئاجىزلىق ۋە پۈتۈن بەدەندە موخاقلقنىڭ غالىپلىقى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: مەنى تېز كېتىشتىكى چارىلار قىلىنىدۇ.
زىغىر پاخىلىدىن ياسىغان ياستۇق ۋە كوپىلەردە يېتىش،
سوگەت يوپۇرمىغى ۋە قىزىل گۈلنى چۈشەك قىلىپ يې-
تىش كېرەك. قەدىمقى كىتاپلاردا كۆپ ئېھتىلام بولىدۇ
خان كىشىلەر قوغۇشۇننى نىپىزلەپ بېلىگە تېگىۋېلىشنى
تەۋسىيە قىلغان خاتىرىلەر بار، سىناپ كورۇش مۇمكىن.
تۈۋەنكى نۇسخىلاردىكى دورىلاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.
نۇسخە: (1) سوزاپ ئۇرۇغى ئۈچ مىسقال، بەش
بارماق ئۇرۇغى ① سوسەن يىلتىزى 2 مىسقال، ئازار گۈلى،
قىزىل گۈل بىر يېرىم مىسقالدىن. سوقۇپ تالقان قىلىپ
سۇت ياكى قېتىق بىلەن كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا
2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(2) سىياداننى قورۇپ باراۋەر ھەسەل بىلەن يې-
مىشكە بېرىلىدۇ.

(3) قۇندۇزقەرى بىر مىسقال، سېمىز ئوت ئۇرۇغى
7 مىسقال، سېرىق ھېلىلە 4 مىسقال، بەلىلە پوستى
7 مىسقال، ئامىلە پوستى 6 مىسقال. دورىلارنى سوقۇپ
تالقان ياساپ 2 - 1 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم بېرى-
لىدۇ. بۇلاردىن باشقا جىنسى ئاجىزلىق ۋە بەدەندىكى ئالامە-
تلىرىگە قاراپ، باشقۇرغۇچى ئەزالار قۇۋۋەتلەندۈرىلىدۇ.

① بەش بارماق (پەنجى ئەنگۈش) — ئىسسىق ئىقلىملىق
جايلاردا ئوسىدىغان لىمون جىنىسلىق بىر دەرەخنىڭ مەۋسى.
پىشقاندا بىرقانچە پارچىغا ئايرىپ خۇددى بارماققا ئوخشاش
كورىنىدۇ. خەنزۇچە فوشۇ (بۇددا قولى) دەيدۇ.

2- پەسىل: ئۇرۇقدان ۋە جىنسى ئەزا كېسەللىكلىرى

ئۇرۇقدان ياللۇغى (ۋەرەمى ئۇنسىيەمىن)

ئۇرۇقدان ياكى ئۇرۇق بېزى مۇرەككەپ تۈزۈلگەن ۋە پەي، قانتومۇر ۋە ئەسەبلىر چىرماشقان بىر ئەزادىن ئىبارەت. شۇنىڭ ئۈچۈن قان سەپرا ياكى سەۋدا خىملىتىلىرىدىن ياللۇغلىنىپ ئىششىسا قاتتىق ئاغرىيدۇ.

ئالامەتلىرى: ئۇرۇقدان ھەرخىل دەرىجىدە ئىششىيدۇ. بولۇپمۇ قاندىن بولغان ياللۇغلىنىشتا ئىششىق چوڭ بولىدۇ. ئاغرىش قاتتىق، رەڭگى قىزىل ۋە قىزىق بىلىنىدۇ، ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. بەدەندە قىزىتما ۋە قان غالىپلىق بەلگىلىرى كۆرىلىدۇ. سەپرادىن بولغاندا ئېچىشش قوشۇلۇپ، ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تېرىسى پاقىراپ تۇرىدۇ. كېسەل ئۇسسايدۇ ۋە ئاغزى ئاچچىق بىلىنىدۇ.

ياللۇغلىنىش ئۇرۇقدان بىلەن تېرە ئارىلىغىدا بولسا ئالامەتلىر يەڭگىلىرەك بولۇپ، بەزىنىڭ ئۆزىدە بولغاندا ئېغىر ئۆتىدۇ. قىزىتما بىلەن تەشەللىق زىيادە بولىدۇ. بەلغەمدىن بولغان ياللۇغلىنىشنىڭ كەيپىياتى سوغاق بولۇپ، ئاغرىش ۋە ئېچىشش ئازراق بىلىنىدۇ، لېكىن ئىششىق چوڭ بولىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر قان ئېلىشقا بولمىسا پاقالچەك ۋە غولىغا ھىجامەت قويۇلىدۇ. ماددىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ

سۈرگە ئۇچۇن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىپ
 ماددا تازىلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن يەرلىك قىزىتمىنى پە-
 سەيتىش ۋە ئىششىق ياندۇرۇش چارىلىرى قىلىنىدۇ.
 بۇنىڭ ئۇچۇن بىر پارچە رەخنى سىركە بىلەپ نەمدەپ
 ئىششىق جايغا يېپىپ قويولىدۇ. گۈلەپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى،
 كوك يۇمىلاقسۇت سۈيى ۋە ئىت ئۇزۇم سۈيى چېپىلىدۇ.
 ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا يۇقۇرقىلارغا تەرخە-
 مەك ئۇرۇغى بىلەن كوكئار قوشۇش كېرەك. ئىششىقنى
 قايتۇرۇش ئۇچۇن بابۇنە، ئەكىلىملىك، زىرىلەرنى سو-
 قۇپ گۈل يېغى ۋە تۇخۇم سېرىغى بىلەن ماي تەييارلاپ،
 ئىششىغان بەزگە قويىلىدۇ. زىغىر شىرىسى بىلەن بەسەي
 ياپرىغى، شۇمشىلەرنى سوقۇپ، ئازراق ھەسەل ئېلىشتۇ-
 رۇپ چېپىلىدۇ. قەۋزىيەت بولسا مۇۋاپىق سۈرگە بېرىش
 مۇمكىن. ئەمما ئالاھىدە سۈيدۈك راۋان قىلغۇچى دۇرد-
 لارنى بېرىشكە بولمايدۇ.

بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغاندا ماددىنى پىشۇرۇش
 ئۇچۇن ئەتە - ئاخشامدا ئارپا بېدىيان ۋە چۈچۈكبۇيا،
 ئارپا بېدىيان يىلتىزلىرىنى قاينىتىپ سۈيىگە گۈل قەن
 سېلىپ بېرىلىدۇ. سۈرگە ئۇچۇن ھەببى قوقيا (17 -
 نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
 تۈۋەندىكى دورىلار سىرتتىن چېپىشقا بېرىلىشى كېرەك.
 نۇسخە: قارا ئەمەن، سېرىق چىچەك، بابۇنە،
 ئەكىلىملىك، شۇمشە، زىرە ھەر بىرى 3 مىسقالدىن،

تۇخۇم سېرىقى بىردانە، زىغىر شىرىسى 5 مىسقال، گۈل يېغى 5 مىسقال، ھەسەل 5 مىسقال، پۇرچاق ئۇنى، نۇقۇت ئۇنى ھەربىرى 2 مىسقالدىن. مەزكۇر دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ زىغىر شىرىسى، گۈل يېغى ۋە ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چاپىدىغان دورا تەييارلاپ ئىششىق ئۇرۇقدانغا قويىلىدۇ. يەل سەۋىبىدىنمۇ ئۇرۇقدانلار ئىششىيدۇ. ئۇ قىزىل-لىق، ئېغىرلىق بولماسلىق بىلەن باشقا خىلدىكى ۋە-رەملەردىن پەرقلەنىدۇ. قوناق ئۇنى، كىپەك تۈزلەرنى قىزىتىپ تېگىش بىلەن قايتىپ كېتىدۇ.

ئۇرۇقداننىڭ چوڭىيىپ كېتىشى

ئىككى ئۇرۇقداننىڭ ئۈستىگە ياغ ئۈسۈپ قېلىش بىلەن ئۇلار ئاسادەتتىكىدىن چوڭىيىپ قالىدۇ. بۇنداق زورىيىش ياللۇغلانغانلىقتىن ھاسىل بولمىغاچقا ئاغرىمايدۇ، ئەمما ئېغىرلىشىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئاق تىكەن يىلتىزى، مېھرى گىيا، كوكئار پوستى، بولەي تاش (سۇرۇپ)، كوك يۇمىغاقسۇت سۈيىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ بەزگە چېپىش لازىم. ياكى گىلى ئەرمىنىگە قوشۇپ چاپسىمۇ بولىدۇ.

بەزىدە بۇنىڭ ئەكسىچە يامان سوغاقلىقنىڭ تە-سىرى بىلەن ئۇرۇق بەزلەر كىچىكلەشىپ قورۇلۇپ قال-دۇ. بونىڭ ئۈچۈن مونچىغا چۇشۇش، ئىسسىق ياغلار بىلەن ياغلاش لازىم.

ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى كېڭىيىپ ئەگرى - بۇگرى كۆپۈپ قېلىش (داۋالى سەفەن)

ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى خۇددى پاقەلچەك قانتۇمۇرلىرىنىڭ ئەگرى - بۇگرىلىشىپ كېڭەيگەن (داۋا - لى كېسىلى) گە ئوخشاشلا كېڭىيىپ ۋە ئەگرى - بۇگرى - لىشىپ قالىدۇ. بۇ كۆپىنچە چەپ تەرەپ ئۇرۇقدان تېرىسىدە كۆرۈلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى كۆك رەڭدە ئەگرى - بۇگرى كۆپۈپ تۇرغانلىقى كۆرۈلىدۇ. ئېغىر ھاللاردا تارتىشىش ۋە تېپىلىش بىلەن مېڭىشقا تەس بېرىدۇ.

داۋاسى: پاقالچەك كۆكتومۇرىنىڭ ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىش كېسىلى بىلەن ئوخشاش.

جىنىسى ئەزا ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ قەچمىشقا كېسىلى

سەۋەبى: كۆپىنچە سەپرانىڭ زىيادىلىكىدىن ياكى سەپرا بىلەن قان ئارىلاشقانلىقتىن بولىدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىشقا توغرا كەلمىسە پاقالچەك ۋە ساننىڭ ئىچكى تەرىپىگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. مەت - بۇخى ھېلىلە (172 - نۇسخە) ۋە مەتبۇخى شاتەرە (38 - نۇسخە) بىلەن ماددا تازىلىنىدۇ. ئىسسىق سۇ بىلەن دائىم تازىلاپ ئارقىدىن سىركە، گۈل يېغى ۋە

توخۇم ئېقىنى بىرلەشتۈرۈپ چېپىلىدۇ. مامىشانى چىڭ -
سەي ياكى يۇمىخاقسۇت سۈيى بىلەن چېپىش كېرەك.

سۇيدۇك يولىنىڭ توسىلىپ قېلىشى

سەۋىيى: سۇيدۇك يولىدا جاراھەت ياكى ئوس -
مە پەيدا بولۇش؛ قويۇق شىرىلىك خىلىت ماددىلىرىنىڭ
تۇرۇپ قېلىش سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: سىيگەندە ئاغرىپ، ئېچىشىپ، سىيمىش
قىيىنلىشىدۇ. يىرىك ئارىلاشقان شىرىلىك ماددىلار ئېقىپ
چىقىدۇ.

داۋاسى: قان غالىپلىغى كورۇلسە ئاياققا شەخەك
قويۇش كېرەك. سېمىز ئوت، قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ شە -
رىسى ۋە خەشخاش شەرۋىتى (69 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
سۇيدۇك يولىدا شىرىلىك نەرسىلەر كۆپ بولسا شە -
ۋىتى بۇزۇرى (132 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بابۇنە، ئەكىل -
مىلىك، مەرزەنجۇشلەرنى قاينىتىپ، ئىسسىقراق ھالدا
جەنىسى ئەزاغا قويىلىدۇ. رۇمبېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى،
قوغۇن ئۇرۇغى، ھەلىيۇن ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان قاتارلىق
سۇيدۇك راۋان قىلغۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. ئەگەر توسە -
لىش سۇيدۇك يولىدا ئۆسمە سەۋىيىدىن بولسا، ئاغردە -
ماسلىق، قان يىرىك بولماسلىق ۋە سۇيدۇك قىيىنلىق
بىلەن كېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كورۇلىدۇ. بۇنىڭ
ئۈچۈن قەلەي كۈشتىسىنى گۈل يېغى بىلەن ئېرىتىپ،
زەكەر توشۇگىدىن تامغۇزۇش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن
نەتىجە بولمىغاندا ئەننوبە (مېتال كاتېتىر) سېلىنىدۇ.

2 - پەسىل: ئاياللار كېسەللىكلىرى

تۇغماسلىق

تۇغماسلىق تىبابەتتە “ئۇقرى” دەپ ئاتىلىدۇ. تۇغماسلىق—ھەقىقى تۇغماسلىق، غەيرى ھەقىقى تۇغماسلىق دەپ ئىككىگە بولىنىدۇ. ھەقىقى تۇغماسلىق دەپ تۇغما ھالدىكى تۇغماسلىققا، يەنى شۇ كىشىنىڭ تۇغۇت-لىشىدىكى تاناسىل ئەزالاردىكى كەمتۈكلەرگە ئىپتىلىدۇ. غەيرى ھەقىقى تۇغماسلىق دەپ تۇغۇلغاندىن كېيىن ياكى بىر قانچىنى تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن ھەرخىل كېسەللىكلەر سەۋىبىدىن تۇغماس بولۇپ قالغانلىققا ئىپتىلىدۇ.

تۇغماسلىقنىڭ سەۋەپلىرى ئەر-ئايال ھەرئىككىسى تەرەپتە بولۇشى مۇمكىن. تۇغماسلىقنى داۋالاش ئۇچۇن ئالدى بىلەن، قايسى تەرەپنىڭ سەۋەپچى ئىكەنلىكىنى ئايرىش لازىم. بۇنىڭ ئۇچۇن تۇغماسلىق ئايال تەرەپ-تىلىگى ئېنىقلانغاندىن كېيىن توۋەندىكى سەۋەپلەرنى ئىزلەپ شۇ ئاساستا داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

(1) مىزاجنىڭ ماددىسىز بۇزۇلۇشى سەۋەپلىك تۇغماسلىق؛

مىزاجنىڭ ماددىسىز بۇزۇلۇشلىرى دېگەننىمىز، بەدەن كەيپىياتىدا، ئىسسىقلىق، سوغاقلىق، قۇرۇقلۇق

ۋە نەملىكلەردىن بىرىنىڭ ئولچەمدىن زىيادە بولۇپ قېلىشىدىن ئىبارەت غەيرى تەبىئىي ئەھۋالنى كورسىتىدۇ. بۇ ئومۇمىي بەدەندە، شۇنداقلا بالىياتقۇ (رەھىم) دە ئوز ئىپادىسىنى كورسىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەندە بۇزۇلغان ياكى ئولچەمدىن زىيادە بولغان مىزاجنىڭ ئالاھىدە ئالامەت-لىرى كورلىنىدۇ (بىرىنچى قىسىم مىزاجلارغا قاراڭ).

ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلغاندا، ئومۇمىي ئالامەتلەر بىلەن بىللە ھېمىز قارامتۇل ۋە قويۇق كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مىزاجىنى ئوزگەرتىشكە؛ بىنەپشە، ئىسلۇفەر، خەشخاش، ئالما سۈيى، ئاق سەندەل، لىموندىن تەركىپ تاپقان شەرۋەت بېرىلىدۇ. ھەم تەمرى ھىندى، ئەينۇلا ۋە پۇ - نۇس، خىيارى شەنبەرنىڭ تەمى چىقىرىلغان سۈيى بېرىلىدۇ. بالىياتقۇ مىزاجىنى تەكشەش ئۈچۈن ئوردەك ۋە توخۇ يېغىنى بىنەپشە يېغى بىلەن قوشۇپ يۇيۇپ تازىلاپ ھورلانغان يۇڭدا پىلتە ياساپ جىنىسى يولغا قويۇلىدۇ.

سوغاقتىن بولغانلىرىدا ئومۇمىي بەدەندىكى ئالامەت-لىرىدىن تاشقىرى، ھېمىز ئاز ۋە ئۇزۇن مۇددەتتە رەڭگى ئاقۇش ۋە سۇيۇق كېلىدۇ. دوۋسۇندا تۈك شالاڭلىشىپ كېتىدۇ. پۈتۈن بەدەن مىزاجىنى ئوزگەرتىش ئۈچۈن، مەش-دىرتۇس (25 - نۇسخە) ۋە داۋائىل مىشكى (22 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. زەپەر، سۇمبۇل، ئەكىلىل مىلىك، سازەنجى ھىندى،

قەرەدمەنا، ئودەك يېغى، بادام يېغىدىن لازىم مىقداردا ئېلىپ
يۇيۇپ تازىلاپ ھورلانغان قوي يۇڭى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ
جىنىسى يولغا قويۇش كېرەك. ھېسزىدىن كېيىن قىزىل زەر -
نىسخ، مۇرمەككى، جويۇز، سەۋرە، مېئە سائىلە، قۇننە،
ھەببىلغارلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، كويدۇرۇپ چىق -
قان ئىس بىلەن جىنىسى يول ئىسلىنىدۇ.

قۇرۇقلۇقتىن بولغانلىرىدا، ئومۇمى بەدەندىكى قۇ -
رۇقلۇق ئالامەتلىرىدىن باشقا، ھېيىز كەلمەسلىك، قەۋ -
زىيەت ۋە جىنىسى يول قۇرغاقلىشىشلار بولىدۇ، بەدەن
مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، دائىم سۇت ئىچىش بى -
لەن شەرۋىتى بىئەپشە ۋە شەرۋىتى نىلۇفەر (74 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ. جىنىسى يولغا يۇقۇرىدا كورسىتىلگەن دورىلار
قويۇلىدۇ.

نەملىك بولغانلىرىدا: ئومۇمى بەدەندىكى نەملىك
ئالامەتلىرىدىن باشقا، جىنىسى يولىنىڭ دائىم نەم -
لىشىپ تۇرۇشى ۋە ئاق خۇن كۆپىيىشلەر يۈز بېرىدۇ.
بۇنىڭ ئۈچۈن سېرىق چىچەكنى سىركە بىلەن كۆپ سۇ -
دا قاينىتىپ ئىچكىزۈپ قەي قىلىدۇرۇش ياخشى نەتىجە
بېرىدۇ. شەھى ھەنزەل، ئەنزىرۇت، شىبىت، سۇماق،
ئۇدھىندى، زەپەر ۋە مۇرمەككىلەرنى باراۋەردىن ئېلىپ
سوقۇپ ئېرىتىلگەن ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ پۇچۇلانغان قوي
يۇڭى بىلەن جىنىسى يولغا قويۇلىدۇ.

(2) ئومۇمى بەدەن ۋە بالىياتقۇ مىزاجىنىڭ ماد -
دىلىق بۇزۇلۇشلىرىدىن كېلىپ چىققان تۇغماسلىق:

ئالامەتلىرى: بۇزۇلغان خىلىتلەر (مەسىلەن، قان، سەپرا، سەۋدا ۋە بەلغەم) ئۇچۇن خاس بولغان بۇيۇمى بەدەن ئالامەتلىرى كورۇلىدۇ (خىلىتلار بايانىغا قاراڭ).
داۋاسى: قان ئالامەتلىرى بولسا، ئاياق تەرەپ - لەرگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. نوقۇتى تەمرى ھىندى (55 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بەلغەمدىن بولسا، قەي قىلدۇ - رۇش، ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بىلەن بەدەن ۋە بالىياتقۇنى بەلغەم ماد - دىسىدىن تازىلاش كېرەك. سەۋدادىن بولسا مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سەپرادىن بولغاندا مەت - بۇخى ھېلىلى بىلەن مەتبۇخى تەمرى ھىندى (115 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) ئايال كىشى بەك سەمرىپ كېتىپ، بالىياتقۇدا ياغ كوپىيىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىققان تۇغماسلىق:
ئالامەتلىرى: قوسىغى يوغان، بەدنى سېمىز بولۇپ، ئىش ۋە ھەركەتتە نەپەس قىستايىدۇ.

داۋاسى: ئورۇقلىتىش تەدبىرلىرىنى قىلىش لازىم. مەسىلەن، ئەمگەك قىلدۇرۇش، ھىجامەت قويۇش ۋە مىزاجىغا قاراپ سۇرگە بېرىش كېرەك. قۇۋۋەتلىك غىزالارنى ئاز بېرىش، ئىستىرىپىل سەغىر (5 - نۇسخە)، جەۋارىش كۇمۇنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. داۋائىل لوڭ (173 - نۇسخە) نىڭ بۇ جەھەتتە مەنپەئەتى زور.

(4) ئايال بەك ئورۇق ۋە زەئىپ بولۇش تۈپەي - لىدىن كېلىپ چىققان تۇغماسلىق:

ئورۇق ۋە زەئىپ ئاياللارنىڭ بالىياتقۇسىدا ئورۇقنىڭ تۇتۇلىشى ناچارلىشىپ ھامىلە بولمايدۇ.

داۋاسى: لوبۇبى كەبىر ۋە سەغىر (171 - نۇس - خە) لەردىن بىرى بېرىلىدۇ. تەرەنجىۋىل بىلەن ھالۋا تەييارلاپ يېيىشكە، مېغىزلىق نەرسىلەرنى كۆپ يېيىشكە بۇيرۇپ، سەمىرىتىشكە ئامال قىلىنىدۇ.

(5) ھېپىز توختاپ قېلىش تۈپەيلىدىن تۇغماسلىق: ھېپىز توختاش (كېسىلىش) يېشىغا بارماستىن تۇرۇپ ھېپىز كەلمەسلىك تۇغماسلىقنىڭ بىر سەۋىيىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ھېپىز ماڭدۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش لازىم (ھېپىز كەلمەسلىك كېسىلىگە قاراڭ).

(6) بالىياتقۇدا ھەرخىل ياللۇغلىنىش، ئىششىق، جاراهەت ۋە گۆش ئۇنۇش تۈپەيلىدىن بولغان تۇغماسلىق:

(7) بالىياتقۇدا قويۇق يەل ھاسىل بولۇش سەۋىيىسىدىن تۇغماسلىق:

ئالامەتلىرى: دوسۇن ۋە كىمىدىك ئارىلىغىدا دوم - باق ئىششىق پەيدا بولۇپ، باسقاندا يەلدەك يوقىلىپ كېتىدۇ. ئاغرىش ياكى باشقا ياللۇغلىنىش ئالامەتلىرى بولمايدۇ. قوساق ئاستىنقى قىسمى كۆپكەندەك سېزىلىدۇ. يەللىك نەرسىلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلغانلىق

تارىخى بولىدۇ (بۇنداقلار ئەگەر ھامىلە بولۇپ قالسىمۇ بالىسى چۈشۈپ كېتىدۇ).

داۋاسى: ھەركۈنى 2 قېتىم (ئەتە - ئاخشام) بېىد - يان ئەرەقى بىلەن گۈلقەن ۋە شەرۋىتى مائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) بىلەن ئىىنەك پىستى يېغى بېرىلىدۇ. جەۋارىش كۇمۇنى (49 - نۇسخە) بېرىپ يەل تازىلىنىدۇ. (8) بالىياتقۇ ئاغزىنىڭ مايماقلىشىپ قېلىشىدىن تۇغماسلىق:

ئالامەتلىرى: ئاغرىپ ھېيىز كورىدۇ. ئاەەتتىكى چاغلاردا جىنسى يولىدىن شىرىلىك سۇيۇقلۇق چىقىپ تۇرىدۇ. بۇ ئەھۋال بىرىنچى تۇغۇتتىن كېيىن بالىياتقۇ - نىڭ ئۆز ئورنىغا توغرا كەلمىگەنلىگى ياكى ئۇنىڭ پەي باغلاملىرىغا زەرەر يەتكەنلىگىدىن بولۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەۋەپلىرىنى تىپىپ ئۇنى داۋالاشنى ئاساس قىلىش، ئۇنىڭغا قوشۇمچە توۋەندىكى چارلارنى كورۇش كېرەك.

ئەنجىر، بابۇنە، شۇمشە، زاراڭزا، زىغىرلارنى بارا - ۋەر مىقداردا ئېلىپ، بىرچوڭ چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ، بىر ئاز گۈل يېغى قوشۇپ ئىلمان ھالەتتە ھوققە ئەس - ۋابى ئارقىلىق جىنسى يولغا كىرگۈزۈپ، بالىياتقۇ چە - لاندۇرۇلىدۇ. دېڭىزىيا (فادى زەھرە ھايۋانى)نى ئىستە - ھال قىلىش ھەر خىلدىكى تۇغماسلىقلار ئۇچۇن ياخشى مەنپەئەت بەرگەنلىگى توغرىسىدا جاتىرىلەر بار.

ھامىلدارلىق ئالامەتلىرى ۋە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك نىشانلار

ھامىلدار بولغانلىق ئالامەتلىرىدىن مۇھىملىرى — ھېيىز توختىشى بولۇپ، بالىياتقۇ ئاغزى يۇمۇلۇپ قالىدۇ. بۇ چاغدا ھامىلدار ئايال كىندىك بىلەن دوسۇن ئارىلىقىدا يەڭگىل يېقىمىسىزلىق ياكى ئاغرىش سېزىدۇ. جىنسى ئالاقىدىن قاچىدۇ. ئەمچەك تۇگمىسى ئەتراپى قارا رەڭگە كىرىدۇ، كوز ئېقى كۆكۈمۈل بولۇپ قالىدۇ. كوڭلى ئاينىش، قۇسۇش، بەزى نەرسىلەرگە ئامراق، بەزى نەرسىلەردىن يىرگىنىدىغان بولۇپ قېلىشقا ئوخشاش ئەھۋاللار كورۇلىدۇ. بۇ ئادەتتە سېزىك دەپ ئاتىلىدۇ. بەزى ئاياللار ھەرخىل غەلىتى نەرسىلەر مەسىلەن، سېغىز توپا، گەژ، ساپال قاتارلىقلارنى يىيىشكە ئامراق بولۇپ قالىدۇ. بۇلار ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى بولۇپ، ئۇندىن كېيىن قوساق روشەن ھالدا چىكىنىدۇ. قوساقتىكى بالىنىڭ مىدىرلىشى ھەممىگە ئايان ئالامەتتۇر.

ھامىلدارلىقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك نىشانلار.

ھامىلدار ئاياللار ھامىلە ۋە ئۆزىنىڭ سالامەتلىكىنى ساقلاش ئۈچۈن توۋەندىكى نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش لازىم:

(1) ھامىلە 7 ئايلىق بولۇشتىن بۇرۇن ئېغىر نەرسە كۆتىرىش، سەكرەش، ئېغىر ئەمگەك قىلىش، ئۈز-كۈك ۋاقىراش، غەم، قايغۇ، غەزەپ، قورقۇپ كېتىش

قاتارلىق ئىشلاردىن ساقلىنىشى لازىم. سۈرگە ئىچىش،
قان ئالدۇرۇش قاتارلىقلار مەنى قىلىنىدۇ. ھامىلدارلىق-
نىڭ دەسلەپكى بىر قانچە ئېيىدا جىنسى ئالاقە چەكلە-
نىدۇ.

(2) 7- ئايلىقتىن كېيىن، يۇقۇرقلارغا دىققەت
قىلىش بىلەن بىللە غىزاسىغا ئەھمىيەت بېرىش لازىم.
يەللىك نەرسىلەر (پۇرچاق خىلىدىكى دانلار، كاۋا، ياڭيۇ،
جۈسەي قاتارلىقلار) دىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ئەگەر
سۈرگە بېرىشكە توغرا كەلگەندە مەجۇنى خىيارى شەنبەر
بېرىلىدۇ. ياكى قان ئېلىش بەك زورۇر بولغاندا، ئۇنىڭ
ئورنىغا ھىجامەت قويىلىدۇ. ھامىلدار ئايال ۋە ھامىل-
نىڭ ساغلام بولۇشى ئۈچۈن داۋائىل مىشكى (22-
نۇسخە)، مۇفەررىھى ياقۇتى (84-85- نۇسخىلەر) ياكى
مەشدىرتۇس (25- نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) سىزىك ئالامەتلىرى 4 ئايلىقتىن ئالدىنقى
ۋاقتىدا بولسا توختىتىش ھاجەتسىز. ئۇندىن كېيىن
يەنە داۋاملىق كوڭلى ئاينىش، قۇسۇش يۈز بېرىپ سا-
لامەتلىكىگە تەسىر يەتكۈزسە ئۇنى توختىتىش لازىم.
(مەئدە كېسەللىكلىرىگە قاراڭ). مەجۇنى كۈمۈنى (49-
نۇسخە) ۋە سۇيۇپى مۇقەۋۋى مەئدە (174- نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

(4) ھامىلدارلىقتا ھېيىز مېڭىپ كەتسە دەرھال
چارە قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرىسى كەھرىبا

(71 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ماش، ئانار گۈلى، ئانار پوستى، ئەنجۈرلەرنى سىركە بىلەن قاينىتىپ، تىرىپىلىرىنى قوساق ۋە دوسۇنغا تېگىش لازىم.

(5) يۈرەك سېلىش، خاپىغان تۇتۇش ۋە پۇت دۈم - بىسىگە ئىششىق پەيدا بولۇش قاتارلىق يۈرەك، بىرەرەك ۋە مىڭە زەرەرلەنگەنلىك ئالامەتلىرى كورۇلسە سەۋەپلە - رىگە قارىتا چارە قىلىنىدۇ.

(6) ئاي كۈنى يېقىنلاشقاندا ھەر كۈنى كەچتە تاتلىق بادام مېغىزى يىيىش، چۈچۈمەل نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش لازىم. سېرىق چىچەك، بابۇنە ۋە زىغىر ياغلىرى بىلەن بەل، توققۇز كوز ئىتراپلىرىنى ياغلاپ بېرىش لازىم.

كوپ بويىدىن ئاجراش (كەسرەتى ئىسقات)

ھامىلدارلارنىڭ بويىدىن ئاجراش (بالا چۇشۇپ كېتىش) ئادەتتە تەسادىپى بويىدىن ئاجراش ياكى ئا - دەتلەنگەن بويىدىن ئاجراش دەپ ئىككى خىلغا بۆ - لىنىدۇ.

تەسادىپى بويىدىن ئاجراشنىڭ سەۋىيىسى تاشقى زە - خىملىنىش مەسلەن، يېقىلىش، بەلگە زەربە تېگىش قاتارلىق تەسادىپى ھادىسىلەر تۈپەيلىدىن ۋە ئىچكى جەھەتتىن ھامىلدارلىق كېسىلى ياكى ھامىلدارلىقتا كۆپ قان كېتىش، ئىچ سۇرۇش، روھى تەسىراتلار، ھىڭگە ئوخشاش سېسىق پۇراقلىق نەرسىلەردىن قاتتىق سەس -

كىنىش ۋە قوپال جىنسى ئالاقە قاتارلىق سەۋەپلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئادەتلەنگەن (كوپ) بويىدىن ئاجراش ھەر قىيىن-تىمقى ھامىلدارلىقتا، توۋەندىكى سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن بالا چۈشۈپ كېتىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بالا چۈشۈپ كېتىش ئادەتكە ئايلىنىپ قالىدۇ.

مىگە ۋە روھى كېسەللىكلەرگە ئوخشاش ئومۇمىي بەدەن كېسەللىكلىرى؛ بالىياتقۇ مىزاجىنىڭ ماددىلىق ياكى ماددىسىز بۇزۇلۇشلىرى؛ بالىياتقۇ سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ كوپ-لىكى؛ بالىياتقۇ ئاغزىنىڭ بوشاپ كېتىشى (تەبىئىي ياكى كېسەللىك سەۋەپلىرى بىلەن)؛ بەدەن ئاجىزلاپ كېتىشى تۈپەيلىدىن بويىدىن ئاجراش كوپ ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: تەسادىپىي چۈشۈكلەردە كەلگۈسىدىكى ھامىلدارلىقتا مەزكۇر سەۋەپلەرگە دىققەت قىلىش، ھامىلدارلىقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارغا ئەمەل قىلىش لازىم.

ئادەتلەنگەن بالا چۈشۈپ كېتىشتە:

(1) مىگە، يۈرەكنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى (تەركىبىگە ياقۇت سېلىنغانى يەنى 84 - نۇسخە، داۋا ئىلمىشكى 22 - نۇسخە)، شەرۋىتى ئەۋرىشم (86 - نۇسخە)، خەمىرى گازىۋان ئەنبەرى (32 - نۇسخە) لەردىن بىرى ياكى ھەممىسىنى بېرىش، روھى جەھەتتىن ئالاھىدە دىققەت قىلىپ، ناچار تەسىراتلاردىن

ساقلاش لازىم؛ قۇرۇق - سوغاقلىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىشقا، ھۆل - ئىسسىق نەرسىلەر ئىستىمال قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ.

(2) بالىياتقۇ مىزاجى بۇزۇلۇشتىن بولغانلىقى بىلىنسە سەۋىيىگە قارىتا چارە قىلىش كېرەك (بالىياتقۇ مىزاجى بۇزۇلۇش ماۋزۇسىغا قاراڭ).

(3) بالىياتقۇ ئاغزى بوشاپ كېتىش، بالىياتقۇدا سۇيۇقلۇق كۆپىيىپ كېتىشلەردىن بولسا مائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) ۋە شەرۋىتى بۇزۇرى (130 - نۇسخە) بىلەن بىللە توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: ئايلىشى دورۇنەج ئەقرەبى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، تېشىلىمىگەن مەرۋايىست كەھرىبا، ئۇد ھىندى 3 مىسقالدىن، ئۇشنى، سۇمبۇل $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن. مەزكۇر

دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، 2 با - راۋەر ھەسەل قوشۇپ مەجۇن ياساپ ھەر كۈندە تاماقتىن كېيىن بىر مىسقالنى قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

(4) ئۇرۇق - ئاجىز ھامىلدارلارغا قارىتا سەھرىتىش چارىلىرى قىلىنىدۇ (تۇغماسلىق بابىغا قاراڭ).

قىيىن تۇغۇت

سېمىز، بالىياتقۇسىنىڭ ئېغىزى سوغاقلىق تەسە - رىدىن قورۇلۇپ قالغان، داس سۆڭىكى كېسەللىك ياكى تۇغما ھالدا تار بولغان ئاياللارنىڭ تۇغۇتى قىيىن ئو -

تەدۇ. بەزىدە ھامىلە توغرا كېلىپ قالغاندىمۇ تۇغۇش قىيىنلىشىدۇ. بۇنداقلارنىڭ ھامىلدارلىق دەۋرىدە ياكى ئۇنىڭدىن ئىلگىرى مەزكۇر ئالامەتلەر بولىدۇ (تۇغماسلىق بابىغا قاراڭ).

داۋاسى: قىيىن تۇغۇتۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش بەك مۇھىم. چۈنكى نۇرغۇن ئەھۋاللاردا، ھامىلدارلىق مەزگىلىدە داۋاملىق تەكشۈرۈش، تېگىشلىك چارىلەرنى كۆرۈش ئارقىلىق قىيىن تۇغۇتۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. شۇڭا ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىن باشلاپلا تۇغۇت قوبۇل قىلغۇچىلار، دوختۇرلارغا تەكشۈر-تۈپ تۇرۇش، بالا قوساقتا توغرىسىغا يېتىپ قالغان بولسا، ئۆز ۋاقتىدا سىرتتىن ئايلىنىدۇرۇپ تۈزلەش؛ ھامىلدارلىقنىڭ كېيىنكى ئايلىرىدا يېتىۋالماي كۆپرەك مېڭىپ ھەركەتلىنىپ تۇرۇش كېرەك.

8 ئايلىقتىن كېيىن، بەدىنى قوبۇل قىلغىدەك مىقداردا سۇت ئىچكۈزۈپ تۇرۇلىدۇ.

ئاي-كۈنلىرى يېقىنلىشىپ قالغاندا مونچىغا چۈ-شۈپ تەرلىنىش، مۇناسىپ ھول-ئىسسىق مايىلار بىلەن ياغلىنىپ تۇرۇش كېرەك.

تولغاق باشلانغاندىن كېيىن، قۇندۇز قەرى بىلەن كۈندۈرنى سوقۇپ بۇرۇنغا تارتتۇرۇپ چۈشكۈرتۈش مۇمكىن. تۇغۇش ئالدىدا 'چوڭ-كىچىك نەرسە قىلدۇرۇش، ياغلىق تاماق بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش كېرەك.

خىيارى شەنبەر پوستىنى يۇمشاق سوقۇپ، قايناقسۇغا چىلاپ، بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) ياكى ئوقۇت سۈيى بىلەن ئىچكۈزۈلسە بالا ئاسان تۇغۇلىدۇ.

بالا ھەمىيى چۈشمەسلىك

بالا تۇغۇلۇپ بولغاندىن كېيىن بالا ھەمىيى چۈشمەس ياكى بالا ئولۇك بولۇپ، تۇغۇلماي قالسا، بۇنىڭغا دەرھال چارە قىلىش لازىم. بولمىسا ئايالنىڭ ھاياتىغا تەسىر يېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: بالا ھەمىيى چۈشمىگەن بولىدۇ. بالا ئولگەن بولسا قوساقتا ھەركەت سىزىلمەيدۇ، قوسىغى سوۋۇپ كېتىدۇ، تومۇرى ۋە نەپسى تېزلىشىدۇ.

ئولۇپ قالغان بالا ياكى ھەمىيىنى چۈشۈرۈش تەدبىرلىرى ئوخشاش.

مۇشكى تارامىشى 2 مىسقال، پىرسىياۋشان، ئارچا مېۋىسى، تىرمىس، پۇدىنە ھەر بىرى 3 مىسقالدىن ئېلىنىپ، دورىلارنى سوقۇپ 2 مىسقال ناۋات قوشۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ.

كوندۇش، سىيادانلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ بۇرۇنغا تارتقۇزۇش ئارقىلىق چۈشكۈرتىلىدۇ (چۈشكۈرۈك كەلگەندە بۇرۇننى تۇتۇپ تۇرۇلسا، ئىچكى بېسىم قۇۋ - ۋىتى بىلەن ئولۇك بالا ياكى چۈشمىگەن بالا ھەمىيى چۈشۈپ كېتىشى مۇمكىن). ئەڭ ياخشىسى دوختۇرخانىلارغا

ئاپىرىپ، دوختۇرلۇق ئۇسۇللىرى ئارقىلىق تۇغۇتلۇق
ئايالنىڭ بەخەتەرلىكىنى تەمىن قىلىش لازىم.
تۇغۇتتىن كېيىن قوساق ئاغرىش ئەھۋاللىرى يۈز
بەرسە، ئىچىشكە مائىل ئۇسۇل بۇيرۇپ، ئارپا سۈيى ۋە
ياغلىق شورپا ئىچكۈزىلىدۇ؛ زىغىر شىمىرىسى ھوقنە قىلىنىدۇ.
ئىزخىر، سۈتتەر، سەلىخەلەرنى قاينىتىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ھامىلىنى چۈشۈرۈش

ھامىلدارلىق ئايالنىڭ سالامەتلىكى ۋە ھاياتىغا
خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھاللاردا، ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى
ئايلىرىدا توۋەندىكى چارىلار ئارقىلىق ھامىلىنى چۈ-
شۈرۈۋېتىشكە توغرا كېلىدۇ. لېكىن بۇ چارنى ھامىلىنىڭ
ۋاقتى، ھامىلدار ئايالنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا قاراپ
قوللىنىش زورۇر. بولمىسا ئانىنىڭ ھاياتى، سالامەتلى-
كىگە زىيان يېتىدۇ.

چارىلىرى: ئولۇك بالىنى چۈشۈرۈش ۋە بالا
ھەمىيىنى چۈشۈرۈش چارىلىرىنىڭ ھەممىسىنى بۇ مەق-
سەت ئۈچۈن قوللىنىشقا بولىدۇ.

ئەپسەننى بىلەن شاتەرەنى بىرقانچە ھەسسە
مىقداردا (3 - 2 مىسقال مىقدارى) ئېلىپ، قاينىتىپ ئى-
چىشكە بېرىلسە ھامىلە چۈشۈپ كېتىدۇ.

كۈنجۈتنى سىركە بىلەن سوقۇپ قايناقسۇ قوشۇپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يېرىم مىسقال ھىڭ، بىر مىسقال مۇر-
مەككى، ئۈچ مىسقال قۇرۇق سۇزاپنى يۇمشاق سوقۇپ،

ئارچا مېۋىسى قايناتقان سۇ بىلەن ئىستە-ئاشامدا بىر قېتىمدىن بېرىلسە بولىدۇ (پۈتۈن دورا مىقدارىنى بىر كۈندە ئىككىگە بولۇپ ئىچىلىدۇ). 2 سەر گۈنجۈتنى سوقۇپ ئىككىگە بولۇپ ئىستە-ئاشامدا بېرىلىدۇ. يۇقۇرقى چارىلارنى قىلىشتىن بۇرۇن ئايال موز-چىغا چۇشۇپ، قوسىغىنى ئىنەك پىتى يېغى بىلەن ياغ-لاپ، مايلىق شورپا ئىچىپ تۇرۇشى كېرەك. دورىلارنى بېرىش جەريانىدىمۇ بۇ چارىلار قىلىنىدۇ.

ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش چارىلىرى

جىنسى ئالاقىدا ئەر كىشى مەنىنى سىرتقا چىقىرىش ئارقىلىق ئەرلىك ئۇرۇغىنى بالىياتقۇغا چۇشۇر-مەسلىك كېرەك. جىنسى ئالاقىدىن كېيىن ئايال دەر-ھال ئورنىدىن تۇرۇپ بىرقانچە قېتىم سەكرەپ مەنىنى سىرتقا چىقىرىۋېتىشى مۇمكىن.

توۋەندىكى شامچىلارنى تەييارلاپ، جىنسى ئالا-قىمىدىن كېيىن ئايال كىشى جىنسى يولىغا (بالياتقۇ بوي-نىغايەتكىدەك قىلىپ) قويۇۋالسىمۇ ھامىلدار بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش مۇمكىن.

ئانار پوستى ئاستىدىكى گوشلۇك قىسمى بىلەن زەمچىنى باراۋەر مىقداردا سوقۇپ، ئازراق سۇدا ئەمدەپ، شامچە تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇپ قويىلىدۇ. لازىم بولغاندا كۈنجۈت يېغى بىلەن ياغلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

پىننە بىلەن چاشقان مايىغىنى سوقۇپ، ھەسەل قوشۇپ شامچە تەييارلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

جىنسى ئالاقىدىن كېيىن، سوقۇلغان ساپ پىلا-
پىلنى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، پەلگۈچ بىلەن جىنسى
يولىدىن كىرگۈزۈش لازىم.

يالغان ھامىلدارلىق (رىجا)

بەزى ئاياللاردا ھېمىز توختاپ كېتىپ، راست
ھامىلدارلىقنىڭ قىسمەن بەلگىلىرى پەيدا بولىدۇ. بەزى-
لىرىدە ھەتتا قوساق چوڭىيىدۇ، قوسىغى تەۋرەيدۇ. بۇ
ئەھۋال يالغان ھامىلدارلىق دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىبى: يالغان ھامىلدارلىقنىڭ ئەڭ كۆپ ئۇچ-
رايدىغان سەۋىبى بالىياتقۇدا ياكى قوساق ئىچىدە ھەر
خىل چوڭلۇقتا ئۆسمە گۆش پەيدا بولۇپ قېلىشتىن
ئىبارەتتۇر. بەزىدە قوساققا سۇ يىغىلىشىمۇ يالغان ھا-
مىلدارلىق بەلگىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: يالغان ھامىلدارلىق بەلگىلىرى ھە-
قىقى ھامىلدارلىققا پۈتۈنلەي ئوخشاش بولۇپ كەتمەيدۇ.
مەسىلەن، بالا مىدىرلاش سېزىمى بالا تەۋرىگەندەك بول-
ماي، ناھايىتى سۇس بىلىنىدۇ ئەمما ئايال كىشى ھا-
مىلدار بولۇپ قالدىم دىگەن گۇماندا بولغانلىغى ئۈچۈن
بەزىبىر يوق سېزىملەرنى سەزگەندەك قىلىدۇ. ئەمما ئاي
كۈنى توشۇپ (ھەتتا ئاي يىللار ئوتتۇپ) كەتسىمۇ
تۇغمايدۇ.

يەلدىن بولغان يالغان ھامىلدارلىقتا قوساق
ئېسىلگەندەك سېزىلىش، سانچىق پەيدا بولۇش ۋە ناغ-
راسىمان قوساققا سۇ چۈشۈش ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: يالغان ھامىلدارلىقنىڭ سەۋەبىنى ئې-
نىقلاش، ئەگەر بالىياتقۇدا گوش ئۇنگەن بولسا دەست-
كارە (ئوپىراتسىيە) قىلدۇرۇش كېرەك.
ئەگەر قوساققا سۇ چۇشۇش تۇپەيلىدىن يالغان
ھامىلدارلىق بەلگىلىرى كېلىپ چىققان بولسا، قوساققا
سۇ چۇشۇش كېسىلىدىكى چارىلار كوردىلىشى لازىم.

ھېپىز كوپ كېلىش

ھېپىزنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى كوپ كېلىشى "كەسرەتى
ھېپىز"، ھېپىز ئوز ۋاقتىدا كەلمەي ۋاقتىسىز كېلىشى،
توختاش ۋاقتىدا توختىماسلىقى "ئىستەھازە" دەپ ئاتى-
لىدۇ.

ھېپىز كوپ كېلىش كېسىلى سەۋەپلىرىگە قاراپ
بىرقانچە تۈرگە بولىنىدۇ:

1) قاننىڭ مىقدارى جەھەتتىن غەيرى تەبىئىلىكى
تۇپەيلىدىن ھېپىز كوپ كېلىش: ئالامەتلىرى — ئايالنىڭ
قول تومۇرى كوپۇشكەن، رەڭگى قارامتۇل قىزارغان
ھالدا بولىدۇ.

داۋاسى: چوڭ يۈتەغا ھىجامەت قويۇش، ئەم-
چەكنى چىڭ تېڭىپ قويۇش كېرەك، ئىچىشكە قۇرسى
كەھرىبا (71 - نۇسخە) بېرىپ توۋەندىكى نۇسخىدىكى
شامچىنى تەييارلاش جىنىسى يولىغا قويىلىدۇ.

نۇسخە: سۇرمە، ئانار گۈلى، زەمچى، دانىكا، كۇن-
دۇر، موزا، ئاقاقىيا ھەر بىرىدىن 3 مىسقالدىن

ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، قايناقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ
شامچە ياساپ قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

شەرۋىتى ئىنجىبار (72 - نۇسخە) نى يالغۇز ياكى
قۇرسى كەربىيا بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.

(2) ماددىلار سەۋىيىدىن بالىياتقۇ قانتومۇرلىرىنىڭ
ئېغىرى ئېچىلىپ قېلىشىدىن ھېيىز كۆپ كېلىدۇ.

ئالامەتلىرى: سەۋىيى خىلىتلارنىڭ ئالامەتلىرى
بولغاندىن تاشقىرى، بەدىنى ئاجىز، كەمقان بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن
1 - قىسىمدا كورسىتىلگەن چارىلەر قىلىنىدۇ.

(3) بەك كىچىك تۇرمۇشقا چىقىرىلسا كېيىنكى
چاغلاردا ھېيىز كۆپ كېلىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرقىلار بىلەن ئوخشاش.
بۇ چارىلار بىلەن ھېيىز توختىمىسا ئانارگۇلى،

قىزىل گۈل، موزا، شاھى بەللۇتلارنى يۇمشاق سوقۇپ گۈل
يېغى قوشۇپ پاكىز پاختىغا سېلىپ جىنىسى يولغا

تىقىپ قويۇش كېرەك.

بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى

بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى سىرتقى ئامىل
يەنى زەخمىلىنىش، ئۇرۇلۇش ۋە يېقىلىش قاتارلىق

ھادىسىلەردىن؛ ئىچكى سەۋەپلەر — قىيىن تۇغۇت، تۇغۇت-
تىكى زەخمىلىنىشلەر ۋە ئىسسىق خىلىتلارنىڭ بالىيات-

قۇغا چۇشۇشى، پاسكىنىلىق تۈپەيلىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوسۇن بىلەن كىندىك ئارىلىغى
ئاغرىيدۇ. ئاغرىش بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ قىزىتما پەيدا
بولۇشى مۇمكىن. دەسلەپ جىنىسى يولىدىن قانلىق سۇ -
يۇقلۇق كېلىدۇ. بۇ بالىياتقۇ تومۇرلىرى زەرەرلەنگەنلىك
ئىپادىسى بولۇپ، كېيىنچە مەزكۇر قانلىق سۇ قويۇقلۇق -
شىپ، سېسىق پۇراق ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ياللۇغلىنىشنىڭ
ئۇفۇنەتلەنگەنلىكىنى، يىرىك ئارىلاش سۇيۇقلۇق، كەلسە
ياللۇغلىنىشنىڭ يىرىك پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

داۋاسى: گۈشلۈك تاماقلار بېرىلمەيدۇ. قۇرسى
كەھرىبا (71 - نۇسخە) بېرىش بىلەن توۋەندىكى نۇس -
خىدىكى دورىنى تەييارلاپ جىنىسى يولغا قويۇش ۋە
ھوقنە ئۇسۇلى بىلەن بالىياتقۇغا بېرىش كېرەك.

نۇسخە: ئەنزۇرۇت، كۈلدۈر، خۇنسياۋشان، مۇر -
مەككى، زەمچى، ئانار پوستى، جويۇز، سەرۋىلەرنىڭ ھەر
بىرىدىن 5 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەل -
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى ياكى ئانار
سۈيى بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ پاختىغا مىلاپ جىنىسى
يولغا چوڭقۇر تىقىپ قويۇش كېرەك (بۇ ئۇسۇل تىبا -
بەتتە فەرزىجە دىيىلىدۇ). ئەگەر يىرىك پەيدا قىلغان
بولسا، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى ۋە شېكەر سۈيىنى
لازىم مىقدارىدا ئېلىپ، ھوقنە ئەسۋابى بىلەن بالىيات -
قۇغا قويۇپ، يىرىك ۋە ئۇفۇنەت تازىلىنىدۇ. يىرىك
تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، مەلھەمى باسلىقۇن (177 -
نۇسخە) ۋە گۈل يېغى بالىياتقۇغا ھوقنە قىلىنىدۇ.

بالياتقۇنىڭ يىرىڭلىق ئاقەسى (ناسۇر رەھىمى)

ئالامەتلىرى: بالياتقۇدىن داۋاملىق يىرىڭلىق زەرداپ سۇ كېلىدۇ، ئاغرىيدۇ، تارتىشىپ قېلىش ۋە مىڭگە زەرەر يېتىش خەۋپى بار.

داۋاسى: بالياتقۇ جاراھەتلىرىدىكى دورىلارنى كوپرەك مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ. بالياتقۇ ئىششىغان بولسا، توۋەندىكى نۇسخىدىكى شەرۋەت بېرىلىدۇ.

نۇسخە: چىلان 20 دانە، ئەينۇلا 15 دانە نىلۇفەر، ئاق لەيلى 3 مىسقال، شاتەرە، ھۇماما 5 مىسقالدىن، سەندەل، قەسبۇسزەررە، قىزىل گۈل ھەربىرى 2 مىسقالدىن، سانا 5 مىسقال. قۇرۇق ئۇزۇم 20 دانە، ئىت ئۇزۇمى، ئوسما ياپرىغى ھەربىرى 3 مىسقالدىن، خاڭگا ئۇرۇغى، قو-غۇن ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، خىيارى شەنبەر بىر سەر، تەرەنجىۋىل 2 سەر، بادام يېغى 5 مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى (172 - نۇسخە) بىلەن ئوخشاش.

ئاق خۇن كېسىلى (سەيلانى رەھىم)

خىلىتلار تەسىرى بىلەن بالياتقۇدىن دائىم ھەر-خىل سۇيۇقلۇقلار (قان ۋە سەۋدا، سەپرا، بەلغەمنىڭ كېرەكسىز غەيرى تەبىئى سۇيۇقلۇقلىرى)نىڭ چىقىپ تۇرۇشى ئاق خۇن كېسىلى (سەيلانى رەھىم) دەپ ئاتىلىدۇ.

بەلگىسى: خىلىتلارنىڭ غالىپلىقىغا قاراپ بەلگە-

لىرى بولىدۇ. بىراق ئاق خۇن كېسىلى بار ئاياللارنىڭ چىرايىدا پاقىراق نۇر ئازىيىپ كېتىدۇ. روھى ئالامەت-لىرىمۇ بولىدۇ.

داۋاسى: قاندىن بولسا خەرنۇپ، جۇبتى بەللۇت، كويدۇرۇلگەن موزىلارنى ھەببۇل ئاس سۈيى بىلەن نەملەپ جىنسى يولىغا قويۇلىدۇ. سەۋدادىن بولسا گا-زىۋان ۋە بالەنگۇ قاتارلىق دورىلار بىلەن ماددىنى پىشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، مەتبۇخى ئەپتىمۇن بېرىپ ماددا سۇرۇپ چىقىرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن 3 مىسقال سەمىغى ئەرەبىنى قورۇپ، تالماكانا، تەمرى ھىندى مې-غىزىنى 2 مىسقالدىن ئېلىپ، ھەممىسىنى سوقۇپ كۈندە 2 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بەل-غەمدىن بولغان بولسا. ئايارەج پەيقارا بېرىپ بەلغەمنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن — چىغىرىتماق يىلتىزى، ئىز-خىر، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پاراسيۇن، قارا نوقۇتلارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ تەمىنى چىقىرىپ، مەزكۇر سۇغا 5 مىسقال ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) قوشۇپ جىنسى يولىغا ھوقنە قىلىنىدۇ. ئەگەر بالىيات-قۇدا ئېچىشىش ئالامەتلىرى بولسا بۇ ھوقنەنى قىلماس-لىق كېرەك. سەۋدادىن بولغاندا مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىپ ئاندىن كېيىن پاقا يوپۇرمىغى ئۇرۇغى، سېمىز ئوت، بالەنگۇ، بىيە ئۇرۇغى، ئىسپۇغۇل لۇئاب-لىرىنى قاينىتىپ جىنسى يولىغا ھوقنە قىلىشقا ۋە ئى-چىشكە بېرىلىدۇ.

ھېيىز كەلمەسلىك

ھېيىز توختاش يېشىغا بارماستىن تۇرۇپ ھېيىز كەلمەي قېلىش كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئاياللار سالامەتلىكىگە زور تەسىر يەتكۈزدى. سەۋەپلىرىگە ئاساسەن بۇ كېسەل بىر قانچە خىلغا بۆلىنىدۇ:

قان ئازلىقتىن ھېيىز كەلمەسلىك:

سەۋىيى ۋە ئالامىتى: بۇرۇن كۆپ قان كەتكەن، ئىچ سۈرگەن ۋە كۆپ مىقداردا قان ئالغانلىق تارىخى بولىدۇ. ياكى ئۇزاق ئاچ قېلىش ۋە ئوزۇقلىنىش ئاز-چارلىقلىرىمۇ سەۋەپ بولۇشى مۇمكىن. مۇنداقلارنىڭ چىرايى سېرىق، ئوزى ئورۇق ۋە زەيىپ بولىدۇ.

داۋاسى: ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاپ قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى بېرىش لازىم. تۇخۇم سېرىغىنى چالاپىشۇرۇپ بېرىش، گۆش ۋە ياغلىق شورپا، سۈت، شېكەرلەرنى ئىستىمال قىلىش ۋە كۆپرەك دەم ئېلىش كېرەك. قان قويۇقلىشىپ قېلىشى ياكى قويۇق خىللىقلار قانغا قوشۇلۇپ قېلىشتىن ھېيىز كەلمەسلىك.

ئالامەتلىرى: بەدەنلىرى ئاق ۋە سۇس بولىدۇ. كۆكرەپ تۇرغان تومۇرلار تېرىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ. سۆيۈك كۆپ، ھەزىمى ناچار بولۇپ، تەرىتىدىن بەلغەم-دەك نەرسىلەر كېلىدۇ. كۆپ ئۇخلايدۇ، ھېيىز كەلسە خۇددى ئوپىكىنى قانسىراتقان سۇدەك سۇس قىزىل كېلىدۇ. **داۋاسى:** پاقالچەككە ھىجامەت قويۇلىدۇ. ئايارەج

پەيتقارا (16 - نۇسخە) بىلەن ماددىلار تازىلىنىدۇ ياكى مۇنۇ نۇسخىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ.

نۇسخە: چىڭسەي ئۇرۇغى، ئۇشە 5 مىسقالدىن، رۇمىدىيان، پىرسىياۋشان، قوغۇن ئۇرۇغى. پىننە، مۇشكى تارامىشى، ئارپا بېدىيان ھەربىرى 3 مىسقالدىن. گۈلقەن 2 سەر. دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 چوڭ چىنە سۇ قۇيۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ، گۈلقەننى قوشۇپ، مەجۇنى پودىنە بىلەن (126 - نۇسخە) بىر كۈندە ئىچىپ بولىدۇ.

باليئاتقۇ تومۇرلىرىنىڭ قېتىپ قېلىشىدىن ھېمىز كەلمەسلىك.

ئالامەتلىرى: تومۇر ھەركىتى مۇختىلىپ، بەدەن رەڭگى ئاق بولىدۇ. ئومۇمى بەدەندە ئېغىرلىق ۋە روھى ئالامەتلىر كورلىنىدۇ.

داۋاسى: تۇغماس كېسىلىدە كورسىتىلگەن چارد-لارنى قىلىش ۋە قۇرسى مۇرى مەككە (176 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

قىزلىق پەردە پۇتەي بولغانلىقتىن ھېمىز كەل-مەسلىك: بالاغەتكە يەتكەن قىزلاردا ئۇچرايدۇ. ھېمىز كۈنلىرىدە دوسۇن قاتتىق ئاغرىپ چىققىلىدۇ. تەكشۈر-گەندە قىزلىق پەردە پۇتەيلىگىنى كورگىلى بولىدۇ.

داۋاسى: تىغ بىلەن كېسىپ يولنى ئېچىش كېرەك.

باليئاتقۇ چىقىپ قېلىش (خۇرۇجى رەھىم)

باليئاتقۇ پەيلىرى سوزۇلۇپ كەتكەندە باليئاتقۇنىڭ

بىر قىسمى توۋەلىگە چۈشىدۇ. بەزىدە بالىياتقۇنىڭ پۈتۈن قىسمى جىنسى يولىدىن چىقىپ قالىدۇ.

سەۋەبى: كوپ بالا تاشلاش، ئىگىز جايىدىن سەكرەش، ئېغىر يۈك كۈتىرىش، ئەمگەكنىڭ بەدەن قابىلىيەتىدىن ئارتۇق بولىشى، تۇغۇتتىن كېيىن بالىياتقۇ ئەسلىگە كەلمەستىن تۇرۇپ ھەركەت قىلىش قاتارلىقلار سەۋەپ بولىدۇ. ئوتتۇرا ياشلىق ۋە قېرى ئاياللاردا كوپ ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن بەل ۋە سۆڭەك چىڭ -

قىلىش، تېلىش ۋە ئاغرىشقا ئوخشاش سېزىملار تەدرىجى ھالدا ئېغىرلىشىپ بارىدۇ، جىنسى يولىدا بالىياتقۇ چىڭ - قىلىپ سېزىلىدۇ. كېيىنچە روشەن ھالدا سىرتقا چىقىدۇ. ھەركەتكە دەخلى قىلىدۇ. ئىشتانغا سۈركىلىپ يارا ھاسىل قىلىدۇ. كېسەل بەك ئازاپ چېكىدۇ، شەلۋەرەپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: بالىياتقۇنى پاسكىنچىلىقتىن تازىلاپ،

توۋەنكى نۇسخىدىكى دورىلاردا يۇيۇپ، گۈل يېغى، ئاز - راق زەپەر ۋە باشقا خۇشپۇراق دورىلار بىلەن بالىياتقۇ يۇقۇرقى قىسمىنى ياغلاپ جىنسى يول ئىچىگە كىرگۈزۈپ، تەۋەندە يېزىلغان جىنسى يولغا كىرگۈزىدىغان دورا نۇسخىسىنى تەييارلاپ، جىنسى يولغا قويۇپ پاكىز لاتا بىلەن چىڭ قىلىپ تارتىپ ياغلاپ قىيىلىدۇ. بۇ ئىشلارنى ئايال ئوڭدا ياتقان شارائىتتا ئىشلىنىدۇ.

(1) نۇسخە: چىلان 15 دانە، ئاق لەيلى گۈلى

5 مىسقال، بىنەپشە 5 مىسقال، گازىۋان، قىزىلگۈل، ئىت ئۇزۇمى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، قۇرۇق ئۇزۇم

20 دانە، ئەينۇلا 10 دانە، قارا شېكەر بىر سەر. قە-
زىلچا سۈيى، ئىت ئۇزۇم سۈيى 2 سەردىن، گۈل يېغى
بىر سەر، دورىلارنى چالا سوقۇپ، ئېھتىياجغا لايىق سۇ
بىلەن قاينىتىپ، تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ، سۈيىگە شې-
كەر، سۇيۇق دورىلار ۋە گۈل يېغى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
سىرتقا چىقىپ قالغان بالىياتقۇنى چايقاشقا ياكى بالىيات-
قۇ تېخى سىرتقا چىقمىغان بولسا جىنىسى يولغا ھوقنە
قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(2) نۇسخە: قورنە، مۇمىيا، تاباشىر، خەرنۇپ،
پۇپەل، موزا، ئاقاقىيا، داۋا ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، دورى-
لارنى يۇمشاق سوقۇپ زەمچى سۈيى ياكى رەيھان سۈيى بىلەن
سۇيۇلدۇرۇپ (ئوماچ ھالىغا كەلسە بولىدۇ) ئۈشكە تىۋىتى
ياكى پاخسىغا ئوبدان سىڭدۈرۈلىدۇ. يۇقۇرىدا كۆرسىتىل-
گەن چارىلەر بويىچە بالىياتقۇغا كىرگۈزۈلۈپ، ئاندىن
مەزكۇر پاخسىنى بالىياتقۇ گەۋدىسىگە يېقىن ھالدا جىن-
سى يولغا قويۇپ، ھېيىز لاتىسى باغلىغاندەك پاكىزە
ماتا بىلەن تېگىلىدۇ. ئايال 7 كۈنگىچە ئورنىدىن
تۇرماسلىقى ۋە ھەر قانداق ھەرىكەت قىلماسلىقى، 2
كۈنگىچە ئوڭدا ياتقان ھالىتىنى ئۆزگەرتىمەسلىكى كېرەك.
3 - كۈنى يۇقۇرىدىكى دورا قايتا يەڭگۈشلىنىپ، داۋالاش
بىر قانچە قېتىم تەكرارلىنىدۇ. ساقايغاندىن كېيىنمۇ
ئېغىر نەرسە كۈتىرىشتىن ساقلىنىش لازىم.

يۇقۇرقى چارىلەر بىلەن بىللە، توققۇز كۈز ۋە
ئەمچەك ئاستىغا قان چىقارماي ھىجامەت قويۇش كېرەك.

بۇ كېسەلگە ئىشلىتىلىدىغان ھوقىقە دورىسى ياكى جىنىسى يولغا كىرگۈزىلىدىغان دورىلارغا سېسىق پۇراقلىق دورا ئەشياسىرى قوشۇلۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

باليئاتقۇ يامان سۈپەتلىك ئوسمېسى (سەرتانى رەھىمى)

باليئاتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى ساقايماي سەر-
تان (راك) قا ئۆزگىرىپ قېلىش ھادىسىسى خېلى كۆپ
ئۇچرايدۇ. سەۋىيىسى — سەۋدانىڭ كويگەنلىگىدۇر.

ئالامەتلىرى: بالىياتقۇدا قاتتىق ۋە ئېغىز ئالماي-
دىغان كۆكۈمتۈل قىزىل ئىششىق كورۇنىدۇ. قان ۋە
زەرداپ چىقىپ تۇرىدۇ، تۇتقاندا ئىسسىق بىلىنىدۇ.
ئېچىشىپ قاتتىق ئاغرىش كېسەلنى بەك ئازاپلايدۇ،
ئاغرىش كۆكرەك تەرەپلىرىگە قاراپ ماڭىدۇ. باش قات-
تىق ئاغرىپ كېتىدۇ. بەزىدە كۆزىمۇ ئاغرىدۇ، كېسەل
تېز ئۆرۈقلەيدۇ. ئالدى بىلەن پاقالچەك گۆشلىرى يىگە-
لىپ كېتىدۇ، پۇت دۈمبىسى ئىششىپ، قوساققا سۇيى-
غىلىدۇ. كېيىن پۇتۇن بەدەنلىرى ئىششىپ ياكى ئورۇق-
لاپ قۇرۇپ ئۆلۈپ كېتىدۇ.

داۋاسى: كېسەلنى دەسلەپكى ۋاقتىدا تونۇپ، ئۆز
ۋاقتىدا دەستىكارە (ئوپېراتسىيە) قىلىپ داۋالانسا ھايا-
تىمنى قۇتقۇزۇپ قالغىلى بولىدۇ. كېسەل ئازاپلىرىنى
يېنىكىلىتىش ئۈچۈن بالىياتقۇ كېسەللىكلىرىدە كورسىتىپ
ئۆتۈلگەن ئاغرىق پەسەيتكۈچى ھوقىقە دورىلىرى ئىشلى-
تىلىدۇ ۋە ياللۇغلىنىشنى قايتۇرغۇچى دورىلار جىنىسى

يولغا كىرگۈزىلىدۇ. شۇمىشە، بابۇنە، زىغىر، بەسەي، ئاق لەيلى، ھەمىشۋالارنى قاينىتىپ سۈيىدە ئولتۇرغۇزۇلىدۇ.

ھىستېرىيە (ئېھتىناقى رەھىمى)

”ئېھتىناقى رەھىمى“ سوزى بالىياتقۇ بوغۇلۇپ قېلىش دىگەنلىك بولۇپ، ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدىغان ھىستېرىيە كېسەللىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ تارتىشىپ قېلىش، ھۇشىدىن كېتىش، بىر ەزگىل سۆزلىمەس، كۆزى كۆرمەس بولۇپ قېلىشتەك ئالاھىدە ئالامەتلەر بىلەن ئوتىدۇ. ئۇنى تۇتقاق كېسەلدىن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. ھىستېرىيىدە گەرچە سەۋەپچى ماددا ۋە كېسەلنىڭ قوزغىلىشى. بالىياتقۇدىن باشلانمىمۇ، مىگە ۋە يۈرەك قاتارلىق باشقۇرغۇچى ئەزالارغا تەسىر كۆرسىتىپ يۇقۇرىدا سۆزلەنگەن ئالامەتلەر كېلىپ چىقىدۇ.

سەۋىيى: ئاياللار ھېمىز خۇنى كەلمەسلىك بىلەن ياتقۇ ئىچىدە ئۇقۇنەت ۋە بۇخارات پەيدا قىلىدۇ. ئۇلار بالىياتقۇ تاملىرىغا تەسىر قىلىپ تارتىشىش ھالىتىنى كەلتۈرۈپلا قالماستىن، بەلكى مىگە ۋە يۈرەككە ئۆزلەيدۇ. **ئالامەتلىرى:** كېسەل تۇتۇش ئالدىدا ئاغرىقنىڭ

ئەقلى - ھۇشى قاراڭغۇلىشىدۇ، باش ئاغرىيدۇ، كۆزى قاراڭغۇلىشىدۇ، ئاغزى، بۇرنى ئىختىيارسىز ھەرىكەت قىلىدۇ، رەڭگى تاتىرىدۇ، كۆزى ياشاڭغىراپ، دوۋسۇن ساھەسىدە بىر يېقىمسىزلىق پەيدا بولۇپ، يۈرەككە قاراپ ماڭغاندەك سېزىلىدۇ. پۇت - قوللىرى بوشىشىپ كېتىدۇ، نەپەس ۋە تومۇر ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ، كېسەل يە -

قىلىپ ھۇشىدىن كېتىدۇ. بۇ چاغدا رەڭگى ساغرىپ، تومۇر ۋە نەپەس ئېلىشلىرى ئاستىلىشىپ، سېزىملىرى يوقىلىدۇ. ھىستېرىيىنىڭ تۇتقاق كېسەلدىن پەرقلىنىدىغان يېرى شۇكى: تۇتقاق كېسەلدە بالىياتقۇغا مۇناسىۋەتلىك سەۋەپلەر ۋە ئالامەتلەر (ھېيىز كەلمەسلىك، جىنسى تۈر - مۇشتىكى ئەھۋاللار ۋە بالىياتقۇ دوۋسۇندىكى يېقىمىسىز - لىقلار) بولمايدۇ. ئېغىزدىن كۆپۈك كېلىپ تۇرىدۇ. ئەمما ھىستېرىيىدە كۆپۈك كەلمەيدۇ.

كېسەل ھۇشىغا كەلگەندىن كېيىن تۇتقاقلىق تۇت - قان چاغدىكى ئەھۋاللارنى سوزلەپ بېرەلەيدۇ. تۇتقاق كېسەلدە سوزلەپ بېرەلمەيدۇ.

تۇتقاق كېسەلدە ھۇشىسىز ھالەتتە ياتقاندا ئالاقىز - دىلىك بولىدۇ. قول ئالىقانلىرى ئوچۇق ياتىدۇ. ھىس - تېرىيىدە مۇنداق بولمايدۇ.

داۋاسى: كېسەل تۇتۇش بەلگىلىرى كورۇلگەندە بەدەن ۋە قول - پۇتلىرىنى ئۇۋۇلاش ۋە تېگىش لازىم. تۈز ۋە قىچىنى قاينىتىپ پۇتلىرىنى يۇيۇش، ھۇشىسىز بولسا بەدەنگە سوغاق سۇ پۇركۇش لازىم. قۇندۇز قەرى، كۇندۇر، كۇندۇش قاتارلىق دورىلارنى جاۋۇش ۋە شور - پا قاتارلىق ئوتكۇر پۇراقلىق دورىلارنى قوشۇپ، سوقۇپ پۇرتىش لازىم. ياكى مۇقىل، گۇڭگۇرت ۋە يۇڭ - چۈ - پۇر قاتارلىق سېسىق پۇراقلىق نەرسىلەرنى كىيىدۇرۇپ پۇرتىش؛ خۇشپۇراق مايلا، ئىپار، ئىدنبەلەرنى يالغۇز ياكى باشقا خۇشپۇراقلىق سۇلاردا ئېرىتىپ، جىنسى يول ئارقىلىق بالىياتقۇغا قويۇش كېرەك. كىندىك ئاستى،

پاقالچەك، تىز ۋە يوتا قاتارلىق جايلارغا ھىجامەت قويۇش لازىم. بالىياتقۇنى ھەركەتلىنىدۇرۇش ئۈچۈن پىلىپىل، زەنجىۋىللىرىنى مۇۋاپىق يىاغلار بىلەن جىنىنى يولغا قويۇش كېرەك. ئەھۋالغا قاراپ بۇ چارىلەرنى كېسەل ھۇشغا كەلگىچە تەكرارلاش مۇمكىن. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن، مىزاج ئەھۋالىغا قاراپ، ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئىستەمىخقۇن (11 - نۇسخە)، ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)، ئايارەج لۇغانىزىيا (175 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. ئەڭ ياخشى چارە ھەپتىدە بىر قېتىم ئايارەج پەيقارا بېرىپ ئارقىدىن ھەجۈنى نۇجا (19 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئارىلاپ داۋائىل، مىشكى (22 - نۇسخە) بىلەن ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ. ئەگەر تۇتقاقلقتىن كېيىن ھارارەت بولۇپ، كۆز ئىچى قىزىل تۇرسا، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. تۇتقاقلق ئوتۇپ كەتكەندىن كېيىن ھىجامەت قويۇشنى ئويلاپ كۆرۈش مۇمكىن.

بالىياتقۇ سۇلۇق ئىششىغى

ئالامەتلىرى: ھېيىز توختايدۇ، قوساقنىڭ كىنىدىك ئاستى قىسمى دوۋسۇن ساھەسىدە ئىششىق كۆرىلىدۇ. باسقاندا خۇددى قوساق سۇلۇق ئىششىغىدەك سۇ بارلىق ئالامەتلىرى بولىدۇ، ئاغرىمايدۇ. جىنىنى يول ئارقىلىق تەكشۈرۈپ قارىغاندا، بالىياتقۇ چوڭىيىپ قالغانلىغىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بالىياتقۇدىن سۇيۇقلۇق كېلىپ تۇرىدۇ. **داۋاسى:** سىقىلىشلىق قوساققا سۇ يىغىلىش چا-

رېلىرىدىن تاللاپ ئىشلىتىش، قەي قىلدۇرۇش، سۇيدۇك راۋان قىلىدىغان دورىلارنى بېرىش مۇمكىن. بەزىلەر خەربەق سەپىتىنى سوقۇپ قابىز دورىلار بىلەن جىنسى يولغا قويۇشنى تەشەببۇس قىلىدۇ.

باليئاتقۇ يەلىك ئىششىقى

تىبابەتتە بۇ كېسەل بالىياتقۇنىڭ كۈچى قىلىدۇ. شى "نەفخەتى رەھىمى" دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى: قىيىن تۇغۇت ياكى بالىياتقۇ مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى بولۇپ، ئۇ بالىياتقۇ ھارارىتىنى تۈۋەنلەشتۈرۈپ قويۇق يەل (بادى غەلىز) تۈپەيلىشىغا ئېلىپ كېلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كىندىك ئاستىدا دۈگىلەك ئىششىق كۈتىرىلىپ چىقىدۇ. كۆپۈپ ئاغرىيدۇ. باسقاندا ئاغرىش يانپاش سوڭىكى ئەتراپىغا ۋە مەئدە تەرەپكە قاراپ ما-گىدۇ، چېكىپ كورگەندە ناغرىدەك ئاۋاز بېرىدۇ.

داۋاسى: ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) نى بېرىپ يەل ماددىسىنى ھەيدەش لازىم. ئۇندىن كېيىن، يەل توپ-لىشىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن جەۋارش كۈمۈنى (49 - نۇسخە)، سەنجىرىدا (33 - نۇسخە) ۋە مائىل ئۇسۇلى (105 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىش ئۈچۈن بابۇنە، سېرىق چېچەك، مەرزەنجۇش، سۇزاپ، چىڭسەي ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، ياۋا ئەمەن، زېرە ۋە جۇۋىنىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ بېرىلىدۇ. ھەم جىنسى يولغا ھوقنە قىلىنىدۇ. سېرىق چېچەك يېغى بىلەن سىرتتىن ياغلىنىدۇ.

XVI ماقالا. تاشقى ئەزا كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: تېرە كېسەللىكلىرى

تېرە كېسەللىكلىرى — تېرە ياللۇغلىرى، مودۇرلار، جاراھەتلەر، ھەر خىل يېرىڭلىق جاراھەت ۋە تۇرلۇك ئىششىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

تېرە ئاستى ھوكۇنەك توقۇلما يېرىڭلىق ياللۇغى
(فېلىڭمۇنى)

سەۋىيى: بۇزۇلغان ۋە ئۇفۇنەتلەنگەن (مىكرۇپ-
لانغان) قان سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تېرىدىن كوتىرىلىپ تۇرىدىغان كەڭ يېپىلغان تېرە ئاستى ئىششىغىدىن ئىبارەت بولۇپ، زەرەرلەنگەن تېرە قىزىرىدۇ. تۇتۇپ كورگەندە ئىسسىق سېزىلىدۇ. لوقۇلداپ چىدىغۇسىز دەرىجىدە ئاغرىيدۇ. يەرلىك تومۇرلار كۆپكەن ھالدا كورىنىدۇ. سۇيدۇك قىزىل، تومۇر ھەركىتى تېز بولىدۇ. ئىششىق بار جايغا قولنى قويۇپ تۇرۇلسا، يەرلىك تومۇرلارنىڭ قولغا ئۇرۇۋاتقان -

① فېلىڭمۇنى — ھازىرقى زامان تىبابىتىدە فېلىڭمۇنا دەپ

ئېيتىلىدۇ.

لىغى سېزىلىدۇ. ماددىنىڭ توپلىشىش ئەھۋالىغا قاراپ چىڭقىلىش بارغانسېرى ئېغىرلىشىدۇ. ھارارەت كۆتىرىد-لىدۇ. مىڭە ۋە يۈرەككە تەسىر بەرگەندە شۇ ئەزالارنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: قارشى تەرەپتىن قان ئېلىش يەنى ئىششىق بەدەننىڭ ئوڭ تەرەپىدە بولسا سول تەرەپ، قان تومۇرلىرىدىن (قەپالدىن)، سول تەرەپتە بولسا، ئوڭ تەرەپ تومۇرلاردىن قان ئېلىش كېرەك. ئەگەر كېسەللىك يېڭىلا باشلانغان بولسا، يەنى ئىششىق قاتتىق، قىزارغان ۋە بەدەن ھارارىتى، يەرلىك تېرە ھارارىتى يۇقۇرى بولسا، ماددىلارنى قايتۇرغۇچى دورىلار، مەسىلەن، ئاق سەندەل، فوفەل، گىلى ئەرمىنى، قىزىل سەندەل، مامىشا، ئاقاقىيا، قىزىل گۈل، كاسىن ئۇرۇقلىرىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، ئازراق سوقۇپ، كاسىن سۈيى بىلەن (كاسىن ئەرقى بولسا تېخىمۇ ياخشى) نەمدەپ ئىششىغان جاي ئۈستىگە قويۇش لازىم. شۇ نەرسىنى چۈشىنىش كېرەككى بۇ دو-رىلارنى چېپىشتىن مەقسەت — يەرلىك ئورۇنغا ماددىغا قارشى قۇۋۋەت بېرىش ۋە ماددىلارنىڭ داۋاملىق كېلىشىنى توساشتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن دورىلارنى قويۇشتا تېرىنىڭ ساق قالغان چېگرا قىسمىغا كۆپرەك قويۇش لازىم. ئىششىقنىڭ تەرەققى قىلغان دەۋرىدە بولسا، يۇقۇرقىلارغا يۇمشاتقۇچى تەسىرگە ئىگە دورىلارنى — ئارپا ئۇنى كۆك يۇمىلاقسۇت، كۆك ئاق لەيلى، كۆك ھەمىشۋالارنى باراۋەر

مىقداردا ئېلىپ قوشۇش كېرەك. ئاندىن كېيىن پۇرچاق ئۇنى، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، بابۇنە قاتارلىق بوشاشتۇر - غۇچى ۋە تارقاتقۇچى دورىلارنى قوشۇپ چېپىش لازىم. ئىششىق قايتىش دەۋرىگە كەچسە ماددىنى تارقاتقۇچى بابۇنە، ئەكىللى مىلىك، زىغىر، شۈمشە قاتارلىقلارنى چېپىش لازىم. ئەگەر ماددىلار يىغىلىپ (ئىششىق تېخىمۇ كوتىرىلىپ ئاقىرىپ مىلىقلىسا) زىغىر، ئەنجۇرنى سوقۇپ، ئازراق سۇ بىلەن نەمدەپ ئاغرىق جايغا قويۇپ تېگىلىسا، ئېغىز ئېلىپ يىرىك چىقىپ كېتىدۇ. ئەگەر ئۆزلىگىدىن ئېغىز ئالمىسا، تىغ بىلەن يېرىپ يىرىگىنى تامامەن چىقىرىۋېتىش لازىم.

تېرە ئاستى ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغىنى داۋالاشتا ھەم تېرىدىكى باشقا ياللۇغلىنىشلىق جاراھەتلەرنى داۋالغاندا، يۇقۇرىدا كورسىتىلگەن تەرتىپ بويىچە چارە قىلىنىدۇ. ئەمما قۇلاق ئارقىسى، قولتۇق، چاتىراق، باش، كۆكرەكتىكى جاراھەتلەرگە قايتۇرغى دورىلارنى چاپقىلى بولمايدۇ. بولمىسا ماددا ۋە ئۇفۇنەتلەر باشقۇر - غۇچى ئەزالارغا ئوتۇپ كېتىپ خەتەرلىك ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداقلاردا يۇمشاتقۇچى ۋە پۇشۇرغۇچى دورىلارنى چېپىپ، ئۆزىچە ئېغىز ئالدۇرۇپ يىرىگىنى چىقىرىش ياكى يېرىش كېرەك. كېسەل كىشىدە قەۋزىيەت بولسا تەمرى ھىندى، پۇنۇس، خىيارى شەنبەرلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قايناقسۇدا تەمىنى چىقىرىپ ئىچكىۋىزىلىدۇ ياكى مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

قارا سان كېسەلى (سەقا قىلۇس) ①

تېرە ۋە گەشنى كەڭ دائىرىدە چىرىتىپ ئولتۇر-
رىدىغان خەۋپلىك كېسەللىك بولۇپ، خەلق ئارىسىدا
قاراسان دىگەن نام بىلەن ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى: قاننىڭ ئۇفۇنەتلىنىپ بوزۇلىشى سەۋەپ
بولىدۇ. كېسەل ماددىسى قان تومۇرلاردا بولۇپمۇ شىريان
تومۇرلىرىدا توپىلىشىپ، گۆش ۋە تېرىلەرنىڭ ئوزۇق ۋە
ھاۋا بىلەن تەمىنلىنىشىنى توساپ قويىدۇ. نەتىجىدە شۇ
جاي ھاياتلىقتىن مەھرۇم بولۇپ ئولىدۇ. بۇنداق جاي يەنە
ئۇفۇنەت ئۇچۇن ماكان بولۇپ، چىرىش تەرەققى قىلىپ
ئەتراپقا تارايدۇ. ھەتتا پۇتۇن بىر ئەزانى (قۇل - پۇتنى)
چىرىتىپ، ئادەمنى ھالاك قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: دەسلەپتە زەرەرلەنگەن جايدىكى سەزگى
ئەسەپلىرى تولۇق زەرەرلىنىپ كەتمىگەنلىكتىن، ئاغرىش
سېزىمى بولىدۇ. بەزىدە تېشىلىپ قان زەرداپ ئاقىدۇ.
بەزىدە تېرىنىڭ يۈزى ساق كۆرىنىپ، تېرە ئاستى سې-
سىغان قوغۇندەك چىرىپ ماڭىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ. ئەڭ
ئالاھىدە ئالامىتى شۇكى، زەرەرلەنگەن جاي قارا بولىدۇ.
سىرتتىن قارىغاندا ئىششىغان، قارامتۇللاشقان تېرە ساق
تېرىدىن ئايرىلىپ تۇرىدۇ، ھارارەت يۈز بېرىدۇ. بەزىدە

① سەقا قىلۇس: ھازىرقى زامان تىبابىتىدە گانگرىنا دەپ

ئاتىلىدۇ.

مىڭە كېسەللىك ئالامەتلىرى يۈز بېرىپ مىڭە پەردىسىنىڭ ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىمۇ مۇمكىن.

داۋاسى: كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە بولسا ماددا چوڭقۇرلىشىپ، ئۇفۇنەت زىيادە بولۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن زەخمىلەنگەن جايغا ھىجامەت قويىلىدۇ. ھىجا - مەتنى ئىلاجىبار كۈچلۈك قويۇپ چوڭقۇر قاتلاملاردىكى بۇزۇق قاننى چىقىرىش كېرەك. ياكى تىغ بىلەن يېرىپ، گوش ئارىسىدىكى قويۇق ماددىلارنى چىقىرىش لازىم. ئاندىن كېيىن زەخمىلەنگەن جايغا پۇرچاق ئۇنى، سەك - بىنەج ۋە سىركىنى بىرلەشتۈرۈپ چېپىش لازىم. ياكى گىلى ئەرمىنى، موزا، زەمچە كۈشتىسى قاتارلىقلارنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ چېپىش كېرەك. ئەگەر كېسەل تەرەققى قىلىپ قارىداپ ماڭغان بولسا، ھايال قىلماستىن، مەزكۇر ئەزانى جەرراھلىق ئىلمى ① بويىچە كېسىپ تاشلاش شەرت.

يامان يارا (ھومرە، سۇرخى باد)

تېرە ئۈستىدە كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان قىزىل رەڭلىك قاپارچۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، سەپرادىن بولغىنى نۇقۇل يامان (خاس سۇرخى باد)، سەپرا ۋە قان بىلەن ئارىلاش بولغىنى نوقۇل بولمىغان يامان يارا (غەيرى خاس سۇرخى باد) دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: نوقۇل يامان يارىدا پاقىراپ تۇرغان

① جەرراھلىق ئىلمى — خەيرۇرگىيە ئىلمى

توق قىزىل رەڭلىك كەڭ يېيىلغان ئىششىق (تېرە يال-
لىغى) روشەن ھالدا تېرىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ. قاتتىق
ئېچىشىپ كۆيگەندەك سېزىلىدۇ. بەدەن قىزىيدۇ، تۇتۇپ
كۆرگەندە تېرىمۇ قىزىق بولۇپ، باسقاندا رەڭگى يوقىلىدۇ.
ئەتراپقا تارايدۇ. نوقۇل ئەمەس بولسا، ئانچە ئېچىش-
مايدۇ، ئەتراپقا كېڭەيمەيدۇ. باسقاندا رەڭگى ئۆزگەرمەيدۇ.
ھەر ئىككىسىدە سۇيىدۇك قىزىل، قويۇق، تومۇر ھەركىتى
يوغان ۋە تېز بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى
ھېلىلە II (178 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بەدەن تازىلىنىپ
بولغاندىن كېيىن ھول قاپاق تىرىپى، سېمىز ئوت، ئو-
سۇڭ، پاقا يوپۇرمىغىنى بىر ئاز يەنجىپ ئىسپۇغۇل لۇئابىنى
بىرلەشتۈرۈپ زەرەرلەنگەن جايغا قويۇش لازىم. تارقاق-
قۇچى دورىلارنى چېپىشىنىڭ ھاجىتى يوق. ئەگەر قان
بىلەن سەپرا ئارىلاشقان بولسا ئاۋال قان ئېلىش،
ئاندىن كېيىن گىلى ئەرمىنى، ئاق سەندەل، قىزىل
سەندەللەرنى قايناقسۇ ئىچىدە تاشقا سۇرۇپ، زەرەرلەنگەن
جايغا سۇرتىلىدۇ.

كوز يارا (جەمەرە)

گوش ۋە تېرىنى چوڭقۇرلاپ يەپ ماڭىدىغان يەل
كېسەل بولۇپ، بەزىلەر ئۇنى ئاتىشەك (سىفىلىس) نىڭ
بىر تۈرى دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: غەيرى تەبىئى سەپرانىڭ قانغا قوشۇل-
شىدىن بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۇمىلاق دانىخورەكتەك مۇدۇرچاقلار -
دىن ئىبارەت زەخمىلىنىشلەر كوردىلىدۇ. ئۇلار بىر
يىپىنى بىر قانچە دانە بولۇشى كۆپىنچە بىر سىزىق
ئۈستىدە تارقاق ياكى بىر جايغا غۇزمەكلەشكەن ھالدا
تۇرۇشى مۇمكىن. مۇدۇرلار تەرەققى قىلىپ چوڭ جارا -
ھەتكە ئايلىنىدۇ، بەدەنگە تاراپىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ. يارا
تېزلا چوڭقۇرلاپ گۆش قاتلىمىغا يېتىپ بارىدۇ. ئوتتا
كويىگەندەك ئېچىشىدۇ. زەخمىنىڭ تېگىدىن قىزىل گۆش
كۆرىنىپ تۇرىدۇ. يىرىك ھاسىل بولمايدۇ. تولۇق، توغرا
داۋالانسا قەقەچ باغلاپ، تېرە كىپەكلىشىپ ساقىيىدۇ.

داۋاسى: سەپرانى سۇرۇپ چىقىدىغان سۇرگە
بېرىلىدۇ. سىركە ئالغان قاقچىنىڭ تېگىدە قالغان لايىنى
ئېلىپ كاپۇر، گىل ئەرەمنى قوشۇپ جاراھەت ئۈستىگە
سۈرتىلىدۇ. بۇ دورىنى كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىستىگەن -
كەچتە سۈرتۈش كېرەك. ئاچچىق ئازار كىنىدىگىنى تېشىپ،
ئىچىگە ئازراق سىركە قۇيۇپ، ئوت ئۈستىدە بىر ئاز
قويۇپ، سۈيىنى سىقىپ جاراھەتكە قويۇلىدۇ.

كويىدۇرگە (قۇرۇھى ساھىلە)

سەۋىبى: غەيرى تەبىئى سەپرا بىلەن ئۇفۇنەتنىڭ
بىرىكىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. باشقا خىلىتلارنىڭ كويى -
گىنىمۇ سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن يارا چىقىدىغان ئورۇن
قاتتىق قىچىشىپ بىر ياكى بىر قانچە (كۆپىنچە بىر دانە)

قاپارتما ھاسىل بولىدۇ. بۇ قاپارتما دەسلەپتە قىزارغان ھالدا بولۇپ، كېيىنچە قارامتۇل رەڭگە كىرىدۇ، ناھايىتى قاتتىق ئاغرىيدۇ. خۇددى ھەرە چاققاندىكە، كۆيگەندەك سېزىم يۈز بېرىدۇ. قاپارتما تېز ۋاقىت ئىچىدە ئويۇلغان جاراھەتكە ئايلىنىدۇ. ئەتراپتىكى ئەزالارغا تەسىر بېرىپ ياللۇغلىنىشلىق دائىرە ھاسىل قىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن تىۋەندىكى نۇسخىدىكى مەتبۇخ بېرىلىدۇ:

نۇسخە: تەمىرى ھىندى، فۇنۇس، خىيارى شەنبەر ھەربىرى بىر سەردىن. سېرىق ھېلىلە 2 سەر، ئىت ئۇ-زۇمى، كاسىن ئۇرۇغى، شاتەرە، سانا، قىزىل گۈل ھەربىرى 3 مىسقالدىن، ئەينۇلا 20 دانە، چىلان 30 دانە، تە-رەنجىۋىل 2 سەر.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن تەمىرى ھىندى، فۇنۇس، خىيارى شەنبەر ۋە تەرەنجىۋىللەرنى ئايرىم قاچىغا سېلىپ، ئۈستىگە قايناقسۇ قۇيۇپ ئېرىتىپ راسا تەمى چىققاندىن كېيىن، داكا ئارقىلىق سوزۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى سو-قۇپ، 2 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ يېرىمى قالغىدەك دەرىجىدە قاينىتىپ سۇزۇپ، ئوبدان سىقىپ، يۇقۇرقى تەييارلىغان دورىلار بىلەن قوشۇپ بىر پىيالىدىن كۈنىگە 2 - 3 قېتىم ئىچىدۇ.

يۇقۇرقى دورىدىن مامىشا، روسۇت، ئاقاقىيالىرىنى كاسىن سۈيى بىلەن ئېزىپ جاراھەتكە چېپىلىدۇ. ھەم

توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار جاراھەتكە چېپىشقا بېرىدۇ.

نۇسخە: مۇزا، كۈندۈر، ھەربىرى 7 مىسقالدىن، زاك، زەمچى، مۇرمەككى ھەربىرى 4 مىسقالدىن، زىرا - ۋەند 12 مىسقال. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ رەيھان شارابى بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ جاراھەتكە چېپىلىدۇ ياكى چېپىشقا مەلھىمى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

نارفارسى

ئالامەتلىرى: ئىچىگە سۇ تولغان قاپارتمىلار پەيدا بولۇپ، قاتتىق ئېچىشىدۇ، قىچىشىدۇ. كۆيگەندەك سېم - زىملەر بولىدۇ. قاپارتمىلار يېرىلىپ قەقەش باغلاپ، كىپەكلىشىپ ساقىيىدۇ ياكى سېرىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ. قاپارتمىلار سۇ يىغىشتىن بۇرۇن خوددى توز (تاۋۇس) قۇيرۇغىدەك سىزىقچىلار ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئالامىتىگە قاراپ بەزىلەر ئۇنى يەل يارا (سىفىلىس) نىڭ بىر خىلى دەپ ئاتايدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) ۋە توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ.

نۇسخە: چىلان 100 دانە، تەمىرى ھىندى 2 سەر، ئانار دانىسى 4 سەر، ئارپا سۈيى، قاپاق سۈيى، ئىسپۇ - غۇل لۇئابى ھەربىرى بىر سەردىن.

تەييارلاش: چىلاننى پارچىلاپ 3 چوڭ چىنە سۇ قويۇپ، يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ئۈستىگە ئىسپۇغۇل

لۇئابىدىن باشقىلىرىنى سېلىپ، تەمىنى چىقىرىپ سوزۇپ ئىسپۇغۇل لۇئابىنى قوشۇپ بىر پىيالىدىن كۈنىگە 3 - 4 قېتىم بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن: قەلەي تۈزى، مەدەستان، ئاق سەندەل 4 مىسقالدىن، كاپۇر، روسۇت ھەربىرى بىر مىسقالدىن، ئىسپۇغۇل لۇئابى 5 مىسقال. پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى 3 مىسقال، قىزىل گۈل لۇئابى بىر سەر. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەل-گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ ۋە لۇئابلار بىلەن قويۇق ئوماچتەك دورا تەييارلاپ، جاراھەتكە قويۇق چېپىلىدۇ ياكى پاكىز لاتىغا سۈركەپ جاراھەت ئۈستىگە قويۇلىدۇ. يىرىڭلاش ۋە شەلۋەرەشلەر كورۇلسە سۈركەشكە مەلھىمى ئىسپىداج (179 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سۇلۇق قاپارتما

ئالامەتلىرى: كويگەندە ھاسىل بولىدىغان پۇرچاق ياكى ئۇنىڭدىن چوڭراق سۇلۇق قاپارتىملار.

داۋاسى: قاننى تازىلاش ئۈچۈن ئىچىشكە ئانار شەرىۋىتى، چىلان شەرىۋىتى، يىمىشكە سىركە بىلەن پىشۇ - رۇلغان ماش، چىلان بېرىلىدۇ. پاكىزە يىڭنە بىلەن جاراھەتنىڭ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن زەچسۈۋە، خىنە، قىزىل گۈل 4 مىسقالدىن، زەپەر، كاپۇر يېرىم مىسقالدىن ئېلىپ، سوقۇپ بىرئاز گۈلپ بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ قاپارتىملارغا چېپىلىدۇ ياكى مەلھىمى ئىسپىداج (179 - نۇسخە) بىلەن ياغلىنىدۇ.

يەلتاشما (شېرا)

ياپىلاق قىزىلغا مايىل قاپارتمىلار بولۇپ، ئىشەك يېمى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: ئوت، قان ۋە بەلغەم ماددىلىرىدىن ھاسىل بولغان يەللەر سەۋىيىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپىنچە تۇيۇقسىز قىچىشىش ۋە بىئاراملىق بىلەن بەدەندە قىزىل قاپارتمىلار پەيدا بولىدۇ. ئۇلار ياپىلاق شەكىلدە، تېرىدىن ئېنىق ھالدا كۆتىرىلگەن ھەرخىل چوڭلۇقتا بولۇپ، بەزىلىرى تېرىدىن كۆتىرىلىپ چىقىماسلىقى مۇمكىن. بەزىلىرىدىن سۇ ئاقىدۇ. قان ماددىسى سەۋىيىدىن بولسا، بەدەندە باشقا قان غالىپلىق بەلگىلىرى — قىزىتما، نەپەس ۋە تومۇر ھەرىكىتى تېزلىشىش، كۆز ئىچى قىزىرىشتەك ئالامەتلەر بولۇپ بەدەنگە كەڭ تارقىلىپ تۇرىدۇ. سەپرادىن بولغانلىرى ئانچە قىزىل بولماي، ئېچىشىش ۋە قىچىشىش ئېغىر بولىدۇ. بەلغەمدىن بولغاندا رەڭگى تېرە رەڭگىدىن ئانچە پەرقلىنمەيدۇ. ئەمما قاپارتمىلار چوڭ ۋە تېرىدىن خېلى كۆتىرىلگەن ھالدا بولىدۇ. كېچىسى كۆپ قىچىشىدۇ.

داۋاسى: ئانار شەرىتى (47 - نۇسخە)، ئەينۇلا ۋە قارا ئورۇك سۇلىرىنى بېرىش لازىم. ھارارەت ۋە بىئاراملىق زىيادە بولسا قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. يەرلىك قىزىتمىنى پەسەيتىش، تېرىنى يۇمشىتىپ تەر توشۇكلىرىنى ئېچىش ئۈچۈن گۇلاپ، سىركە، گۈل

يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ تېرىگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ياكى
پاقا يوپۇرمىغى، پالەك، ئوسۇڭنى يانچىپ سۈركەش ۋە
سىركە بىلەن پىشۇرۇپ يېمىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

بەلغەمدىن بولغانلىرىدا ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش
ئۇچۇن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) گە تۇربوت قوشۇپ
بېرىلىدۇ. ھەسەل بىلەن تەييارلىغان ئىسكەنجىۋىل بېرىش
مومكىن. مونچىغا چۇشۇش پايدىلىق.

تېلما (ماشىرا)

خەلق ئىچىدە تېلما ۋە ماش يارا دىگەن نام
ئاتىلىدىغان كېسەللىك بولۇپ، كۆپىنچە يۈزدە، باشتا
پەيدا بولىدۇ. بەزىلەر بۇنى يۈزدىكى پەلغۇمۇنى دەپمۇ
ئاتىغان.

سەۋەبى: قىزىق قان بىلەن سەپرا بىرىكىپ ئۇ -
فۇنەت پەيدا قىلىشىدىن تېرە ئاستىدا يۈز بەرگەن يامان
ياللۇغلىنىشتىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن يۈز قىزىرىپ قىچىشىشقا
باشلايدۇ. كېيىنچە يۈز، پىشانە، قۇلاقنىڭ ئالدى - كەينى،
ھەتتا پۈتۈن باش قىسمى ئىششىيدۇ. ئوتتا كويگەندەك
كۇيۇپ، ئېچىشىپ قاتتىق ئاغرىيدۇ. باش، قۇلاق ۋە
بويۇنلارمۇ زىڭىلداپ ئاغرىيدۇ. ماددا مىڭە قانتومۇرلىرىغا
چۇشۇپ قالسا سەرسام، مىڭە پەردە ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى
بىلەن كېلىپ، ئېغىر ھاللاردا ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ.

داۋاسى: غول، باش ئارقا قىسمىنى تىيلىپ

ھىجامەت قويىلىدۇ. ئىچىنى يۇمشىتىش ئۈچۈن شەرۋىتى فەۋاكە (15 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئاق سەندەل، روسۇت، گىلى ئەرمىنى، كوك يۇمغاقسۇت، سېمىز ئوت، ئىت ئۇ - زۇمى قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئازراق يەنجىپ، گال، بويۇن، كۆكرەك ئەتراپىغا سۈركەش ۋە ئېغىز، تاماقنى چاقاش لازىم. ئازراق كاپۇرنى گۇلاپتا ئېرىتىپ، توخۇ پېمى بىلەن يۈزگە چېپىش كېرەك. كېسەلگە دائىم ماش، چىلان ۋە يۇمغاقسۇتلەرنى قاينىتىپ بېرىلىدۇ. بەزىلەر باشنى ئوبدان ئوراپ تۇرۇپ يېشىل ماش قاينىتقان سۇنىڭ ھورى بىلەن يۈزنى تەرلىتىش ۋە يېشىل ماشنى پىشۇرۇپ ئارپا سۈيى ۋە كوك يۇمغاقسۇت بىلەن ئىچىدە - رىشنى تەكلىپ قىلىنىدۇ. ئومۇمەن تىلىمنىڭ داۋاسى ھول سوغاقلىغىنى ئاساس قىلىش لازىم.

بەزىلەر ياللۇغى (مۇغابىن)

قۇلاق ئارقىسى، قولتۇق ۋە چاترادىكى بەزىلەرنىڭ ياللۇغى بولۇپ، بۇ خىل بەزى ياللۇغى تائۇن (چۇما) كېسىلىدىكى بەزى ئىششىقتىن پەرقلىنىدۇ، خەتەرلىك ئەمەس.

سەۋەپلىرى: (1) باشقۇرغۇچى ئەزالار ئوزىدىكى ماددىلارنى يېقىن ئورۇنلاشقان چوڭ بەزىلەرگە چۈشۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەزكۇر جايلاردىكى بەزىلەر ئىششىق روشەن ھالدا ئىششىق كۆتىرىلىپ چىقىدۇ.

(2) ئەزالارنىڭ بىرىدە (تاشقى تەرەپتە) يىرىك

ۋە ئۇفۇنەتلىك ياللۇغلىنىش پەيدا بولغاندا مەزكۇر جايغا يېقىن بولغان جايدىكى بەزلەردە ئىششىق پەيدا بولىدۇ. بۇ بەدەننىڭ قوغدىنىش چارىلىرىدىن بىرىدۇر.

مەسىلەن، ئاياقلاردىكى جاراهەتلەردە چاتراغا "يۇمشاق" چۈشىدۇ ۋە باشقىلار. بۇنى بەزى كىتاپلاردا "باغىرە" دىگەن نام بىلەن يازىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەۋجۇت سەۋەپلەرگە ئاساسەن، چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان ئىششىقلار كۆرىنىدۇ، ئاغرىيدۇ. بېسىپ كۆرگەندە بەزىلىرى مىدىرلايدۇ، بەزىلىرى مىدىرلىماسلىقى مۇمكىن. ئەمما ياللۇغلىنىش ئالامەتلىرى روشەن بولمايدۇ. كۆپىنچە قۇلاق ئارقىسى، قولتۇق، چات - لاردا كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: سۈرگە بېرىش كېرەك. ئېغىر بولمىغاندا ئالاھىدە سۈرگە بېرىش ياكى قان ئېلىش ھاجەت ئەمەس. بىنەپشە رەڭلىك پارپىنى ئىلماق سۇدا تاشقا سۇرۇپ ئىششىق ئۈستىگە بىرقانچە قېتىم چېپىش كۇپايە قىلىدۇ (مەسىلەن، ئادەتتىكى يۇمشاقلاردا). ئەگەر باشقۇرغۇچى ئەزالار جۈملىسىدىن مىڭنىڭ زەرەرلىنىش ئالامەتلىرى بار بولسا، ماددىنى يۇمشاتقۇچى دورىلاردىن بىنەپشە گۈلى، ئاق لەيلى گۈلىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئازراق گۈل يېغى ياكى بىنەپشە يېغى بىلەن ئىششىققا چېپىلىدۇ. شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، ماددىنى قايتۇرغۇچى دورىلارنى چاپماسلىق لازىم. چۈنكى مۇنداق قىلغاندا ماددا ئەسلى كەلگەن جايىغا قايتىپ كەتسە يامان ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ

چىقىرىشى مۇمكىن. ئەگەر ماددىلار كۆپ يىغىلىپ يىرىك پەيدا قىلغان بولسا، ماددىنى پىشۇرۇپ ئېغىز ئالدىرىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە، يۈرەك، مىڭە ۋە جىگەر قاتارلىق باشقۇرغۇچى ئەزالارنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش چارىلىرىنى بىللە ئېلىپ بېرىش لازىم.

چىقان (دومۇل)

سەۋىيى: غەيرى تەبىئى قان ماددىسى سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دەسلەپتە كىچىك، قىزىل رەڭلىك قاپارتما پەيدا بولۇپ، بارغانسېرى چوڭىيىپ ئۇچى ئۇچلۇق، تۈۋى يوغان مۈنەككە ئايلىنىدۇ. شۇڭا خەلق ئارىسىدا "تۈۋى يوغان"، "كوتى يوغان" دەپمۇ ئاتايدۇ. قاتتىق ئاغرىيدۇ، يەرلىك قىزىتما يۈز بېرىدۇ، بەزىدە ئومۇمەن بەدەن قىزىشمۇ مۇمكىن. گايىدا ياپىلاقلىشىپ قالىدۇ، يىرىك زەرداپ يىغىدۇ.

داۋاسى: دەسلەپكى مەزگىلدە پاقالچەككە ھىجامەت قويۇش؛ خىلىت ئەھۋالىغا قاراپ سۈرگە بېرىش ئارقىلىق ماددىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاش لازىم. ئىچىشكە ئىسكەنجىۋىل بېرىلىدۇ ۋە فۇپەل، كاپۇرنى گۇلاپتا تاشقا سۇرۇپ چىقارغا چېپىلىدۇ. ياكى سېمىز ئوت، ئىسپۇغۇل، لۇئابى، گۇلاپلارنى چېپىش كېرەك. بۇ دورىلارنى قىلىپ 3 كۈندىن كېيىن ئىسپۇغۇل بىلەن تۇخۇم ئېقى چېپىلىدۇ. بۇنىڭدىن مەقسەت ماددىنى يىغىش ۋە پىشۇرۇشتۇر. ماددا

يىغىلىپ پىشقاندا (ئۇچى ئاقارغاندا) پاكىز تىغ بىلەن يېرىپ يىرىگىنى چىقىرىۋېتىش لازىم ۋە گەش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن ئازار گۈلى، موزا، سەبرە، زەچىۋىلەرنى سوقۇپ بېسىش كېرەك.

چىقانىنىڭ ھەممىسى ئۈزۈچە ئېغىز ئالمايدۇ. ياكى بىرلا قېتىم بىلەن يىرىك تازىلىنىپ كەتمەيدۇ. ياكى بىرقانچە يەردىن ئېغىز ئېلىپ خېلى ۋاقىتقىچە يىرىك ئېقىپ تۇرىدۇ. شۇڭا ماددىلارنى پىشۇرىدىغان كۈچلۈگرەك دورىلارنى بېرىش لازىم (ئادەتتە كوپ يەردىن ئېغىز ئالغانلىرى "غەلۋىرەك" دەپ ئاتىلىدۇ).

نۇسخە: ئەنجۇر، مەستىكى، مەرزەنجۇش، گىلى ئەر- مىنىلەرنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ دورىلارنى يۇمشاق سو- قۇپ بىرئاز دوغاپ بىلەن نەمدەپ، قىزىتىپ جاراھەت ئۈستىگە قويۇپ تېگىلىدۇ ياكى خېمىرتۇرۇش، تۈز، زىغىر يېغى، ھەسەللەرنى مەلھەمدەك قىلىپ يارىغا قويۇپ تېگىلىدۇ. ماددا پىشىپ تەپلانغانلىقى بىلىنسە ئېغىز ئالدۇرۇش ئۈچۈن تەۋەندىكى دورىلارنى چېپىش كېرەك: خېمىرتۇرۇش، كەپتەر مايىغى، سۇ تەگمىگەن ھاك، تۇ- خۇم سېرىغى، ھەسەللەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ جاراھەت ئۈستىگە قويۇش كېرەك. يىرىگىنى تولۇق چىقىرىش ئۈچۈن قائىدە بويىچە يېرىش ئەڭ ياخشى چارە.

چىقان پەيدا بولغان كۈندىلا سۇ تەگمىگەن ھاكىنى

تۇخۇم ئېقى ياكى كۈنجۈت يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ چاپسا،
ئۇ يوقاپ كېتىدۇ، چوڭىيىپ يىرنىڭ يىغمايدۇ.

بەزى كىشىلەرگە چىقان كوپ ياكى ھەر يىلى
چىقىدۇ. مۇنداق كىشىلەر ھەر يىلى ياز (باھار) پەسلىدە
مىزاج ئەھۋالىغا قاراپ سۈرگە ئىچىپ بەدەننى تازىلاپ
تۇرۇشى لازىم.

يىرنىڭ خالىتىسى (دۈبەيلى)

ئالامەتلىرى: دەسلەپ كورلىدىغان ئالامەتلىرى
چىقانغا ئوخشاش ئەمما جاراھەتنىڭ رەڭگى تېرە رەڭ-
گىدىن پەرقلىنمەيدۇ، تېرە ئاستىدا كەڭ يېيىلىپ بىلىن-
مەستىن يىرنىڭ - زەرداپ يىغىلىدۇ. يۇمۇلاق ياكى ياپى-
لاق شەكىلدە تېرىدىن سەل كوتىرىلگەن ئىششىق ھاسىل
بولىدۇ. باسقاندا ئاغرىيدۇ. ياللۇغلىنىشنىڭ تەرەققى قى-
لىشى ۋە ماددىنىڭ يىغىلىشى ئەھۋالىغا قاراپ ھازارەت،
ئاغرىش يۈز بېرىدۇ، يىرنىڭلىق خالتا ئۈزە بولسا باس-
قاندا قاتتىق ئاغرىيدۇ ۋە بېسىلغان ئورۇن ئويمانلىشىدۇ.
يىرنىڭلىق خالتا بەك چوڭقۇردا بولسا ئويمانلاشمايدۇ،
ئاغرىش ئانچە كۈچلۈك بولمايدۇ، تەرەققى قىلسا گۈشلەر
چىرىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: مۇۋاپىق دورىلارنى بېرىپ ماددىلار تو-
مۇردىن چىقىرىلغاندىن كېيىن تېرىنى ئېپىزلەشتۈرۈش،
يىرنىڭنى سۇيۇلدۇرۇش ۋە پىشۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش
كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن زەيتۇن يېغى، گۈل يېغى، كالى-

ئىككى بورەك يېغى، زىغىر ۋە شۇمشە شىرىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ زەرەرلەنگەن جايغا چېپىش لازىم. ئەڭ ياخشىسى مەلھىمى داخىلىسون (177-نۇسخە)نى سۈركەش كېرەك. ماددا پىشقاندىن كېيىن تېرە ئاستى يۇمشاپ مېلىقلاپ كېتىدۇ. بۇ چاغدا تىغ بىلەن يېرىپ يىرىڭنى چىقىرىش لازىم. ئەگەر يىرىڭ بەك كۆپ بولسا، بىراقلا چىقىرىشقا بولمايدۇ، پاكىزە داكا تىقىپ قويۇپ ئاستا-ئاستا ئېلىپ قىتىپ چىقىرىش لازىم. چۈنكى كۆپ مىقداردىكى يىرىڭنى بىراقلا چىقىرىش بىلەن كېسەل كىشى ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. يىرىڭ تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن يېڭى گۆش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن-مەدەستاندىن 5 مىسقال، گۈل يېغى، سىركىدىن بىر مىسقالدىن، قەلەي كۈشتىسىدىن 5 مىسقال، كاپۇردىن بىر مىسقال ئېلىپ، ئالدى بىلەن مەدەستاننى يۇمشاق سوقۇپ، سىركە بىلەن ياخشى ئارتلاشتۇرغاندىن كېيىن، گۈل يېغى قويىلىدۇ، ياغ بىلەن ئوبدان ئېلىشىپ بولغاندىن كېيىن ئۈستىگە قەلەي كۈش-تىسىنى سېلىپ تەييارلىنىدۇ. ۋە جاراھەت ئىچىگە كىر-گۈزۈپ ياغلىنىدۇ.

بەزىدە يىرىڭلىق خالتا بەك چوڭقۇر بولسا، يار-غاندا يىرىڭ چىقماستىن تۇرۇپ قان چىقىشى مۇمكىن، بۇ چاغدا يىرىڭ يوق دەپ ئەمەلنى توختىتىپ قويماستىن ئېھتىيات بىلەن چوڭقۇر يېرىش لازىم. بۇنداق چوڭقۇر يىرىڭلىق خالتىلاردا ماددىنى سۇيۇقلاشتۇرۇشنى ئاساس قىلىپ سىرتتىن دورا چېپىش لازىم.

ئاغرىقىسىز ئىششىقلار (ۋەرەمى روخۇد)

بەدەندە ئاغرىمايدىغان ۋە ياللۇغلىنىشنىڭ باشقا بەلگىلىرى بولمايدىغان ئىششىقلار بولىدۇ. ئۇلار "روخۇد" ياكى "ئۇزما" دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى: مىزاج بۇزۇلۇشى ياكى بەلغەم ماددىنىڭ غالىپ بولۇشى ئاساسىي سەۋەپلىرىدىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: بەدەندە تېرە ئۈستىدىن خېلى كۆپ تىرىلىپ تۇرغان ھەرخىل چوڭلۇقتىكى ئىششىقلار بولىدۇ. باسقاندا ئوتتۇرىسى ئويما نىلىشىدۇ، ئاغرىمايدۇ، قىزارمايدۇ، بەدەندە ھارارەت بولمايدۇ. ئەمما شۇ جايدا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرىدىغان چارلارنى قىلىپ، سۈرگە ئۈچۈن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە ھەببى رەۋەن (128 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. چېپىش ئۈچۈن تۈز بىلەن زەيتۇن يېغى بېرىلىدۇ. ماددىنىڭ قايتا يىغىلماسلىقى ئۈچۈن بورە ئەرمىنى، تال ياغىچىنىڭ كۈلىنى سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ. ياكى ئاقاقىيا، سەبەز، سەئدە، شىپافى مامىشا، زەپەر، گىلى ئەرمىنىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمىلاق سوقۇپ، سىركە بىلەن ئوماچ ھالىتىدىكى سۇيۇق دورا تەييارلىنىدۇ ۋە داڭغا سۈركەپ روخۇد ئۈستىگە قويۇپ تېگىلىدۇ.

يەل ئىششىق (نەفەغە)

يۇقۇرىدىكى ئاغرىماسلىق ئىششىق بىلەن ئوخشاش كورۇنۇشتە بولىدۇ، ئەمما قاتتىق ئەمەس. باسقاندا يو-قىلىپ كېتىدۇ، قويۇپ بەرسە يەنە ئوز ھالىغا كېلىدۇ. **سەۋىيى: قويۇق يەلدىن ئىبارەت.**

ئالامەتلىرى: ھەرخىل چوڭلۇقتىكى شارىدەك پۇل-تىيىپ چىققان ئىششىقلاردىن ئىبارەت بولۇپ ئاغرىمايدۇ، قىزارمايدۇ ياكى ئېغىرلىق ھىس قىلىنمايدۇ. قول بىلەن بېسىپ كورگەندە ئويمانلاشماي يوقىلىپ كېتىدۇ. قىزىلنى ئالغاندا ئوز ئەكسىگە كېلىدۇ.

داۋاسى: يەل پەيدا قىلغۇچى ئۇزۇقلارنى مەسىلەن، پۇرچاق خىلىدىكى دانلار، كالا گۆشى، ياڭيۇ قاتارلىقلار چەكلىنىدۇ ۋە توپلانغان يەلنى تارقىتىش ئۈچۈن، زىرە بىلەن قوناق ئۇنىنى قىزىتىپ تېگىش ياكى تال ياغى-چىنىڭ كۈلى، داۋا (يۇلغۇن مېۋىسى) ۋە ئارچا مېۋىسىنى سوقۇپ سۇ بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ چېپىش كېرەك. يېمىش ئۈچۈن جەۋارش كۈمۈنى (49 - نۇسخە)، گۈلنەلەرنى بېدىيان ئەرەقى (130 - نۇسخە) ياكى شەرۋىتى بۇزۇرى (129 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

پۇقاق (سەلئە)

گالدا ئېسىلىپ تۇرىدىغان ئىششىق بولۇپ قاتتىق يۇمشاقلىقى ۋە چوڭ-كىچىكلىكى ھەرخىل بولىدۇ.

سەۋەبى: قويۇق بەلغەمدىن بولغان بەز ئىششىغىم
دىن ئىبارەت.

تۈرلىرى: تىبابەتتە پوقاق ئاساسەن 5 خىلغا
بولىنىدۇ:

(1) ياغ پوقاق (سەلئەيى شەھمىيە): ياغلارنىڭ
كويۇپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىپ، يۇمشاق، ھەركىتى
ئەركىن (مىدىراتسا خالتىسى ئىچىدە مىدىرلايدۇ). ئى
چىدىكى ماددىلار ئاساسەن ياغدىن ئىبارەت بولىدۇ.

(2) ھەسەلسىمان پوقاق (ئەسەلسە): ياغ پوقاققا
ئوخشاپ كېتىدۇ. ئەمما بەزلەر ئىچىدىكى ماددا ھەسەل
دەك قويۇق ۋە شىرىلىك كېلىدۇ.

(3) پاتقاقسىمان پوقاق (سەلئەيى ئارود خالىيە)
ئىششىقتىكى ماددىلار پاتقاقىدەك يۇمشاق بولۇپ، باسقاندا
مىلىقلاپ تۇرىدۇ.

(4) يۇمشاق پوقاق (شەرازىيە): بەكمۇ يۇمشاق
خۇددى ھالۋىدەك بولىدۇ، مىدىرمايدۇ.

(5) بەز پوقاق (سەلئەيى غودۇدى) بەزدەك قاتتىق،
تۈگۈن-تۈگۈن بولىدۇ، مىدىرمايدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن
سۈرگە ئىچكۈزۈپ، تاشقى تەرەپتىن چېپىشقا دورا بېرىلىدۇ.
ماددىنى تارقىتىش ئۈچۈن مەلھىمى داخىلىئون (177 -
نۇسخە) بېرىلىدۇ. دەسلەپكى دەۋرىدىكى پوقاقلارنى داۋا-
لاش مۇمكىن. ئەمما كونسراپ كەتكەن پوقاقلارنى جەر-

راھلىق قائىدىسى بويىچە كېسىپ ئېلىپ تاشلاش لازىم. ئاقمۇچ، چىلان دەرىخىنىڭ پورنى باراۋەر مىقداردا قاينىتىپ سۈيىنى ئىچىشكە بېرىدىغان ياكى دېڭىز ئۇسۇملۇڭى (خەيدەي) بىلەن ئاقمۇچنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈپ دىغان چارىلار بولۇپ، ئۇنۇمى ياخشى.

توپۇق (ئوقدە)

گۆش ۋە چاندىردىن تۈزۈلگەن ئۈسمىدىن ئىبارەت بولۇپ، بەدەندە سۈڭەك ۋە ئۈزە چاپلاشقان ئورۇنلاردا ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى: شور ياكى كويگەن ماددىلاردىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: پىشائە، قول، پۇت، بارماق يانلىرى، قۇلاق ئارقىسى قاتارلىق جايلاردا كۆپرەك، ئالقان ۋە تاپانلاردا ئازراق ئۇچرايدۇ. بەزىلىرى كىچىك ياڭاق تەك، بەزىلىرى چوڭ ياڭاق تەك كېلىدۇ، ماددىلارنىڭ توپلىنىش ئەھۋالىغا قاراپ بەزىسى ئاغرىيدۇ. باسقاندا بەزىلىرى قاتتىق، بەزىلىرى بىر ئاز يۇمشاق بىلىنىپ، تېرىنى تېگىدىن كۆتىرىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئاغرىش بولسا، ئاۋال مۇم يېغى بىلەن بىرقانچە كۈن ياغلاپ يۇمشىتىش ۋە ئاغرىقنى پەسەيتىش مەقسىدىگە يېتىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن توپۇقنى قول ياكى باشقا قاتتىق نەرسە بىلەن بېسىپ بىر ئاز زەخمەلەندۈرۈپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە سەبە، روسۇت، ئاقاقىلارنى

باراۋەر مىقدارىدا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سىركە بىلەن نەمدەپ، توپىسىدىن قېلىن قوغۇشۇن تاختىسى قويۇپ تېگىپ قويۇش لازىم. ماددىنى قايتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە دورىلاردىن گۈلى سوسەن يىلتىزى، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، زىغىر، بابۇنە ۋە زاراڭزىلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ سۈيىنى قىزىق ھالدا توپۇققا قويۇش ۋە تىرىپلىرىنى سۇزۇپ ئۈستىگە چېپىش كېرەك.

يۇقۇرقى چارىلار ئۈنۈم بەرمىسە، يۇمشاتقۇچى دورىلارنى ياكى مەلۇمى داخىلىئوننى بىرقانچە قېتىم قويۇپ يوشىتىپ بولغاندىن كېيىن تىغ بىلەن كېسىپ، توپۇقنى ئوبدان قىرىپ ئېلىۋېتىش لازىم. كەسكەندىن كېيىن پەيدا بولغان جاراھەتكە يېڭى گۆش ئۇندۇرۇش ئۇچۇن يىرىك خالتىلىق ئىششىقتا كورسىتىپ ئۆتۈلگەن مەلھەمنى قويۇش مۇمكىن.

چاشتان يارىسى (خانازىر)

بويۇن ۋە كۆكرەك ئۈستى ساھىسىدىكى بەزلەرنىڭ سىل خۇسۇسىيەتلىك ئىششىغى. ۋاقتىدا ۋە توغرا داۋالانمىسا ئېغىز ئېلىپ ئاقما (ناسۇر) شەكىللىنىپ چىقىدۇ. **سەۋەبى:** قويۇق بەلغەم بىلەن جەراسىم (مىكروپ) بىرلىشىپ پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپىنچە بويۇن، جاغ ئاستى، ئوقىرەك ۋە قولىتۇق تېرىلىرىدە ئۇچرايدۇ. دەسلەپ تېرە ئاستىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان كىچىك مۇدۇر پەيدا

بولىدۇ. ئاغرىيدۇ، تېرە ئاستىدا مىدىرلاپ تۇرىدۇ. كېيىنچە گۆش ۋە تېرە چاپلىشىپ كېتىدۇ. تېشىلىپ سېرىق زەرداپ سۇ ياكى يىرىك چىقىپ تۇرىدىغان ئاقما جاراھەتكە ئايلىنىدۇ. زەخمىلەنگەن ئورۇندا قاتار تىزىلغاندەك جاراھەتلەر كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. جاراھەت داۋاملىق بولمايدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئىتتىپاقلىرىدىن بىرى ياكى ئايارەج پەيىقارا (1-5-16 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ. يۇمشاق، تېز ھەزىم بولىدىغان بەدەننى كۈچەيتىدىغان غىزالار بېرىلىدۇ. چۈشمەل ۋە ئاچچىق نەرسىلەرنى بېرىش مەنئى قىلىنىدۇ. كەچ تەرەپتە تاماقنى بەك كەچ يېيىشتىن ۋە روھى غىدىغلىنىشلاردىن ساقلىنىش لازىم. ماددىنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ئىششىق قايتۇرغۇچى دورىلارنى چېپىش كېرەك. ئۇلار: قىچا، ئەنجۈر ئۇرۇغى، كوپۇكى دەريا، زىراۋەند، مۇقىل، ئوشەق، كونا زەيتۇن يېغى ۋە ئاق مەملەردىن ئىبارەت بولۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، مايىسمان دورا تەييارلاپ جاراھەت ئۈستىگە قويىلىدۇ ھەم مەلھىمى داخىلىئون (177 - نۇسخە) سىرتتىن دايلاشقا بېرىلىدۇ.

يىرىك ۋە زەرداپلار كوپىيىپ كەتسە، بۇنى چىقىرىپ تاشلاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن قىزىل لۇبىيا ئۇنى، زەيى تۇن يېغى ۋە كىچىك بالا سۇيىدۇگىنى بىرلەشتۈرۈپ جاراھەت ئۈستىگە قويۇلسا، يىرىك، زەرداپلارنى ئاققۇزۇپ چىقىرىدۇ. تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن قۇرىسى فىلىدەرنى

(46 - نۇسخە) نى سوقۇپ تالقال ھالىدا جاراھەت ئۈستىگە يېپىلىدۇ. بۇ كونا بۇزۇلغان گۈشلەرنى يەپ، يېڭى گۈش ئۇندۇرىدۇ.

چاشقان يارىسىنىڭ ئالاھىدە دورىسى ئىتريپىل غۇدودى (180 - نۇسخە) بولۇپ، يۇقۇرقى چارىلار بىلەن بىرلىكتە ئېلىپ بېرىلىدۇ ۋە قوي - مۇڭگۈزى ئىچىدىكى پۈردەك قىسمىنى ئېلىپ كۆيدۈرۈپ كۈلنى كۈنىگە 2 مىسقالنى ئازراق شېكەر بىلەن بىر ھەپتە يىمىشكە بېرىلىدۇ.

خانازىر ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان ئاغرىقدۇر. دورىلار بىلەن نەتىجە بولمىسا، جەرراھلىق ئۇسۇلى بىلەن كېسىپ قىرىپ ئېلىنىدۇ ۋە يېڭى گۈش ئۇندۇرىدىغان دورىلار چېپىلىدۇ.

سەرتان (راك)

بەدەننىڭ مەلۇم ئەزاسىدا پەيدا بولىدىغان ۋە قانئومۇرلار ئارقىلىق باشقا ئەزالارغىمۇ كۆچۈپ يامرايدىغان بىر خىل سەپراۋى ئىششىق مۇنەكچە — سەرتان دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ سەرتان دەپ ئاتىلىپ قېلىشىدىن كىم مۇھىم سەۋەپ، دېڭىزدا بولىدىغان سەرتان بەھرى (دېڭىز قىسقىچ پاقىسى — راك) سۇدا پۇت - قوللىرىنى سوزۇپ تۇرغاندەك بۇ سەرتان ئىششىقىنىڭمۇ بەدەنگە ئۆز تومۇرلىرى بىلەن مۇستەھكەم يامراپ تۇرۇشىدىن ئىبارەتتۇر. چۈنكى سەرتان (راك) ئۆسمىسى چوڭايغاندا

ئۇنىڭ يىلتىزلىرى بەدەن توقۇلمىلىرىغا كەڭ تارقىلىپ
دەرەخ يىلتىزىدەك يامراپ كېتىدۇ.

سەۋىيى: سەرتانىنىڭ تۇپ سەۋىيى تازا روشەن
ئەمەس. قەدىمقى ھۆكۈمالار ئۇنى سەۋدا ماددىسىنىڭ
ياكى سەپرا ئارىلاش بەلغەم ماددىسىنىڭ كويىشىدىن
كېلىپ چىقىدۇ — دەپ قارايدۇ، كويىگەن سەۋدادىن
بولغان سەرتاندا قان بولمايدۇ. سەپراۋى سەۋدادىن
بولسا، ئۇ ئەلۋەتتە ئىششىيدۇ.

ئالامەتلىرى: سەرتان ئوسمىسى دەسلەپتە پەيدا
بولغاندا مەخپى (يوشۇرۇن) ھالەتتە بولىدۇ. ئۇنىڭ
ئاشكارىلىنىشى كۆپ چاغلاردا ئالامەتلىرىدىن كېيىن بو-
لىدۇ. دەسلەپتە كىچىك پۇرچاق ياكى ئۆشكە (بادام)
چوڭلۇغىدا، قاتتىق، يۇمۇلاق مۇنەكچە ھاسىل بولۇپ،
ئاندىن كېيىن تېزلا چوڭىيىپ كېتىدۇ. سەرتان ئىششىغى
ۋە ھارارىتى كۈچەيگەنسېرى خۇددى سەرتان (قىسقۇچ
پاقا) نىڭ پۇتىغا ئوخشاش قارا، كۆك تومۇرلار پەيدا
بولىدۇ ۋە ئوت يالقۇنىغا ئوخشاش دائىم لاۋۇلداپ
تۇرىدۇ.

سەرتان جاراھەتلىگەندە قارا ۋە قورقۇنۇشلۇق
جاراھەت ھاسىل بولىدۇ. يارىنىڭ ئاغزى قىزىل ياكى
كۆك رەڭدە ئورۇلۇپ چىقىپ، يىرگىنىشلىك تۈسكە كى-
رىدۇ، سېسىق زەرداپ ئېقىپ تۇرىدۇ. سەرتان ئوسمى-
سىنىڭ ئاغرىشى كويىگەندەك ئېچىشىپ تۇرۇشى تۈپەي-
لىدىن.

لىدىن، بەزى ئاغرىقلار ئازاپلىنىپ ھۇشىدىن كېتىپمۇ قالىدۇ.

خۇلاسە: سەرتان ناھايىتى ئېغىر ۋە خەتەرلىك كېسەللىك بولۇپ، ساقىيىشىدىن ئۈمىت تۇتۇش تەس. ئەمما كېسەلنىڭ باشلىنىشىدا تونۇپ ۋە توغرا تەدبىر - لەر كورۇلسە ئۇنى تىخىتىشقا ۋە كۈچۈيۈپ كېتىشىنى توسۇشقا ئىمكانىيەت بار.

داۋاسى: تىبابەتتە سەرتان كېسەلىنى داۋالاش دورا ئىچكۈزۈش؛ سىرتتىن دورا چېپىش ۋە دەستىكارە بىلەن (ئوپىراتسىيە قىلىپ) داۋالاشتىن ئىبارەت 3 چوڭ تارماققا بولىنىدۇ. سەرتاننى داۋالاشتا قەدىمقى مەشھۇر تىۋىپلەرنىڭ نۇرغۇنلىغان ئەمىلىي تەجرىبىلىرى توپلان - ھان. ئاتاغلىق تىبابەت ئالىمى ئىبنى سىنانىڭ توۋەن - دىكى سۆزلىرى سەرتان كېسەلىنى داۋالاشتا بەلگىلىك نەزىرىيە، ئاساسى بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ: "سەرتاننى دەسلەپكى ۋاقتىدا تونۇپ داۋالاش ئېلىپ بېرىلسا ئۇنىڭ كۈچىيىپ كېتىشىنى توساشقا ئۈمىت تۇتۇش مۇمكىن. ھەتتا ئۇنى بىر ھالەتتە تۇرغۇزغىلى ۋە جاراھەتلەندۈر - مىگىلى بولىدۇ. بەزى ھاللاردا سەرتان باشلىنىشىدىلا داۋالانسا، ھەتتا ساقىيىپمۇ كېتىدۇ ئەمما تەلتۈكۈس ساقىيىشى تەس. كۆپىنچە سەرتان ئىچكى ئىداردا ۋە مەخپى تەرەققى قىلىۋاتقان بولىدۇ. سەرتان بىلەن ئاغرىغانلارغا ئارپا سۈيى، يېڭى بېلىق ۋە تۇخۇم سېرىد -

غىغا ئوخشاش بەدەننى كۈچەيتىپ ياخشى قان پەيدا
 قىلىدىغان، سوغاق ۋە ھوللۇك يەتكۈزىدىغان نەرسىلەرنى
 بېرىش، زىيان قىلىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش مۇ-
 ۋاپىق. ئەگەر سەرتان ئۆسكەن جايدا ھارارەت بولسا،
 ياغ تەركىۋى چىقىرىپ تاشلانغان ئايران ئىچكۈزۈش،
 يېڭى قاپاق يىگۈزۈش لازىم. سەرتان كىچىك بولسا
 دەستىكارە (ئوپېراتسىيە) قىلىپ داۋالسا بولىدۇ. لېكىن
 ئىلاجى بار باشقا ئۇسۇل بىلەن يوقىتىش پايدىلىق.
 چۈنكى كۆپ ۋاقىتلاردا سەرتاننى كەسكەندە ئۇنىڭ يا-
 مانلىشىشى (تەرەققىياتىنىڭ تېزلىشىشى) كورلىدۇ. ئەگەر
 ئوپېراتسىيە قىلىپ داۋالاشقا توغرا كەلسە يىلتىزنى
 قىرىپ تازىلىۋېتىش زورۇر، بەزىدە ئۆسۈمنى كېسىپ
 يىلتىزنى تازىلىۋەتكەندىن كېيىن داغلاشقا توغرا كېلە-
 دۇ. لېكىن داغلاشتا قاتتىق ئېھتىيات قىلىش لازىم.
 چۈنكى سەرتان يۈرەك، جىگەر، مىڭدەك نازۇك ئەزالار-
 دا بولسا داغلاش خەۋپ - خەتىگە ئېلىپ بارىدۇ. سەر-
 تاننى ئوپېراتسىيە قىلغاندا ئۆسۈمدىن قان ئېقىپ، باش-
 قا تومۇرلار ئارقىلىق بولەك ئەزالارغىمۇ يامراپ كېتىش
 ئېھتىمالى بار. شۇڭا بەدەننى تازىلايدىغان سۇرگە بېرىش
 ۋە قان ئېلىش، ئاغرىققا يېڭى، ساپ قان يارىتىدىغان
 تاماقلارنى بېرىپ بەدەننى كۈچەيتىش كېرەك.

ئىبنى سىنا يەنە مۇنداق دەپ كورسەتىدۇ: "قە-
 دىمقى ھوكۇمالارنىڭ بايان قىلىشىچە بىر تىۋىپ سەر-

تان كېسىلى بىلەن ئاغرىغان ئايالنىڭ بىر ئىمىچىگىنى يىلتىزىدىن كېسىپ تاشلىغان بولسىمۇ، كېيىن ئۇنىڭ يەنە بىر ئىمىچىگىدە سەرتان پەيدا بولغان. بىزنىڭ قارنىمىزچە ئىككى ئىمىچىككە سەرتان گەردەن ئارقىلىق ئۆتكەن بولۇشى، شۇنداقلا سەرتان ماددىسىنىڭ كۈچى - يېشىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن، بۇ ئېنىق.

ئېنى سىنانىڭ بۇنىڭدىن 1000 يىل ئىلگىرى يازغان سوزلىرىگە ئاساسەن تىبابەتتە نوۋەندىكىچە داۋالاش چارىلىرى قوللىنىلىپ كەلمەكتە:

1. دورا ئىچكۈزۈپ داۋالاش

سەرتان كېسىلى باشلىنىشىدا تونۇلسا، ئالدى بىلەن سەرتان پەيدا بولغان ئەزادىن قان ئېلىش كېرەك. لېكىن بۇ چارىنى كېسەل كىشىنىڭ قۇۋۋىتى، يېشى، مىزاجى ۋە مۇۋاپىق كېلىدىغان پەسىل قاتارلىق ئەھۋاللىرى يار بەرگەندە ئاندىن قوللىنىش كېرەك. ئەگەر سەرتان بىلەن ئاغرىغان كىشى ئايال بولسا ھېيىزنى راۋان قىلىدىغان ئىلاجلارنى قوللىنىش كېرەك.

دورا ئىچكۈزۈش جەھەتتە — سەۋدا ماددىلىرىنى تازىلىغۇچى دورا — سۈرگە بېرىش مەسىلىن، ئەپتىمۇن شەرۋىتى، غارقۇن شەرۋىتى بېرىش لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا سەۋداۋى خىلىت ۋە قاننى تازىلىغۇچى دورىلارنى بېرىش كېرەك. بۇنداق دورىلارنى بىر ئىككى قېتىم بىلەن توختىتىپ قويماي، تاكى بەدەن تازىلانغىچە تەكرار - تەكرار

ئىستىمال قىلدۇرۇش زورۇر. بۇ مەقسەتتە قارا ھېلىلىدىن 5 مىسقال، ئىسپاتىمۇندىن 5 مىسقال، ئېستۇخۇددۇسى، بىستىپايەج 6 مىسقالدىن، ھىندى تۇزىدىن 2 مىسقال، قاراخەرىبەق 3 مىسقال، غارىقۇندىن 5 مىسقال ئېلىپ، سۇقۇپ، تاسقاپ سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ كۇمۇلاچ ياسىلىدۇ ۋە كۈندە 2 دانىدىن 3 قېتىمدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇ دورىلارنى قاينىتىپ شەرۋەت قىلىپ ھەر قېتىمدا 4 - 6 مىللىلىتىرىدىن ئىچىشكە بېرىلسىمۇ بولىدۇ. يۇقۇرىدىكى چارىلەر بىلەن بەدەن تازىلانسا مۇستەھكەم دورىلارنى بېرىشكە باشلاش، ھولۇك يەتكۈزگۈچى دورىلارنى بېرىش بىلەن سەۋدا خىلىتلىرىنى پەسەيتىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا بەدەندە ساپ ياخشى قان پەيدا بولىدۇ. تامىغىغا پاقلان گۆشى، چۈجە گۆشى، موزاي گۆشى، يېڭى بېلىقلارغا بەقلەتۇليامانى، قاپاق، پىشىمىغان ئۇزۇملەرنى قوشۇپ شورپا قىلىپ بېرىش كېرەك. ھەمدە ئارپا سۈيى، ئايران (مائىلجىمىن) ۋە سەۋدانى بوشاتقۇچى تالغان دورىلارنى كۆپرەك بېرىش لازىم. بەزى ھوكۇمالار قارا يىلان گۆشىنى سۇ ياكى رەيھان شەرۋىتىدە قاينىتىپ تۇز سېلىپ ئىچكۈزۈپ بېرىلسە سەرتان ماددىسىنى يوقىتىدۇ، دەپ تەكىتلەيدۇ.

قاننى تازىلاش ئۈچۈن گازىۋان شەرۋىتى، كاسىن ئۇرۇغى، بادىرەنجىبۇيا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزلىرىنى قاينىتىپ شېكەر قوشۇپ ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ.

يەنە بەزى تىۋىپلار سەرتان كېسىلىنى داۋالاشتا توۋەندىكى دورىنى كومۇلاچ ياكى قايناتقان شەرىۋەت شەكلىدە ئىشلىتىشنى تەكىتلەيدۇ: قارا خەربەقنى قوي سۈتىگە 3 كۈن چىلاپ قويۇپ، قۇرۇتۇپ ماھى زەھرەج (بىر خىل بېلىق — ت)، ھەببۇلخارنىڭ ھەربىرىدىن 3 ھەسسە، ھەشقىپچەك ئۇرۇغى يېرىم دالكا^①، ئەپسەنتىن غارىقۇن 2 داڭدىن، ئايارەج پەيقارا بىر مىسقال، ھەندە دىستان تۇزى، سۇقمونىيا 1 داڭدىن، مەزكۇر دورىلارنى سوقۇپ كالىك بەسەي ياپرىغىنىڭ سىقىلغان سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، قارىمۇچ چوڭلىغىدا كومۇلاچ تەييارلىنىدۇ. ياكى قاينىتىپ ھەر قېتىمدا $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پىكرىچە، مەزكۇر دورا سەرتان ئۆسمىسىگە تەسىر قىلسا ئۆسمىنىڭ ھەجمى كىچىكلەيدۇ ۋە يۇمشايدۇ. ئانداقتا مەزكۇر دورىنى يەنە داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.

2. سەرتەن دورا سۇركەپ داۋالاش.

سەرتاننى سىرتىدىن داۋالاشنىمۇ توۋەندىكى تەتقىقات مەقسەت كۆزدە تۇتۇلىدۇ: سەرتاننى يوقىتىش (بۇ مەقسەتكە يېتىش تەس)؛ تەرەققى قىلىشنى توساش؛ جارا-ھەتلەندۈرمەسلىك؛ ئىششىقنى كىچىكلەتىش.

③ دالكا — 16 دانە ئارپا ئېغىرلىقى بىلەن تەڭ ئېغىرلىقى ئۆلچىمى.

سەرتاننى يوقىتىش مەقسىتىدە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار سەرتاننى بوشىتىدىغان، تەرەققىياتىنى ئاستىلىتىدىغان ۋە ناچار قاننى تۈزىتىدىغان بولمىشى شەرت. چۈنكى ناچار بۇزۇق قان، يامان خىلىتلار سەرتاننى پەيدا قىلىدۇ. لېكىن دورا بەك كۈچلۈك بولماسلىقى كېرەك. چۈنكى قاتتىق غىدىقلىغۇچى كۈچلۈك دورىلار سەرتاننى تېز يامانلاشتۇرىۋېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كۆيدۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئادەتتە مەدەندىن ۋە ئوسۇمەلۈكتىن ئېلىنغان دورىلار مەسىلەن، تازىلانغان توتىيا، گۈل يېغى، تۈگۈرمەن تېشى (كوپ خىل ناشلار بىرىكمەسىدىن ھاسىل بولىدۇ)، بۇلەي تېشى (بۇلارنى سۇ ياكى سىركە بىلەن بىللە تاشقا سۇرۇپ يۇمشىتىپ ئىشلىتىلىدۇ)، مىس مەدىنى (رودىسى)، قوغۇشۇن، يۇمغاقسۇت سۈيى، پىشىمىغان ئۇزۇم، ئىت ئۇزۇمىنىڭ سۈيى، جۈسەي ئۇرۇغى، پاقا يوپۇرمىغى (بىارتەڭ) سۈيى، سېمىز ئوت سۈيى، كاسىن سۈيى، كاكىنەج (شوخلەك) سۇلىرىنى ئىشلىتىش بەلگىلىك ئۇنۇمگە ئىگە.

(1) توتىيا^①دىن ياسىلىدىغان مەلھەم تەركىبى:

تازىلانغان توتىيا، مۇرداسەڭگ، سەپىداپ بىر ھەسسە، موم

$\frac{1}{4}$ ھەسسە. مەدەن دورىلارنى سوقۇپ، مومنى گۈل يېغى

بىلەن قورۇپ يۇقۇرىدىكى دورىلارغا قوشۇپ مەلھەم قىلىنىدۇ. بۇ مەلھەمنى سەرتان ئۈستىگە سىرتتىن چېپىلىنىدۇ.

(2) قوغۇشۇن مەلھىمى: قوغۇشۇن كۈشتىسىنىڭ تالقىنى، قەلەي كۈشتىسى، ئۇيا، توتىما، پاقا، يوپۇرما، غېنىڭ سۈيى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، تىشاستە، تەمىغى ئەرەبى 3 مىسقالدىن. تەييارلاشتا: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، بىر سەر ئاق مومنى تۈر-مۇر قاچىدا ئېرىتىپ، ئۈستىگە گۈل يېغى قۇيۇپ ئارد-لاشتۇرۇپ ئوتتىن ئېلىنىدۇ. ئۇنىڭغا سۇقۇلغان دورىلارنى بېلىپ تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، چىنە - قاچىدا ساقلاپ لازىم كەلگەندە سەرتان ئۈستىگە چېپىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(3) گىلى ئەرەبىنى ئىت ئۇزۇمى سۈيى ۋە كوك يۇمغاقسۇت سۈيى بىلەن ئېزىپ چېپىلىدۇ.

(4) سەرتاننى جاراھەتلىنىشكە قويماسلىق كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن پىشمان ئۇزۇمنى سوقۇپ تېگىش، دەر-يادىن تۇتۇلغان قىسقۇچ پاقا (سەرتان) نى كويدۇرۇپ سوقۇپ، ئىقلىمىيا ياكى ئاق قەلەي كۈشتىسى قوشۇپ چېپىش پايدىلىق.

(5) قوغۇشۇننى كاھو (ئوسۇڭ) سۈيى ياكى ئىسپۇ-غۇل شىرىسىدە ئېزىپ چاپسا ئۇنۇمى ياخشى.

(6) تۈگۈرمەن تېشىنىڭ ئېرىتمىسى، مىس مەدىنى، قوغۇشۇنلارغا گۈل يېغى، يۇمغاقسۇت سۈيى، پىشمان ئۇزۇم سۇلىرىنى قوشۇپ تېگىش كېرەك.

① توتىما - زىنك (zn) مەدىنى.

سەرتان جاراھەتلەنگەن بولسا زەرداپ ئاقىدۇ.
مۇنداق چاغدا توۋەندىكى چارىلارنى قوللىنىش كېرەك:
(1) يۇيۇلغان توتىما، گىلى مەختۇم، قىزىل گۈل،
گىلى ئەرمىنىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قەلەي ھاۋانە
چىدا گۈل يېغى بىلەن بىللە قوشۇپ ئوبدان سوقۇپ
جاراھەتكە تېگىش لازىم.

(2) دەريادا ياشايدىغان قىسقۇچ پاقىنى تۇتۇپ،
يېرىپ ئىچىنى تازىلاپ ئۆسمە ئۆستىگە تېگىش لازىم
(بۇنى كۈندە بىر ياكى ئىككى قېتىم تەكرارلىسا بولىدۇ).
ياكى قىسقۇچ پاقىنى كويدۇرۇپ كۈلىنى نېفىت ۋە گۈل
يېغى بىلەن بىللە مەلھەم قىلىپ تاكسىمۇ بولىدۇ.

3. دەستكارە (ئوپىراتسىيە) بىلەن داۋالاش

سەرتاننى ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە باشقا چارىلار
بىلەن داۋالاش لازىم. ئەگەر ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشقا
توغرا كەلگەندە ئۇنىڭ يىلتىزلىرىنى قالدۇرماي تازىلىۋې-
تىش زورۇر. بولمىسا قايتا ئۆسۈپ چىقىشى ياكى باشقا
ئەزالارغا يۆتكىلىشى چوقۇم. لېكىن نازۇك ئەزالاردا بول-
غاندا بۇ چارىنى قوللانغىلى بولمايدۇ. كېسىپ تاشلىغاندىن
كېيىن، ئۆسمە ئۇنىڭغا جاي ئەتراپىنى داغلاشنىڭ پايدىسى
بار. بىراق چوڭ قانتومۇرلارغا، نازۇك ئەزالارغا يېقىن
جايلارنى داغلاش مۇمكىن ئەمەس. ئوپىراتسىيەدىن ئىلگىرى
سەرتان ئۆسمىسىنىڭ ئەتراپىنى موم ۋە گۈل يېغى بىلەن
نەمدەپ، ئۆستىگە قوغۇشۇنغا ئىسپۇغۇل شىرىسى، بىيە

ئۇرۇغىنىڭ شىرىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ تېگىش لازىم. بۇنى ئۇدا بىر قانچە كۈن داۋاملاشتۇرۇلسا، سەرتاننىڭ ئەتراپىدىكى يىلتىزلىرى ئاشكارىلىنىدۇ. ئاندىن مەزكۇر يىلتىزلارنى داغلاپ ۋە كېسىپ تاشلاش كېرەك. كېسىلگەن ئورۇننى ھول زۇفا سۈيى، بىيە شىرىسى، موم، گۈل يېغى، بىنەپشە ياغلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلانغان سۇيۇق مەلھەم بىلەن تېگىپ، تېگىق ئۈستىنى دائىم نەم تۇتۇش ئۈچۈن ئىت ئۇزۇمى سۈيى قۇيۇپ تۇرۇش كېرەك. بەزى ھوكۇمالار تېگىقنى ئادەم سۈتى بىلەن ھوللەپ تۇرۇش پايدىلىغىراق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

ماخاۋ (جۇزام - دائىل ئەسەد)

يۇقۇملۇق ھەمدە ۋاقتىدا توغرا داۋالانمىسا، ئاقىۋىتى ناچار كېسەلدىن ئىبارەتتۇر. "جۇزام" دىگەن سۆز "ئايرىلغۇچى" دىگەن سۆز بولۇپ، كېسەلنىڭ بەدەنلىرى ئېقىپ، كېسىلگەندەك ئاجراپ چۈشۈپ كېتىدۇ. كېسەلنىڭ يۈزى شىرنىڭ يۈزىدەك بولۇپ قالدىغانلىقى ئۈچۈن "شە كېسىلى" (دائىل ئەسەد) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى: غەيرى تەبىئى كويگەن سەۋدا سەۋەبىچى بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن بەدەن تېرىسىدە قىزىل ياكى قارامتۇلغا مايىل داغلار پەيدا بولىدۇ، ئاندىن كېيىن مەزكۇر داغلاردىن ھەر خىل چوڭلۇقتىكى قاپارتەملەر پەيدا بولىدۇ، تېشىلىپ ئاقىدۇ، سېرىق زەرداپ سۇ

چىقىدۇ. مۇنداق ئالامەتلەر بەدەننىڭ كۆپ جايلىرىدا پەيدا بولۇشقا باشلاپ پۈتۈن بەدەننى قاپلايدۇ. ئۇقۇنەت يۈرەككە تەسىر بېرىپ توت كۈنلۈك قىزىتما (تەپى رۇبى) پەيدا بولىدۇ. تېرىدىكى جاراھەتلەر بارغانسېرى چوڭقۇرلىشىپ سېسىشقا باشلايدۇ، بۇرۇن ئۆلتۈرۈشۈپ كېتىدۇ. قۇلاق يۇمشاقلىرى چۈشۈپ كېتىدۇ. جاراھەت- لەردىن سېسىق پۇراق چىقىپ كىشىلەر قاچىدۇ. شەكلى ئۆزگىرىپ يۈزلىرى مۇدۇرلۇق ئىشىپ، خۇددى شىرنىڭ يۈزىدەك قورقۇنۇچلۇق قىياپەتكە كىرىدۇ، ئاۋاز پۈتۈندۇ، چاچ، ساقال، كىرىپكىلەر تۈكۈلىدۇ، بەزىدە ماخاۋ قارا سېرىق كېسەل يۈز بېرىش بىلەن باشلىنىدۇ. ئانداقتا پۈتۈن بەدەن رەڭگى قارىداپ كەتكەندىن كېيىن، ماخاۋ- نىڭ خاس بەلگىلىرى چىقىشقا باشلايدۇ. كېسەل جارا- ھەتلىرىدە ئاغرىش سەزمەيدۇ، كېچىسى ياخشى ئوخلىيال- مايدۇ. قورقۇنۇچلۇق چۈشلەرنى كۆرىدۇ، كۆزلىرى ياشاڭ- غىراپ نۇرسىزلىنىدۇ، پۇت ۋە قول بارماقلىرى قىسقىرىپ ئىگىلىپ قالىدۇ، بەزىلەر قارغۇ بولۇپمۇ قالىدۇ، تىر- ناقللىرى يېرىلىدۇ، باشقۇرغۇچى ئەزالارغا تەسىر بېرىشى نەتىجىسىدە نەپەس قىسىلىش، يۈرەك زەئىپلىشىشلەر بىلەن ئۆلۈپ كېتىدۇ.

داۋاسى: ماخاۋ بەدەننىڭ ئەسلى مىزاجىنى ئۆز- گەرتىپ تاشلايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ماخاۋنى بالدۇرراق، توغرا ۋە سەۋىرچانلىق بىلەن داۋالاش زورۇر. بەدەندە بۇزۇلۇش يۈز بېرىشتىن بۇرۇن دەسلەپكى چاغلاردا

داۋالاش ئېلىپ بېرىلسا كېسەلنى جىسمانى جەھەتتىكى ئازاپ ۋە ئۆلۈمدىن ساقلاپ قېلىش ئىمكانىيىتى بار. مۇۋاپىق دورىلارنى بېرىپ قۇستۇرۇش ئارقىلىق بۇزۇق ماددىلار بەدەندىن چىقىرىپ تاشلىنىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، تۇرۇپ ئۇرۇقلىرىنى قايناتقان سۈنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش مۇمكىن.

يەنە مەتبۇخى شاتەرە (172 - نۇسخە) بىر قانچە قېتىم تەكرار بېرىلىپ ئارقىدىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن مائىل جىبىن (181 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇرۇنغا بىنەپشە يېغى تامغۇزۇش؛ بىنەپشە يېغى، قاپاق ئۇرۇغى يېغى، سېرىق ماي، ئادەم سۈتىنى پۈتۈن بەدەنگە سۈركەش لازىم. ئەفئائىلىنىڭ گۆشىنى پىشۇرۇپ يېمىشكە بېرىش ۋە تەرياقى فارۇق (186 - نۇسخە) قاتارلىق دورىلار بىلەن مىڭ، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ماخاۋ كېسەلنى داۋالاشتا كۆپ قوللىنىدىغان چارىلاردۇر.

كېسەل تۈزلانغان گۆش ۋە كۆندىراپ قالغان يىمەك-لەردىن پەرھىز قىلىش شەرت. پالەك، جۈسەي ۋە قىزىلچا سالغان توخۇ شورپىسى، ئارپا نېنى قاتارلىقلار بىلەن ئوزۇقلىنىشى لازىم. چاي ئورنىدا بېدىيان سۈيى بېرىلىدۇ. يېڭى ساققان سۈتنى يالغۇز ياكى ھەسەل قوشۇپ بېرىلىدۇ.

تاز كېسەلى (سۇتقە)

كۆپىنچە باشنىڭ چاشلىق قىسمىدا، بەزىدە بەدەن تېرىلىرىدە ئۇچرايدىغان كېسەللىك بولۇپ، بالىلار ۋە

ئوسۇرلەردە كوپرەك كىرىلىدۇ. تىبابەتتە تاز ھول تاز (سۇنىقە رەتەپ) ۋە قۇرۇق تاز (سۇنىقە يابەس) دەپ 2 چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن تېرىدە ئۇششاق مۇ. دۇرلار پەيدا بولۇپ، ئەتراپقا تاراشقا باشلايدۇ. بۇلار دەسلەپتە قۇرۇق بولۇپ، قىچىشىدۇ. تاتىلاش بىلەن سېرىق سۇ چىقىپ جاراھەتكە ئايلىنىدۇ ۋە قۇرۇق سېرىق قەقەش باغلايدۇ، تاتىلاپ قەقەشلەر ئاجىزلىسا تېگىدىن سېرىق سۇ چىقىپ تۇرغان قىزىل يارا يۈزى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.

ھول تاز بولسا، دائىم سۇ چىقىپ تۇرىدۇ، بۇ كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچىرايدۇ ۋە خۇددى چاشقان سۇيىدۇگىدەك پۇرايدۇ.

قۇرۇق تاز يارىسىدىن سۇ چىقماستىن، تىزىڭدەك كىپەكلەر ئۆرلەپ تۇرىدۇ. ئۈستى ئاق قوماق باغلاپ تۇرىدۇ، كۆنرىغانسېرى باش تېرىسىدە تۈك ئۈنمەيدىغان تاتۇق قالىدۇ.

داۋاسى: ھول تازلاردا — ئالدى بىلەن ماددىنى چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن زۇلۇك قوندۇرۇش ياكى ھىجالەت قوبۇش لازىم.

بۇزۇق قان ۋە كېرەكسىز ماددىلارنى تازىلاش ئۇ. چۇن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ ۋە تۈز. لانغان گۆش، كالا گۆشى، ئاچچىق ئۆتكۈر نەرسىلەردىن

پەرھىز قىلىش، پالەك ۋە چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش لازىم.

تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن توۋەندىكى نۇس-خىلەردىن تاللاپ ئىشلىتىش مۇمكىن.

نۇسخە: زەچىۋە سىرسەر، ئاچچىق بادام مېغىزى 1 سەر، ئانار گۈلى، رال، كويدۇرۇلگەن ئاق تۇز، موزا، ھەبۇل ئاس ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، گۈل سوسىن يىلتىزى 1 سەر، ئاقاقىيا، قەمبىل 2 مىسقالدىن، سىركە، گۈل يېغى 1 سەردىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن ئىشلىتىۋېلىپ، قىيۇق مايدەك دورا تەييارلىنىدۇ.

نۇسخە: زەچىۋە، ئانار پوستى، مەدەستان، خېنە-لىرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

قۇرۇق تازدا سەۋدانىڭ غالىپلىقى كۆپرەك ئۇچرايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن ماددا سۇرۇپ چىقىرىلىدۇ. بەدەندە ئەمەلىي كۆپەيتىش ئۈچۈن ھەل تاماقلارنى بېرىش كېرەك. ئالدى بىلەن چاچنى چۈشۈرۈپ تاشلاش لازىم، ئەگەر بۇنىڭغا تاقەت قىلالىمىسا ئاق تۇز بىلەن سىركىنى ئارىلاشتۇرۇپ، ئىلمانراق ھالدا باشقا سۇرتۇپ، كېيىن ئىسسىق سۇدا باشنى سۈ-

پۇنلاپ يۇيۇش لازىم، باشنى قۇرۇتۇپ تىرۋەندىكى نۇسخە-
لاردىكى مەلەملەرنى چېپىپ، باشنى ماتا بىلەن ئوراپ
قويۇش كېرەك.

نۇسخە: ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، زىغىر
لۇئابى، بىنەپشە سۈيى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغى، تاتلىق
بادام يېغى، توخۇ ۋە ئۆدەك يېغى، ئاق موملارنى باراۋەر
مىقداردا ئېلىپ، مومنى ئېرىتىپ، قالغان ياغلارنى ئۇنىڭ
ئۈستىگە قويۇپ ياخشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، بىنەپشە
سۈيىنى قويۇپ تەييارلىنىدۇ، پاكىز قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

نۇسخە: مەدەستان، زەچىۋىنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، زەيتۇن يېغى 3 باراۋەر ئېلىنىدۇ. مەدەستاننى
ئايرىم ئېزىپ، زەچىۋىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگىگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ زەيتۇن يېغى ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم تەييارلىنىدۇ
(زەيتۇن يېغى ئورنىغا كۈنجۈت يېغى بولسىمۇ بولىدۇ).

نۇسخە: زاك، تۇز، گۇڭگۇرت سېرىغى، سىماپ
كۈشتىسى، موزا، زەچىۋە، زىراۋەند، مەدەستان ھەر بىرى
2 مىسقالدىن، سىركە، گۈل يېغى بىر سەردىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگىگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ سىركە ۋە گۈل يېغى ئارىلاشتۇرۇپ قويۇق
ھالدىكى ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىشتە، دەسلەپ بىرىنچى نۇسخىدىكى ماي
دورىدىن كېيىن ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى نۇسخىلاردىكىلەردىن
بىرىنى تاللاپ بېرىش كېرەك.

قۇرۇق تازدا: مەتبۇخى شاتەرە (172 - نۇسخە)
ياكى مەتبۇخى ئەپتەمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن ماددىنى
سۇرۇپ چىقىرىش: ئاق لەيلى ۋە ھەمشىۋانى قاينىتىپ
سۈيى بىلەن باشنى يۇيۇش كېرەك، ئاندىن كېيىن كوي-
دۇرۇلگەن سەدەپ، كويۇڭى دەريانى سۇقۇپ، تۇخۇم ئېقى
بىلەن باشقا چېپىش لازىم.

تاز كېسىلى بار بالىلار بىلەن ساق بالىلارنى
بىر ئورۇندا ياتقۇزماسلىق، داۋالاش جەريانىدا بېگى
باش كېيىم ئالماشتۇرۇش، تاز كېسىلى تارقىلىشقا
سەۋەبچى بولىدىغان سەتراچلىق سايىمانلىرىنى زەمچە
سۈيى بىلەن تازىلاپ ئىككىنچى كىشىگە ئىشلىتىش
لازم.

قوتۇر (جەرەپ)

سەۋىيى: بۇزۇلغان قان ۋە شور بەلغەم سەۋىيىدىن
پەيدا بولىدۇ. ئازاپلىغۇچى قىچىشىلار بىلەن داۋام
قىلىدۇ، كىشىلەرگە بىر-بىرىدىن يۇقۇپ كەڭ تارقىلىپ
كېتىش ھادىسىلىرى دائىم كۆرىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن قول بارماقلىرى ئارى-
سىدا ئۇششاق مۇدۇر پەيدا بولىدۇ، قاپارنىملار دەسلەپتە
قىزىل رەڭلىك بولۇپ تاتىلاش بىلەن بۇزۇلۇپ سېرىق
زەرداپ سۇ چىقىدۇ. قاتتىق قىچىشىدۇ. قوتۇرقۇرۇق ۋە ھول
دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. قۇرۇق قوتۇردىن سۇ چىقماي-
دۇ. تېرە قېلىنىلىشىپ كېپەكلىشىپ تۇرىدۇ. ھول تۇرىدىن

تاتىلاش بىلەن سۇيۇقلۇق چىقىدۇ. سۇيۇقلۇقلارنىڭ رەڭگى، سەۋەپچى ماددىسىغا قاراپ ھەر خىل بولىشى مۇمكىن، يەنى كۆيگەن سەپرادىن بولسا سېرىق، بەلغەمدىن بولسا ئاق ۋە قاندىن بولغانلىرىدا قىزغۇچ كېلىدۇ. سەپرادىن بولغىنىدا ئېچىش كۆپرەك بىلىنىدۇ. ئۇفۇنەتلەنسە يىرىڭلىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ. قۇرۇق ياكى ھول قوتۇر پەيدا بولغان تېرە ئاستىدا بىر خىل سالجىدەك ھاشارەت پەيدا بولۇپ ئۇ "سېبان" دەپ ئاتىلىدۇ.

داۋاسى: قۇرۇق قوتۇرلاردا مونچىغا چۇشۇپ ياكى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش ھەم بەدەنگە نەملىك پەيدا قىلغۇچى چارلارنى قىلىش ۋە ھول غىزالارنى كۆپرەك بېرىش؛ قۇرۇقلۇقنى كۆپەيتكۈچى بارلىق نەرسىلەرنى چەكلەش لازىم. سىرتتىن سېرىق پۇرچاق ئۇنىنى قىزىلچا سۈيى بىلەن چېپىش لازىم. تېرە نەملىك ياكى يۇمشاقلىق پەيدا قىلغاندىن كېيىن، مائۇل جىپىن (181-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئارىلاپ بىر قانچە قېتىم سۇرگە بېرىلىدۇ. ئەمما سۇرگە ئارىلىغىدا نەملىك ئوتكۈزۈشنى ئەستىن چىقارە-سالىق كېرەك. ئاندىن كېيىن قارائۇرۇك مېغىزى، تەمىرى ھىندى مېغىزىدىن بىر سەردىن، سىماپ كۈشتىسىدىن بىر مىس-قال ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنجۈت يېغى ۋە قېتىق بىلەن ئۇماچتەك قويۇق دورا تەييارلاپ 3 كۈن ئۇدا سۇرتۇپ ئەتىسى مونچىغا چۇشۇپ يۇيۇنۇش، كىيىم-

كېچەكلەرنى يەڭگۈشلەپ، قايناقسۇغا بېسىش، يوتقان - كورپىلەرنى ئاپتاپقا سېلىش لازىم.

ھول قوتۇردا سەۋەبچى ماددىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ سۈرگە بېرىش، مەسىلەن، ئېچىش كوپ بولۇپ سېرىق سۇ ئېقىپ تۇرسا مەتبۇخى ھېلىمە (38 - نۇسخە) تەر - كىۋىگە ئەپسەنتىن ۋە مامۇرانچىن قوشۇپ تەييارلاپ بېرىدۇ. ياكى مەتبۇخى خىيارى شەنبەر (54 - نۇسخە) بەرسىمۇ بولىدۇ. كاسىن سۈيىگە تەمرى ھىندىنى بىر كېچە چىلاپ قۇيۇپ، ئەتىسى راسا مىجىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ سۇزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. 3 كۈن ئۇدا ئىچىپ، 3 كۈن ئىچمەيدۇ. ماددا تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن كۇمۇش ئىقلىمىياسى ماش ئۇنى 5 مىسقالدىن، سىماپ كۈشتىدىن بىر مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سىركە بىلەن چاپ - دىغان دورا تەييارلىنىدۇ. ئۇنى قەرتۇرغا سۈرتۈپ، 3 كۈندە بىر قېتىم مونچىدا يۇيۇلىدۇ. بۇ چارىنى بىر قانچە قېتىم تەكرارلاش كېرەك. يۇقۇرقى دورىغا يەنە مەدەستان بىلەن شەھى ھەنزەل قوشۇپ تەييارلانسىمۇ بولىدۇ. مىزاجنى ھوللەشتۈرۈپ تۇتۇش ئۈچۈن شەرۋىتى بىنەپشە (65 - نۇسخە) ياكى مەجۇنى بىنەپشە (74 - نۇسخە) دىن بىرىنى بېرىپ تۇرۇش لازىم.

قۇرۇق قىچىشقاق (ھىككە)

قوتۇر بىلەن قۇرۇق قىچىشقاقنىڭ پەرقى شۇكى، قۇرۇق قىچىشقاققا زەرەرلەنگەن جايى كەڭ بولىدۇ ۋە

تېرە ئەسلى رەڭگىدىن قىزىرىپ ئۆزگەرگەن بولسىمۇ، قوتۇردەك روشەن ھالدىكى قاپارچۇق، زەخمىلىنىشلەر بولمايدۇ. تۈزلانغان بېلىق، تۈزلانغان گوشنى كوپ يىگۈچىلەردە، قان كوپەيتىدىغان قۇۋۋەتلىك دورىلارنى زىيادە ئىستىمال قىلىدىغان، مونچىغا بارماي تېرىدىكى تەر توشۇكلىرى (مىساملار) ئېتىلىپ قالغان ئادەملەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ. قېرى كىشىلەردىكى قۇرۇق قىچىشقاق بەدەندىكى تەبىئى ھارارەتنىڭ ئاجىزلىشىشى ۋە جىگەر خىزمىتىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. جىنىسى ئەزا، مەقەد ۋە جىنىسى يوللاردا شۇ ئەزادىكى خىستىلارنىڭ بۇس — بۇخاراتلىرى ياكى ئومۇمى بەدەن — دىكى بۇخاراتلار سەۋىيىدىن قۇرۇق قىچىشقاقلار پەيدا بولىدۇ، كىچىك بالىلار ھەتتا بوۋاقلاردىمۇ پەيدا بولۇپ، خېلى ئازايلايدۇ.

داۋاسى: ھىجامەت قويۇش، كىچىك بالىلارغا زۇلۇك قوندۇرۇش كېرەك (زەرەرلەنگەن تېرىگە قوندۇرۇلسا تېخىمۇ ياخشى). ئاندىن كېيىن مائۇل جىبىن (181 - نۇسخە) بېرىپ ماددىلار قويۇقلۇغىنى تەڭشەش ۋە سۇيۇقلاندۇرۇش لازىم. شۇنىڭدەك تەۋەنىدىكى نۇسخىدىكى دورا قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە، بەلىلە پوستى بىر سەر — دىن، قارا ھېلىلە، ئاقلانغان ئامىلە بىر سەردىن، ئۇرۇقسىز قۇرۇق ئۈزۈم، شاتىرە 5 مىسقالدىن، تۇربۇت 4 مىسقال،

خىيارى شەنبەر 7 مىسقال، تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىل
بىر سەردىن، بادام يېغى بىر مىسقال.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن خىيارى شەنبەر، تەم-
رى ھىندى ۋە تەرەنجىۋىلنى ئايرىم قاچىغا سېلىپ،
ئۈستىگە بىر ئاز قايناقسۇ قويۇپ ئۈستىنى دۈملەپ
قويۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى چالا سوقۇپ، 4 چۈك
چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە
قاينىتىپ، داكىدىن ئۆتكۈزۈپ تىرىپىنى ئوبدان سىقىپ
بۇلارنىڭ ئۈستىگە دۈملەپ قويغان دورىلارنى ئوبدان
مىچىپ تەمىنى چىقىرىپ سۈزۈپ تازىلىنىدۇ ۋە قايتىد-
دىن يەنە بىرلا قاينىتىپ ئېلىپ، بادام يېغىنى قويۇپ
تەييارلىنىدۇ. پۈتۈن دورىنى بىر كۈندە 3 كە بولۇپ
ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كۆك چىڭگەي سۈيىگە گۈل يېغى،
سىركە ۋە بىر ئاز توغرىغۇ قوشۇپ بەدەنگە سۈركەش
ئۈچۈن بېرىلىدۇ. جىنسى ئەزالاردا بولغان قىچىشقاق
ئۈچۈن زەمچە، قەتران ① بىر مىسقالدىن، ھەسەل 2
مىسقال، سوقۇپ ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ قىچىشىدىغان جايغا
چىپىش لازىم ياكى شۇمشە، زىغىرلارنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، 3 باراۋەر ھەسەل بىلەن قاينىتىپ پاختا ياكى
داكىغا يۇقتۇرۇپ چاپلاش لازىم. كىچىك بالىلار ياكى
ئەمچەكتىكى بالىلاردا بولسا، قىزىلگۈل، بىنەپشە، نىلۇفەر،
ئاقلاڭغان ئارپىلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ

① قەتران - لاتىنچە نامى پىكىس لىكۇئىدا.

سۈيىدە بەدەنلىرىنى يۇيۇش كېرەك؛ ئەمچەكتىكى بالىلارغا سۈرگە بېرىش لازىم بولسا، ئانىسىغا بەرسە سۇت بىلەن تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئىسسىقلىق (ھەسەپ)

ئىسسىق پەسىللەردە كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەل بولۇپ، تېرىگە كەڭ تارقالغان، قىزىل، بەكمۇ ئۇششاق تاش-مىلار چىقىپ قىچىشىدۇ، ئېچىشىدۇ ھەتتا داغرىيدۇ. كۆكرەك، پىشانە قىسىملىرىدا كۆپ ئۇچرايدۇ، ئەمەلىيەتتە، ئۇفۇنەت ھاسىل قىلسا يىرىڭلىق قاپارتمىلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مۇھىم ئالامەتلىرى — بەدەن قىچىشىدۇ. تاشمىلار خۇددى تىكەندەك ئۇچلۇق ۋە كۆپ سانلىق بولىدۇ. گايىدا بوۋاق بالىلارنى ھەددىدىن ئارتۇق ئىسسىق يۈگەپ قويغاندىمۇ ئىسسىقلىق تېشىپ چىقىشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەپرا ۋە قان ماددىسىنى سۈرگۈچى سۈرگىلەر بېرىلىدۇ. ئاندىن تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلارنى قاينىتىپ بەدەن يۇيۇلىدۇ.

(1) نۇسخە: بابۇنە، ئەكىلىملىك باراۋەر مىقداردا، بۇغداي كېپىگى 2 ھەسسە.

(2) نۇسخە: گۈل يېغى، سىركە بىر ھەسسە، پىننە يېرىم ھەسسە بىرلەشتۈرۈپ بەدەنگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ. مۇزا، زەچىۋىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ تاشمىلارغا سۈركىلىدۇ، سوغاق سۇدا كېپەك شىرىسىنى چىقىرىپ بىر سائەتتىن كېيىن يۇيۇپ تاشلاش لازىم.

قارا تەمرەتكە (قۇبا) ①

تېرە ئۈستىدە پەيدا بولىدىغان قۇرۇق ۋە قارام-
تۇل رەڭلىك تەمرەتكىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن تېرە ئۈستىدە قىزىل،
قاتتىق قاپارتمىلار پەيدا بولۇپ، قىچىشىدۇ. تېرە بار-
غانسېرى قۇرۇپ ئۈستى قارامتۇل قاسراقلىق شەكىل ئا-
لىدۇ؛ ساق تېرە بىلەن سىزىق تارتقاندا ك ئايرىلىپ
تۇرىدۇ. ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ تېرىنى زەخمىلەيدىغان ياكى
بېلىق تەڭگىسىدەك قاسراقلىشىپ ئاسانلا ساقىيىپ كې-
تىدىغان خىللىرى بولىدۇ. ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان خىلىدا
تېرە زەخمىلىنىپ، زەرداپ سۇ ئېقىپ شەلۋەرەپ تۇرد-
ۇ. قۇبانىڭ تەرەققىياتى 3 باسقۇچقا بولىنىدۇ. بىرىن-
چى باسقۇچتا، تېرە ئۈستىدىكى زەخمىلىنىش گۈشكە
يەتمىگەن، قىزغۇچ رەڭدە بولىدۇ، ئاسان داۋالاش مۇم-
كىن؛ ئىككىنچى باسقۇچتا، زەخمىلىنىش تېرىدىن ئوتۇپ
گۈشكە بىر ئاز تەسىر قىلىدۇ؛ ئۈچىنچى باسقۇچتا، ئوت-
كۈرلىشىپ گۈشكە كۆپرەك تەسىر قىلىپ، تېرە رەڭگى
قارىيىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: بىرىنچى باسقۇچىدا بۇغداي يېغى
سۈركەشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى ياكى سىركە، توخۇ يېغى،
موم يېغى، يۇمىلاقسۇت ياكى سەبرە قاتارلىقلارنى يالغۇز
① قۇبانى بەزىلەر چالاش دەپ ئاتايدۇ. ئەمما قۇبا پە-
قەت تېرىدىكى زەرەرلىنىش كوزدە تۇتىلىدۇ، چالاش بولسا -
ئومۇمىي بەدەن كېسىلىدۇر.

ياكى بىرلەشتۈرۈپ تېرىگە سۈركەش كۇپايە قىلىدۇ،
ئاچچىق ئۇرۇك يىلىمى ياكى ھېلىلىنى سىركە بىلەن
سۈرۈپ چېپىشمۇ ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

2 - باسقۇچىدا، تېرىگە زۇلۇك قوندۇرۇش لازىم.
ئۇندىن كېيىن ئۇشەق، كۈندۈش، زەچىۋە، قەرەمانالارنى
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، سىركە بىلەن
سۇيۇلدۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ.

3 - باسقۇچىدا يۇقۇرقى دورىلار بىلەن بىللە،
ئىچىدىن ئىچىشكە مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)نى
مائۇل جىپىن (181 - نۇسخە) بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.
تېرە زەخمىلەنگەن بولسا، چېپىشقا مەلھىمى ئىسپىداچ
(179 - نۇسخە) بېرىش بىلەن بىللە، بەدەننى قۇۋۋەت-
لەندۈرۈش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك.

بۇغداي يېغى چىقىرىش ئۇسۇلى:

ئاق بۇغدايدىن لازىم مىقداردا ئېلىپ، ئەخلەت
ۋە باشقا ئۇرۇقلاردىن تازىلاپ چوڭراق ياپىلاق ۋە تۈز
تاش ئۈستىدە يېپىتىپ، ئۇنىڭ بىلەن تەڭ كېلىدىغان
تاختاي تومۇرنى ئوتتا قىزىتىپ بۇغداي ئۈستىگە قويۇپ
توپىسىدىن يەنە بىر ئېغىر تاش بىلەن باستۇرۇپ قو-
يۇلىدۇ. تاشنىڭ ئەتراپلىرىغا بۇغدايدىن چىققان ياغ
ساقىپ چۈشىدۇ. بۇنى يىغىپ ئېلىپ پاكىز قاچىدا
ساقلىنىدۇ. بۇ ھەرقانداق تېرە تەمرەتكىلىرىگە پايدىلىق.

سوغان (سوبوز)

بەدەندە كېرەكسىز سۇيۇقلۇقلارنىڭ يىغىلىپ قېلىدۇ. شىددىتى پەيدا بولىدۇ. كۆپىنچە يۈز تېرىلىرىگە چىقىدۇ. كۆكرەك ياكى باشقا جايلارىغىمۇ تارايىدۇ. رەڭگى قىزىل ياكى ئاقۇش بولۇپ، تېرىدىن روشەن كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ. باسقاندا رەڭگى ئۆزگەرمەيدۇ؛ ئەگەر ماددىسى ئىسسىق بولسا قان غالىپلىق ئالامەتلىرى بولىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ھېلىلە (20 - نۇسخە) ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۈرگە ئۇچۇن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىش مۇمكىن. سۇ زاپ، مۇرمەككىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ سىركە قوشۇپ چېپىش كېرەك.

دانىخورەكمۇ سوغاننىڭ بىر تۈرى بولۇپ، "سۇبۇ-زى لەبەنى" (سۇتلۇك سوغان) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ چوڭراق قاپارتمىلاردىن ئىبارەت بولۇپ، ئىچىدە ياققا ئوخشاش ئاق نەرسە تولۇپ تۇرىدۇ، قول بىلەن باسقاندا ئاق ئۇيۇل نەرسە چىقىپ كېتىپ ئاغرىمايدۇ، كۆپىنچە پىشانە ۋە يۈز قىسمىلىرىدا پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ھەببى قوقىيا (7 - نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (17 - نۇسخە) بېرىپ ئىچى سۈرگۈزۈلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەدەن ۋە باش تەرەپتىكى ماددىلار تازىلىنىدۇ. تاشقى تەرەپتىن پۇرچاق ئۇنى، كۆيدۈرۈلگەن تۇخۇم شاكىلى، كۆيدۈرۈلگەن سۈڭەك، قىمۇلىيالىرنى

باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، قاينىتىپ سۇيى بىلەن يۇز يۇيۇلىدۇ ۋە خەرىق سەپىت ۋە چىغىرتماق يىلتىزنى سىركىدە سۇرۇپ دانىخورەككە چېپىش كىپرەك ياكى زىغىر، قىزىل لوبىيا، سىيادان، ئۈزۈم ياغىچىنىڭ كۆيدۈرۈلگەن كۈلىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ سىركە قوشۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ.

سۈگەل (سالىل)

كوپىنچە تېرە رەڭگىدىكى تېرىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان قاپارتمىلار بولۇپ، ئۇچى يۇمشاق، تۇۋى ئىنچىكە بولغانلىرى "مىسمارى"، ئۇزۇن ساڭگىلاپ تۇرىدىغانلىرى "قىرۇنا" دەپ ئاتىلىدۇ. كېيىنكى خىلى تەتۈرىگە يانغان، ئەگرى مىخەك شەكىلدە كۆرۈنىدۇ. بەزىلەرى مۈگۈغا ئوخشاپ كېتىدۇ. سۈگەلنىڭ نەملىشىپ تۇرىدىغانلىرى، كۆپىنچە دائىم سۈركۈلۈپ تۇرىدىغان جاي-لاردا، مەسىلەن: بارماق ئارىلىقلىرى، قولتۇق قاتارلىق جايلاردا ئۆسۈپ چىقىدۇ.

سەۋەبى: قويۇق خىلىتلارنىڭ كىچىك قانتومۇرلارغا قويۇلغانلىقىدىن، مەسىلەن: سەۋدا بىلەن بەلغەمنىڭ بىرىكىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) بادام يېغى قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ. سۈرگە ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

تۈۋەندىكى سۈگەل چۈشۈرىدىغان دورىلارنى بىرقانچە كۈن سۈگەلگە چېپىلىدۇ:

(1) بورە، كەھرىبا، بورە ئەرمىنى، بورە، خەرنۇپ -
لاردىن بىرىنى ياكى ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ، سىركە بىلەن
بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ سۈگەلگە چېپىلىدۇ. مۇشۇ دورىنى بىر
قانچە قېتىم تەكرار سۈركەش بىلەن چۈشۈپ كېتىدۇ.

(2) سىيادان، ئاق تۇزلارنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئوتكۇر
سىركە بىلەن ئۇماچتەك ھالغا كەلتۈرۈپ سۈگەلگە چېپىپ
قويۇلسا، سۈگەل ئۈزىچە چۈشۈپ كېتىدۇ.

(3) داۋا (يۇلغۇن مېۋىسى) نى سوقۇپ، سىركە
بىلەن سۈگەلگە قويۇق ھالدا چېپىلىسىمۇ سۈگەل چۈشىدۇ.

(4) تۇخۇمەك ئۈزۈمى، شەترەنجى ھىندىنى بارا-
ۋەر مىقداردا ئېلىپ سىركە بىلەن يۇقۇرقىدەك ئىشلىتىل-
سىمۇ بولىدۇ.

(5) گۈڭگۈرت پوقى، بورەق (ئورنىغا توغرىغۇ ئىش-
لىتىش مۇمكىن) باراۋەر مىقداردا، كۈندۈش يېرىم ھەسسە
ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ سىركە بىلەن يۇقۇرقىدەك ئىشلى-
تىلىدۇ. بۇنىڭغا زەرەنخ بىلەن زىراۋەندىن توغرىغۇ بىلەن
تەڭ مىقداردا ئېلىپ قوشۇلسا نەتىجىسى نېغىمۇ ياخشى.

پاقالچەك يارىسى (بەتەم)

پاقالچەكلەردە خۇددى ئوسما ئۇرۇغىدەك مۇدۇر
قاپارتمىلار پەيدا بولۇپ، كېيىنچە قاپارتمىلاردىن قارام-

تۇل كوكۇش رەڭلىك زەرداپ سۇ ئاقىدۇ ۋە ساقىيىشى تەس بولغان، ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلىدىغان جاراھەت شەكىللىنىپ چىقىدۇ. بۇ سەۋدا ماددىسىنىڭ پۇتۇن بە- دەندىن ئاياققا توكۇلگەنلىكىدىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىشقا مۇمكىن بولمىسا، تەكرار- تەكرار ھىجامەت قويۇش، زۇلۇك قوندۇرۇش، ئىلاجى بار قاپارتمىلار ئىچىدىكى ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاش لازىم. قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى بېرىپ قۇستۇرۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن كۆيدۈرۈلگەن خىنا، داۋا، ئۇزۇن زىراۋەند، بىخ كەبىر پوستى، مامىرانچىنلارنى تەڭ ھىق- داردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ 2 ھەسسە سىركە، بىر ھەسسە زەيتۇن يېغى قوشۇپ، مايسىمان قويۇق دورا تەييارلاپ سىرتتىن چېپىش كېرەك. ئۇزۇنغىچە ساقايمى- ۋان پاقالچەك يارىسىغا يېڭى سەۋزىنى قىرىپ، سىقىپ سۈيىنى چىقىرىپ داكىنى چىلاپ تېڭىپ بەرسە ياكى شوخلىنىڭ سۈيىگە داكىنى چىلاپ تېڭىپ بېرىلسە سا- قىيىشى تېزلىشىدۇ.

ئۆزەمسىمان ئۆسمە (تۆتى)

شەكلى ئۆزە (جۈجەم)گە ئوخشايدىغان كۈل رەڭ- لىك، جاراھەتلىنىپ تۇرىدىغان ئۆسمىدىن ئىبارەت بو- لۇپ، كۆپىنچە سوڭ توشۇكى يانلىرىدا، جىنىسى لەۋلەردە ۋە ئەرلەر ئۇرۇقدان خالىتىسى ئاستىدا پەيدا بولىدۇ. بەزىدە يۇز قىسىملىرىدەمۇ (ئىگەك، كالىپۇكلار) ئۇچرايدۇ،

پەيدا بولغان جايليرغا قاراپ ھوللەشكەن (مەقەت ۋە جىنسى لەۋلەردە) ياكى قۇرۇق (يۈزدە) بولۇشى مۇمكىن. **داۋاسى:** مەلھەمى زاڭگارنى ئۈسمە ئۈستىگە قو- يۇق سۇرتۇپ قويۇلسا، بىرقانچە ۋاقىت ئۆتكەندىن كې- يىن چۇشۇپ كېتىدۇ. تېگىدىن پەيدا بولغان جاراھەتكە يېڭى گۆش ئۇندۇرگۈچى دورىلار چېپىلىدۇ. زاڭگارنى چاپقاندا بەدەندە قىزىتما پەيدا قىلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن جاراھەت بار چاغلاردا ئىشلەتمەسلىك لازىم.

تېرە ئاستىغا قان چۇشۇش (ئوبۇرسىما)

سەۋەبى: تاشقى زەخمىلىنىش (يىقىلىش، ئۇرۇ- لۇش) بىلەن تېرە ئاستى ئۇششاق قان تومۇرلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى نەتىجىسىدە تېرە ئاستىغا قان چۇشىدۇ ياكى قان تەركىبىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن تېرە ئاستىغا چېكىنىسىمان قان چۇشۇشى مۇمكىن.

ئالامەتى: تېرە ئاستىدا كۆك رەڭدە تېرىدىن كۆ- تىرىلمىگەن ھەر خىل چوڭلۇقتىكى قانلىق چېكىت ۋە داغلار كۆرۈنىدۇ. بۇلارنى دىققەت بىلەن قارىغاندا ياكى قۇل بىلەن بېسىپ تۇرغاندا، تومۇر كېڭىيگەندە كۆتىرىد- لىدۇ، تارايغاندا تۆۋەنلەيدۇ، باسقاندا ئويمانلىشىدۇ. قو- يۇپ بەرگەندە دەرھال ئەكسىگە كېلىدۇ.

داۋاسى: شاھ بەللۇت، موزا، ئاقاقىيا قاتارلىق قورىغۇچى دورىلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ سۇ بىلەن سۇيۇق ئۇماچ ھالەتكە كەلتۈرۈپ، قانغان نۇقتا

ئۇستىگە چېپىپ مەھكەم تېكىپ قويۇش، ھەركەتنى بىر مەزگىل چەكلەش لازىم.

يەل يارا (ئابىلە فەرەڭگى، ئاتىشەك) ①

يۇقۇمچان ۋە كېسەلنىڭ ئوز بەدىنىدە ئېغىر جىسمانى كەمتۈكلىكلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يارىلىق كېسەللىك بولۇپ، جىنسى ئالاقە، قاچا - قۇچىلار ئارقىلىق يۇقۇپ، ئەر - ئاياللارنىڭ جىنسى ئەزاسىدا، كالىپۇكتا قاتتىق مۇنەكچە پەيدا بولۇش بىلەن باشلىنىدۇ. مۇنەكچە بىر مەزگىلدىن كېيىن يوقىلىپ كېتىپ قايتا پەيدا بولغاندا جاراھەت ھاسىل قىلىدۇ. جاراھەتتىن زەرداپ سۇ ئېقىپ تۇرىدۇ، بارغانسېرى يوغانىدۇ، ئەگەر ۋاقتىدا توغرا تولۇق داۋالانمىسا، يارا ھاسىل بولغان ئەزالاردا بۇزۇلۇش كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن، بۇرۇن ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ. سوڭەككە تەسىر قىلغاندا سوڭەك قايناپ چىقىدۇ. ھەركەت دەخلىگە ئۇچرايدۇ؛ ئەڭ مۇھىمى مىڭە، يۈرەك قاتارلىق باشقۇرغۇچى ئەزالاردا ئۆزگەرىش پەيدا قىلىدۇ. يەل يارا ئۇفۇنەت (مىكروپ) لىق كېسەللىك بولۇپ، كېسەللىك يۈز بېرىشكە شارائىت تۇغدۇرۇپ بەرگەن خىلىتلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، ئۇنىڭ تۈۋەندىكى خىللىرى بار:

① ئابىلە فەرەڭگى — فرانسۇز يارىسى دېگەنلىك بولۇپ، سىغىلى كېسىلىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ كېسەل دەسلەپتە ئىسپانىيلىك - لىەر ئارقىلىق فرانسىيىگە، ئاندىن ئۇلاردىن ياۋرۇپاغا تارقالغاچقا قەدىمقى كىتاپلاردا، فرانسۇز يارىسى، دەپ يېزىلغان.

1) قان ئالامەتلىرى غالىپ بولغان تۇرى —
باش ئېغىر بولۇپ، باشتىكى قىزىل تومۇرلار قان بىلەن
تولۇپ، كۆپكەندەك كورۇنىدۇ. يۈزى قىزىل، كۆز چاندە-
غىدا ئېغىرلىق سېزىدۇ. بۇ تۈرىدە جاراھەت قىزىل قال-
پارتىمىلاردىن ئىبارەت بولۇپ، كۆپىنچە نەملەشمەيدۇ. بە-
زىدە سۇلۇق قاپارتىمىلارغا ئايلىنىدۇ.

داۋاسى: ھىجامەت قويۇلىدۇ. مەتبۇخى سانا
(183 - نۇسخە) ياكى توۋەندىكى نۇسخىدىكى سۈرگە
بېرىلىدۇ.

نۇسخە: سانا 7 مىسقال، قىزىل گۈل 4 مىسقال،
سېرىق ھېلىلە پوستى، قارا ھېلىلە ھەر بىرى 5 مىس-
قالدىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئارپا بېدىيان، شاتەرە
گازىۋان، بادىرەنجىبۇيا، بىنەپشە، نىلۇفەر 3 مىسقالدىن،
سەرپىستان 60 دانە، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 60 دانە.

تەييارلاش: سانا، قىزىلگۈل، نىلۇفەر بىنەپشە ۋە
ئۇزۇمدىن باشقىلىرىنى چالا سوقۇپ ھەممە دورىلارنى 2
چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتىسى يېرىمى قال-
غىچە قاينىتىپ، سىقىپ، سۇزۇپ 3 كە بولۇپ بىر
كۈندە ئىچىپ بولىدۇ. چىلان سۈيى بىلەن كۈنىگە 3
مىسقال مەجۈلى شاتەرە بېرىلىدۇ. جاراھەتكە سىرتتىن
چىپىش ئۈچۈن توۋەندىكى مەلەم ئىشلىتىلىدۇ:

(1) **نۇسخە:** ئۇزۇن زىراۋەند 2 مىسقال، كۈندۈش
بىر مىسقال، ئاچچىق ئۇرۇك مېغىزى بىر سەر، سىماپ
كۈشتىسى 2 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن قويۇق ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

(2) سەپرا ئالامەتلىرى غالىپ بولغان تەۋرى: بەدىنى ئورۇق سېرىققا مايىل، ئاغزى ئاچچىق ۋە تەش-ئاللىق كۆپ بولىدۇ. تومۇر ھەركىتى تېزلىشىش ۋە باش ئاغرىش، ئاچچىقى يامان بولۇپ قېلىش، ئۇيقا كەلمەس-لىكتەك روھى بەلگىلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. سۇيىدۇكى قە-زىل كېلىپ، كۆز ئالدىدا يوق نەرسىلەر — پاشا، كومۇ-تىلار ئۇچقاندەك كۆرۈنىدۇ. بەدەندىكى يارىلار ھۆل قا-پارتىمىلار بولۇپ، دائىم سېرىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ، جاراھەت يۈزى تەكشى ۋە چوڭقۇر بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىۋىل بۇزۇرى (100- نۇسخە)، ئازار شەرۋىتى قاتارلىقلارنى بېرىپ سەپرانى پەسەيتىش كېرەك، ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن سۈرگە بېرىد-لىدۇ.

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە پوستى، سانا ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، شاتەرە 5 مىسقال. تەمىرى ھىندى، ئەينۇلا 15 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى، ئاق لەيلى، ئىت ئۇزۇمى، زىراۋەند، قىزىل گۈل ھەر بىرى 3 مىس-قالدىن، چىلان 9 دانە، سەرىپىستان 9 دانە، تەرەنجە-ۋىل بىر سەر.

تەييارلاش: تەرەنجىۋىل، تەمىرى ھىندىلەردىن باش-قىلىرىنى چالا سوقۇپ 2 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە

چىلاپ، يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، تىرىپى سىقىپ سۇزۇلىدۇ، باشقا دورىلارنى قايناقسۇغا چىلاپ ئوبدان تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ يۇقۇرىدىكى دورىلارغا قوشۇلىدۇ. تەييار بولغان دورىنى بىراقلا ياكى بىرقانچە چىگە بولۇپ بىر كۈندىلا ئىچىپ بولۇش لازىم. يارىغا سىرتتىن ئىشلىتىش ئۈچۈن:

(1) نۇسخە: شادىنەج ئەدەسى، كۈندۈش، ئەنزۇرۇت ھەر بىرى بىر مىسقالدىن، گۈل يېغى 12 مىسقال، ئاق موم $1\frac{1}{2}$ سەر. تەييارلاش ئۇسۇلى: شادىنەج ئېزىلىدۇ. باشقىلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوت-كۈزۈپ، ئاۋال گۈل يېغىنى بىر ئاز قىزىتىپ بولغاندىن كېيىن، ئۈستىگە ئاق موم سېلىپ ئېرىتىپ، باشقا دورىلارنى قوشۇپ ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

(2) نۇسخە: ئەنزۇرۇت، شادىنەج، ئاقاقىيا، ئانار گۈلى، خۇنىسىياۋشىيان، زىراۋەندە ھەربىرى 2 مىسقالدىن، بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان دورا تەييارلاپ، جاراھەت ئۈستىگە سېپىشكە بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغان تۈرى: بەلغەم ئۇفۇنەتلەنگەن بولۇپ، بوغۇملار ئاغرىيدۇ. تېرە ئۈستى سوغاق، جاراھەت ھول، ئەتراپى ئاقۇش رەڭدە كېلىدۇ. ئېغىز-بۇرۇندىن سۇ ئېقىپ تۇرىدۇ. سوغاق ھاۋا ۋە سوغاقلىقلار كېسەلنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن

ئالدى بىلەن ھەببى ئىستېمىخقۇن (11- نۇسخە) ياكى ھەببى قوقىيا (17- نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ھەپتىدە بىر كۈن ئىسكەنجىۋىل، ئەبكامە، سىركە، ئاقىرقەرھە بىلەن قۇستۇرۇش كېرەك. ماش، قىزىل گۈل، شۇمشە ئۇرۇغى، شەھى ھەنزەللەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ ئۇنىڭغا چىڭسەي سۈيى قوشۇپ سۈيىدە يارىنى يۇيۇشقا بۇيرۇلىدۇ. گۈل يېغى ۋە كالا- پاقالچەك يىلىڭى بىلەن ئاقىرقەرھە، قۇست، مەدەستان، ئەنزۇرۇت خۇنسىياۋ- شىيانلارنى ئارىلاشتۇرۇپ، ماي دورا تەييارلاپ چېپىشقا بېرىلىدۇ ياكى مۇنۇ نۇسخىدىكى دورا تەييارلاپ بېرىلىدۇ. نۇسخە: كۈندۈش 2 مىسقال، زىراۋەند، زەچىۋە، سىماپ كۈشتىسى 2 مىسقال. سىركە، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغى يېتەرلىك مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ياغنى بىر ئاز

ئىسسىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئۇستىگە سىركىنى قويۇپ، قۇيۇق ئۇماچتەك دورا تەييارلىنىدۇ، سىرتتىن سۈركىلىدۇ.

(4) سەۋدا غالىپ بولغان تۈرى: بەدەن رەڭگى

قارامتۇل، ئىسلاشقانداك بولۇپ قالىدۇ. بەدەن ئېغىرلە-

شىنىدۇ، تومۇر ھەركىتى ئاستا ۋە كىچىك بولۇپ،

سۈيىدۈك ئاق كېلىدۇ. جاراھەت ئويۇلۇپ كەتكەن ياكى

قايناپ چىققانداك بولۇپ، ئىچى قارامتۇل قىزغۇش

رەڭدە، قۇرغاق كورۇنىدۇ. بەرلىرىنىڭ ئۈستى كىچىككە-

شىپ، قارامتۇل قاسراق باغلايدۇ، روھىي ئالامەتلەر ئې-
غىرلىشىدۇ. ئۇيىقىسىز، خام خىيالچان، كىشىلەردىن
قاچىدىغان بولۇپ قالىدۇ. جاراھەت چوڭقۇرلىشىپ،
سوڭەكلەرگىچە يېتىپ بېرىپ ئېغىر ئازاپ كەلتۈرىدۇ.
ساقايماي ئۇزۇن داۋام قىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەت-
بۇخى ھېلىلە (38- نۇسخە) ۋە مەتبۇخى ئەپتىمۇن
(20- نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھېلىلە مۇرابباسى بىلەن،
تەركىۋىدە بىخ كەبىر بولغان ئىسكەنجىۋىل ھەسلىنى
داۋاملىق بېرىش كېرەك. ئايارەج پەيقارائى ھەسەل
سۈيى بىلەن بەرسىمۇ بولىدۇ. ئارىلاپ توۋەندىكى
سۇرگە بېرىلىدۇ:

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە پوستى 15 مىسقال، سانا،
شاتەرە 5 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى، بىتىپايەج،
ئەپسەنتىن 3 مىسقالدىن، ئەپتىمۇن 5 مىسقال، خىيارى
شەنبەر 1 سەر، تەرەنجىۋىل 1 سەر، بادام يېغى بىر
مىسقال.

تەييارلاش: ئادەتتىكى قاينانما ئۇسولىدا تەييار-
لىنىدۇ. جاراھەتكە سىرتتىن سۈركەش ئۈچۈن:

كۇندۇش، كۇمۇش ئىقلىمىياسى ھەربىرى 2 مىس-
قالدىن، گۇڭگۇرت 3 مىسقال، زىراۋەند، زەچسەۋە،
سىماپ كۇشتىسى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، سىركە، گۈل
يېغى يېتەرلىك مىقداردا.

تەييارلاش: يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تەييار-
لىنىدۇ.

قىزىل گۈل، ئەنزۇرۇت، باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ جاراھەتكە سېپىش
لازىم. بۇلار بىلەن توۋەندىكى مەجۇن بېرىلىدۇ:
ھېلىلە پوستى، ئامىلە، تۇربۇت، زەنجىۋىل،
شاتەرە ھەربىرى 5 مىسقالدىن، قەنىبىل 4 مىسقال،
ئەپتىمۇن 3 مىسقال، قەن 10 سەر. -
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، قەننى قىيام قىلىپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

2- پەسەل: تېرە رەڭگى ئۆزگىرىش كېسەللىكلىرى ئاق كېسەل (بەرەس)

ئاق كېسەل — بەرەس، ئاۋلاق، پەسە دىگەن ناملار
بىلەن ئاتىلىدىغان كېسەللىك بولۇپ، تېرىدە ھەر خىل
چوڭلۇقتىكى ئاق داغلار چۈشۈش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.
داغنىڭ خۇسۇسىيىتىگە قاراپ تىبابەتتە ئاق بەرەس
ۋە ئاق بەھەق دەپ 2 تۈرگە ئايرىلىدۇ.

سەۋىبى: ئاق كېسەلنىڭ مۇتلەق سەۋىبى ئېنىق
ئەمەس. بىراق تىبابەتتە بەدەندە قويۇق بەلغەم (بەلغە-
مى غەلىز)نىڭ غالىپلىغىدىن پەيدا بولىدۇ دىگەن كۆز
قاراش مەۋجۇت.

ئالامەتلىرى: تېرە ئۈستىدە ھەرخىل چوڭلۇقتىكى

ئاق داغلار پەيدا بولىدۇ. ئۇنداق داغلار بەدەننىڭ مەلۇم جايلىرى بىلەن چەكلىنىشى مۇمكىن. بۇ "بەھەق" دىيىلىدۇ. ئەگەر داغلار بەدەننىڭ كۆپ يېرىگە تارىغان ۋە ئوزۇن ئارالار بىرىكىپ يېپىلغان بولسا ئۇ "بەرەس" دىيىلىدۇ. داغلار ئاغرىمايدۇ. ئەمما كېسەلنىڭ تېرىسىدىكى تەبىئىي ئاق رەڭنى ئۆزگەرتىۋېتىپ، يۈز ساھەسىدىكى داغلار قىياپەتتىكى قىسمەن ئۆزگەرتىۋېتىدىغانلىقى ئۈچۈن، كېسەل كىشى روھىي ئازاپ چېكىدۇ.

بەرەس بىلەن بەھەقنى تۈۋەندىكى نۇقتىلارغا قاراپ بىر بىرىدىن پەرىقلەندۈرۈش مۇمكىن:

(1) بەھەق كۆپىنچە چەكلىك دائىرىدە بولىدۇ. بەرەس كەڭ يامراشقا مايىل كېلىدۇ. بەھەق تۈستىدىن بىلىنىپ، داۋالاش بىلەن تېزلا ساقىيىپ كېتىدۇ؛ بەرەس ئاستا پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي كېڭىيىپ يامرايدۇ، ئۇزاق مۇددەت داۋالاش تەلەپ قىلىنىدۇ.

(2) بەھەق مەيلى قانچە كۈن بولسۇن، تېرىگە يېڭى سانچىغاندا قان چىقىدۇ. بەرەسنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدە قان چىقىمۇ كېيىن قان چىقىماستىن ئاقۇش سۇيۇقلۇق چىقىدۇ (تېرىگە يېڭى سانچىپ كۆر-گەندە گوشكە سانچىپ تاشلاشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، تېرىنى كۈتىپ تۇرۇپ سانچىش كېرەك).

(3) بەھەقتە داغ چۈشكەن تېرى سېرىققا مايىللىشىپ قالىدۇ، داغ ئورنىدىكى تۈكلەر ئاقارمايدۇ. بەرەستە

ئاقارغان تېرە ئۈستى پارقىراپ تۇرىدۇ، تۈكلەرمۇ ئاقىپ
رىپ كېتىدۇ.

(4) بەھەقتە تېرىنى ئۆۋىلىسا قىزىرىدۇ، بەرەستە
ئانچە ياخشى قىزارمايدۇ.

بەرەس بىلەن بەھەق يۇقۇرىدىكىدەك پەرقلەنسىمۇ،
كۆپ ھاللاردا ئېنىق ئايرىۋېلىش تەس. شۇنىڭدەك ھەر
ئىككىسىنىڭ داۋاسى، پەرھىز قىلىدىغان ئىشلار ئاساسەن
ئوخشاش.

داۋاسى: ئاق كېسەلنى داۋالاش سەۋرىچانلىق ۋە
كېسەل كىشىلەرنىڭ روھى، ماددى جەھەتتىن ھەمكار-
لىشىشنى تەلپ قىلىدىغان ئىش، شۇڭا ئۇنى تەرتىپلىك
ھالدا ئېلىپ بېرىش لازىم، داۋالاشتا ھەرخىل سۈرگىلەر
ياردىمى بىلەن سەۋەپچى ماددىنى چىقىرىپ تاشلاش،
ئىچىدىغان دورا بېرىش، سىرتتىن دورا چېپىش، كۈن
نۇرىغا قاخلاش ۋە ئومۇمى بەدەننى كۈچەيتىش، پەرھىز
قىلىش چارىلىرىنى كورۇشتىن ئىبارەت بىر قاتار
مۇرەككەپ داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. ئۇنىڭ بىر
تارمىغى كەم بولسا، داۋالاش ئۇنۇمى كۈڭۈلدىكىدەك
بولماسلىقى مۇمكىن.

بۇزۇق بەلغەمنى چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن، داۋا-
لانىڭ دەسلەپتىنلا سەۋدا ۋە بەلغەم سۈرگىسى بېرىلىدۇ.
شۇنىڭدەك داۋالاش داۋامىدىمۇ بىرقانچە قېتىم
سۈرگە دورىلىرى بېرىپ تۇرۇلۇشى لازىم.
دەسلەپكى سۈرگىدىن بىر كۈن كېيىن، ئىچىش

ئۇچۇن توۋەندىكى دورىلاردىن بىرىنى تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. تەجرىبىلەرگە قارىغاندا ئەتىرئال مەجۇنى ئاق كېسەلنى داۋالاشتىكى ئاساسى دورا ھىساپلىنىدۇ. توۋەندە ئىچىلىدىغان دورىلارنىڭ بىر قانچە نۇسخىسىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:

(1) بىر كېچە سىركىگە چىلاپ قۇرۇتۇلغان ئەتىرئال، ئاقىرقەرھە، بىخىكەبىر، شەترەنجى ھىندى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، ھەسەل 24 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قائىدە بويىچە كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ. كۈندە $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن 10

كۈن ئىستىمال قىلىدۇ. كېيىن 2 مىسقالدىن 10 كۈن بېرىلىدۇ. مۇشۇنداق مىقدارنى ئاشۇرۇپ چوڭ كىشىلەرگە ئەڭ يۇقۇرى كۈنلۈك مىقدار بىرسەرگە يەتكۈزۈلىدۇ.

(2) نۇسخە، ئەتىرئال بىر ھەسسە، ئاقىرقەرھە،

تۇربۇت، توم زەنجىۋىل ھەربىرى $\frac{1}{5}$ ھەسسە، ھەسەل

ئومۇمى دورا مىقدارىدىن 3 ھەسسە.

تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئىچىش مىقدارى يۇقۇردىكى بىلەن ئوخشاش.

(3) مەجۇنى بەرەس: تەركىۋى — قىزىل گۈل 8 سەر، ئوغرى تىكەن ئۇرۇغى 6 مىسقال، ئاقىرقەرھە 2

سەر، توم زەنجىۋىل $\frac{1}{2}$ سەر، ئاق تۇرپۇت 2 سەر،
 تاغ زىرىسى 3 سەر. كۆپۈگى ئېلىنغان ھەسەل 60 سەر،
 تەييارلاش ئۇسۇلى: تاغ زىرىسىنى بىر كېچە
 سىركىگە چىلاپ، سۈزۈپ قۇرۇتۇپ سوقۇلىدۇ. باشقا
 دورىلارنىمۇ سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، كۆپۈگى
 ئېلىنغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ تەجۈن قىلىنىدۇ.
 دەسلەپ ھەركۈندە يېرىم سەردىن يېتىمىشكە باشلاپ،
 بارغانسېرى مىقدارىنى ئاشۇرۇپ كۈندە 2 سەرگە
 يەتكۈزۈلىدۇ.

يۇقۇرىدىكى دورىلاردىن بىرىنى ئىچىشكە باشلاپ،
 2 - 3 كۈندىن كېيىن ئاغرىق كىشى داغ چۈشكەن
 جاينى كۈن نۇرىغا قاقلاشقا باشلايدۇ. كۈن نۇرى تېرى-
 گە تىك چۈشۈشى، قاقلاش ۋاقتى كۈندە ئاز-ئازدىن
 ئۇزارتىلىشى لازىم. كۈن نۇرىغا قاقلانغاندىن كېيىن
 تېرىنىڭ داغ چۈشكەن جايلىرى سۇ كوتىرىپ چىقىشى،
 قەش باغلىشى مۇمكىن. بۇ چاغدا كۈن نۇرىغا
 قاقلاشنى توختاتسىمۇ بولىدۇ (بەك ئېغىر يارىلانسا
 توختىتىش كېرەك).

دورا ئىچىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، داغلارغا تۈۋەن-
 دىكى دورىلاردىن بىرىنى سۈركەش لازىم.

(1) قىزىل لوبيا، بىخكەبىر بىر ھەسسە، شەتەرەنجى
 ھىندى، ئاقىرقەرھ، تۇرۇپ ئۇرۇغى، كۈندۈش، قىچا

بېرىم ھەسسە. قۇرۇق دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىرگە قوشۇپ ئۇماچ ھالىغا كەلتۈ-
رىدۇ. داغ چۈشكەن جايغا سۈركەلسە تېرىنى قىزارتىش
تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ.

(2) زەمچە، شورا، ئوردان، گىلىسى ئەرمىنى،
شەترەنجى ھىندى، تومۇر دېتى، ئوسمانىل بويىغىنى
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ سىرگە بىلەن سۇيۇق-
لاندىرۇپ تەييارلىنىدۇ. بۇ دورا تېرىدىكى ئاقارغان
جايىنىڭ رەڭگىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەسىرىنى كۆرسى-
تىدۇ. بۇنى دورا ئىچىپ، كۈن-نۇرىغا قاقلاپ سۇ
كەتىرىپ چىققان (پۇتۇنلىقى بۇزۇلغان) تېرىگە سۇر-
كەسە ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

سىرتتىن چاپىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىۋاتقان
جەرياندا مۇزا قايىنىتىلغان سۇ ياكى زاك سۈيى
بىلەن ئالدىنقى قېتىم چېپىلغان دورىنى يۇيۇپ تاشلاپ،
(2) ئۇسخىدا كۆرسىتىلگەن بويىچە دورىنى چېپىش
لازم.

ئومۇمەن داۋالاش جەريانىدا ئارىلاپ سۈرگە بېرىپ
ماددىلارنى سۈرۈپ چىقارغاندىن تاشقىرى، ئىنتىرىپىل
كەبىر (1 - نۇسخە)، ئىنتىرىپىل سىغىر (5 - نۇسخە) لەرنى
بېرىپ مىزاجنى تەڭشەپ تۇرۇش، شۇنىڭدەك مەجۇنى
كەلكىلانەج (132 - 131 - نۇسخىلار)، قۇرسى بەرەڭگى،
تەرياق ۋە مەجۇنى مەشىدىر تۇس (25 - نۇسخە) لەردىن
بىرىنى بېرىش لازىم.

بەرەسنى داۋالاش جەريانىدا ۋە داۋالاشتىن كېيىن خېلى بىر مەزگىلگىچە قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى بېرىش، ياۋا قۇشلار (ئۇلا كەكلىك، كۆك كەپتەر باچكىلىرى) نى كاۋاپ قىلىپ بېرىش، سۇت، قېتىق ۋە بېلىق گۆشى، تۇزلانغان گۆشلەر ھەمدە بەلغەم كۆپەيتىدىغان پۇرچاق خىلدىكى دانلىق ئاشلىقلار، ھول مەۋە بەزى كۆكتاتلارلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن دورىلاردىن تاشقىرى، تۈۋەندىكى بىر قانچە خىل چارلىرىمۇ بەرەس كېسىلىنى داۋالاشتا مەلۇم ئۈنۈمگە ئىگە. سىناپ ئىشلىتىش مۇمكىن: (1) قارا يىلاننى تۇتۇپ، ئۇنىڭ قېنىنى بەرەس دېغىغا قايتا-قايتا سۈركەش لازىم. ئاندىن يىلاننىڭ قوسىغىنى يېرىپ، ئىچىگە بەلگىلىك مىقداردا شاتەرە چۆپىنى تىقىپ، يىلان قوسىغىنى قايتا تىكىپ، ئاستا ئوتتا كاۋاپ قىلىنىدۇ، ئاندىن شاتەرەنى چىقىرىپ ئىلىپ، داغ چۈشكەن تېرىگە سۈركەپ بېرىش لازىم.

(2) زىنقى رۇمى، شورا، قىزىل قىچا، ئاق ۋە قارا خەربەق، تۇخۇمەك ئۇزۇمى، ھاك، زەرىنىخ، قارا توغرىغۇ، ياۋا پىياز (ئەنسەل)، شەتەرەنج ھىندى، ئاقىر قەرھا، سىيادان، بىخ كەبىر پوستى قاتارلىق دورىلارنى يالغۇز ياكى بىر قانچىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، كونا سىركە (قانچە كونا بولسا شۇنچە ياخشى) دە تاشقا سۈرۈپ (ياكى ئېرىتىپ) ئاق داققا چېپىلسا بولىدۇ.

قارا داغ (بەرەسى ئەسۋەد)

تېرە يۈزىگە قارا داغ چۇشۇشتىن ئىبارەت كې-
سەللىك بولۇپ، 2 خىلغا بۆلىنىدۇ:

بىر خىلدا، داغ ئۇستىنى قول بىلەن سۇرتۇل-
سە قارا كىپەك چۇشىدۇ. بۇ ياشلاردا ئۇچرايدۇ.

يەنە بىر خىلدا تېرە قارامتۇل رەڭگە كىرىش
بىلەن قوتۇردەك قېلىنىلىشىپ قالىدۇ، قىچىشىدۇ.

داۋاسى: ئالدىنقى تۈرىنى داۋالاشتا مەتبۇخى
ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)، مائۇل جىپىن (181 - نۇسخە)

لار بېرىلىدۇ. مىزاجنى تەڭشەش ئۈچۈن مونچىغا كىرىش
ۋە ھوللۇك نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلىش، سىرتتىن مونۇ

دورلارنى چېپىش كېرەك. قارا خەربەق، زەرنىخ، زاك،
گۇڭگۇرت، تۇرۇپ ئۇرۇغى، بىتىپايەج، كۈندۈش، قۇستە

تەلخى، زاغۇنلارنى سوقۇپ، سىركە بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ
چېپىلىدۇ.

كېيىنكى تۈرىنى داۋالاش ئۈچۈن، ئاۋال سۇرگە
بەرگەندىن كېيىن، سىرتتىن يۇقۇرقى دورىلار چېپىلىدۇ.

داغ (كەلەق)، سەپكۇن (نەمەش)

يۈز تېرىسىدە پەيدا بولىدىغان تار ياكى كەك
دائىرىلىك قارا داغ "كەلەق" دەپ ئاتىلىدۇ. چېكىتسىمان

داغلار — سەپكۇن (نەمەش) دىيىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پەيدا
بولۇشىغا تېرە ئاستىغا چۈشكەن غەيرى تەبىئى ماددىلار

(قان، سەۋدا) نىڭ بۇخاراتلىرى سەۋەپ بولىدۇ. بەزى

قىزىتمىلار (مەسىلەن، توت كۈنلۈك قىزىتما) ھامىلدارلىق، ھېمىز توختاپ قېلىش، كۈن نۇرىدا كويۇش، جىگەر كېسىلىدىن كېيىن پەيدا بولۇپ چىقىدۇ. سەپكۈن ئاتا - ئانىدىن مىراس بولۇپ قېلىشمۇ مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: پىشانە، مەڭزى ۋە ئىگەك تېرى - سىدە چەكلىك دائىرلىك ياكى كەڭ تارقالغان ھالەتتىكى ساغۇش، قارامتۇل داغلار پەيدا بولىدۇ. بەزىدە كېسەل ساقىيىپ، ھامىلە تۇغۇلغاندىن كېيىن تەدرىجى يوقىلىپ كېتىدۇ. ئەكسىچە بەزى كىشىلەردە مەڭگۈگە تىۋرۇپ قالىدۇ، كۈن نۇرى ئاستىدا يۈرگەندە بارغانسېرى قى - نىقلىشىپ كېتىدۇ.

سەپكۈن تۇلاراق بۇرۇن ئۈستى زە كوز ئەتراپىدا ئورۇنلىشىدۇ، قىسمەن كىشىلەرنىڭ يۈز تېرىسىنى پۇ - تۇنلەي قاپلاپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋاسى: قان ۋە سەۋدا ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن ئەپتىمۇندىن 7 مىسقال، تۇر - بۇت، غارىقۇن بىر مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقانلاپ 2 قېتىمدا ئىسكەنجىۋىل بىلەن يېمىشكە بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن: توغرىغۇ، قارىمۇچ 2 مىسقال - دىن، قوغۇن ئۇرۇغى، قىزىل لوبىيا كۈنجۈت، تۇرۇپ ئۇرۇغى 4 مىسقالدىن، كۈندۈش بىر مىسقال، بادام مې - غىزى، گۈل سوسەن يىلتىزى، قىچا، تۇخۇمەك ئۇزۇمى، ئانار گۈلى، قىزىل گۈل 5 مىسقالدىن، مامۇرانىچىن (زە -

چىۋە) 2 مىسقالدىن، ئوقۇت، كەترا 2 مىسقال، گۇرۇچ، بۇغداي كىپىگى 2 سەر. ئايال سۇتى 15 مىسقال، 6 دانە تۇخۇمنىڭ ئېقى، ئەنجۇر شىرىسى 5 مىسقال، تەييارلاشتا دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇتە تۇخۇم ئېقى ۋە ئەنجۇر شىرىسى بىلەن قويۇق ھالدىكى دورى تەييارلىنىدۇ. ھەركۈنى كەچتە يۇزنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇپ، ئارقىدىن مەزكۇر دورىلارنى قويۇق چېپىپ ئەتىسى سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىلىدۇ. داغ كونا بولسا بۇ دورىلارغا سىماپ كۈشتىسىدىن 2 مىسقال قوشۇش كېرەك. ئەنجۇر شىرىسى مۇنداق تەييارلىنىدۇ: ئوبدان پىشقان ئەنجۇردىن بىر قانچىنى ئېلىپ، تازا مىجىپ داكىدىن سۈزۈپ ئۆتكۈزۈپ سىقىپ قايىناتسا ئاق رەڭلىك شىرە ھاسىل بولىدۇ. بۇ دائىم يۈزگە سۈركەپ يۈرسە بولىدۇ. ھول ئەنجۇر بولمىسا، ئەنجۇر قىپقىنى بىر كېچە قايى-ناقسۇغا چىلاپ قويۇپ قايىنىتىپ تەمى چىقىرىلسا بولىدۇ.

مەڭ (خەلال)

تۇغما مەڭنى داۋالاپ ساقايتقىلى بولمايدۇ. مەڭنىڭ بەزىلىرى كىشىلەر، بولۇپمۇ ئاياللار ئۈچۈن زىنەت بولىدۇ. داۋالاش ھاجەتسىز. ئەگەر كۆپ بولۇپ ياكى جاراھەت-لەنسە، ئالدى بىلەن بەدىنىنى سەۋدا ۋە غەيرى تەبىئى قاننى تازىلاش ئۈچۈن سۈرگە بېرىلىپ، مەڭنى كويىدۇ-رۇپ چۈشۈرۈش ئۈچۈن، ئاق كېسەلدە كۆرسىتىلگەن زەرنىخ، گۇڭگۇرتنى سىركە بىلەن چېپىش چارىسىنى

قوللىنىپ، بەرەستە كورستىلگەن كونا سىركە بىلەن
يۇيۇلىدۇ ۋە سەپكۈن داغدا كورسەتكەن دورا سورتىلىدۇ.

تېرە كوكۇرۇپ قېلىش

يىقىلىش، ئۇرۇلۇش ياكى سوقۇلۇشلار بىلەن تېرە
ئاستىدىكى ئۇششاق قان تومۇرلاردىن چىققان قان تېرە
ئاستىغا يىغىلىپ قالىدۇ ياكى قان ئالغاندا كوپ مىق-
داردىكى قان سىرتقا چىقماستىن تېرە ئاستىغا چۈشۈپ
قالىدۇ.

داۋاسى: كالىك بەسەي ياكى چەلەك قۇلىغى (يو-
پۇرمىغى)، پىننە، زەرنىخ ۋە سىركە قاتارلىقلارنى بىر-
لەشتۈرۈپ سوقۇپ تېرىگە قويۇش كېرەك.

تېرە رەڭگىنىڭ بۇزۇلمىلىرى

تېرە رەڭگىنىڭ ئەسلىدىكى تەبىئى ھالىدىن ئۆز-
گىرىپ كېتىشى توۋەندىكى بىرقانچە قىسىمغا بۆلىنىدۇ.
1) بەدەندە كوپىيىپ قالغان كېرەكسىز ماددىلار
تېرە ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىش تۈپەيلىدىن تېرىنىڭ
رەڭگى ئۆزگىرىدۇ، بۇنداقلار داغ كېسىلىدىكى چارە بى-
لەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

2) بەدەندە مەۋجۇت خىلىتلار بىرەرسىنىڭ غالىپ
بولۇشى تۈپەيلىدىن تېرىنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىدۇ. مەسىلەن:
قان غالىپ بولسا تېرە قىزىرىدۇ، سەپرا غالىپ بولسا
ساغىرىدۇ، بەلغەم غالىپ بولسا ئاقىرىدۇ. سەۋدا غالىپ
بولسا تېرە قارىيىپ كېتىدۇ. بۇنداق ئەزالاردا خىلىت-
لارغا مۇناسىۋەتلىك زەرەرلىنىش ئالامەتلىرىمۇ روشەن

بولىدۇ. بۇخىل تېرە رەڭكى ئوزگىرىشلەرنى داۋالىمىسىمۇ يۈرەك، تال، جىگەر شۇنىڭدەك مەئىدە كېسەللىكلىرىدەك سەۋەبچى كېسەللىكلەرنىڭ ساقىيىشى بىلەن يوقىلىپ كېتىدۇ.

(3) كۈن ئورنىدا ئۇزۇن ۋاقىت تۇرۇشتىن تېرە رەڭكى بۇزۇلۇش: بۇنىڭدا تېرە رەڭكى قىزىرىپ كۆي-گەندەك ئېچىشىدۇ، ئۇنى داۋالاش ھاجەتسىز. ئېغىر بولسا ماش ئۇنى، تۇخۇم ئېقى، ئاچچىق بادام شاكىلى (يۇمشاق سوقۇپ)، نىشاستىلەرنى سۇت بىلەن ياكى موگو سۈيى بىلەن سۇيۇق ئۇماچتەك ھالغا كەلتۈرۈپ سورتىلىدۇ. (4) بەدەن رەڭگىنى ئۇزگەرتىش تەسىرىگە ئىگە دورىلاردىن جۇۋىنە زىرە ۋە باشقىلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش بىلەن بەدەن رەڭكى ئوزگىرىپ كېتىدۇ. دورىلار توختىتىلغاندىن كېيىن ئاستا-ئاستا ساقىيىپ كېتىدۇ.

(5) ئۇزاق كېسەل بولغۇچىلار ۋە بەدەننى ئورۇق-لاپ كەتكەنلەرنىڭ رەڭگىمۇ ئوزگىرىپ كېتىدۇ. بۇنداق-لارغا ئوزۇقلۇققا باي تاماقلارنى بېرىش، مائۇل لەھمى بېرىش لازىم ("جۈدەتكۈچى ئىستىما" غا قاراڭ). تۇخۇمنى چالا پىشۇرۇپ قەن ۋە سۇت بىلەن بېرىش كۇپايە قىلىدۇ.

ئومۇمەن بەدەن رەڭكى بۇزۇلۇشنىڭ قايسى تۈرى بولسۇن ئىترىپىل كەبىر بېرىلسە نەتىجىسى ياخشى.

3 - پەسىل: تېرىنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى

باش كېسەللىكلىرى (ھۇزاز)

باش تېرىسىدىن خۇددى بۇغداي كىپىگىدەك نەرسىلەر ئاچ-راپ چۈشىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن، بەدەندە قايىسى ماددا خالىيلىق ئالامەتلىرى بولسا شۇلارغا قاراپ سۈرگە بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن قاپاق مېغىزىدىن چىقارغان ياغ، بادام يېغى ۋە بىنەپشە ياغلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ باشقا سۈركەش كېرەك ياكى ئاق لەيلى، پۇرچاق، نوقۇت ئۇنى، ئىسپۇغۇل لۇئابى قاتارلىقلارغا سىركە قوشۇپ باشقا سۈركەش كېرەك.

تېرە يېرىلىش

تاشقى تەرەپتىن كۈن نۇرى، قۇرغاق ھاۋا، شامال، توپا - چاڭ، سىرتتىن ئىشلىتىلگەن زاك، زەمچىلەرنىڭ تەسىرى بىلەن قول، پۇت، يۈز تېرىلىرى يېرىلىپ كېتىدۇ؛ ئىچكى سەۋەپلەردىن بەدەندە قۇرغاقلىقنىڭ بەك ئېشىپ كېتىشى، چالاش، جىگەر خىزمىتى بۇزۇلۇش قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن ئوچۇق تۈرىدىن قىسىملار (يۈز، قول، پۇت) تېرىلىرى يېرىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ھوللىلەندۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە مايىلار بىلەن بىنەپشە يېغى، بادام يېغى، گۈل يېغى، توخۇ،

ئودەك ياغلارنى كالا يىلىگى قاتارلىقلار بىلەن ياغلاش كۇپايە قىلىدۇ. ئىچكى سەۋەپلەردىن بولسا، يىمەك-ئىچمەكلىرىدە بەدەننى ھوللەندۈرۈشكە دىققەت قىلىش لازىم. دورىلاردىن بىيە ئىسكەنجىبىنى ۋە ئىسكەنجىۋىل ئەپتىمۇن (88-نۇسخە) بېرىلىدۇ. مەستىكى، قەلەي كۈشتىسى ۋە نىشاستىلەرنى سوقۇپ گۈل يېغى، بادام يېغى، موم يېغى ۋە تۇخۇم ئېقى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ يېرىلغان جايغا سۈركەش لازىم. سۇنچاق (پۇت ئارقىسى) ۋە ئالغانلار يېرىلغاندا موزا، كەترانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئوچىكە يېغى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ. يېرىق گۆشكە يەتكەن بولسا گۈل يېغى ياكى زەيتۇن يېغى بىلەن داغلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن مەدەستانى خېنە سۈيىدە سۇرۇپ چېپىلىدۇ.

چالاش (قۇبا)

غەيرى تەبىئى سەۋدا ۋە قاندىن پەيدا بولىدىغان كېسەللەك بولۇپ، ئادەتتە قۇرۇق ئىسسىق كېسىلى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىدە ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچار-لىغىنىڭ ئالاھىدە تەسىرى بار. خىلىتلارغا قاراپ تېرە قارامتۇل ۋە قىزغۇچ رەڭگە كىرىدۇ، بۇ خىل ئوزگىرىش كۆپىنچە گەردەن، بويۇن، كۆكرەك، قول، پۇت دۇمبىلە-لىرىدە كۆرىلىدۇ. تېرە قۇرغاقلىشىپ بېلىق قاسراقلىرىدەك قاسراقلىشىپ، قېلىنلىشىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپ

تومۇمى بەدەندە ئۇيقۇسىزلىق، ئويچانلىق، ھەر خىل يامان خىياللارنى قىلىش، جويۇلۇش ھادىسىلىرى كېلىپ چىقىدۇ، ئەس-ھۇشى جايىدا بولمايدۇ، تىلى ئاق ياكى قىزىل رەڭدە ۋە يېرىلغان بولىدۇ. سەپرا غالىپ بولسا كۆپ ئۇسسايدۇ، ئاغزى ئاچچىق بولىدۇ. سۇيدۇكى قىزغۇچ سېرىق رەڭدە كېلىدۇ، تومۇر ھەركىتى تېز ۋە كىچىك بولىدۇ، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، قوسىغى ئاغرىپ، ئىچى سۇرىدۇ.

داۋاسى: بىيە ئىسكەنجىۋىلى (88-نۇسخە) ۋە مائۇل جىبىن (181-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىش ئۈچۈن كاسىن ئەرەقى ۋە بىدىمۇشكى ئەرەقى بېرىلىدۇ. كۆك قاپاق بىلەن ئاش قىلىپ كۆك يۇمغاقسۇت، پالەك سېلىپ، بىرتاز بادام يېغى قوشۇپ بېرىش لازىم. بېرد-لىدىغان نان ئۈچۈن كىپەكلىك ئۇندا ياققان نان، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، مائۇللەھمى ("جۈدەتكۈچى ئىستىما"غا قاراڭ)، مائۇل جىبىن (181-نۇسخە) بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن توۋەنكى نۇسخىدىكى دورا ماددىنى سۇرۇپ تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (184-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

نۇسخە: توخۇ يېغى، ئودەك يېغى، كالا يىلىگى ھەر بىرى 4 سەردىن، ئاق موم بىر سەر، زىغىر، قاپاق ئۇرۇغى مېغىزى بىر سەر، كۈنجۈت يېغى توت سەر، ئاق لەپىلى ئۇرۇغى، شۈمشە ئۇرۇغى، زىغىر، ئىسپۇغۇل، بىيە

ئۇرۇغى بىر سەر، كەتسە، نىشاستە ھەربىرى ئىككى مىسقالدىن.
 تەييارلاش: ئالدى بىلەن زىغىر، ئىسپۇغۇل، ئاق
 لەيلى ئۇرۇغى ۋە شۇمىشلارنى سۇغا چىلاپ شىرىسى
 (لۇئابى) چىقىرىلىدۇ. كەتسە، سۇقۇپ نىشاستە بىلەن
 ئارىلاشتۇرۇپ ئەلگەكتىن ئوتكۇزىلىدۇ. ياغلارنى تومۇر
 قاچىدا قىزىتىپ، ئۇستىگە ئاق موم سېلىپ ئېرىگەندە
 لۇئابلار قويۇلىدۇ، لۇئابلارنىڭ سۈيى قالمىغاندا سۇقۇل-
 غان دورىلارنى سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلاپ
 شىشە قاچىلاردا ساقلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

4- پەسىل: چاچ كېسەللىكلىرى

چاچ چۈشۈش (دائىل سوئەلەب)

چاچ چۈشۈش — چاچ ئۆزى چۈشۈش ۋە تېرە
 قوشۇلۇپ چۈشۈش دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ. دائىل سوئەلەب دىگەن
 سۆز “تۈلكە كېسەلى” دىگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ. تۈلكە-
 لەرنىڭ تۈكى چۈشۈشىگە ئوخشىتىپ شۇ نام بېرىلگەن.
 تېرە بىلەن قوشۇلۇپ چۈشۈش “دائىل ھەيپە” (يىلان
 كېسەلى) دىگەن سۆز بولۇپ، خۇددى يىلان تېرە تاشلى-
 غاندەك ئادەم تېرىسىنىڭ چاچ- تۈكلەر بىلەن توكۇلۇشىنى
 ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئىككى كېسەلنىڭ قايسى بىرىدە بولسۇن
 چاچ. ساقال- بۇرۇن ۋە قاش- كىرىپىكلەر چۈشۈپ كېتىدۇ.
 سەۋەبى: غەيرى تەبىئى خىلەتلەرنىڭ تېرە ۋە

چاچ يىلتىزلىرىغا تەسىر قىلىشى يەنى بەلغەم ياكى قاننىڭ كويۇشى سەۋەپ بولىدۇ. چاچ چۇشۇشنى داۋالاش مۇمكىن. تېرە قاسراقلىشىپ چۇشۇش كېسىلىنىڭ ① ساقىيىشى تەسىرەك.

ئالامەتلىرى: چاچلار (تۈكلەر) چۇشۇش بىلەن بىللە، ھەرخىل خىلىتلار غالىپلىق ئالامەتلىرى ئىپادىلىنىشى مۇمكىن. مەسىلەن، بەلغەم غالىپ بولسا يەرلىك ئورۇن ئاق، يۇمشاق بولىدۇ؛ بەدەندىمۇ بەلغەم ماددىسى كۆچ-لۈك ئالامەتلىرى كورۇلىدۇ. سەپرادىن بولغانلىرىدا بەدەن سېرىق ۋە ئورۇق، تېرە يىرىك بولىدۇ؛ قاندىن بولغانلىرىدا باش ئېغىر، ئاغزى تاتلىق، كوزى قىزىل ۋە چاچ چۇشكەن جاينىڭ رەڭگىمۇ قىزىل كېلىدۇ؛ سەۋادىن بولغانلىرىدا تېرە قارامتۇللىشىدۇ ۋە روھىي ئالامەتلەر مەۋجۇت بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ماددىلارنى پىشۇرىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. مەسىلەن، بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغاندا مائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) بېرىپ ئارقىدىن ھەببى قوقيا (17 - نۇسخە) بۇيرۇلىدۇ ياكى ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە ھەببى شەبىيار (82 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ماددىلار تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ياۋا پىياز سۈيىنى سۈركەش، قىچا، ئاقىر

① تېرە قاسراقلىشىپ چۇشۇش كېسىلى دوختۇرلىقتا تېرە چۇشىدىغان تېرە ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ.

قەرھا، پەرپىيون ۋە كالا ئوتى سۈركەش؛ گۈل يېغى، شاھى بەللۇت، ئاق موم، گۈل سۇسەن يوپۇرمىغىنىڭ سۇلىرىنى تۇخۇم سېرىغىغا ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن سۈركەش كېرەك.

(2) سەپرا ماددىسى غالىپ بولغاندا، مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە)، مەتبۇخى خىيارى شەنبەر 54 - نۇسخە بېرىلىپ، سىرتتىن سۈركە بىلەن گۈل يېغى ياكى ھوزۇز، كوپۇڭى دەريا، ھەبۇل ئاس سۈيى، ئاق لەيلى گۈلى، بۇغداي كىپىڭى شىرىلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈركەش كېرەك. قان ماددىسى غالىپ بولغاندا، ھىجامەت قويۇش، نىلۇفەر، بىنەپشە، كاسىن ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، تەمرى ھىندى قاتارلىقلارنى چىلان شەرۋىتى بىلەن بېرىپ، سىرتتىن سۈركەشكە سەۋدا ماددىسى غالىپلىقتىكى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

سەۋدا ماددىسى غالىپ بولغاندا، مەتبۇخى ئەپتە - مۇن (20 - نۇسخە) ماڭۇل جىبىن (181 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. مونچىغا چۇشۇش، بادام يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش لازىم. بۇ خىلدىكى چاچ چۇشۇشلەرگە مەخسۇس سىرتتىن سۈركەش ئۇچۇن:

(1) ياۋا پىياز سۈيى، خوراز يېغى، يولۋاس يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ.

(2) پەرپىيۇن، قومۇش يىلتىزى، مېھرىگىيا گۈلى، تۇرۇپ سۈيىنى كونا زەيتۇن يېغى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ بېرىلىدۇ.

چاچ سۇنۇپ چۇشۇش (تەساقۇتى شەئىر)

چاچلار چۇشكەندە سۇنۇپ چۇشۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، بەدەندە چاچلارنىڭ ئۇ سىشىگە ياردەم بەرگۈچى قۇۋۋەتنىڭ يېتەرسىزلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. جۇدەتكۈچى قىزىتما، ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان كېسەللىكلەر، يەل يارا (سېغىلىس)لەردە ئۇچرايدۇ. تاز كېسىلىدىمۇ چاچلار سۇنىدۇ. **ئالامەتلىرى:** بەدەن ئورۇق، ئىشتەي تۇتۇلغان بولۇپ، چاچ، ساقاللار سۇنۇپ چۇشىدۇ، چاچ چۇشكەن جاي تېرىسى يۇمشاپ قالىدۇ.

داۋاسى: بەدەننى ھۆللەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى كورۇش بىلەن ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاش، ياخشى دەم ئالدۇرۇش كېرەك. ئاچچىق بادام يېغى بىلەن چاچنى ياغلاش ياكى ئامىلە يېغى سۈركەش كېرەك. ئامىلە يېغى تەييارلاش ئۇسۇلى مۇنداق:

ئامىلە پوستى، ئاس يوپۇرمىغى، سەنئۇبەر دەرىخىنىڭ يىلتىزىنى باراۋەردىن ئېلىپ، يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيىگە باراۋەر مىقداردا كۈنجۇت يېغى قويۇپ قاينىتىلىدۇ. سۇ تۈگەپ ياغ قالغاندا شىشىگە ئېلىپ ساقلىنىدۇ ۋە كېرەك بولغاندا ئىشلىتىلىدۇ. تازدىن بولغانلىرىدا تازنى داۋالاش بىلەن بىللە ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ۋە ھەمشىۋا سۇلىرىنى سۈركەش كېرەك.

چاچنىڭ يېرىلىپ كېتىشى (تەشەققۇقى شەتەر)

بۇ كېسەلدە چاچ ئۇچى تالا-تالا بولۇپ ئېتىلىپ (يېرىلىپ) كېتىدۇ، چاچ ئوسۇستىن توختايدۇ، پاقىرىماي قالىدۇ. بۇنى ئادەتتە بىردىنلا بايقىغىلى بولمايدۇ، ئىنچىكىلەپ قارىغاندىلا كورۇش مۇمكىن.

داۋاسى: قان كوپلۇك ئالامەتلىرى بولسا ھىجال-مەت قويۇش، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئېيتىپ مۇن (20-نۇسخە) بېرىش كېرەك. ئەگەر قۇرۇقلۇق بولسا سۈرگە بېرىشكە بولمايدۇ. بادام يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش لازىم.

باشتىن ياغ تەپچۇرەپ چىقىش

بۇ كېسەلدە چاچنى ياغلاپ قويغاندەك ياغ چىقىپ تۇرىدۇ، باش كىيىملىرى، ياستۇقلار دائىم ياغلىشىپ كېتىدۇ. سەۋىيى، باش تېرىسىدە ياغ ماددىلىرى زىيادە بولۇپ كېتىشىدۇر.

داۋاسى: ھەببى ئايارەج (7-نۇسخە) ياكى ھەببى قوقىيا (17-نۇسخە) بىلەن ماددىدىن تازىلاپ بولغاندىن كېيىن، ئىتتىرىپىل كەبىر (1-نۇسخە) ياكى ئىتتىرىپىل سەغىر (5-نۇسخە) بېرىلىدۇ. توز، ئوسما، پىننىلەرنى قوشۇپ قايناتقان سۇ ياكى بۇغداي كىپىگى، ئاق نەيلى قايناتقان سۇ بىلەن باشنى يۇيۇش كېرەك. باشقا ئاچچىق بادام يېغى سۇرۇش لازىم.

چاچنىڭ بۇرۇن ئاقىرىپ كېتىشى

ياشاغاندا چاچنىڭ ئاقىرىشى تەبىئىي ئەھۋال. ئەمما قان ئوزىنىڭ ئېتىسادىكى قويۇقلۇقى، شىرىسى ۋە ھارارىتىنى ساقلاپ قالالسا چاچ ئاقارمايدۇ. ۋاقىتسىز ئاقىرىشنىڭ سەۋىيى قاننىڭ يۇقۇرىدىكى خۇسۇسىيەتلىرىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ئىبارەت. چاچنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىشى ئاتا-ئانىدىن مىراس بولۇپ قالىدۇ (ئىرىسى بولىدۇ) دىگۈچىلەرمۇ بار؛ چاچنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىشى روھى ئامىل ۋە تەسىراتلارغا باغلىقلىقى ئېنىق.

داۋاسى: ھەپتىدە بىر قېتىم بەلغەم سۈرگىسى بېرىلىپ، ھەر ئايدا بىر ھەپتە ئىتىرىپىل سەغىر (5 - نۇسخە) ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ. ھەر كۈنى ناشىدا بىر دانە ھېلىلە مۇرابباسى بېرىلىدۇ. چاچ ۋاقىتسىز ئاقىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە چاچنىڭ قارىلىغىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن، مەجۇنى بالادۇر (185 - نۇسخە)، جەۋارش جالە - نۇس (3 - نۇسخە)، مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە) قاتارلىق لاردىن بىرىنى دائىم ئىچىپ يۈرۈشكە بۇيرۇلىدۇ. بۇ جەھەتتىن توۋەندىكى نۇسخە مەخسۇس چارە ھىساپلىنىدۇ:

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە پوستى 1 سەر، قارا ھېلىلە 1 سەر، كۈندۈر، لۇبان، تاباشىر ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، پىلىپىل $2\frac{1}{2}$ مىسقال، زەنجىۋىل، ئىگىر، قىزىل

گۈل ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ئاق سەندەل، كاسىن

ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ھەسەل $7\frac{1}{2}$ سەر،

ھېلىلە مۇرابباسى $7\frac{1}{2}$ سەر. تەييارلاش: دورىلارنى يۇم-

شاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەلنى بىر قاچىغا ئېلىپ، چوڭ-راق قاچىغا سۇ قۇيۇپ، ھەسەل قاچىلانغان قاچىنى ئۇنىڭغا سېلىپ ئوتتا ئېرىتكەندىن كېيىن، ئۈستىگە ھېلىلە مۇرابباسى سېلىنىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن سوقۇلغان دورىلارنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ، كۈنىگە 3 مىسقالدىن يېيىشكە بېرىلىدۇ.

چاچنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۇسۇللىرى

چاچنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن ئۇمۇمىي بەدەننىڭ سالامەتلىكىنى ساقلاش بەك مۇھىم، ئۇمۇمىي بەدەن ساق بولسا، چاچمۇ ساغلام ئۆسىدۇ. باش تېرىسىنى تەرتىپلىك ھالدا تىرناق ياكى تاغاق بىلەن غىدىغلاپ، ئۇنىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئۆستۈرۈش بەلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. چاچنى شۇلتىسى ئاز سۇ بىلەن يۇيۇش پايدىلىق. يالاڭباش يۇرۇش چاچ چۈشۈشكە مەلۇم دەرىجىدە سەۋەپچى بولىدۇ. چاچنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى دورىلارنىڭ ئۇنۇمى خېلى ياخشى:

1) قارا ھېلىلىنى قايناتقان سۇ، تېرمىس سۈيى، تاتلىق ياڭيۇ (خۇڭشۇ - چۇقۇندەر) سۈيى، ئامىلە سۈيى (قۇرۇق ئامىلە قايناتقان سۇ) قاتارلىقلار بىلەن چاچنى يۇيۇش كېرەك.

2) لادەن يېغى بىلەن چاچنى ياغلاپ تۇرۇش لازىم، لادەن يېغى توۋەندىكىچە تەييارلىنىدۇ:

نۇسخە: لادەن 2 مىسقال، كۇنجۇت يېغى 4 سەر، قارا ھېلىلە 10 مىسقال، تاتلىق ياڭيۇ سۈيى 10 مىسقال قىزىل لوبىيا سۈيى 10 مىسقال. تەييارلاشتا قارا ھېلىلە بىلەن لادەننى سوقۇپ يۇقۇرىدىكى سۇلارغا بىر كېچە - كۈندۈز چىلاپ، ئەتىسى كۇنجۇت يېغى قۇيۇپ قاينە - تىپ، سۈيى تۈگەپ يېغى قالغاندا ئېلىپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ، لازىملىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

3) چاچنى ئۇزارتىش ئۈچۈن، باشنى دائىم ئامىلە قايناتقان سۇ بىلەن يۇيۇش پايدىلىق (نۇشدارى تەييار - لاش جەريانىدا ئامىلەنى يۇغان سۇ بولسا ناھايىتى ياخشى). ئاس يوپۇرمىغى، قىزىل گۈللەرنى يۇمشاق سوقۇپ، ئامىلە سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ باشقا چېپىش كېرەك ياكى تاتلىق ياڭيۇ سۈيىگە سوقۇلغان قىچىدىن ئازراق ئارىلاشتۇرۇپ سۈركىتىمۇ بولىدۇ.

4) چاچ ئۇندۇرۇش ئۈچۈن، كونا زەيتۇن يېغى، قەيسوم چۈپىنىڭ كۈلى ۋە كوپۇڭى دەريالارنى ئارىلاش تۇرۇپ سۈركەش ۋە چاچ چۈشۈش ماۋزۇسىدىكى چارىلارنى قوللىنىش لازىم.

ئەگەر داۋالاش مەخسەتدە چاچنى چۇشۇرۇشكە توغرا كەلسە، مۇنۇ چارلاردىن بىرىنى قوللىنىش مۇمكىن:

(1) سۇ تەگمىگەن ھاك، زەرىنخ 4 مىسقالدىن، كۆيدۈرۈلگەن سەدەپ، كوپۇگى دەريا، گەجدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ، سوقۇپ ئۇچ دانە تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاش تۇرۇپ تەييارلىنىدۇ، ئۇنى باش تېرىسىگە چېپىپ بىر قانچە سائەت يۈگەپ قويۇلسا، چاچ چۇشۇپ كېتىدۇ.

(2) مىڭ دىۋانە ئۇرۇغى، ئەپيۇن، شۇكران، مېھرى گىيا كۈلى قاتارلىقلارنى سىركە بىلەن ئېلىشتۇرۇپ چېپىلىسىمۇ بولىدۇ.

(3) موزا بىلەن چۇمۇلە تۇخۇمىنى سوقۇپ تاشپاقا قېنى قوشۇپ چېپىش كېرەك.

ئەگەر چاچ (تۈك)نى چۇشۇرۇپ مەزكۇر بولۇپ، دورىلارنى چاپسا شۇ ئورۇنغا قايتا تۈك ئۈنمەيدۇ.

5-پەسىل: تىرناق كېسەللىكلىرى

تىرناققا ئاق چۇشۇش

غەلىز بەلغەمنىڭ تىرناققا چۇشۇشىدىن كېلىپ چىقىپ، تىرناققا ھەرخىل چوڭلۇقتىكى ئاق چېكىنلەر پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى سۇرۇپ چىقارغاندىن كېيىن، ئۈزىچە ساقىيىمۇ كېتىدۇ، ئەگەر يەنىلا شۇ يېتى تۇرسا،

زىغىر بىلەن شۇمشىنى سوقۇپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ
تىرناققا چېپىلىدۇ ۋە زوپىتى رە تەپ، ئۆشكە تۇۋىغىنىڭ
كۈلى ۋە قومۇش يىلتىزلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ چېپ-
پىش كېرەك.

تىرناق سارغىيىپ قېلىش

تىرناقلارغا سېرىق رەڭلىك داغلار چۇشۇپ تىرناق
رەڭگىنى ئۆزگەرتىپ قويىدۇ. قان ئازلىق ئېغىر كىشىلەردە
ۋە سەپرا غالىپ كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: قان ئازلىق روشەن بولسا كۆپەيتكۈچى
دورلارنى بېرىش كېرەك. بەدەننى سەپرادىن تازىلاش
ئۈچۈن، مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. زاغۇن-
نى يۇمشاق سوقۇپ سىركە قوشۇپ سىرتتىن چېپىلىدۇ.

پور تىرناق

تىرناق قېلىنلىشىپ يېرىلىپ كېتىش "پور تىرناق"
دەپلىنىدۇ. بەزىلەر بۇنى تىرناقنىڭ جوزام كېسىلى دەپ
قارايدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ تىرناقنىڭ تاز كېسىلىدىن ئىبارەت
بولۇپ، تىرناق چۇرۇكلىشىپ سۇنىدۇ. كۆپىنچە تاز كې-
سىلى بارلاردا بولىدۇ.

داۋاسى: سەۋدانىڭ كويۇشى سەۋەپ بولغانلىقى
ئۈچۈن، ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ. بەدەننى ھوللەندۈرۈشكە تىرىشىلىدۇ؛ موم يېغى،
ئودەك ياغلىرى بىلەن ياغلاش ۋە مەلھىمى داخىلىون
(177 - نۇسخە) مايلاش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن ئەسلىدە

كى زەرەرلەنگەن تىرناق يۇمشاپ ئاجراپ تېگىدىن يېڭى ساغلام تىرناق ئۆسىدۇ، بەزىدە ساق تىرناقلارنىڭ ئاغرىشى ئۇچرايدۇ، ئۇنى داۋالاش ئۈچۈن قاپاق يوپۇرمىغى، ئاس يوپۇرمىغىنى سوقۇپ، تىرناققا قويۇپ ئۆستىنى تېگىپ قويۇش كېرەك ياكى خام ئانارنى مۇسەللەستە قاينىتىپ، پىشۇرۇپ، ئانارنى يانچىپ تىرناق ئۆستىگە قويسا بولىدۇ.

تىرناقنىڭ باشقا زەخمىلىنىشلىرى

(1) تىرناق يانچىلىپ كېتىش - ئۇرۇلۇش، سوقۇلۇشلار بىلەن تىرناقنىڭ يانچىلىپ كېتىشى كۆپ ئۇچرايدۇ، مۇنداق چاغلاردا ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ.

داۋاسى: ئاغرىشنى توختىتىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئانار يوپۇرمىغى ياكى ئاس يوپۇرمىغىنى سوقۇپ تىرناق ئۆستىگە قويۇش لازىم. ئاغرىش پەسەيگەندىن كېيىن، بۇغداي ئۇنىغا زەيتۇن يېغى قوشۇپ تىرناققا قويۇش ياكى چەلەڭنى سوقۇپ، ئېرىتىلگەن ئۆشكە يېغى قوشۇپ قاينىتىپ، سۈيى قالغاندا ئېلىپ تىرناققا چېرىتىش لازىم. بۇ تىرناقنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ. ئەگەر تىرناق جاراھەتلەنگەن بولسا، ئەنزۇرۇتنى سوقۇپ جاراھەت ئۆستىگە سېپىش كېرەك.

(2) تىرناق تۈۋىنىڭ قىچىشى - تىرناق تۈۋى قىچىشقاندا ماش، پۇرچاق قاينىتىلغان سۇ بىلەن تىرناقنى ۋە تىرناق تۈۋىلىرىنى يۇيۇش، زىغى رۇمىنى

سۇ بىلەن چېپىش ياكى ئەنجۇرنى سوقۇپ چېپىش لازىم.
(3) تىرناقنىڭ سۇنۇشى: تىرناق خۇددى سىڭىر
تېشىدەك قات-قات بولۇپ سۇنىدۇ بۇ كۆپىنچە قان
ئازلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: گۈلقەن بىلەن ئىسكەنجىۋىل ۋە مائىل
گۇسۇل (105 - نۇسخە) بېرىپ، ماددا پىشۇرۇلغاندىن كې-
يىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بۇيرۇلىدۇ. سىرت-
تىن بادام يېغى بىلەن قوي چاۋىسىنى بىرلەشتۈرۈپ
تىرناققا داۋاملىق چېپىش كېرەك.

(4) تىرناق ئاستىدا قان ئۇيۇپ قېلىش: تاشقى
زەخمىلىنىش تۈپەيلىدىن تىرناق ئاستىغا قان چۈشىدۇ.
داۋاسى: زىڭتىرۇمى، قىزىل زەرنىخ، پەتەرسالىيون،
بىنەپشە قاتارلىقلارنى سىركە بىلەن قوشۇپ چېپىش لازىم.

سۈيىنەك (داخەس)

تىرناق ئەتراپى گوشنىڭ يىرىڭلىق ياللۇغى سۈي-
نەك، كۆكسەنە (ئەرەپچە داخەس) دەپ ئاتىلىپ، خېلى
كۆپ ئوچرايدىغان كېسەللىكتۇر. بارماق ئېرىقچىسى تېرە
ئاستى گۆشلىرىنىڭ ئۇفۇنەتلىنىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

مەزكۇر جاي قىزىرىپ ئىششىيدۇ، لۇقۇلداپ قات-
تىق ئاغرىيدۇ، ياللۇغلىنىش پۈتۈن بارماقنى قاپلايدۇ،
بەدەن ھارارىتى يۇقۇرى كۆتىرىلىدۇ، شۇ تەرەپ قولتۇق-
قا يۇمشاق چۈشىدۇ، ۋاقتىدا داۋالانمىسا تىرناق كۆ-
چۈپ چىقىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: سۈرگە بېرىلىدۇ، ئارپا سۈيى ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ. دەسلەپكى مەزگىلدە بىر چىنىگە قايناقسۇ قۇيۇپ، سوينەك بار بارماقنى سۇغا تىقىپ تارتىۋېلىپ داغلاش، بۇنى ئاغرىش پەسەيگىچە داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. موزنى سوقۇپ، تومۇر دېتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئاغ رىق جايغا قويۇلىدۇ؛ پىيازنى ئوتقا كومۇپ پىشۇرۇۋېلىپ، قىزىق ھالدا بارماقنى پاتۇرۇلىدۇ. بارماقنى شۇ جايغا تىقىپ تۇرۇپ بارماق تېگىپ قويىلىدۇ ياكى كالا ۋە قويىنىڭ يېڭى ئوت خالتىسىغا زەرەرلەنگەن بارماقنى تىقىپ تۇرۇش كېرەك.

ئەگەر تىرناقنى چىقىرىۋېتىشكە توغرا كەلسە، ئالدى بىلەن مەلھىمى داخلىئون (177 - نۇسخە) نى تىرناق ئۈستىگە قويۇپ ئارقىدىن زەرنىخ، جاۋۇش ۋە ئاچ-چىق بادام يېغى قوشۇپ تىرناققا قويۇلسا تىرناق چۈشۈپ كېتىدۇ. ئۇندىن كېيىن بارماقنى ۋە تىرناقنى مۇھاپىزەت قىلىش چارىلىرى بىلەن يېڭى تىرناق ئۆس-تۈرىلىدۇ.

6 - پەسىل: تەر كېسەللىكلىرى

كوپ تەرلەش

كوپ تەرلەش توۋەندىكى بىرقانچە سەۋەپلەردىن بولىدۇ:

(1) بەدەندىكى سۇيۇقلۇق ھەددىدىن زىيادە كۆپ-

يېپ، بەدەن ئۇنى سىرتقا ھەيدىشى؛ بەدەندە تارتىش ۋە تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى؛ قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا بوھران كۈنلىرىدە بەدەن كېسەللىك ئۈستىدىن غەلىبە قىلغاندا سەۋەپچى ماددىنىڭ تەرلەش يولى بىلەن سىرتقا چىقىرىلىشى؛ يۇقۇرى ھارارەتلىك شارائىتلاردا ئەمگەك قىلىش.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى سەۋەپلەردىن بىرى مەۋجۇت بولۇش بىلەن بىللە، ئادەتتىكىدىن كۆپ تەرلەپ كېتىش كورۇلىدۇ. مەسىلەن، بەدەننىڭ تارتىش ۋە تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىز بولغاندا، كۆپ تەرلەش تۈپەيلىدىن كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلاپ ماغدۇرسىزلىنىدۇ ۋە ئاسانلا چارچايدىغان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: تاماقنى قۇۋۋەتلىك، ئەمما مىقدارىنى ئاز بېرىش، تۈزلۈك گۆش بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، ئەمگەكنى كۆپرەك قىلىش، گۈرۈچ، سىماق، يۇمىغاقسۇت، ماش، چىلانلارنى قاينىتىپ ئىچىشكە بۇيرۇش، ئاز-ئازدىن بىرقانچە قېتىم شەرۋىتى خەشخاش بېرىش لازىم. تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۇچۇن توۋەندىكىلەردىن بىرى بېرىلىدۇ:

(1) موزا، قەلەي كۈشتىسىنى گۈلەپ بىلەن سۇرۇپ چېپىش؛

(2) ئانار گۈلى، ھەببۇل ئاس، قىزىل گۈل، رۇسۇت، ئاقاقىيا ۋە كوندۇرلاردىن بىر قانچىسىنى ياكى بىرىنى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ چېپىش كېرەك.

(3) كالدەك بەسەي سۇيى، لىمون سۇلىرىنى كافۇر بىلەن چېپىش مۇمكىن.

(4) بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، ئىسپۇغۇل لۇئابى بەدەنگە چېپىلىدۇ.

(5) چىڭسەي سۇيىنى بىر ئاز گولاپ ۋە سىركە قوشۇپ بەدەنگە سۇ كىلىدۇ. تەرلەشنى توختىتىش ئۇ-چۇن توۋەندىكى نۇسخە تەجرىبىدىن ئۆتكەن:

نۇسخە: ئالما سۇيى، لوبۇ سۇيى، قىزىل گۈل ئەرە-قى، گۈل يېغى، كۈنجۇت يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئې-لىپ، ئاستا ئوتتا قاينىتىلىدۇ، سۇيى تۈگەپ خاس ياغ قالغاندا شىشكە ئېلىپ قويۇپ، ھاجەت بولغاندا بەدەنگە سۈركىلىدۇ، ئىچىشكە ئىسكەنجىۋىل بېرىلىدۇ.

سېسىق تەرلەش

بۇزۇلغان خىلىتلارنىڭ ئۇفۇنەت ھاسىل قىلىشىدىن (ئومۇمى بەدەندە ياكى قولتۇق ۋە پۇتتا) پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ ھەركەتتىن كېيىن، ياكى جىنسى ئالاقىدىن كېيىن ئالاھىدە سېزىلىدۇ (سېسىق پۇرايدۇ). بەزىدە سې-سىق دورىلار-ھىڭ ۋە ئۇنىڭ يىلتىزى، سامساق قاتار-لىقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلغۇچىلاردا ئۇچراپ، كۆپىنچە سۈركىلىپ تۇرىدىغان ئەزالار يەنى قولتۇق، چاتراق، ئۇرۇقدان خالىتىسىنىڭ ئاستى قاتارلىق جايىلاردا بىلە-نىدۇ.

داۋاسى: سۈرگە بېرىش ئارقىلىق بەدەننى كېرەك-

سىز ماددىلاردىن تازىلاش ۋە مىراجنى ئېتىدالغا كەلتۈ-
رۇش ئۈچۈن ئىسكەنجىۋىل بېرىش، پات-پات يۇيۇنۇپ
تۇرۇش لازىم. ماش، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى ۋە گۈلى،
چىغىرىتماق يىلتىزى، يوپۇرمىغى، ئاق سەندەللەرنى قاينى-
تىتىپ بەدەننى يۇيۇش كېرەك. ئۇششە، قىزىل گۈل، سۈم-
بۇل، زەمچەللەرنى يۇمشاق سوقۇپ كۆپ تەرلەيدىغان
جايلارغا سېپىش لازىم. بۇلاردىن تاشقىرى، يوقۇرىدا
كورسىتىپ ئوتۇلگەن تەر توختاتقۇچى دورىلاردىن تاللاپ
ئىشلىتىش كېرەك.

7-پەسىل: سېمىزلىك ۋە ئورۇقلاش كېسىلى

ھەددىدىن زىيادە سېمىزلىك ۋە ئورۇقلاش غەيرى
تەبىئىي ئەھۋال يەنى كېسەللىك بولۇپ، ئۇلارنى ئوز
ۋاقتىدا داۋالاش ئارقىلىق ساقلىقنى ساقلاش لازىم.
ئورۇقلاپ كېتىش:

سەۋىيى: (1) ئوزۇقلىنىش بۇزۇلۇش بىلەن
بەدەندە ماددا ئالمىشىش (مايە تەھەللۇل) ناچارلىشىپ
ئورۇقلايدۇ. (2) قوبۇل قىلغان ئوزۇقلۇق يېتەرلىك بول-
سىمۇ، ئۇنى سىڭدۈرۈش ناچارلىغىدىن كىشى ئورۇقلايدۇ.
بۇنداق كىشىلەر يىگەن قۇۋۋەتلىك نەرسىلەر چوڭ تە-
رەت بىلەن چىقىپ كېتىدۇ-دە، بەدەن بەھرىمەن بو-
لالمايدۇ. (3) تاماقتا ئوزۇقلۇق ناچار بولۇپ، بەدەن

ئۇنى قوبۇل قىلمىغاندىمۇ كىشى ئورۇقلايدۇ. (4) مىزاج -
 نىڭ بۇزۇلۇشلىرى ئىشتەينى تۇتىدۇ، ھەزىمنى بۇزىدۇ،
 بۇلارمۇ ئورۇقلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. (5) باشقۇر -
 غۇچى ئەزالارنىڭ، بولۇپمۇ جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى ۋە
 چاۋا قانتومۇرلىرىدىكى غەيرى تەبىئى ئەھۋاللار ئوزۇق -
 لۇقلارنىڭ ئوز يولى بىلەن شىمىرىلىشىگە تەسىر بېرىپ،
 بەدەندە ئورۇقلاش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. (6) روھى
 ئامىللار - غەزەپلىنىش، قورقۇش، روھى زەربە، ۋە
 ھەددىدىن زىيادە جىنىسى ئالاقىلاردىمۇ ئورۇقلاش كېلىپ
 چىقىدۇ.

ئالامەتلىەر: ئاغرىق كىشىلەر بارغانسېرى ئو -
 رۇقلاۋاتقانلىقىنى ھىس قىلىدۇ. تېرە قۇرغاقلىشىپ، قا -
 رىيىپ، ساغۇش تۇس ئالىدۇ، كىشى ماغدۇرسىزلىنىدۇ.
 ئوتتۇرا ياشتىن ئاشقان كىشىلەردە ھېچقانداق كېسەللىك
 ئالامەتلىرى بولماي تۇرۇپ، سەۋەپسىز ھالدا ئورۇقلاش
 ئېغىرلىشىۋەرسە سەرتان كېسىلىدىن گۇمان قىلىپ تەك -
 شۇرتۇش لازىم.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيىنى يوقىتىش، ئو -
 زۇقلۇقلاردىن ھول ۋە ياغلىق نەرسىلەر بېرىشنى ئاساس
 قىلىش كېرەك. مونچىغا كىرىش، بەدەننى ھوللەندۈرۈش
 خۇسۇسىيەتلىك ماي دورىلار بىلەن مۇۋاپىق مايلاپ تۇ -
 رۇش، يېتەرلىك دەم ئېلىش لازىم. توۋەندىكىلەرنى
 تاللاپ ئىشلىتىلسە بولىدۇ:

(1) پۇرچاق جىنىسىدىكى دانىلار، بادام مېغىزى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، ئارپا سۈيى، ئانار سۇلىرىنى يالغۇز ياكى بىرىكتۈرگەن ھالدا ئىستىمال قىلدۇرۇلسا تېز سەمىرىشكە ياردەم بېرىدۇ.

(2) چىلان بىلەن قۇرۇق ئۇزۇمنى لازىم مىقداردا ئېلىپ يېتەرلىك سۇ بىلەن ياخشى قاينىتىپ، سۇزۇپ، سىقىپ ئېلىنىدۇ. بادام مېغىزى، كۆكنار ئۇرۇغى، سەمەغى ئەرەبىنى ئوتتا بىر ئاز قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ چىلان ۋە ئۇزۇم سۈيىگە سېلىپ قاينىتىلىدۇ. تازا قايناپ سۈيى قالماي ھالۋىدەك بىر نەرسىگە ئايىلانغاندا ئۈستىگە بىر ئاز بىنەپشە يېغىنى قوشۇپ رەسمى ھالۋا تەييارلاپ يېمىشكە بېرىلىدۇ.

(3) نوقۇتنى ئاخلاپ، يېڭى سۈتكە چىلاپ، سۈتنى تامامەن ئېچىپ بولغاندا نوقۇتنى قۇرۇتۇپ قويىلىدۇ. ئاقلاغان ئارپا، گۈرۈچ، بۇغدايلاردىن بىر ھەسسە، چىلانغا نوقۇت 10 ھەسسە ئېلىپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۈت ۋە قەن بىلەن قاينىتىپ، ئۈستىگە بىر ئاز قۇرۇق ناننى يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ھالۋا تەييارلىنىدۇ. بۇ سەمىرىشنىڭ ياخشى چارىسىدۇر. تېز كۈندىلا روشەن نەتىجە بېرىدۇ.

نۇسخە: ئاق تۇدرى، قىزىل تۇدرى، كۆكنار ئۇرۇغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، ھەببى موھەپ، زەد-جىۋىل، گۈلدارچىن، دارچىن، شاقاقۇل، سىيادان، بوزىدان ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، زەپەر 3 مىسقال، بادام مېغىزى -

زى 16 سەر، ئورمان ياڭىغى (پىندۇق) 5 مىسقال،
كۈنجۈت يېغى 2 سەر، شېكەر 16 سەر، گۈلاپ بىر
چوڭ چىنە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ (بادام مېغىزىنى ئايرىم ئوبدان يانچىپ سالسا
بولىدۇ) گۈلاپ، شېكەر قوشۇپ يۇمشاق ئوتتا قاينىتىپ،
كۈنجۈت يېغىنى ئاز-ئازدىن قاينىتىپ قوچۇپ بېرىلسە
ھالۋىدەك بىر نەرسە تەييار بولىدۇ. شۇنى يېمىشكە
بېرىلىدۇ.

(2) سېمىزلىك: ھەددىدىن زىيادە سېمىزلىك تو-
ۋەندىكىدەك ھەرخىل غەيرى تەبىئى ھاللارغا، كېسەللىككە
دۇچار قىلىشى مۇمكىن. نەپەس قىيىنلىشىشنى
كەلتۈرىدۇ، بەدەندىكى سۇيۇقلۇقنىڭ تۇتۇلۇپ قېلىشى،
تومۇرلارنىڭ توسىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئايلىنىپ
كېتىش (غەشى) كېسىلىگە سەۋەپچى بولىدۇ.

قانتومۇرلار ئاسانلا قانايىدىغان، قان توختىمايدىغان
ۋە تېرە ئاستىلىرىغا قان چۈشىدىغان ئەھۋاللارنى پەيدا
قىلىدۇ. يۈرەك ئەتراپىغا ياغ توپلىشىپ، يۈرەك سېلىش،
خاپىقان كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ئەر ياكى ئا-
يالىنىڭ پەرزەندىسىزلىكىگە سەۋەپچى بولىشى مۇمكىن.
پالەچلىككە ئېلىپ بېرىشى، مەئدە سەۋىيىدىن بولىدىغان
ئىچ سۇرۇشكە سەۋەپ بولىشى ئېھتىمال، بۇلاردىن باشقا،
سېمىزلىك ئادەمنىڭ كېسىلىگە ئاسان باھا بەرگىلى

بولمايدۇ، چۈنكى زەرەرلەنگەن ئەزانى بىلىش تەس ھەم سېمىز كىشىلەر تەسادىپى ھاللارغا مەسىلەن، رىيازەت، ئاچلىق، تەشئالىق ۋە قىزىتمىلىق كېسەللەرگە دىگەندەك چىداشلىق بېرەلمەيدۇ.

داۋاسى: سۈرگە ۋە سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورى-
لارنى بېرىش؛ ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئۇزۇقلۇق قىممىتىگە
ئىگە تاماقلارنى بېرىش؛ كۆپرەك ئەمگەك ۋە ھەرىكەت
قىلىش، ئاز دەم ئېلىپ، ئاز ئۇخلاشقا بۇيرۇش كېرەك.
مونچىغا كىرىپ كۆپ تەرلىنىش، قۇرۇقلۇق خۇسۇسىيە-
تىگە ئىگە ياغلارنى مەسىلەن، قۇستە يېغى، پەرفىيون يې-
غى، سېرىق چىچەك يېغى قاتارلىقلارنى بەدەنگە سۈر-
كەشكە، ئىتتىرىپىل كەبىر (1 - نۇسخە) ۋە ئىتتىرىپىل سەغىر
(5 - نۇسخە)لەرنى دائىم ئىچىشكە بېرىش، ئارىلاپ مەجۇ-
نى جەۋارش كۇمۇنى (49 - نۇسخە)، سەنجىرىنا (33 -
نۇسخە)لەردىن بېرىپ تۇرۇش كېرەك. ئەفئا يىلىنىنىڭ
گوشىنى يېيىشكە بېرىلسە سېمىزلىك كېسىلىدە بەك ياخ-
شى نەتىجە بېرىدۇ. توۋەندىكى نۇسخىمۇ سېمىزلىك كې-
سىلىنى داۋالاشتا (ئورۇقلىتىشتا) كەڭ قوللىنىلىدۇ:

نۇسخە: جۇۋىنە، بېدىيان، سۇزاپ، زىرە ھەرىرى
3 مىسقالدىن، مەرزەنجۇش بىر مىسقال، بورە ئەرمىنى،
لەكى مەغسۇل ھەرىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلاپ كۈنىگە 1 - 2 قېتىم، 1 - 2
مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

8 - پەسىل: ئۇششۇك ۋە كويۇك

ئۇششۇك

سوغاق تەسىرى بىلەن بەدەننىڭ قىسىملىرى (قول، پۇت، بۇرۇن، قۇلاق) نىڭ ئۇششۇپ قېلىشى، چىرىش ۋە ئۇفۇنەتلىنىشى ئۇششۇك يارىسى دېيىلىدۇ.

داۋاسى: ئۇششىگەن جاي كۆكەرگەن ھالىتىدە تۇرۇپ تېخى ئۇفۇنەت ھاسىل قىلمىغان (قارا رەڭگە كىرمىگەن) بولسا زەيتۇن يېغى، كۈنجۇت يېغى، ياسمەن ياغلىرىنى قوشۇپ ياغلاشقا بېرىلىدۇ. ئەگەر ئۇششىغان، قارايدىغان بولسا بۇغداي سامىنى، سېرىق چىچەك، گۈلى سوسەن، چامغۇر، بەسەي، يالپۇز، ئەمەن، مەرزەنجۇش، شۇمشە، زىغىز، بابونە، ئەكىللىلىكلىرىدىن بىرىنى ياكى بىرقانچىسىنى بىرلىكتە قاينىتىپ، سۈيىنى ئۇششەگەن جايغا قويۇش، ماشىنى يۇمشاق سوقۇپ ھاراق بەلمەن يۇغۇرۇپ ئۈستىگە قويۇش، ئەگەر ئۇششىق بولسا، ئۈستىگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. ھىجامەتتىن كېيىن گىلى ئەرمىنىنى ھەسەل ۋە سىركە بىلەن قوشۇپ چېچىش، بىر سائەتتىن كېيىن ھاراق ۋە سىركىنى بىرئاز قىزىتىپ يۇيۇش مۇمكىن. ئۈلگەن گۈشلەرنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن تاتلىق ياڭيۇ يوپۇرمىغى ياكى ئوزى ۋە كالىك بەسەينى باراۋەردىن ئېلىپ، سوقۇپ بىرئاز سۇغا چىلاپ

ئېلىپ، كالا يېغى ۋە مەشكە ماي بىلەن ئېلىشتۇرۇپ
 زەرەزلەنگەن جايغا تەكرار قويۇش، ئولگەن گۆشلەر چۇ-
 شۇپ كەتكەندىن كېيىن، يېڭى گۆش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن
 تەدبىر قىلىش كېرەك. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بول-
 مىسا يېرىپ زەرداپ ۋە بۇزۇلغان ماددىلارنى چىقىرىپ
 تاشلاپ، جاراھەتكە تېگىشلىك تەدبىر قىلىش؛ ئەگەر
 ئۇششۇك ئېغىر بولۇپ ئەتراپىغا كېڭىيىپ، قارىداپ
 ماڭسا، باشقا چارە تەدبىرلەر كار قىلمىسا شۇ ئەزانى
 قارايدىغان جاينىڭ يۇقۇرسىدىن كېسىپ تاشلاش ۋە جەر-
 راھىيە تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك.

كۇيۇك

كۇيۇش — ئوتتا، سۇدا، قىزىق تومۇر، كۈن نۇرى،
 قىزىق ماي تەسىر قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. دورىلار
 بىلەن كۇيۇش چاقماق نۇرى بىلەن كۇيۇش ئاز
 ئۇچرايدۇ

1) توتتا كۇيۇش: يەڭگىل ھاللاردا سۇ كوتە-
 رىلىپ چىقمايدۇ. بۇنداق ھاللاردا يەرلىك ھارارەتنى
 پەسەيتىش يېتەرلىك، مەسىلەن، داكىدەك بىر نەرسىنى
 سوغاق سۇ بىلەن ھۆلدەپ سوغاق ئۆتكۈزۈلىدۇ، ياكى
 مۇزدەك سۇغا تەكرار-تەكرار چىلاپ تۇرىلىدۇ، بۇنىڭدا
 دەسلەپ ئاغرىيدۇ، كېيىن ئاغرىش توختايدۇ. گىلى ئەر-
 مىنى سۇ ياكى سىركە بىلەن ئىزىپ سۈركىلىدۇ. ئەگەر
 ئېغىر بولمىسا، قارا سىيا، سەمغى ئەرەبىلەرنى يۇمشاق

سوقۇپ، تۇخۇم ئېقى ئېلىشتۇرۇپ چېپىش، قېتىق، سۇت،^۴ نۇخۇم ئېقىنى قايتا-قايتا چېپىش بىلەن سۇ كۈتە-رىشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. كويىگەن جايىنى بۇزۇشتىن ساقلىغىلى بولىدۇ. شۇنىڭدەك توۋەندىكىلەردىن قايسى بىرى بولسا شۇنى كويىگەن جايغا سۈركەش كېرەك.

تۇخۇم ئېقىنى يالغۇز ياكى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ چاپسىمۇ بولىدۇ. بىر مىسقال كافۇرنى سوقۇپ بىر پىمالە قېتىققا ئېلىشتۇرۇپ چېپىش مۇمكىن. ماشىنى ئاقلاپ قىزىل گۈل بىلەن قاينىتىپ، ماش ئوبدان پىش-قاندىن كېيىن، بىر ئاز ئارپا ئۇنى ۋە گۈل يېغى قو-شۇپ چېپىلىدۇ. ئاقلاغان ئارپا، ئاق لەيلى گۈلى ۋە غولى، ھەمىشۋالارنى سوقۇپ، بىر ئاز سۇ بىلەن قاينىتىپ پىشۇرۇپ، سىقىپ سۈيىگە بىر ئاز كۆك يۇمىاقسۇت سۈيى ۋە قەلەي كۈشتىسى ئارىلاشتۇرۇپ، قويۇق ئوماچتەك دورا تەييارلاپ كويىگەن جايغا سۈركەش مۇمكىن. كويىگەن جاي سۇ كۈتىرىپ قېتىپ قارا قەقەش باغلاپ قالغان بولسا مەلھىمى ئىسپىداج (179 - ئۇسخە) چېپىشقا بېرىلىدۇ ياكى توۋەندىكىلەردىن بىرى ئىشلىتىلىدۇ.

(1) ھاك مەلھىمى: يۇيۇلغان ھاكتىن گۈل يېغى ياكى كۈنجۇت ياغلىرى بىلەن ماي دورا تەييارلاپ، ئۇنىڭغا گىل، قىمۇلىيا قوشۇپ، كويىگەن يەرگە چېپىش كېرەك. ھاكتى يۇيۇش ئۇسۇلى مۇنداق: ئادەتتىكى ھاك-نى ماتادىن تىكىلىگەن كىچىك بىر خالىغا ئېلىپ، سۇ

ئالغان قاچىغا سېلىپ تازا مالتىلاپ ھەركەتلەندۈرىلىدۇ.
قاچىنىڭ تېگىگە ئورناپ قالغان ھاك يۇيۇلغان ھاك
بولىدۇ. بۇنى يەنە قايتا 7 قېتىم سۇ بىلەن چايقىغاندا -
دىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

(2) توخۇ سوڭىگى بىلەن تۇزنى ئومۇر قاچىغا
سېلىپ، كويدۇرۇپ، ئۇلارغا يۇمشاق سوقۇلغان گۇرۇچ،
ئۇپىلارنى قوشۇپ تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ
چېپىش كېرەك. بۇنىڭغا بىنەپشە يېغى قوشۇلسا تەسىرى
تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

(2) قايناقسۇ بىلەن كويۇش: بۇنىڭدا ئۇتتا
كويگەندىكىگە ئوخشاش چارە قىلىنىدۇ. سوغاق سۇ قۇ -
يۇش ياكى داكىدەك بىر نەرسىنى مۇز سۈيى (ياكى كول
سۈيى) بىلەن نەمدەپ كويگەن جايغا قويۇش لازىم.
كۈل سۈيىنىڭ ئوزۇنى كويگەن جايغا توكۇش كېرەك.
كۈل سۈيى تەييارلاش ئۇچۇن ئوتۇن كۈلىدىن مەلۇم
مىقداردا ئېلىپ، ئۈستىگە سۇ قويۇپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ
تىندۈرۈلىدۇ ئۈستىدە سۇزۇلۇپ چىققان سۈنى باشتا بىر
قاچىغا توكۇۋېلىپ، ئۇنىڭغا يەنە كۈل سېلىپ ئاۋالقد -
دەك تەكرارلىنىدۇ (2 - 3 قېتىم ياكى كوپرەك). شۇنىڭ
بىلەن كۈل سۈيى تەييار بولىدۇ. چاچنى كويدۇرۇپ،
تۇخۇم ئېقى ئارىلاشتۇرۇپ كويگەن جايغا سۈركەشمۇ
مۇمكىن.

(3) كۈن نۇرى بىلەن كۇيۇش: كافۇر مەلھىمى

ۋە سىركە مەلھىمى سۈركەشكە بېرىلىدۇ. سىركە مەلھىمى تەييارلاش ئۇسۇلى:

مەدەستان 9 سەر، كونا زەيتۇن يېغى 18 سەر، ئۆتكۈر سىركە 27 سەر. بۇلارنى تومۇر قاچىغا سېلىپ، ئاستا ئوت ئۈستىدە قويۇپ تۇرۇپ قاينىتىش كېرەك. مەدەستان ئوبدان ئارىلىشىپ بولغاندىن كېيىن، يەنە قاينىتىپ، قويۇق ھالغا كەلتۈرۈپ تەييارلىنىدۇ. ئەگەر كويگەن يەر سۇلۇق جاراھەتكە ئايلىنىپ قالغان بولسا بىرنەرسە زەنجىۋىلىنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇش كېرەك.

(4) دورىلار بىلەن كۇيۇش: تىبابەت دورىلىرى

ئىچىدە بالادۇر سۈيى بىلەن كۇيۇش ئۇچرايدۇ. بونىڭ ئالامىتى قايناقسۇ بىلەن كويگەنگە ئوخشاش بولۇپ، سۇ كۆتىرىپ چىقىدۇ ۋە ئېغىر جاراھەتلىنىدۇ. سېرىق زەر-داپ سۇ ئاقىدۇ. بۇنداق ھاللاردا ئالدى بىلەن سۇلۇق قاپارتمىنى يېرىش ۋە زەخمىلەنگەن جايدىكى يىغىلغان زەرداپنى چىقىرىش ئۈچۈن ھەجىمەت قويۇش ياكى گوشنى تىلىش بىلەن زەخمىلەنگەن جايعا سىركە مەلھىمى قويۇش كېرەك. يەنە ھەر خىل تىزىپلار بىلەنمۇ كۇيۇش مۇمكىن، بۇنداق چاغدا دەرھال شۇلتىلىق سۇ بىلەن زىرىكمەي يۇيۇش، ئاندىن يۇقۇرقىدەك چارىلارنى كۆرۈش لازىم.

9- پەسىل: جاراهەت ۋە يارا

جاراهەتلەر

تېرە ياكى تېرە، گوش ۋە سوڭەك پۇتۇنلىگىنىڭ بىردەك بۇزۇلۇشى جاراهەت دەپ ئاتىلىدۇ. جاراهەت يىرىڭلىسا يىرىڭلىق جاراهەت (قۇرۇھ) دەپ ئېيتىلىدۇ.

جاراهەتلەر كىچىك، چوڭ، ئاددى (بەدەن مىزاج-لىرى بۇزۇلمىغان)، مەركىزى قىسمى ئولتۇرۇشۇپ كەتكەن (جاراھىتى غايىر)، جاراهەت مەركىزىدىن بۇزۇلغان تو-قۇلىلار ئاجراپ چۇشۇپ تۇرىدىغان (جاراھىتى مۇنخىلە) ۋە ئىككى گىرۋىگىنى يېقىنلاشتۇرغىلى بولمايدىغان دى-گەندەك تۇرلەرگە بۆلىنىدۇ.

جاراهەتلەر ئەسلىدە تاشقى كېسەللەر ئىلمى (ئىلمى جەرراھىيە)گە مۇناسىۋەتلىك بولسىمۇ كىتتاۋىسىزدا بۇ ھەقتە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.

باشقۇرغۇچى ئەزالاردا بولىدىغان جاراهەتلەرنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى ئەمەس، مەسىلەن، يۈرەك، مىڭە جارا-ھەتلىرى كوپرەك ئېغىر ئاقىۋەتلەرگە سەۋەپچى بولىدۇ. جىگەر جاراھىتى گەرچە قۇرۇنۇچلۇق بولسىمۇ، ئەمما ساقىيىشىغا ئۈمىت باغلاش مۇمكىن، باشقا ئەزالاردىن چوڭ قانتومۇر ۋە ئەسەپ (نېرۋ) مول جايلاردىكى جاراهەتلەر خەتەرلىك. كۆكرەكتىكى جاراهەتلەرگە ھىق تۇتۇش ۋە

كەڭۈل ئاينىش قوشۇلۇپ قالسا خەتەردىن دېرەك بېرىدۇ.
توۋەندە جاراھەتلىرىنىڭ ئومۇمى چارىسى ھەققىدە قىسقىچە
سۆزلەپ ئۆتىمىز.

جاراھەت يېڭى بولسا، ئۇنىڭغا كىرىپ قالغان يات
نەرسىلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئېلىپ تاشلاش، ئەگەر قان
چىقىپ تۇرسا، دەرھال 3 بۇرجەك تېڭىق بىلەن چىڭ
تېڭىش كېرەك. جاراھەت ئىچى تازىلىنىپ بولغاندىن
كېيىن، جاراھەتنى ئوتتۇراھال چىڭلىقتا تېڭىلىدۇ. بەك
چىڭ بولۇپ كەتسە قانئومۇرلارنى توساپ قويۇپ گۆش-
لىرىنىڭ ئولۇشى (چىرىشى) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بوش
بولۇپ قالسا پاسكىنىلىشىپ ئۇفۇنەتلىنىدۇ. جاراھەت كونا
ئەمما يىرىڭسىز بولسا، ئۆلگەن ياكى ئاجرىغان گۆشلەرنى
ئېلىۋېتىش، ھەمدە ماددا يىغىلىپ قالمىسۇن ئۈچۈن،
ئاق سەندەل، قىزىل سەندەلنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ،
كاسىن ياكى يۇمىلاقسۇت سۈيىدە سۇرۇپ جاراھەتكە ۋە
جاراھەت ئەتراپىغا چېپىلىدۇ ۋە سەندەل گۈلابى بىلەن
نەمدەلگەن داكا پارچىسىنى قويۇپ تېڭىلىدۇ. يېڭى گۆش
ئۇندۇرۇش ئۈچۈن، خۇنسىياۋشان 2 ھەسسە، مۇرمەككى،
سەبرە، كۈندۈر بىر ھەسسەدىن ئېلىنىپ، يۇمشاق سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، جاراھەتكە تەكشى سېپىلىدۇ. ئەگەر
جاراھەتنىڭ ئاغزى چوڭراق بولسا ئىلاجى بار 2 قىرغاقنى
بىرلەشتۈرۈش، ئامال قىلىپ تېڭىش ياكى ئەۋرىشم
(ئىپەك يىپ) بىلەن تىكىپ ئۈستىگە گۆش ئۇندۇرغۇچى
دورلارنى سېپىپ تولدۇرۇلىدۇ.

ئەگەر جاراهەت يۇزى كەڭ ھەمدە يىرىڭلىغان بولسا، يىرىڭنى قۇرۇتقۇچى، نەملىكنى يوقاتقۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن، كۈندۈر، سەبرى، زىراۋەند، ئىرسا (چىغىرتماق يىلتىزى)، كۇمۇش ئىقلىمىياسى، توتىيالارنى يۇمشاق سوقۇپ، موم يېغى قو- شۇپ جاراهەتكە قويۇش ياكى قۇرۇق ھالدا سېپىش كېرەك. تېڭىقنى كۈندە بىر ياكى 2 قېتىم يۈتكەپ تۇ- رۇش، جاراهەت ئۈستىگە زەرداپلارنى شىمىرىش ئۈچۈن ياغسىز پاختا قويۇپ تېڭىش كېرەك. يىرىڭ زەرداپلار تۈگەش بىلەن كورسىتىپ ئۈتكەن گۆش ئۈندۈرگۈچى دورىلارنى سېپىش لازىم. بۇ دورىلار قۇرۇتقۇچى خۇسۇ- سىيەتلىك ۋە ئېچىشتۇرمايدىغان بولۇشى لازىم. جۈملىدىن مەدەستەن، كويدۇرۇلگەن ئەمەن، موزا، ئانار گۈلى، سەبرى ۋە زەچىۋىلەرنى ئىشلىتىش مۇمكىن. بۇنىڭغا سېرىق ھېلىلە پوستى ۋە گۈل سوسەن ياپرىغىنى قوشسا تېخىمۇ ياخشى.

يېقىلىش ياكى باشقا سەۋەپلەردىن بولغان سۇنۇش- لاردا سۇنۇقلارغا چارە كۆرۈش تەرتىۋى بويىچە چارە قىلىش؛ جاراهەت قاناۋاتقان بولسا قان توختىتىش چارىلىرى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش لازىم.

جاراهەتلەردىن قان ئېقىش، شۇ جايدىكى چوڭراق كۆكتۈمۈر (ۋەرىد) ياكى قىزىلتۈمۈر (شىرىيان)لارنىڭ زەخمە- لىنىشىگە باغلىق. ئادەتتە جاراهەتلەرنىڭ كۆپچىلىگىدە

ئازدۇر - كوپتۇر قاناش بولۇپ، ئاددى چارىلار بىلەن ياكى ئۆزلىكىدىن توختاپ قالىدۇ. لېكىن داۋاملىق قاناش كېسەل ئۈچۈن خەۋپلىك بولۇپ، توۋەندىكى چارىلەردىن بىرىنى مۇۋاپىق قوللىنىش لازىم.

(1) سىركە ۋە گۈلاپقا چىلانغان رەخ (داكا) پار - چىسى جاراھەت ئىچىگە تىقىلىدۇ (سىركە قانچە كۈچ - لۈك بولسا شۇنچە ياخشى).

(2) قىزىلتومۇردىن چىققان (يۈرەكتىن كەلگەن قان) بولسا يارىلانغان جاي يۇقۇرىسىدىن؛ كوكتومۇردىن چىققان (يۈرەككە بارىدىغان قان) بولسا جاراھەت ئاستىدىن باغلام سېلىپ قويۇش كېرەك. قاننىڭ قايسى تۈمۈردىن چىقىۋاتقانلىغىنى تۈۋەندىكى بەلگىلەرگە قاراپ بىلىۋېلىش مۇمكىن. قان سۇزۇك، قىزىل رەڭدە ئېتىلىپ چىقسا (چوڭراق تومۇر قانغانىدا) ۋە جاراھەتلىگەن كىشى (مەجرۇھ) تېزلا ماغدۇرسىزلىنىپ ھۇشىدىن كەتسە، قاننىڭ قىزىلتومۇر (شىرىيان)دىن چىقىۋاتقانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. قان قويۇق، قارامتۇل رەڭدە ئاستا چىقسا ۋە مەجرۇھ ئاسان ھالىسىزلاشمىسا، دېمەك قان كوكتومۇر (ۋەرىد)دىن چىقىۋاتقان بولىدۇ.

(3) توۋەندىكى قان توختاتقۇچى دورىلار ئىشلىتىدۇ -

لىدۇ:

(1) پۇرچاق ئۇنى، خۇنسىياۋشان، سەبرى، كوي - دۇرۇلگەن موزىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈ -

زۇپ، سىركە، توخۇم ئېقى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ جاراھەت يۈزىگە قويۇلىدۇ.

(2) سەمىغى ئەرەبى، خۇنسىياۋشان، ئەنزۇرۇت، كۈندۈر قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ، سەمىغى ئەرەبى سۈيى ياكى سىركە بىلەن نەمدەپ جاراھەت يۈزىگە قويۇلىدۇ. يۇ-قۇرقى دورىلارنى جاراھەت يۈزىگە قويۇش بىلەن جارا-ھەت ئۈستى چىڭ قىلىپ تېگىلىشى لازىم. مۇمكىن بولسا تېگىش بىر ھەپتىگىچە شۇ ھالدا تۇرۇش كېرەك. بۇ چارىلەر بىلەنمۇ قان توختىماي ئېقىپ تۇرسا سۇ تەگمىگەن ھاك بىلەن زاكنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ جاراھەت يۈزىگە سېپىش كېرەك. بۇ قان تومۇر-نىڭ ئۈزۈلگەن ئاغزىنى كويدۇرۇش ئۇسۇلىدىن ئىبارەت. بەزىلەر ئالتۇن زىخنى ئوتتا تازا قىزىتىپ، قان چە-قىۋاتقان تومۇرنى داغلاشنى كورسىتىدۇ. ئەمما بۇ چارىلار باشقا ئۇسۇللار ئۇنۇم بەرمىگەندە، كېسەلنىڭ ھالى ئېغىرلاشقاندىلا قوللىنىلىدۇ. ئادەتتىكى ھاللاردا كونا ۋە ئۆتكۈر سىركە ئەڭ ياخشى قان توختاتقۇچى ھىساپلىنىدۇ.

يارىلار

تىبابەتتە يارىلار "قۇرۇھ" دەپ ئاتىلىپ بەدەننىڭ گۈشلۈك تىسمىغا پەيدا بولىدىغان چاقىلاردىن ئىبارەتتۇر. ئالامەتلىرىگە قاراپ يارىلار بىر قانچە خىلغا ئايرىلىدۇ.

(1) ئاددى يارا (قۇرۇھى بەست): ئاغرىش، زەرداپ ئېقىش ۋە ئېچىش قاتارلىق ئالامەتلەر ئاز

بولىدۇ. بۇنداق يارىلار كىچىك بولسا، سىركە ۋە ھە-
 سەل سۈيى بىلەن كۈنىگە بىرقانچە قېتىم يۇيۇپ تۇرۇش
 كېرەك. قېتىشقا باشلىغاندا گۈل يېغىغا چىلانغان پاختا
 قويۇلىدۇ. ئەگەر دائىرىسى كەڭ بولۇپ زەرداپ سۇ ۋە
 يىرىك يېغىش ئەھۋاللىرى كورۇلسە، مەدەستان، زەچىۋە-
 لىەرنى باراۋەر ئېلىپ، سوقۇپ، سىركە ۋە زەيتۇن يېغى
 (كۈنجۈت يېغى بولسىمۇ بولىدۇ) بىلەن ماي دورا
 تەييارلاپ يارىغا قويۇلىدۇ. ئەگەر يارا قاتتىق بولسا
 يۇقۇرقى دورىلارغا موزا، ئانار گۈلى، زەمچى ئىقلىمىيا،
 سوسەن يوپۇرماقلىرى ۋە ئازراق زاڭگار ئارىلاشتۇرۇش
 كېرەك. يارىلارغا گوش ئۇندۇرگۈچى دورىلارنى ئىشلەت-
 كەندە ئېغىزى ئاسانلا پۇتۇپ قېلىپ تېگى كاما بولۇپ
 قالىدۇ. بۇنىڭغا دىققەت قىلىپ، گوش ئۇندۇرگۈچى دو-
 رىلارنى يارىنىڭ تېگىدىن قويۇش كېرەك. بۇ خىلدىكى
 جاراھەتلەر ئۈچۈن تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى مەلھەم بېرىلىدۇ.
نۇسخە: مەدەستان 3 سەر، زەيتۇن يېغى 9 سەر
 (كۈنجۈت يېغى بولسىمۇ بولىدۇ) ئەنزۇرۇت، خۇنسىياۋشان،
 كۇندۇر، زۇفتە ھەربىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن مەدەستاننى يۇمشاق
 سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇپ ياغدا پىشۇرۇش كېرەك.
 ياغ يېتەرلىك دەرىجىدە قويۇقلاشقاندا ئالغان دورىلارنى
 يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇپ، ياغ بىر ئاز
 ئىلمان بولغاندا ئۈستىگە سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم
 تەييارلىنىدۇ.

2) مۇرەككەپ يارىلار: باشقا ئەزادىكى كېسەللەكلەر بىلەن قوشۇلۇپ كەلگەن يارىلاردىن ئىبارەت بولۇپ، قاتتىق ئاغرىش ۋە ئىششىق بىلەن ئوتىدۇ.
داۋاسى: يۇقۇرقلار بىلەن ئوخشاش.

3) ساقىيىش تەس بولغان يارىلار: بۇ خىلدىكى يارىلار ياشانغانلاردا كورۇلۇپ يىللاپ سوزۇلۇپ كېتىدۇ. ئۇنداق بولىشنىڭ سەۋىيى: قان ئازلىق؛ قانغا تۇرلۇك غەيرى تەبىئى خىلىتلارنىڭ ئارىلىشىشى؛ ئومۇمى بەدەن مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى؛ يارا ئىچىدە بىخلىما گۆشلەر ئوسۇپ قېلىپ، يارىنىڭ ساقىيىشىغا تەسىر بېرىشى؛ يارىغا چاپقان دورىلارنىڭ توغرا بولماسلىقىدىن ئىبارەتتۇر.

داۋاسى: ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاپ، يارا ئەتراپىنى دائىم قول بىلەن بېسىپ يەرلىك ئورۇننىڭ قان بىلەن تەمىنلىنىشىنى ياخشىلاش؛ پاكىز داكىنى قايناقسۇغا چىلاپ يارىغا ئىسسىق ئوتكۈزۈش كېرەك. مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە)، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىپ، بەدەندىكى بۇزۇق خىلىتلارنى تازىلاش ۋە سىرتتىن تو-ۋەندىكى مەلەملەرنى ئىشلىتىش لازىم.

(1) مۇرداسەڭ مەلەمى: — تەركىبى مەدەستان، سىركە ھەربىرى 3 سەردىن، زەيتۇن يېغى 9 سەر، ئانار گۈلى، موزا، زەچمەۋە، كويۇرۇلگەن مىس، سىرەنجى ئىقلىمىيا، زەمچى ھەربىرى 3 مىسقالدىن، مەدەستاننى يۇمشاق سو-قۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۈزۈپ، سىركە ۋە ياغ بىلەن

ئارىلاشتۇرۇپ، سىركە تۈگەپ ياغ قالغىچە سۇس ئوتتا قاينىتىلىدۇ (دېققەت قىلىپ مالتىلاپ تۇرمىسا مەدەستان كالىكەلىشىۋالىدۇ)، ئۇندىن كېيىن قالغان دورىلارنى يۇم-شاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ياغ ئىلمان بولغان چاغدا قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم تەييارلىنىدۇ. يارا دائىم نەملىشىپ تۇرىدىغان ھاللاردا يارىغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(2) يارا ئىچىدە ئولۇك گۆشلەر پەيدا بولۇپ، يارىنىڭ ساقىيىشىغا تەسىر بەرگەندە مەلەمى زەڭگار (182 - نۇسخە) بىلەن تازىلىغاندىن كېيىن يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئونۇلگەن مەلەم بېرىلىدۇ.

(3) مەلەمى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) ئىشلىتىش مۇمكىن.

(4) ئاقما يارا (ناسۇر): — بەزىلەرنىڭ قارىشىچە، ئېغىز ئالغان يىرىڭلىق جاراھەت 40 كۈندىن ئېشىپ كەتسە ئاقما يارىغا ئايلىنىدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئىيتقاندا ئاقما يارا دائىم سېرىق زەرداپ، يىرىڭ، قان ئارىلاش سۇيۇقلۇقلار ئېقىپ تۇرىدىغان، تېرە ئاستىغا يىلتىز تارتىپ ھەر تەرەپلەرگە يول ئېلىپ ماڭىدىغان ئۇستى قاتتىق يارىدىن ئىبارەت. ئاغرىش ئانچە كۆپ بولمايدۇ. بەزىدە يارىنىڭ ئاغزى پۈتۈپ قېلىپ ساقايىغاندەك قىلىشىمۇ يەنە جايىدىن ياكى باشقا بىر تەرەپتىن تېشىلىپ ئاقىدۇ. ئاقما يارا ھاسىل قىلغان يول بەزىدە

تۇز، بەزىدە ئەگرى بولىدۇ. ھەتتا بەزى ئاقىلار گوشنىڭ تېلىنى قاتلاملىرىدىن ئوتتۇپ سوڭىگەككە يېتىپ بېرىشى مۇمكىن. مۇنداق ھاللاردا ئاقىمىنىڭ توشۇڭىدىن سىم تەقىپ تەكشۈرۈپ كورگەندە قاتتىق بىر نىمىگە تاقىلىدۇ، ئەنە شۇ سوڭىگەكتىن ئىبارەتتۇر. ئاقما يارا بىر جايدا بىر توشۇكلۇك ياكى بىر قانچە توشۇكلۇك بولۇشى مۇمكىن. كوز بۇرجىگىدىكى ئاقما يارا "غەرەپ" دەپ ئاتىلىپ، ھەمىشە يىرىك توپلىنىپ قېلىشى، سىققاندا يىرىك چىقىپ كېتىشى مۇمكىن. كۆكرەك ئەتراپلىرىدىكى ئاقىملار كۆكرەك پەردىسىگە قەدەر يول ئالىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ئاقما ئىچىدىكى زەرداپ ۋە يىرىكلارنى تازىلاپ چىقىش ئۇچۇن، توۋەندىكى سۇلار بىلەن كۈندە بىر ياكى بىر قانچە قېتىم يۇيۇش كېرەك:

(1) تال (ئۇزۇم) كۆلىنى تەكرار چىقارغان گۈلاپقا چىلاپ، سۇزۇپ، تەييارلانغان سۇ بىلەن يۇيۇش كېرەك.

(2) زەرنىخ بىلەن نوشىدىر باراۋەر مىقداردا ئاربلاشتۇرۇلغان قايناقسۇنى بىر ئاز ئىلمان قىلىپ سوپۇندلاپ يۇيۇش كېرەك. مەزكۇر 2 خىل سۇنىڭ كۈندە بىر خىلىنى ئالماشتۇرۇپ يۇيۇلسا تەسىرى تېز بولىدۇ. ئاقما يارا بىر قەدەر تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ئەلۋرۇت، سەبرى، كۈندۈر، خۇنسىياۋشىيان، ئەپيۇن، زەپەر قاتارلىق

دورلارنى يۇمشاق سوقۇپ، بۇغداي ھارىغىغا چىلانغان پاختىنى مەزكور تالقان دورلارنى مىلەپ ئاقما ئۈستىگە قويۇش كېرەك. بۇلار نەتىجە بەرمىسە كېسىش، ئاندىن كېيىن گۆش ئۇندۇرگۈچى دورلارنى قويۇش لازىم.

چاچراتقۇ (قۇرۇھى سائىيە)

ئەتراپقا چاچرىغۇچى يارا بولۇپ، دائىم سېرىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ. مەزكور سۇيۇقلۇق تەككەنلە يەرگە يەنسە يارا چىقىدۇ. يارىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ كېسەل كىشى قىزىيدۇ. يۈرەك سېلىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى بېرىدۇ. ۋە كۆپىنچە ئۇفۇنەت پەيدا قىلىدۇ (يۇقۇملىنىدۇ).

داۋاسى: سەپرا سۈرگىسى بېرىلىدۇ. مىزاجنى تەڭ شەش ئۇچۇن ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) ۋە تەمرى ھىندىنىڭ چىلانما سۈيى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يارا ئۈس-تىگە تۇتسيا، مەدەستان، كويدۇرۇلگەن قەغەز، كۇمۇش ئىق-لىمىياسى، مىس سۈيى، مىس ئۇپىسى، ھامىران چىنە-لەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ياكى ھاراق بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ چېپىلىدۇ. غىزاسىغا پالەك، سىماق، توخۇ گۆشى ۋە شورپىسى بېرىلىدۇ.

10 - پەسىل يىقىلىش ئۇرۇلۇش (زەرە)

يىقىلىش ياكى ئۇرۇلۇش بىلەن تاشقى ئەزالار زەخمىلىنىپلا قالماستىن بەلكى ئىچكى ئەزالارمۇ زەرەرلە-

ئىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق ھاللاردا ئومۇمىي بەدەن
ۋە باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ ئەھۋالىغا دىققەت قىلىش ھەم-
دە ئۇلارغا قۇۋەت بېرىش كېرەك.

(1) قاناش ۋە قىزىتما بولمىسا گىلى ئەرمىنىنى
تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ زەرەرلەنگەن جايغا سۈركەش؛
مۇغاس، ئاقاقىيا، سەرۋە يوپۇرمىغى، سەبرە، ئاقلانغان
ماش، ۋە ئاس سۇلىرىنى بىللە چېپىش كېرەك. زەربە
تەككەن جايغا دەرھال ھىجامەت (لوڭقا) قويۇلسا نەتىجە-
سى ياخشى بولىدۇ. ئەگەر قىزىتما بولسا ۋە يەرلىك قى-
زىش ئىششىق ئەھۋاللىرى كورۇلسە قىزىلگۈل، ماش، گى-
لى ئەرمىنى، ئاق سەندەل، پوپەل (سۇپارى) لارنى يۇم-
شاق سوقۇپ، گۈلاپ ئارىلاشتۇرۇپ، زەرەرلەنگەن جايغا
چېپىش كېرەك. غىزاسىغا ماش، نوقۇتلار بىلەن ماش
گۈرۈچ ئاش قىلىپ بېرىش لازىم. بىر ھەسسە رەۋەن،
يېرىم ھەسسە ئوردان، گىلى ئەرمىنىنى يۇمشاق سوقۇپ،
نوقۇت چىلانغان سۇ بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يىقىلىش
ئۇرۇلۇش قاتارلىق زەربىلەردە مەيلى ئىچكى ئەزا ياكى
تاشقى ئەزا زەخمىلەنگەن بولسۇن ياكى سوڭەكلەر زەخمى-
لەنگەن بولسۇن، ھەدەندىن چىققان مۇمىيانى گۈلاپ ياكى
سىركىدە تاشقا سۈركەپ سىرتتىن چېپىشقا ياكى يالغۇز
ئوزنى يېيىشكە بېرىش ناھايىتى تېز مەنپەئەت قىلىدۇ.
قانغان بولسا جاراھەتلەر بابىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەندەك
چارە قىلىنىدۇ.

(2) قاتتىق ئۇرۇلۇش ياكى يىقىلىشتىن باش زەربە يىگەندە دەرھال قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىنسا مەڭگە ئىششىپ قېلىشى ۋە قان ئۇيۇپ قېلىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. لېكىن بۇنى كېسەل ئەھۋالغا قاراپ قوللىنىش شەرت. ئۇندىن كېيىن يۇمشاتقۇچى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىش ياكى تەمرى ھىندىنى قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ بېرىش كېرەك. باش ساھىسىگە گۈل يېغى ۋە گۈللاپ سۈركەش. ئانار گۈلى، ئانار پوستى، ئاس يوپۇر-مىغىنى ئازراق سوقۇپ، سىركە بىلەن قاينىتىپ باشقا چېپىش كېرەك. بۇنىڭغا ئۇد ۋە قەسبۇسزەرىرە قوشۇلسا ئۇنۇمىنى تېخىمۇ يۇقۇرى كۆتىرىدۇ. 3 - كۈنىگىچە يىمىشكە خوراز مىڭىسى بېرىلىدۇ.

(3) كۆكرەك زەربە يىگەندە بەزى ئېغىر چاغلاردا كۆكرەك پەردىسى زەخمىلىنىدۇ ۋە قانلىق بەلغەم تاشلايدۇ. بۇنداق چاغدا كەھربا، ئانار گۈلى، گىلى ئەرمىنى خۇنسىياۋشيان، لوك لارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇم-شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سېمىز ئوت سۈيى (ياكى ئۇرۇغىنى قايناتقان سۈيى) بىلەن؛ ئەگەر ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا ئوقۇت چوڭلۇغىدا ئەپيۇن قوشۇپ، كۆكرەك قىسمىغا قويۇلىدۇ. يىغىش ئۈچ-ۈن قۇرسى كەھربا (71 - نۇسخە) ۋە ئەنجىبار شەرۋىتى (72 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) مەئدە زەربە يىگەندە، ئەھۋال ئېغىر بولسا،

مەئدە قان تومۇرلىرى زەرەرلىنىپ قان قۇسۇش كېلىپ چىقىدۇ. قان توختىتىش ئۈچۈن كىيىدۇرۇلگەن مارجان، كەھربانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ گۈلگە ئارىلاشتۇرۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ. ئاقاقىيا، مەستىكى فېزىل-گۈل، سۇمبۇلنىڭ ھەر بىرىدىن 5 مىسقالدىن، زەپەر، سەبە، قارىغاي مېۋىسىنىڭ ھەر بىرىدىن بىر مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، پاقا يوپۇرمىغى سۈيى بىلەن قويۇق ئوماچتەك دورا تەييارلاپ، مەئدەگە تاشقى تەرەپتىن چېپىلىدۇ (ئۇلارنى مەجۇندەك قىلىپ يېيىشكە بەر-سىمۇ بولىدۇ).

5) تال، جىگەرگە زەربە تەككەندە: — جىگەر ياكى تال بار تەرەپتە قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ. بۇ چاغدا رەۋەن، ئوردان 5 مىسقالدىن، لوك، تاباشىر ھەر بىرى 3 مىسقالدىن ئېلىنىپ، يۇمشاق سوقۇپ گۈللاپ ياكى كاسىن ئەرەقى بىلەن يېيىشكە بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن: ئاق سەندەل، قىزىلگۈل، بىنەپشە 5 مىسقال-دىن، ئارپا ئۈنىدىن 7 مىسقال، زەپەردىن بىر مىسقال، كافۇردىن يېرىم مىسقال ئېلىپ، گۈللەپ، گۈل يېغىدىن يېتەرلىك مىقداردا قوشۇپ چېپىش كېرەك. ئەگەر يەرلىك جايدا قىزىتما بولسا قىزىلگۈلدىن 5 مىسقال، سۇمبۇل، مەستىكى، دارچىن، لادەننىڭ ھەر بىرىدىن 2 مىسقالدىن، ھەببۇل ئاسدىن 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، گۈل يېغىنى بىر ئاز قىزىتىپ، ئارىلاشتۇرۇپ سوۋۇتۇپ ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

(6) ئۇرۇلۇش ۋە يېقىلىش بىلەن تارامۇش - پەي-
لەر زەرەرلەنگەندە زەرەرلەنگەن جاينىڭ ھەركىتى توخ-
تايدۇ، روشەن ئىششىق ۋە قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ. بۇ-
داق ھاللاردا ئالدى بىلەن ئاغرىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن
ماش ئۈستىدىن 1 سەر، گىلى ئەرمىنى دىن $\frac{1}{2}$ 3 مىس-

قال، سەبەر، زەپەر سوكلەردىن بىر يېرىم مىسقالدىن
ئېلىپ ئۇلارنى يامغۇر سۈيى، گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ
چىپىش لازىم (يامغۇر سۈيى ئورنىغا گۈللاپ بولسىمۇ مەي-
لى). ئۇندىن كېيىن يەرلىك ئورۇندىكى ماددىلارنى تار-
قىتىش ئۈچۈن: ئاق لەيلى، بىنەپشە، ئەكىلىملىكلەرنى
يۇمشاق سوقۇپ گۈل سوسەن يېغى، سېرىق چىچەك يېغى
ياكى بابۇنە يېغىنىڭ بىرى بىلەن قوشۇپ چىپىش كېرەك.

(7) بوغۇملارغا زەربە تەككەندە: كۆپىنچە يېقىلىش
سەۋىيى بىلەن يۈز بېرىپ تېز ۋە جەينەك بوغۇملىرىدا
ئۇچرايدۇ، ئاغرىيدۇ، ئىششىيدۇ، ھەركەت قىيىنلىشىدۇ.
بۇنداق ئەھۋاللاردا ئالدى بىلەن، گۈل يېغىنى ياكى ئاق
لەيلى يىلتىزىنى (كوك بولغىنى ياخشى) سوقۇپ يالغۇز
ھالدا ياكى ئىككىسىنى قوشۇپ بوغۇم ئۈستىگە قويۇپ
ئۈستىدىن ماتا بىلەن تېگىپ قويىلىدۇ. ئەتىسى ۋاڭ
(ئىت ياڭغى) نى قوي مېيى ئىچىدە تاشقا سۇرۇپ چې-
پىپ قويۇش كېرەك.

(8) تاياق تېگىش ياكى يېقىلىش بىلەن گۈشلەر

بولۇنۇپ كېتىدۇ: قاتتىق تاياق زەربىسى بىلەن كوپىنچە پەللەك ۋە پاخالچەك گوشلىرى يېرىلىپ كېتىدۇ، ئاغرىش ۋە روشەن ھالدىكى غەيرى تەبىئى ئوزگىرىشلەر بولىدۇ. بۇنداق چاغدا ئالدى بىلەن دەرھال بولۇنۇپ كەتكەن جايلارنى قولدا ئۇگىلاپ ئوز ئەكسىگە كەلتۈرۈش كېرەك. ئۇندىن كېيىن زىغىر پاخىلىدىن توقۇلغان رەخنى گۇلاپ قاقچىلاپ ئارقا - ئارقىدىن قويۇش كېرەك. يېڭىلا سويۇلغان قوي تېرىسى بىلەن زەخمىلەنگەن جايىنى يۈگەش بەك ياخشى ئونۇم بېرىدۇ.

11 - پەسىل: باشقا تېرە كېسەللىكلىرى

پىتلاپ كېتىش (قەمەل، سىپەش)

پىتلاپ كېتىش — پات - پات يۇيۇنۇپ تۇرماسلىق، كىيىملەرنى يۈتكىمەسلىك قاتارلىق پاسكىنىچىلىقتىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: كىيىم - كېچەك ئالماشتۇرۇش ۋە ئورۇن - كۆرپە، بەدەننىڭ تازىلىغىغا رىايە قىلىش پىتلاپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىمۇ، داۋالاشتىمۇ مۇھىم چارىدۇر. بەدەننى شور سۇ بىلەن يۇيۇش كېرەك. دىنقى يوپۇرمىغى، مېۋىزەج، كۈمۈش پوقى، ئاچچىق باداملارنى سوقۇپ ئېلىشتۇرۇپ، بەدەنگە سۈركەش لازىم ياكى قىل يۇرغا (سۇسمار) مايىغى، نوشىدىرلەرنى سىركە بىلەن ئىزىپ

بەدەنگە (پىت كوپ جايلارنى ئاساس قىلىپ) سۈركەش كېرەك. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن نەتىجە بولمىسا قۇستە تەلەخى، زىراۋەندە، زەرنىخلەرنى سۈركە ۋە كالا ئوتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بەدەنگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر پىت بەدەنگە سالجىدەك قالدۇلۇپ ئالغان بولسا، مەنە سائىلە، ئاقمۇچ، ئانار پوستىنى قاينىتىپ يۇيۇش كېرەك. بىر مىسقال سىمپنى 5 مىسقال ئۇزۇم بىلەن ئولتۇرۇپ (ئۇ-زۇم بىلەن سىمپنى ھاۋانچىدا بىردەم يانچىلىسا سىمپ ئۇزۇم بىلەن ئېلىشىپ كېتىدۇ. بۇ سىمپنى كۈشتە قىلىشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى)، بىر قانچە تال توم يېپقا سۇۋاپ، پىتلاپ كەتكەن ئادەمنى يۇيۇندۇرۇپ، كىيىملىرىنى ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بويىنى، قولتىغى ۋە بېلىگە بىر قانچە كۈن باغلاپ قويۇلسا پىت يوقاپ كېتىدۇ.

يۈز، پىشانە تېرىسىگە قورۇق چۈشۈش

قېرىلىقتىن قورۇق چۈشۈش بىر تەبىئىي ھادىسىدىن ئىبارەت. ئەمما بەزىدە بەدەندىكى خىلىتلار، بولۇپمۇ مىڭدىكى خىلىتلار سەۋىيىسى بىلەن ياكى بەدەندە قۇرۇقلۇق كۈچىيىپ كېتىشى تۈپەيلىدىن تېرىگە ئوڭايلا قورۇق چۈشۈپ قالىدۇ.

داۋاسى: بىنەپشە يېغى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغى، ئايال سۈتىنى ئايرىم ياكى ئارىلاش ھالدا سىرتتىن چېپىشقا بۇيرۇلىدۇ. مىڭدىكى ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. زۇفانى تۇخۇم ئېقى بىلەن چېپىش ۋە موم يېغى بىلەن ياغلاپ تۇرۇش كېرەك.

ياتاق يارىسى (كورپە يارىسى)

ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئاغرىقلار جۇدەپ كەتكەندە بەل، ساغرا (پەللەك) ۋە توققۇزكوز ساھەسىدە يارا ھاسىل بولىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت بىر تەرەپ بىلەنلا يېتىش تۈپەيلىدىن ئورۇن - كورپىلەر سۇرۇپ، يېتىپ تېرىنى يارا قىلىدۇ. بۇ دەسلەپتە تېرىنىڭ ئاقىرىپ كېتىشى ۋە قىزىرىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، كېيىنچە تېشىلىپ ئاسان ساقايىماس جاراھەتكە ئايلىنىپ ئاغرىق ئازاۋىنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ ۋە كېسەلنى يامانلاشتۇرۇپ قويدۇ.

داۋاسى: ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئاغرىقلار ۋە بەدىنى ئاجىز، ئورۇق كىشىلەرنىڭ ئورۇن - كورپىلىرىگە دائىم دىققەت قىلىپ كېسەلنىڭ تېرىسىنى زەرەرلىنىشتىن ساقلاش لازىم. ئەگەر بەل ۋە پەللەك ساھەسىدە قىزىرىپ قالغان جايلىرى بولسا، روسۇت، ئاقاقىيا، گىلى ئەرمەنى، موزا، ئانار گۈلى قاتارلىقلارنى سوقۇپ ماي قوشۇپ چېپىش كېرەك. سىركە بىلەن گۈلاپنى مۇز ياكى قار بىلەن سوۋۇتۇپ سۈركەش كېرەك. ئەگەر تېشىلىپ يىرىكلاش ھادىسىلىرى كورۇلسە سىرتتىن چېپىشقا مەلھىمى ئىسپىداج (179 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كېسەلنىڭ تېگىدىكى بارلىق قاتتىق نەرسىلەرنى ئېلىپ تاشلاپ يۇمشاق كۆرپە سېلىپ بېرىش، جاراھەتلەنگەن جاي يوتقان - كورپىگە تەگمەيدىغان قىلىپ ئورۇن سېلىپ بېرىش كېرەك.

XVII ماقالا. سۇنۇق ۋە چىقىقلار

1 - پەسىل: سۇنۇق ①

تېرە زەخىمىلەنگەن سۇنۇق (يېپىق سۇنۇق)

سوڭەكلەر سۇنغاندىن كېيىن ئەگەر گۆش ۋە پەي-
لەر ئۇزۇلگەن ياكى بولۇنۇپ كەتكەن بولسا، ئەزادىكى
غەيرى تەبىئىي ئەھۋال روشەن كۆرىنىدۇ. ئۇنداق بولمى-
غاندا پەقەت مەزكۇر ئەزا ھەركەتسىزلىنىپلا قالىدۇ. ساق
ئەزاغا قارىغاندا ئۇزۇن - قىسقىلىقتا پەرقلىنىدۇ. قول بى-
لەن بېسىپ كۆرگەندە سوڭەك سۇنغانغانلىغى بىلىنىدۇ.

داۋاسى: سۇنغان ئەزانى تەكشى تارتىپ، سۇنغان
سوڭەكنىڭ ئىككى ئۇچى ئۇدۇللاشتۇرۇلىدۇ. ئەزانى تارت-
قاندا ئىككى كىشى بىرسى ئارقىدىن، بىرسى ئالدىدىن
تارتىش كېرەك. ئەمما بەك كۈچەپ تارتىماسلىق لازىم.
ئەزا ئەسلىدىكى شەكلى ھالىتىگە كەلسە ۋە ساق ئەزا
بىلەن تەڭلەشسە كۇپايە قىلىدۇ. بۇ ھالەتنى ساقلاپ

① تىبابەتتە سۇنۇقلار توغرىسىدا ئالاھىدە ساۋاتلار بار.
بۇ يەردە سۇنۇقلار توغرىسىدىكى ئاددى ۋە ئوڭاي چارىلار ئۇس-
تىدىلا توختىلىمىز.

تۇرۇپ دەرھال تېگىشقا باشلاش كېرەك. ئالدى بىلەن سۇنغان جاينىڭ ئەھۋالىغا قاراپ مومىيانى سوقۇپ ② (ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ) تۇخۇم ئېقىمغا ئارىلاشتۇرۇپ سۈن-غان ئەزا دائىرىسىگە سۈركەش كېرەك. تېگىش بەك بوش ياكى ھەددىدىن زىيادە چىڭ بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم. تېگىش ئۇسۇلى: سۇنغان ئەزانىڭ چوڭ - كىچىك - لىگىگە قاراپ تېگىش ماتېرىيالى (ئوسابە) نىڭ كەڭ - تار ۋە ئۇزۇن - قىسقىلىغى بەلگىلىنىدۇ. كەڭلىك جەھەتتىن كۆكرەك قىسمى ئۇچۇن بىر غىرىش؛ يەلكە، قول - پۇتلار ئۇچۇن 4 - 3 ئىلىك كەڭلىكتە بولسا كۇپايە. ئالدى بىلەن سۇنغان جايدىن باشلاپ 3 قەۋەت تېگىپ يۇقۇرىغا مې-گىش كېرەك. يەنە بىر لاتا بىلەن سۇنغان جاينىڭ ئاس-تىدىن ئۈستۈنگە قاراپ تېگىلىپ، توت قات قىلغانىدىن كېيىن قايتۇرۇپ يەنە تۈۋەنگە چۈشۈرۈلىدۇ. لاتىنى ئو-راشتا سۇنغان ئورۇننىڭ چىگراق ۋە باشقا جايلار بوش-راق تېگىلىشىغا دىققەت قىلىش لازىم. تەكشى تېگىلىشى، ئىگىز - پەس ياكى چوڭقۇر بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. ئەگەر تەكشىسىزلىك ئەھۋاللىرى بولسا مۇۋاپىق ھالدا داكا پارچىلىرى قويۇپ تۈزلەش كېرەك. ئاندىن كېيىن، ياغاچتىن سۇنغان ئەزاغا لايىق تۈز تاختاي تەييارلاپ، تېگىش ئۈستىگە قويۇپ يەنە بىر قات تېگىپ قويىلىدۇ.

② مومىيانى تۇخۇم ئاق سېرىغى بىلەن تاشقا سۇرۇپ چاپ-سىمۇ بولىدۇ.

بۇ خىل تاختاي تىبابەتتە "جەبەرە" دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ-
نىڭ سۇنغان جايغا ئۇدۇل كېلىدىغان قىسمى باشقا قىس-
مىدىن قېلىنراق بولىشى كېرەك. ئاستى - ئۈستى ۋە ئىك-
كى يانغا يەنى تۆت تەرەپكە قويۇلىدۇ.

تېڭىقتىن كېيىنكى ئىششىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ئۈچۈن ئەھۋالغا قاراپ يەڭگىل سۈرگە بېرىش كېرەك.
ئوڭاي سىڭىدىغان تاماقلار بېرىلىدۇ. توخۇ شورپىسى چالا
پىشۇرۇلغان تۇخۇم، كالاپاقالچەك، چۈجە گۈشلىرىنى
يالغۇز ياكى موميا قوشۇپ بېرىش لازىم. تاختاينى 3
كۈندىن بۇرۇن ئېلىۋېتىشكە بولمايدۇ. ئەگەر بەك ئاغ-
رىپ ياكى قىچىشىپ كەتسە ئەھۋالغا قاراپ تېڭىقنى يې-
شىپ ئەزانى ئىلمان سۇ بىلەن چايقاپ، تېڭىق ماتىرى-
يالنى سىركە، گۈلاب ۋە گۈل يېغى ئارىلاشمىسىغا چىلاپ،
قايتا چىڭراق تېڭىش كېرەك. تېڭىق ئۈستىدىن مۇغاس،
گىلى ئەرمىنى، ئاقاقىيالىرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ئاس سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىلىدۇ.
ياكى تېڭىق ماتىرىيالىرىنى سوقۇلغان سەبرە، مۇرمەككى،
ئاق لەيلى، ئاقاقىيا، قىزىلگۈل، گىلى ئەرمىنىلەرنى سو-
قۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن تەييار-
لانغان ئېرىتمىگە چىلاپ تېڭىلىدۇ. 7 كۈندىن كېيىن
ئەگەر ئاغرىش، ئىششىق ۋە يەرلىك قىزىتما قاتارلىقلار
بولمىسا تېڭىقنى قايتىدىن چىڭ قىلىپ تېڭىلىدۇ. سۇنغان
ئەزانىڭ ھەركەتلىنىشىنى ئالدىراپ تەشەببۇس قىلماسلىق،

بەلكى ئاستا - ئاستا ئۆزىنىڭ ئەسلى ھەركەت دەرىجىسىگە يەتكۈزۈش لازىم. سۇنۇقىنىڭ ئەكسىگە كېلىشى (تۇتۇشى) قېرىلاردا ئاستا، ياشلاردا تېزراق بولىدۇ. قول، بىلىك ۋە ئۆخىرەك سوڭەكلىرىنىڭ تېگىشىنى 40 - 30 كۈن ئەتراپىدا؛ يانپاش ۋە پاخالچەك سوڭەكلىرىنىكىنى 50 كۈندىن 3 - 2 ئايغىچە تۇرغۇزۇش لازىم. بەزىدە سوڭەك تۇتماي قالسا، سۇنغان جاي بۇزۇلۇپ زەرداپ يىرىك يىغىدۇ، ئىششىق پەيدا قىلىدۇ. مۇنداق ھاللاردا سۇنغان جايىنى يېرىپ، يىرىك، زەرداپلارنى پۇتۇنلەي تازىلاپ، جاراھەتكە چارە كۆرۈش ئۇسۇللىرى بويىچە باشقۇرۇلىدۇ.

تېرە - گۆشنى بۇزغان سۇنۇق (ئوچۇق سۇنۇق)

سۇنغان سوڭەكنىڭ پارچىلىرى ياكى بىر قىسمى سۇنغان جايىنىڭ تېرە ۋە گۆشلىرىنى بۇزۇپ تېشىپ چىقىدۇ. ياكى تېرە - گۆشلەر زەخمىلىنىپ، ئاندىن سوڭەككە زەربە يېتىپ سۇنغان بولىدۇ. ھەر ئىككى ئەھۋالدا سۇنغان جايدا جاراھەت بولىدۇ.

چارىسى: قان ئېقىۋاتقان بولسا جاراھەتلەردە كورسىتىلگەن چارە بويىچە قاننى توختىتىش لازىم. سوڭەك سىرتىغا چىقىپ قالغان بولسا، بىر تەرەپتىن قول بىلەن ئىتتىرىپ جايىغا كىرگۈزۈش، يەنە بىر تەرەپتىن ئىككى كىشى تارتىپ تۇرۇپ سۇنغان ئەزانى جايىغا چۈشۈرۈش ۋە قائىدە بويىچە تېگىش، ئەمما جاراھەتنىڭ يۈزىنى ئوچۇق قالدۇرۇش كېرەك. تاختاي

قويغاندىمۇ جاراھەتنى ئوچۇق قالدۇرۇپ تېگىش لازىم. جاراھەتنىڭ داۋاسى جاراھەتلەر بايانىدا كورسىتىپ ئۆتۈلگەندەك تەدبىر بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەمما سۇنغان سوڭەكلەر بەك پارچىلىنىپ كەتكەن بولسا، سوڭەك پارچىلىرىنى پۇتۇنلەي ئېلىپ تاشلاش كېرەك. بەزى ھاللاردا، ئەگەر سوڭەكنىڭ سۇنۇشى بەك ئېغىر دەرىجىدە بولۇپ، سوڭەك ئەسلىگە كېلىش ئىمكانىيىتى بولمىسا، لازىم كەلگەندە مەزكۇر ئەزانى ئىلمى جەببارى ① قاندىلىرى بويىچە كېسىپ تاشلىنىدۇ ۋە كېسىلگەن جاي جەرراھلىق قاندىلىرى بىلەن باشقۇرۇلىدۇ.

چىقىقلار (خۇلى)

سوڭەكلەر ئۆز ئارا تۇتىشىدىغان بوغۇم (مەفسەل) لەردىن چىقىپ كېتىشى "چىقق" (خۇلى) دەپ ئاتىلىپ، بوغۇم شەكلىنىڭ ئۆزگىرىشى يەنى بىر تەرەپ ئويىمان، يەنە بىر تەرەپ كوتىرىلىپ قېلىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. بوغۇم ھەركىتى چەكلىنىدۇ. قارشى تەرەپتىكى ساق ئەزادىن شەكلى، قىياپىتى، ئۇزۇن-قىسقىلىغى ۋە ئەگرى تۈزلىگى جەھەتتىن پەرقلىنىدۇ. ئوخشەك، يەلكە سوڭەك-لىرىنىڭ چىققلىرىنى پەرق قىلىش تەسەرەك. تۈۋەندە بىر قانچە خىل چىققىلارنىڭ ئومۇمى چارىسى ۋە ئاي-رىم چىققىلارنىڭ چارىسى ئۈستىدە توختىلىمىز:

① ئىلمى جەببارى — سۇنۇق تېگىش ئىلمى. تېخىقچى، "جەببار" دەپ ئېيتىلىدۇ.

(1) ئومۇمەن قانداقلا چىقىقلار بولمىسۇن، بوغۇم بوشلۇغىغا ماددا چۈشۈپ قېلىپ، كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئاغرىشنى زىيادە قىلىپ قويىشى مۇمكىن. بۇنىڭ ئال-دىنى ئېلىش ئۇچۇن بىر مىسقال گىلى ئەرمىنى قەن سالغان گۇلاپ بىلەن ئىچكۈزىلىدۇ. پۇنۇس، خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل ۋە تەمرى ھىندىلەرنى قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ قەن قوشۇپ ياكى باشقا ھەرخىل مۋە سۇلىرى بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇ يەڭگىل سۇرگىلىك خىزمىتىنى قىلىدۇ.

(2) چىقىقلارنى ئوز جايىغا سېلىشتىن بۇرۇن ئەگەر ئىمكانىيەت يار بەرسە كېسەلنى مونىچىدا يۇيۇن-دۇرۇپ، زەرەرلەنگەن ئەزانى بىنەپشە يېغى ۋە گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ بوغۇم ئاسانلىقچە جايىغا چۈشۈشنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك.

(3) چىقىقلار زەربە ۋە يىقىلىشىدىن بولۇپلا قالماي، بەلكى بوغۇملاردا بار بولغان كېسەللىك ئوزگىرىشلىرى-دىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ. ئالدى بىلەن ئۇنى ئېنىقلاش، چىقىقلار ئادەتتىكى كىچىك بوغۇملاردا بولسا سەۋىبىنى داۋالاشنى ئالدىن ئېلىپ بېرىش؛ ئەگەر چوڭراق بوغۇم-لاردا بولسا، بوغۇمنى جايىغا چۈشۈرۈپ، ئاندىن سەۋەپ-چىسىنى داۋالاش لازىم.

(4) چىقىپ كەتكەن بوغۇمنىڭ ھەركەت يۈنۈلۈشىگە ۋە قارشى يۈنۈلۈشىگە قارىتىپ تولغاش، ئالدى-كەينىگە

قارىتىپ ھەركەت قىلدۇرۇش بىلەن بوغۇم ئوز جايىغا چۈشىدۇ. بۇ چاغدا بوغۇمدىن ئالاھىدە ئاۋاز چىقىدۇ. قايتا چىقىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن بوغۇم ئوز ئالاھىدە-لىكىگە ئاساسەن تىگىلىدۇ. تاڭىدىغان لاتىنى موغاس ۋە گىل ئەرمىنى ئېرىتكەن ئاس سۈيگە چىلاپ تېگىلىدۇ. چېپىش ئۈچۈن، ئارپا ئۇنى بىلەن ئاس سۈيى ياكى تۇخۇم ئېقى قولىنىلىدۇ. تاختاي قويۇپ تېگىش بوغۇم-نىڭ قايتا چىقىپ كەتمەسلىكىنى تېخىمۇ ياخشى كاپا-لەتكە ئىگە قىلىدۇ. ھەركەتنىڭ تېز ئەكسىگە كېلىشىگە ياردەم بېرىدۇ. ئەگەر ۋاقىت ئوتۇپ كەتكەن بولسا، كېسەلنى تەكرار مونچىغا ئېپىرىپ سىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش ۋە سېرىق ماي ئىچكۈزۈپ بوغۇمنى يۇمشىتىش كېرەك.

كوپ ئۇچرايدىغان چىقىقلار

(1) نىڭكەك بوغۇمنىڭ چىقىقى: توۋەنكى ئىككەك چۈشۈپ كېتىپ ئېغىز ئوچۇق ھالەتتە تۇرۇپ قېلىپ يۇمۇلمايدۇ. چىشلار بىر بىرىگە ئۇدۇل كەلمەيدۇ. سوز-لەش ۋە چايناشقا ئىمكانىيەت بولمايدۇ. يەڭگىل ھاللار-دا ئېغىزنى يۇمغىلى بولسىمۇ، يەنىلا چىشلار ئۇدۇل-لىمىشالمايدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى ئىككى خىل: (1) تېۋىپ كېسەلنىڭ ئارقا تەرىپىگە ئوتۇپ، 2 قولى بىلەن ئىككەك-نى كۈچ بىلەن توۋەنگە بېسىپلا دەرھال ئارقىغا قارىتىپ

تارتىدۇ. بۇ چاغدا جالاقلىغان ئاۋاز ئاڭلىنىپ، ئىگەك جايغا چۇشۇپ ئېغىز يۇمۇلىدۇ. ئورنىغا چۇشكەندىن كېيىن بىر قانچە كۈنگىچە قاتتىق نەرسە چايناش، ئېغىزنى چوڭ ئېچىپ ئەسەنەشتىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك. (2) ياردەمچى كېسەلنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ كېسەلنىڭ بېشىنى چىڭ تۇتۇپ بېرىدۇ. تىۋىپ ئالدىدا تۇرۇپ ئىككى قولىنىڭ باشبارمىغىنى ئېغىزغا تىقىپ، ئىگەكنى تۈۋەنگە، ئالدىغا باسىدۇ. ئاندىن يۇقۇرىغا - ئارقىغا ئىتتەرسە بوغۇم جايغا چۇشىدۇ.

(2) مورە بوغۇمىنىڭ چىقىشى

ئالامەتلىرى: قاتتىق ئاغرىيدۇ، قولى ئىگىز كۆ-تىرىشكە، باشقا يەتكۈزۈشكە بولمايدۇ. قول يانپاشتىن يىراقلاشقان ھالەتتە تۇرىدۇ. ئەگەر كۈچ بىلەن يېقىنلاش-تۇرۇلسا قاتتىق ئاغرىيدۇ. مورە قىسمى ساق تەرەپكە ئىسبەتەن مايماق بولۇپ قالىدۇ. قولتۇق كاتىگى چوڭ-كىچىك، بەزىدە بوغۇم ئۇچى (قولتۇق ئويىمىنى ئىچىگە) پۇلتىيىپ چىقىدۇ.

ئورنىغا چۇشۇرۇش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن موز-چىغا چۇشۇرۇش، ياغلاش قاتارلىق ئومۇمىي چارىلار كۆرۈلگەندىن كېيىن كېسەل ئوڭدىسىغا تاختاي ئۈستىدە تۇز ياتىقۇزۇلىدۇ. يۇمشاق رەختىن توپتىن چوڭ-راق يۇمۇلاق تۈگۈنچە ياساپ، قولتۇق ئىچىگە قويۇپ تىۋىپ تاپىنى بىلەن (قايسى تەرەپ چىققان بولسا شۇ تەرەپ پۇتى بىلەن) باسىدۇ ۋە ئىككى قولى

بىلەن كېسەلنىڭ قولىدىن چىڭ تۇتۇپ ئۆز تەرىپىگە تار-
تىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بىر خىل ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ ۋە بوغۇم
جايىغا چۈشىدۇ.

(3) بىلەيزۇك بوغۇمىنىڭ چىقىشى

ئالامەتلىرى: بىلەيزۇك بوغۇم شەكلى قىڭغىر
بولۇپ، سىرتقا (يانغا) چىقىپ قالىدۇ ۋە قاتتىق
ئاغرىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ئالغانى ئېچىپ
تۇرۇشقا بۇيرۇلىدۇ. ياردەمچى ئارقا تەرەپتىن بىلەكنى
چىڭ تۇتۇپ تۇرىدۇ. تىۋىپ ئىككى قولى بىلەن ئالغان-
دىن تۇتۇپ ئالدىغا تارتىپ، بوغۇمنىڭ ھەركەت يۈزۈ-
لۈشىگە قاراپ (ئوڭ، سول، ئىچكى، تاشقى تەرەپكە)
ئايلىنىدۇرۇپ قويۇپ بېرىدۇ. بوغۇم شەكلى توغرىلىنىپ
جايىغا چۈشىدۇ، ۋە تېگىپ بويۇنغا ئېسىپ قويۇلىدۇ.

(4) جەينەك بوغۇم چىقىشى

ئالامەتلىرى: جەينەك غەيرى تەبىئى ھالدا ئالدى-
غا ئىگىلىپ، جەينەك ئارقىسىدا چوڭقۇرلۇق پەيدا
بولۇپ قالىدۇ. جەينەكنى ئىگىش مۇمكىن بولمايدۇ.
ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ياردەمچى كېسەلنىڭ
ئارقا تەرەپىدە، يۇقۇرقى بىلەكتىن تۇتۇپ تۇرىدۇ.
تىۋىپ بىلەيزۇك قىسمىدىن تۇتۇپ ئالدىغا تارتىپ،
بىلەكنى ئىچكى تەرەپكە كەتكەن ھالدا قويۇپ بېرىدۇ.
قولىنى ئىگىپ بويۇنغا ئېسىپ قويۇلىدۇ.

5) بەل ئومۇرتقىلارنىڭ چىقىمى

ئالامەتلىرى: ئالدىغا ياكى كەينىگە ئەككىلى بولمايدۇ. قاتتىق ئاغرىيدۇ، ئېغىرلاردا ئولتۇرۇپ قويۇشقا ۋە مې-كېشىقا بولمايدۇ. بەل ساھەسىدە كوتىرىلىپ چىققان ئومۇرتقا ۋە ئۇنىڭ ئاستىدا غەيرى تەبىئى چوڭقۇر جاي كورىنىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: بوقرات (ھىپوكرات) ئۇسۇلى: كېسەلنى ئالدى بىلەن مەۋجىغا چۈشۈرۈپ، ئىسسىق تۇتۇپ ياغلىنىدۇ. كېسەل بىلەن تەڭ ئۇزۇن-مۇقتا ياغاچ تاختاي تەييارلىنىدۇ. كېسەلنىڭ قوساق قىسمىغا يۇمشاق تەكىيە قويۇپ دۇم ياتقۇزۇلىدۇ. كېسەل-نىڭ كۆكرەك قىسمىدىن پۈتتە بىلەن 2 - 3 قەۋەت باغ-لاپ، پۈتتىنىڭ ئىككى ئۇچى كېسەلنىڭ 2 قولىتىغىدىن چىقىرىلىدۇ ۋە يېرىم غۇلاچ ئۇزۇنلۇقتىكى ياغاچنىڭ 2 ئۇچىغا چىگىلىدۇ. ياغاچقا ئېغىر تاش باغلىنىدۇ. شۇنىڭدەك بىر تېگىنى كېسەلنىڭ ئىككى پۈتتىنى تىزدىن يۇقۇرى جايىدىن باغلىنىپ يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تۈۋەنگە قاراپ تارتىپ تاشقا باغلىنىدۇ. بۇ چاغدا تىۋىپ ئالغىنى بىلەن بەلنى بېسىپ تۇرۇپ كېسەلنى كۈچ بىلەن پۈتتىغا باغلانغان تاشنى ئوز تەرىپىگە تارتىشقا بويۇرىدۇ ۋە ئالغانى بېسىپ ئومۇرتقىنى جايىغا چۈشۈرىدۇ. سوقۇلغان ماش، گىلى ئەرمىنى، سەبرى، مۇ-غاس، زەپەر قاتارلىقلارنى گۈلاپ ۋە تۇخۇم سېرىغى بىلەن قوشۇپ چېپىپ تېگىپ قويۇلىدۇ.

6) سان (يوتا) بوغۇمىنىڭ چىقىمى

ئالامەتلىرى: ئىچ تەرەپكە چىقىپ كەتكەن بولسا، ساق پۇتقا نىسبەتەن ئۇزۇرۇپ قالىدۇ، تىز بوغۇمىنى يىغىشقا بولمايدۇ. بوغۇم بېشى سىرتقا چىقىپ، ئىشىق-تەك، كورۇنىدۇ تاشقى تەرەپكە چىقىپ كەتكەندە ئەكس-چە پۇت قىسقىراپ قالىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: كېسەلنى ئوڭدىشىغا ياتقۇزۇپ، ياردەمچى كىشى كېسەلنىڭ ساغرىسىنى چىڭ بېسىپ بېرىدۇ. تىۋىپ ئورە تۇرۇپ، كېسەلنىڭ تىزى ئارقىسىدىن بىلىگىنى چىقىرىدۇ. يەنە بىر قولىدا كېسەلنىڭ پاقالچىگىدىن تۇتۇپ تۈۋەنگە تارتىدۇ ھەم كېسەلنىڭ ئىگىلىگەن تىزىدىن ئۆتكۈزۈلگەن بىلىگى بىلەن ئۈستۈنگە داۋاملىق تارتىدۇ ۋە ئىچكى، سىرتقى تەرەپ-كە تولغايدۇ. بۇ چاغدا بىر ئاۋاز چىقىدۇ. بوغۇم جايىغا چۈشىدۇ، پۇت تۈزلىنىدۇ. بوغۇمنىڭ قايتا چىقىپ كەتمەسلىگى ئۈچۈن يۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن مايلارنى چېپىپ بوغۇم تارتىپ قويىلىدۇ. يەنى پوتىغا ئوخشاش مەھكەم بىر نەرسە بىلەن تاپنىغا ئۈزەڭگە سېلىپ، پۇتۇن پاقالچەك ۋە ساننى چىڭ ئوراپ، بىر تەرىپىنى مورىگە (ئارقا تەرەپتىن) ئېلىپ، قولتۇقنى ئايلاندۇرۇپ، بەل باغلايدىغان يەرگە كەلتۈرۈپ سانغا چىگىپ قويىلىدۇ ۋە بىر ھەپتە ھەركەتلىنمەي ياتىدۇ. بوغۇم خىلىدىكى تېڭىق تىبابەتتە "ئاۋاتىرى" دەپ ئاتىلىدۇ.

7) ئوكچە (ھوشۇق) بوغۇمنىڭ چىقىغى

ئالامەتى: ئوكچە ئورنىدا ئىششىق پەيدا بولىدۇ. يەرگە دەسسەشكە بولمايدۇ. بوغۇم ئورنى ئويمانلىشىپ قالىدۇ. ئورنىغا چۇشۇرۇش ئۇسۇلى: ئوكچە بوغۇمنىڭ جايىغا چۇشۇشى تەس. كېسەلنى تۈز تاختايدا ئوڭدىسە - ھا ياتقۇزۇلىدۇ. ياردەمچى كېسەلنىڭ پاقالچەك سوڭىگىدىن تۇتۇپ، چىڭ تارتىپ تۇرغان ھالدا تىۋىپ كېسەلنىڭ تاپىنىدىن تۇتۇپ زور كۈچ بىلەن ئوز تەرىپىگە تارتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا قاراسلىغان ئاۋاز بوغۇمنىڭ جايىغا چۇشكەن - لىگىنى ئۇقتۇرىدۇ. دەرھال مايلاپ ئوكچىدىن تاپانغا قاراپ چىڭ تىگىلىدۇ ۋە 3 - 4 كۈن ھەركەت قىلىنمايدۇ.

8) قايرىلىپ كېتىش

ئالامەتلىرى: يىقىلىش ياكى يېرىم يىقىلىش بە - لىن پۇت ھوشۇق بوغۇمى ياكى يەرگە تايىنىپ قالغاندا قول بىلەن يۈك بوغۇمىدىكى پەيلەر سوزۇلۇپ كېتىدۇ. ھەركەت قىلغاندا قاتتىق ئاغرىيدۇ، ئىششىيدۇ.

داۋاسى: يەڭگىل بولسا، كۈچلۈك سىلكىۋېتىش كۇپايە قىلىدۇ. ئەگەر ئىششىق پەيدا بولۇپ ئاغرىش كۈچىيىپ كەتسە ھىجامەت قويۇش، تۇخۇمنىڭ سېرىغىنى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش، شاكاراپ سۇغا پاختا چېلاپ، پاخ - تىنى سىقىۋېتىپ شور پاختا بىلەن تېڭىش كېرەك. ئاق لەيلى يىلتىزى، ئانار گۈلى، سوگەت يوپۇرمىغى، ئاقاقىيا، ماش ئۇنى، سۇپارى قاتارلىقلارنى سوقۇپ، تۇ - خۇم ئېقى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش مۇمكىن.

XVIII زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى چارىلار

1 - پەسىل: دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش

دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش — ئوسۇملۇك دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش ۋە مەدەندىن ئېلىنغان دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش دەپ ئايرىلىدۇ^①. بۇ خىلدىكى زەھەرلىنىش ئادەتتە ئىستىمال قىلىش مەنىسى قىلىنغان زەھەرلىك دورىلارنى تەسادىپى ياكى قەستەن ئىستېمال قىلىش، تەسىر كۈچى پەۋقۇلئاددە كۈچلۈك ۋە تەسىر كۈچى نىسبەتەن زىيادە بولغان دورىلارنى ئوز ئېتىدالدىن كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. تۇرلۇك زەھەرلىك دورىلارنى ئىستىمال قىلىش (يېيىش، ئىچىش) بىلەن كېلىپ چىققان ئالامەتلەرنىڭ ئوز ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن قوللىنىلىدىغان چارىلىرى بار ھەم توۋەندىكىچە ئومۇمى چارىلارمۇ بار.

① بۇلاردىن باشقا تىبابەتتە زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ زەھەرلىرىمۇ دورا سۈپىتىدە قوللىنىلىدۇ. بۇلار بىلەنمۇ زەھەرلىنىشلەر ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، ئەفئا زەھىرى.

(1) زەھەرلىك دورا يىگەنلىكى مەلۇم بولغان ھامان دەرھال قەي قىلدۇرۇش (قۇستۇرۇش) لازىم. قۇستۇرۇش قانچە كۆپ ۋە قانچە بالدۇر بولسا نەتىجىسى شۇنچە ياخشى. قۇستۇرۇش چارىلىرى مۇنداق:

(1) كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ بىلەن كۈنجۈت يېغى ئىچكۈزۈلسە ئۈزلۈكسىز قەي قىلىشى مۇمكىن يا - كى گالغا بىرنەرسە تىقسا كوڭلى ئېلىشىپ قۇسىدۇ.

(2) سېرىق چىچەكنى قاينىتىپ سۈيىگە تۈز بىلەن توغرىغۇ قوشۇپ كۆپرەك ئىچكۈزۈش لازىم. بۇنىڭ بىلەن قەي يېتەرلىك يانمىسىمۇ زەھەرنىڭ تەسىرى سۈنىدۇ.

(2) كۆپلەپ قەي يېنىپ بولغاندىن كېيىن، كالا سۈتى ئىچكۈزۈلىشى ۋە ئىمكانىيەت دائىرىسىدە كۆپرەك بېرىلىشى كېرەك. ئەگەر سۈت ئىچىپ تۇرۇپ قەي قىلسا تېخىمۇ ياخشى.

(3) تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە)، تەرياقى گىلى مەختۇم (187 - نۇسخە) ۋە مەشدىرتۇش (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار ھەرخىل زەھەرلەرنى قايتۇرۇش تە - سىرىگە ئىگە.

(4) ئىچ ئەزاسى قىزىپ كەتسە، سېرىق مايغا سو - غاق سۇ قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(5) زەھەرلەنگەن كىشىنى ئۇخلا تىماسلىق لازىم. قو - سىغىنى ئاچ قويۇش زەھەرنىڭ تەسىرىنى كۈچەيتىپ قويىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن زەھەرلەنگۈچى كىشى غىزا خالى - سا تويغىچە بېرىش كېرەك.

6) يۇقۇرقىلاردىن باشقا زەھەرنىڭ كەپپىياتىغا قار-
شى دورىلارنى بېرىش كېرەك. مەسىلەن: ئىسسىق نەرسىلەر
(دورىلار) بىلەن زەھەرلەنگەندە (ئالامىتى — ئېغىز، مەندە،
ئۈچەيلەردە ئېچىشىش، كويگەندەك سېزىملارنىڭ بول-
شى، يۈرەك، مىڭنىڭ زەرەرلىنىشى قاتارلىقلار) سوغاق
دورىلاردىن كافۇر، يۇمىلاقسۇت، گۈلپ قاتارلىقلارنى بې-
رىش كېرەك. سوغاق خۇسۇسىيەتلىك زەھەرلىك دورىلار
مەسىلەن، ئەپيۇن، بەزۇرۇلبەنجىلەر بىلەن زەھەرلەنگەن
بولسا ئىسسىق دورىلار (شېرىك سۇ بىلەن ھىڭ ياكى
داۋائىلىمىشكى ھار) نى بېرىش كېرەك.

7) زەھەرلەنگەن كىشىلەر توۋەندىكى ئالامەتلەر-
گە قاراپ ئېنىقلىنىدۇ: زەھەرلەنگۈچىنىڭ ئاغزىدىن غەي-
رى تەبىئى پوراق كېلىدۇ؛ زەھەرلەنگەن كىشى بىردىنلا
قۇسىدۇ. قۇسقان ماددىنىڭ رەڭگى ھەرخىل بولىدۇ؛ بە-
دىنىدە زەھەرلىگەن دورىغا خاس بولغان ئالاھىدە ئالا-
مەتلەر كۆرىنىدۇ. توۋەندە ھەرخىل زەھەرلىنىشلەردىكى
ئالاھىدە ئالامەتلەر ۋە قۇتقۇزۇش چارىلىرى تونۇشتۇر-
لىنىدۇ:

مەندەن جىنىسلىق دورىلار بىلەن زەھەرلەنىش

1) سىمپ بىلەن زەھەرلىنىش: تىرىك سىمپ
زەھەرلىمەيدۇ بەلكى تىرىكلا چىقىپ كېتىدۇ. ئەمما سى-
مپ كۈشتىسى (ئولتۇرۇلگىنى) بەدەنگە سىڭىپ ئېغىر
ھالدا زەخمىلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: قوساق قاتتىق تولغاقسىمان ئاغرىيدۇ. مەئىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ، ئېغىز قۇرۇيدۇ، كۆپ شول-كەسەي ئاقىدۇ، ئېغىز ئىچى ئاغرىيدۇ، سۇيىدۇك توختايدۇ. **داۋاسى:** ھەسەل سۈيىگە توغرىغۇ قوشۇپ تەييارلىغان سۇدىن كۆپلەپ ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇش ھەم ھوقنە قىلىش كېرەك. بۇنىڭغا 3 مىسقال مۇرمەككى قوشۇلسا تەسلىرى تېخىمۇ ياخشى. ئۇندىن كېيىن، كالا سۈتسىگە زىغىر لۇئابى، ئاق لەيلى لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى ۋە مۇرمەككىنى قوشۇپ بېرىش ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار بېرىش لازىم.

(2) مەدەستان (موردارسەنگ) ① بىلەن زەھەرلىك-ئىش: ئادەتتە مەدەستان تاشقى تەرەپتىن ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنى يەپ سالسا زەھەرلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەن ئىششىيدۇ، ئىششىقلار ئاغا-رىيدۇ. تىل قۇرۇپ ئېغىرلىشىدۇ. ئۈچەي توسىلىش ئالا-مەتلىرى پەيدا بولۇپ، قوساق قاتتىق مۇجۇپ ئاغرىيدۇ، قانلىق تەرەت كېلىدۇ (بۇ خۇددى قان تولغاقتىن ئەسلى-تىدۇ)، قۇسىدۇ. قوسقان ماددا قوغۇشۇن پۇراپ، قارام-تۇل، كۆكۈش رەڭدە بولىدۇ.

داۋاسى: ئەنجۈر، سېرىق چىچەك ۋە توغرىغلارنى قاينىتىپ بىر ئاز سېلىپ كۆپ مىقداردا ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش، كۈچلۈك دورىلارنى ھوقنە قىلىش ياكى

① مەدەستان: كۆيدۈرۈلگەن قوغۇشۇن.

مىزاجىغا قاراپ سۈرگە بېرىش لازىم. ئارقىدىن زەنجىۋىل مۇرايىياسى يېمىشكە بېرىپ مۇنچىدا تەرلىتىش كېرەك. مۇرمەككىدىن 3 مىسقال، سۇمبۇلدىن 2 مىسقال، ھەسەل - دىن 15 مىسقال ئېلىپ، قاتتىق دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەل بىلەن ئېلىشتۇرۇپ 4 گە بۆلۈپ بىر كۈندە يېمىشكە بېرىلىدۇ، توخۇ شورپىسىدا نوقۇت پىشۇرۇپ بېرىش كېرەك.

(3) قەلەي كۈشتىسى (قەلەي تۈزى) بىلەن زە - ھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: تىلى ئاقىرىپ كېتىدۇ، ھىق تۇتىدۇ، كۆڭلى ئاينىدۇ. يوتەل ۋە گالنىڭ قۇرۇشى كېسەلنى ئازاپلايدۇ. مەئدە ئاغرىيدۇ، ئەس - ھۇشى جايىدا بولمايدۇ، جويلىيدۇ. بەزىدە سۈيدۈك كەلمەيدۇ، ئۇيىقا باسىدۇ.

داۋاسى: ھەسەلگە سۇ قوشۇپ بىر ئاز ئەنجىر سېلىپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈش ئارقىلىق قەي قىلىدۇ. رۇلىدۇ. 2 يېرىم پۇڭ مەھمۇدە (سوقمۇنىيا) نى ھەسەل سۈيى بىلەن بېرىپ ئىچى سۈرگۈزۈلمەدۇ ياكى مۇناسىپ دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ. سۈيدۈك تۇتۇلغاندا شەر - ۋىتى ئەپسەنتىن (91 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇخلا تىماسلىققا تىرىشىلىدۇ.

(4) مەرگىمۇش (سىمولىفار - چاشقان زەھىرى) دىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتى ۋە داۋاسى: (3) بىلەن ئوخشاش. كېپەك شىرىسى ئىچكۈزۈلىدۇ.

(5) زەرنىخ بىلەن زەھەرلىنىش:

ئالامىتى: قوساق قاتتىق ئاغرىيدۇ، ئۇچەيلەر جاراھەتلىنىپ، قان تولغاقتەك ئىچى كېلىدۇ، يوتەل ۋە سۇيىدۇك قىيىنلىشىدۇ، بەدىنى سوۋۇپ كېتىدۇ ۋە سىمپ بىلەن زەھەرلەنگەندەك بەزى ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ. قۇس-خى سېرىق بولۇپ، زەرنىخ پۇرايدۇ.

داۋاسى: سىمپ بىلەن زەھەرلەنگەنگە ئوخشاش بولۇپ، كۆپ مىقداردا سۇت ئىچكۈزىلىدۇ.

(6) تومۇر دېتى ۋە تومۇر كۈشتىسىدىن زەھەرلىنىش:

باش قاتتىق ئاغرىيدۇ، قۇسىدۇ، ئېغىزدىن تومۇر دېتىنىڭ پۇرىغى كېلىدۇ. قوساق ئاغرىپ قارامتۇل ياكى پور رەڭلىك سۇيۇق تەرەت كېلىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش، كۆپ مىقداردا سۇت بىلەن مەشكە ماي ياكى سېرىق ماي ئىچكۈزۈش كېرەك. گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى ۋە بادام يېغى بىلەن باشنى ياغلاپ بېرىش لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كۈنىگە بىر مىسقال-دىن ئاھانرەباتاش (ماگنىت تېشى) تالقىنى ئىچكۈزۈپ، ئارقىسىدىن سۈرگە بېرىش ياكى قۇستۇرۇش لازىم.

(7) ھاك بىلەن زەھەرلىنىش:

ھاك تۈزۈندىلىرىنىڭ ئېغىز ۋە بۇرۇندىدىن كۆپ كىرىپ كېتىشى ياكى قەستەن ھاك سۈيى ئىچىۋېلىشتىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: يوتەل، باش ئاغرىش، كوزلىرى قىزىرىش، كوڭلى ئاينىش، سۇيدۇكى قىزىل كېلىشتەك بەلگىلەر يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: بادام يېغى، سېرىق ماي ۋە مەشكە مې- يىنى كۆپ مىقداردا ئىچكىۈزۈپ (بىر ئاز ئىسسىق سۇ بىلەن) قۇستۇرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ياغلىق شورپا ۋە زىغىر، بىيە ئۇرۇغىنىڭ شىرىلىرى بېرىلىدۇ.

(8) زەمچى ۋە زاكىتىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: ئاساسەن ئۆپكە زەھەرلىنىدۇ، يوتەل بىلەن قان تۆكۈرىدۇ. سوزۇلما زەھەرلەنگەندە ئۆپكەنىڭ جاراھەتلىك كېسەللىكلىرىگە سەۋەپ بولىدۇ.

داۋاسى: دەرھال سەزگىلى بولغاندا قەي قىلدۇ- رۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن كۆپ مىقداردا سۇت ۋە مەشكە ئىچكىۈزىلىدۇ. شەرۋىتى بىنەپشە (74 - نۇسخە)، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى ۋە توخۇ شورپىسى بېرىلىدۇ.

(9) زەڭگەر بىلەن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: توختىماي قۇسىدۇ. قۇسىغى كۆك رەڭدە بولۇپ، مىس دېتى پۇراپ تۇرىدۇ. سۇيدۇكى يېشىل كېلىدۇ، مەئدىسى ئاغرىيدۇ.

داۋاسى: زەرنىخ بىلەن ئوخشاش.

ئوسۇملۇك دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش

(1) پارپا (فارفى) دىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: پارپا ئادەتتە ئاق ۋە قارا ئىككى خىل رەڭدە بولۇپ، داۋالاشتا قارىسى قوللىنىلىدۇ. ئاق پارپىنىڭ زەھەرلىگى بەك ئوتكۇر بولغانلىقى ئۈچۈن، مەيلى ئىچتىن ياكى سىرتتىن ئىشلىتىلىشى مەنى ئىشلىتىلىدۇ. قارا پارپىنىڭ ئوزۇن يالغۇز ئىشلىتىش قەتئىي چەكلىنىدۇ. چۈنكى دىققەتسىزلىك بىلەن ئازراق ئارتۇق ئىچىۋەتسە زەھەرلەيدۇ. مەسىلەن، كالىپۇگى، تىلى ئىش-شىيدۇ، نەپەس ئېلىشى ئېزىلىشىدۇ. بوغۇلۇپ ھۇشسىز كېتىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئەگەر قۇتۇلۇپ قالغان تەقدىردىمۇ ئۆپكە زەھەرلىنىشكە دۇچار بولىدۇ.

داۋاسى: دەرھال چامغۇر ئۇرۇغىنى قاينىتىپ سۈيىنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش، كۆپ مىقداردا ماي-لىق (سېرىق ماي) سۇ ئىچكۈزۈپ تەكرار قۇستۇرۇپ، ئارقىدىن كۆپلەپ سۇت ئىچكۈزۈش لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن شاھ بەللۇتنى قاينىتىپ، سۈيىگە بىر مىسقال داۋائىل مىشكى (22 - نۇسخە) قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئىمكا-نىيەت بولسا، تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە) مەشدر-تۇس (25 - نۇسخە) ياكى فادى زەھرە ھايۋانى (دېڭ-زىيا) بېرىش كېرەك (بەزىلەر بىخ كەبىر پوستى سېرىق مايىنى مۇشۇك گۆشى بىلەن پىشۇرۇپ بېرىشنى كۆرسە-تىدۇ).

(2) پەرىپىيوندىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: مەئدە، قوساق چىشلىگەندەك ئاغرىپ، قاتتىق ئېچىشىدۇ، ھىق تۇتىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن كۆپ مىقداردا سۇت ۋە مەشكە بېرىلىدۇ.

(3) بالادۇردىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: بالادۇرنىڭ قىزىتىپ چىقىرىلغان مېيى تەككەن يەردە سۇلۇق قاپارتما پەيدا قىلىدۇ. ئېغىر بولسا ئويۇلۇپ كېتىدۇ. بۇنداق ھاللاردا جاراھەت-لەر ۋە كويۇكلەر قاتارىدا چارە قىلىنىدۇ. 2 مىسقالنى يىگەندە ئادەم ئولتۇرىدۇ. بىر مىسقالغا يەتمىگەن مىقدارنىمۇ زەھەرلەيدۇ. مەسىلەن، ئېغىز ئىچلىرىدە سۇلۇق قاپارتىمىلار پەيدا بولىدۇ، بەدەن قىزىيدۇ، پۇتۇن ئىچ ئىزالار كويىگەندەك ئېچىشىدۇ. بولۇپمۇ مەئدە ۋە قوساق ساھەسىدە ئېچىشىش روشەن كۆرىنىدۇ. كېسەل بەك قورقۇپ كېتىدۇ. ساقايغاندىن كېيىنمۇ بىرقانچە ۋاقىتقىچە قورقۇپ يۇرىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇشقا دائىم ئۇلگۈرەلمەيدۇ. ئىچ ئەزانى (ئېغىز ئىچى، گال ۋە مەئدىنى) كويىدۇرد-ۋە تەكەندىن كېيىن قەي قىلدۇرۇش، ئەكسىچە زەرەرلىك. بۇنىڭ ئۈچۈن، سوۋۇق ياغلاردىن قاپاق ئۇرۇغى مېغە-زىنىڭ يېغى، بادام يېغى ئىچكۈزۈش ۋە ئەنە شۇ ياغلار قوشۇلغان ئىلمان سۇ بىلەن ھوقنە قىلىش لازىم. مې-

مېغىزلارنى سوقۇپ يىگۈزۈلسە مەسىلەن، ياڭاق مېغىزى بەرسە بولىدۇ. دېڭىزىيا بېرىشنىڭ ئۇنۇمى ياخشى. بە- دەنگە بالادۇر شىرىسى (بالادۇر ھەسلى) تېگىپ كەتسە دەرھال قېتىقنى دوغ قىلىپ چايقاش كېرەك (قېتىق قانچە ئاچچىق بولسا شۇنچە ياخشى). ئۇندىن كېيىن ياڭاق مېغىزى، ئورمان ياڭىغى (پىندۇق) مېغىزى ۋە بادام مېغىزلىرىنى سوقۇپ يارا ئۈستىگە قويۇش، 4 - 5 سائەتتىن كېيىن يەنە دۇغ بىلەن يۇيۇش كېرەك.

(4) ئاق خەرىپە قىتىق زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: ئىچى سۇرىدۇ، قوساق ئاغرىدۇ. بۇغۇلۇپ قالىدۇ. يۈرەك قوزغىلىپ ھۇشىدىن كېتىدۇ. سۇيدۇڭى قىزىل كېلىپ، كۆپىگەندەك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: كالا سۈتى ۋە مەشكە بېرىلىدۇ. كالد- نىڭ ئوغۇز سۈتى بىلەن ھەسەل قوشۇپ بېرىلسە مەنپە- تى ياخشى. ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن ئانار ۋە ئالما شەۋەتلىرى (47 - 48 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ.

(5) قۇندۇز قەرىدىن زەھەرلىنىش:

ئادەتتە قۇندۇز قەرىنى يالغۇز ھالدا يىيىشكە بېرىلمەيدۇ. دورىلار بىلەن بىرلىكتە قوشۇپ بېرىلگىنى ئانچە زەھەرلىك ئەمەس. قارامتۇل كەلگەن قۇندۇز قە- رىنىڭ زەھەرلىك كۈچى بەك ئۈستۈن بولۇپ، يالغۇز ياكى باشقا دورىلار بىلەن قوشۇلغىنىدىن 2 - 3 مىسقال يىيىلسە زەھەرلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەن قىزىيدۇ، قۇسۇش،
باش قاتتىق ئاغرىش، يۈز، كۆزلىرى قىزىرىش، قىزىل
رەڭدە سىيىش، جۈپلۈش، تارتىشىپ قېلىش ئالامەتلىرى
كۆرۈلۈپ خۇددى مىڭە پەردە ياللۇغىنىڭ بەلگىلىرىنى
بېرىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك، سەرىستان قايناتقان
سۇ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ئۇندىن كېيىن لىمون
شەۋىتى، ئاچچىق دوغلارنى ئىچكۈزۈپ، ئارقىدىن سېمىز
ئوت شىرىسى ۋە بىيە لۇئابلىرى بېرىلىدۇ. بەزىلەر
تۇرۇنجى ۋە پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى ياكى ئۇرۇغىنىڭ
سۈيىنى بېرىشنى كۆرسىتىدۇ.

(6) ياۋا پىياز (ئەنسەل) دىن زەھەرلىنىش:

ياۋا پىيازنى تىبابەتتە ئوتقا (چوققا) تۇتۇپ پە-
شۇرۇپ، تاش پوستى تازىلاپ بېرىلىدۇ. ئەگەر مۇنداق
قىلماي بېرىلسە، ئاز مىقداردا بولسا قوساق ئاغرىپ
ئىچى سۇرۇپ كېتىدۇ؛ كۆپرەك بولسا، چىش مۈلۈكلىرى
ئاغرىش، كۆكرىگى ئاغرىش ۋە قانلىق ئىچ سۇرۇشلەر
كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: تومۇر پارچىسىنى ئوتتا قىزىتىپ، سۈتكە
تاشلاپ سۇت ئىچكۈزىلىدۇ. تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇ-
رۇپ يىيىشكە بېرىلىدۇ. ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن قۇرس
كەھرىبا (71 - نۇسخە) بەرگەندە ئىچ سۇرۇش توختايدۇ.
(7) رەۋەندىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: يەرلىك رەۋەننىڭ زەھەرلىك خۇسۇسىيىتى ئاز. رەۋەن چىنى (ئات تۇۋىغى رەۋەن) زەھەرلىك تەسىرگە ئىگە. كۆپ ئىچىپ قويسا توختاۋسىز ئىچ سۇرىدۇ. قوساق مۇجۇش ۋە ئىنچىقسىمان ئاغرىشلار كېسەلنى ئازاپلايدۇ، تارتىشىپ قالىدۇ.

داۋاسى: كۆپ مىقداردا سۇت ۋە مەشكە بېرىلىدۇ. ئالما شەرىۋىتى ۋە بىيە، ئانار شەرىۋەتلىرى (47 - 48 - نۇسخىلەر) بېرىلىپ بەدەن سوغاق سۇ بىلەن يۇيۇلىدۇ. (8) ئەپيۇندىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: بىر قېتىملىق مىقدارى 2 مىسقالدىن ئېشىپ كەتسە ئۆلتۈرىدۇ. 2 مىسقالغا يەتمىگەن مىقدار - دىكىسىنى كۈنجۇت يېغى بىلەن يىسە ئۆلۈم بېرىدۇ. ئادەتتە زەھەرلەنگەندە كۆرىلىدىغان ئالامەتلىرى: ئۇيىقا بېسىش، ئۇخلاپ ئويغانماسلىق، سوزلىمەلمەسلىك قاتارلىق بەلگىلەر كۆرۈلۈپ، سوغاق تەرلەپ كېتىدۇ. كۆزلىرى ئۆلتۈرۈشۈپ كېتىپ، نەپەس قىيىنلىشىدۇ، كۆزى قاراڭ - غۇلىشىدۇ. ھىق تۇتىدۇ. ئاغزىدىن ئەپيۇن پۇرىغى كېلىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك، تۇرۇپ ئۇرۇغى، دار - چىنلارنى سوقۇپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچكىۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ئۇندىن كېيىن تەرياقى ئەرپەنە (188 - نۇسخە) ياكى ئاقىر قەرە، قۇندۇز قەرى، پىلىپىل، ھىڭ، ئارچا مېۋىسى (ئۇبەل) لەرنى سوقۇپ، ھەسەل ئارىلاش -

تۇرۇپ خېمىردەك قىلىپ ئۇرۇك مېغىزىدەك يىمىشكە
بېرىلىدۇ ۋە قوست يېغى بەدەنگە سۇرتىلىدۇ.

(9) يۇمىغاقسۇتتىن زەھەرلىنىش:

كوك يۇمىغاقسۇتنى 5 سەر مىقدارىدا يىسە زەھەر-
لەيدۇ. 4 سەر مىقداردىكى سۇيىنى ئىچسە ئولۇم بېرد-
دۇ. ئەگەر سۇت بىلەن ياكى باشقا كوكتاتلار بىلەن
بىرگە يىسە زەھەرلىك تەسىرى توۋەن بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: پۇتۇن بەدىنىدىن يۇمىغاقسۇت پۇرىغى
كېلىدۇ، باش قايىدۇ. ئاۋازى پۇتۇپ قالىدۇ، ئۇيىقا
باسىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك بىلەن توغرىغۇ قاينىتىلغان
سۇغا زەيتۇن يېغى ياكى گۈل سوسەن يېغىدىن بىر ئاز
قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن
تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ، قارىمۇچ، پىلىپىلىنى
سوقۇپ ئېلىشتۇرۇپ يىمىشكە بېرىلىدۇ.

(10) سوقۇلغان ئىسپۇغۇلدىن زەھەرلىنىش:

ئادەتتە ئىسپۇغۇلنى سوقماستىن پۇتۇن ھالدا ياكى
لۇئابىنى چىقىرىپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئۇقۇشما سېلىقتىن
باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ سوقۇلۇپ قالسا زەھەرلىك
تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەئدە ئېچىشىدۇ، نەپەس قىيىنلە-
شىدۇ. بەدەن ماغدېرسىزلىنىپ تومۇر ھەركىتى ئاجىز-
لىشىدۇ. پۇتۇن بەدەن سوۋۇپ كېتىپ، ھۇشىدىن كېتىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك بىلەن توغرىغۇ قاينىتىلغان سۇنى كېرەك ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇ. رۇلغاندىن كېيىن، ئارقىدىن رەبھان شەرۋىتى، تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە) بېرىش كېرەك ۋە ھەببى جەدۋار (26 - نۇسخە)، تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ بېرىش لازىم. ئىچىشكە سېمىز ئوت شىرمىسى ياكى خاڭگا، سېمىز ئوت، كاسىنى ۋە قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىلىرى بېرىدۇ.

(11) ۋاڭنىڭ ئۇرۇغى (جەۋزى ماسىل) دىن زە- ھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: سوغاقتىن بولغان سەرسامنىڭ ئالا- مەتلىرى كۆرىلىدۇ، جويۇلىدۇ، بېشى قاينىدۇ. كۆزىگە ھەر خىل نەرسىلەر (خىيالىت) كۆرىنىدۇ، تارتىشىپ قې- لىپ ھۇشىدىن كېتىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش ۋە ھەقنە قىلىش كېرەك. ئەپسەنتىن، سۇتتەر قاينىتىلغان سۇ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. سۇت ئىچكۈزۈش (مەشكە، سېرىق ماي قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى). گۈل يېغى، سىركە گۈللەرنى بىرلەشتۈرۈپ باشقا چېپىلىدۇ، تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە) يىگۈزۈلىدۇ.

(12) كۇچۇلا (ئازاراقى) دىن زەھەرلىنىش: كۇچۇلنىڭ زەھەرلىشى ئادەتتە بىردىنلا يۈز بېرىدۇ. ئالدى بىلەن گەژگە (گەدەن)، كېيىن پۇتۇن بە-

دەن تارتىشىپ، كوز قارچۇغىمۇ ئارقىغا تارتىشىپ كېتىدۇ. كۈچۈلا بىلەن ئېغىر زەھەرلەنگەندە ئولۇم بىلەن ئاياغلىشىدۇ. كۈچۈلنىڭ زەھەرلىك قىسمى ئۇنىڭ ئىچىدىكى تىلى بولۇپ، كۈچۈلىدىن مەجۇن ياكى تالقان ياساشتا، ئىچىنى يېرىپ تىلىنى قاتتى ئېلىۋېتىش شەرت. ئاندىن ئۇنى سۈتكە چىلاپ قاينىتىش چارىسىنى ئەلۋەتتە توغرا قولۇق ئىشلەش لازىم. شۇنىڭدەك كۈچۈلا قوشۇلغان دو- رىلارنى تېگىشلىك مىقداردىن ئاشۇرماي يېمىش ۋە 20 - 30 كۈن ئىستىمال قىلىپ، يېرىم ئايچە توختىتىپ، قايتا بىر ئاي ئىستىمال قىلىش كېرەك.

داۋاسى: قۇستۇرۇش ۋە كۆپ مىقداردا سۇت ئىچكۈزۈش، خوشبۇي دورىلار بىلەن ھەسەل ياكى قەن سۈيى بېرىش كېرەك.

يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى، تىبابەتتە يىلان قاتارلىق زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ زەھەرلىرىمۇ دورا سۈپىتىدە قوللىنىلىدۇ (ناھايىتى كەم ھاللاردا ئىشلىتىلىدۇ). ئۇلاردىن كۆپرەك ئىشلىتىدىغىنى ئەفئايىلىنىنىڭ زەھىرى بولۇپ، ئۇنىڭدىن زەھەرلەنگەندە باش قېپىش، كۆڭلى ئاينىش، قۇسۇش بىلەن كېسەل تېزلا ھۇشىدىن كېتىدۇ. كۆپىنچە ئولۇپ قېلىشى مۇمكىن. مۇنداق ھاللاردا، ئاۋال سېرىق ماي بىلەن مەشكە ۋە كۈنجۇت يېغى ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇپ ئاندىن كېيىن تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە) ۋە داۋائىل مىشكى (22 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. مائۇل

لەھىمى ① ۋە ياغلىق شورپىلار بېرىلسە زەھەرنىڭ كېيىنكى تەسىرىنى يوقىتىشقا ياردىمى بار.

2 - پەسىل: زەھەرلىك ھاشارەتلەر چېقىش ۋە ئۇلارنى داۋالاش

زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ زەھەرلىرى ئادەم ئۈچۈن بەزىدە ئۆلۈم بىلەن ئاياغلىشىدىغان ئەھۋاللارنى كەلتۈرىدۇ. ياكى سالامەتلىكىگە بىر مۇددەت خېلى ئېغىر تەسىر بېرىدۇ. زەھەرلىك ھاشارەتلەر زەھىرىنى قايتۇرۇش ئۇسۇل چارىلىرى ھەرقايسى ھاشارەتنىڭ ئۆزىگە خاس بولىدۇ. بۇ يەردە شۇ توغرىدىكى ئومۇمىي تەدبىرلەر ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز:

ئومۇمىي چارىلار

1) زەھەرلىك ھاشارەتلەر چاققان جايدىكى زەھەر تەسىر قىلغان بەدەن سۇيۇقلۇقىنى چىقىرىۋېتىش كېرەك. چۈنكى بەدەندىكى سۇيۇقلۇقلار زەھەرنى پۈتۈن بەدەنگە، جۈملىدىن باشقۇرغۇچى ئەزالارغا تارقاقچى ئامىل بولۇپ قالىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قەي قىلدۇرۇش ۋە سۈرگە بېرىش ئارقىلىق بۇ مەقسەتكە يېتىش كېرەك. سۇيۇق ماڭدۇرۇش رولىمۇ چوڭ. يەنى كۆپ مىقدارىدا سۇ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش، ھوقنە دورىلىرىدىكى سۇنىڭ مىقدارىنىمۇ

① "جۈدەتكۈچى ئىستېما" غا قارالغۇ.

ئەلۋەتتە ئادەتتىكىدىن ئارتۇغراق قىلىش كېرەك. قىسمەن يىللار چاققاندىن باشقا ھاللاردا قان ئېلىشقا بولمايدۇ. (2) بەدەندىكى خىلىتلارنى ھەركەتلەندۈرۈپ ئۇ-لارنىڭ زەھەرنى سىرتقا ھەيدىشىگە ياردەم بېرىش، مەسىلەن، تەرلىتىش لازىم.

(3) بەدەندىكى تەبىئى كۈچنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق بەدەننىڭ زەھەرگە قارشى تۇرۇش قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش مەقسىدىدە تەرياقى فارۇق (186 - نۇسخە) مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە) فادزەھرە ۋە لۇئبەتى بەر - بەرى قاتار-لىقلارنى بېرىش كېرەك.

(4) چاققان ھاشارەت زەھەرنىڭ تەبىئىتىگە قاراپ ئۇنىڭغا قارشى تەسىرلىك دورىلارنى قوللىنىش لازىم. مەسىلەن، چاپان زەھەرنىڭ قارشىسى ھىڭ ھىساپلىنىدۇ. بەزىدە شۇ زىيانداشلارنىڭ ئۆزىمۇ داۋا بولىدۇ. مەسىلەن، ئەفئا يىلان چاققاندا زەھەر پۇتۇن بەدەنگە تاراپ كەتكەن بولسىمۇ، شۇ خىل يىلاننىڭ گۆشى بېرىلسە زەھەرنى قايتۇرىدۇ. لەھەڭ (ئىت بېلىغى) نىڭ زەھەرنى ئۆز گۆشى قايتۇرىدۇ ۋە ھاكازا.

(5) زەھەرنىڭ تاراپ كەتمەسلىگى ئۈچۈن چارە كۆرۈش ئالدىنقى شەرت ھىساپلىنىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن، زەھەرلىك ھاشارەت چاققان جاينىڭ يۇقۇرقى تەرىپىدىن ئولغام سېلىپ باغلاش، كېسىش، زۇلۇك قويۇش، ھىجا-مەت قويۇش ۋە ئەتراپىنى قىزىتىلغان پولات، تومۇر زىخ بىلەن داغلاپ مۇھاسىرە قىلىش قاتارلىق چارىلەرنى

ئەھۋالغا قاراپ قوللىنىش كېرەك. ئەڭ بولمىغاندا ئېغىز بىلەن شىۋاش لازىم ئەمما شورىغۇچى كىشىنىڭ قوسىغى توق ۋە ئېغىز ئىچىنى گۈل يېغى بىلەن چاپقاپ ئالغان بولىشى كېرەك.

(6) زەھەر قايتۇرغۇچى مەخسۇس دورىلارنى تاللاپ بېرىش كېرەك (بەزى ئالدىراش چاغلاردا قايسى مەۋجۇت بولسا شۇنى بېرىشكەمۇ توغرا كېلىدۇ. زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار مۇنۇلاردىن ئىبارەت):

(1) تورۇنجى (پىشقان جۈيزە) ئۇرۇغىدىن 2 مىسقال يىگۈزۈلسە زەھەرلىك ھاسارەتلەر زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

(2) چىنار دەرىخىنىڭ مېۋىسىنى يېمىشكە بېرىلسىمۇ يۇقۇرقىدەك تەسىر كۆرسىتىدۇ.

(3) قورۇلغان قۇرۇق يۇمىغاقسۇت ئۇرۇغىنى قايمىتىپ، سۈيىنى ئىچكىۈزۈش ياكى سوقۇپ تالقان قىلىپ يىگۈزۈش كېرەك.

(4) غۇلجاڭ (ئولجاڭ — ھىڭنىڭ يىلتىزى) ۋە فادزەھەردە زەھەر قايتۇرۇشتا ياخشى تەسىرگە ئىگە.

(5) ئۆشكە مايىغى چېپىش (بەزىلەر يېمىشىمۇ كۆرسىتىدۇ). تاغ پىنىسىنى يېمىش ۋە سوقۇپ سىرتتىن چېپىش؛ خام قايماق، مەشكە ماي چېپىش زەھەر قايمىتىرۇشتا ئۇنۇم بەرگەنلىكى توغرىسىدا خاتىرىلەر بار.

(6) مۇرەككەپ دورىلاردىن تەرياق I، II (189) — 190 نۇسخىلەر ئىشلىتىلىدۇ.

مەخسۇس چارىلار

(1) يىلان، چايان چېقىش:

ئالامەتلىرى: كويگەندەك ئېچىشش، چىدىغۇسىز قاتتىق ئاغرىش سېزىلىدۇ. چاققان يەر قىزىرىپ قاتتىق تۈگۈن بولۇپ قالىدۇ. ئەگەر قىزىلتومۇرلارغا چاققان بولسا تېزلا ھۇشىدىن كېتىدۇ. ئېغىر ھالدا ئولۇپمۇ قالىدۇ. ئەگەر ئەسەپ (نېرۋا)غا تېگىپ قالسا تۇتقاق كېسەل ۋە مىڭە پەردە ياللۇغىدىكىدەك ئالامەتلەر كورلىنىدۇ. قۇتۇلۇپ قالغاندىمۇ باش ئاغرىغى قالىدۇ.

داۋاسى: دەرھال چاققان جاينىڭ يۇقۇرىسىدىن ئولغام سېلىپ، چاققان يەرنى تىلىپ ھىجامەت قويۇش ۋە ئەتراپىغا چورەدەپ زۇلۇك قوندۇرۇش كېرەك. بابۇنە، بەزەنجا سەپ (ئاددى ئەمەن)، بۇغداي كىپىگىنى قاينىتىپ يۇيۇلىدۇ. ھىندىستان ئورمان ياڭىغى (پىندۇق)نى ئېغىزغا سېلىپ شۇمۇش ۋە يۇمشاق سوقۇپ چاققان جايغا بېسىش كېرەك. چاققان جايغا توۋەندىكىلەردىن بىرىنى چېپىش لازىم:

(1) پىننە، ئارپا ئۇنىنى سۇزاپ سۈيگە ئارىلاش - تۇرۇپ چېپىش. (2) گۇڭگۇرت پوقى، زىغىر، مەستىكى، قۇندۇز قەرى ۋە سامساق قاتارلىقلاردىن بىرى ياكى بىرقانچەسىنى بىرلىكتە زەيتۇن يېغى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ چېپىش. (3) ھىڭ بىلەن سامساقنى ھاراققا قوشۇپ چېپىش.

يېيىش ئۈچۈن مۇرەككەپ دورىلاردىن: تەرياقى

ئەربەئە (188 - نۇسخە)، سەنجىرىنا (33 - نۇسخە)،
مەجۇنى سۇم (191 - نۇسخە)لەردىن بىرى بېرىلىدۇ.

(2) ھەرە چېقىش:

ئادەتتىكى ھەرلەر چاقسا بىر مەزگىل ئاغرىش ۋە
ئىشىش بىلەن ساقىيىپ كەتسەمۇ، قارا ھەرە چاقسا ئا-
دەمنى ئولتۇرۇپ قويىشى مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: كۈچلۈك ئاغرىدۇ، ئىشىش كېتىدۇ.
پۇتۇن بەدەن ئىشىش نەپەس تۇتۇلۇپ ئولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: دەرھال بىر سىقىم كوك يۇمغاقسۇتنى
يىگۈزۈش، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، ئىت ئۇزۇمى، بىندەپشە
كاسنى، كاكىنەجلەرنى سوقۇپ ھەرە چاققان يەرگە قويۇش
كېرەك. داكىنى سىركىگە چىلاپ مۇز بىلەن سوۋۇتۇپ
ھەرە چاققان يەرگە قويۇلسا بولىدۇ. ئاچچىق ئانار سۈيى،
ئالما شەرىۋىتى (48 - نۇسخە) ياكى ئىسكەنجىۋىل بېرىد-
لىدۇ. كاسىن سۈيى، خاڭگا سۇلىرىنى بېرىش مۇمكىن.
ئادەتتىكى ھەرە چاققاندا چىۋىنىنى ئولتۇرۇپ ھەرە چاققان
جايغا سۈركەش ۋە ھەرە كۈنىگىنى سىركىدە ئىزىپ
چىپىش ياكى كوك يۇمغاقسۇتنى سوقۇپ چىپىش كېرەك.
(3) دو (چوڭ ئومچۇك) چېقىش:

ئۇلار بىر قانچە خىل بولۇپ، ھەر بىرى ئۆز
ئالدىغا ئالاھىدە كېسەللىك ئالامەتلىرى پەيدا قىلىدۇ.

(1) رەڭگى قارا، پاچاقلىرى قىسقا، ئۈستىدە تۈك
بولمايدىغانلىرى (قارا قۇرۇت) چاقسا پۇتۇن بەدەن قىچىد-

شىپ كېتىدۇ. قىزىتما يۈز بېرىپ نەپەس سىقىلىدۇ، بوغۇلۇپ ئولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: چاققان ئورۇننى بىلگىلى بولسا دەرھال تىلىپ ھىجامەت قويۇش ياكى بىلەك تومۇردىن قان ئېلىش لازىم. ھەتتا چاققان يەردىن قان چىقىرىش ئۇ - چۈن ئازراق كېسىپ تاشلاشنى كۆرسەتكەنلەرمۇ بار. جاراهەت ئورنىنى كېسەل ئېغىر ئەھۋالدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، جاراهەتلەرگە چارە قىلىش ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش مۇمكىن. تەمرى ھىندى، چىلان، ئەينۇلا ۋە خىيارى شەنبەرلەرنى قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچكۈزۈش لازىم.

(2) رەڭگى ئاق قارا يوللۇقلىرى چاقسا: قوساق ئىسلىدۇ. چاققان يەر قاتتىق ئاغرىيدۇ، تىترەك باسىدۇ، بەدەنلىرى سوۋۇپ كېتىدۇ.

داۋاسى: چاققان جايغا ھىجامەت قويۇپ زەھەرنى شوراپ ئېلىش، ئىسسىق سۇغا بىرئاز تۇز قوشۇپ بەدەننى يۇيۇش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى كېسەلنى بىر مەزگىل ئىسسىق سۇغا چۈشۈرۈش كېرەك. ئۇندىن كېيىن تۇز بىلەن مۇرمەككىنى ئىسسىق سۇدا ئېرىتىپ بەدەنگە سۈركەش لازىم. سىياداننى تالىقان قىلىپ يېمىشكە بېرىش ياكى تەرياق (189 - 190 - نۇسخىلەر)نى بېرىش لازىم.

زىيانلىق ھاشارەتلەرنى يوقىتىش چارىلىرى

(1) بۇغا مۇڭگۈزنى يالغۇز ياكى ئۆشكە مايىغى، گۇڭگۇرت، سەكبىنەج، مۇقىل، ئانار ياغىچى بىلەن كوي -

دۇرسە يىلان، سېرىق ئىشەك (چايان) قاتارلىق زىيانداشلار قاچىدۇ. ئۇۋىسى ئىسلانسا ئولىدۇ.

(2) نۇشىدىرنى سۇزاپ سۇيىدە ئېرىتىپ ئويىگە چاچسا ھەر خىل زىيانداشلار قاچىدۇ، ئۇۋىسىغا توكۇلسە ئولىدۇ.

(3) زەرنىخ، نوشىدىرنى كالا يېغى بىلەن قوشۇپ كويدۇرۇلسە پاشا، ھەرە قاچىدۇ (ئولىدۇ).

(4) سېرىق زەرنىخنى سوقۇپ، سۈتتە ياكى سۇدا ئېرىتىپ تەخسىگە ئېلىپ قويسا چىۋىنىلەر ئۇنىڭغا قونۇپ ئولىدۇ (لېكىن بالىلار، چوڭلار ئىچىۋېلىپ زەھەرلىنىشتىن ساقلىنىش لازىم).

(5) مەدەستان، تومۇر پەقى، ھىڭ دىۋانە (بەزۇرۇل-بەنجى)نى باراۋەردىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سۇ بىلەن كۈمۈلەپ قىلىپ چاشقان توشۇگىگە قويسا سىرتقا چىقالماي قالىدۇ. خېمىر ۋە مېغىز ئېلىشتۇرۇپ قويۇلسا ئۇنى يەپ چاشقان ئولىدۇ. سەڭگىيانىڭمۇ شۇنداق تەسىرى بار.

(6) ھىڭ بىلەن چۇمۇل ئۇۋىسى ئىسلانسا چۇمۇلە قاچىدۇ.

(7) ئەمەننى كويدۇرۇپ ئىسلاش ياكى قۇرۇتۇپ سوقۇپ ئويىگە چېچىش بىلەن تۇرلۇك زىيانلىق ھاشا-رەتلەر يوقىلىدۇ.

غالجىر ئىت چىشلەش (غالجىر كېسىلى)

غالجىر (ساراڭ) ئىت چىشلىگەندە، ئەگەر جىددى تادىرلەر كورۇلمىسە، چىشلىگەن ئادەممۇ خۇددى ئىت ئاغرىغاندەك غالجىر كېسىلىگە دۇچار بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىت چىشلىگەندىن كېيىن ئوخشاش بولمىغان ۋاقىت ئىچىدە تۈۋەندىكى ئالامەتلەر كورىلىدۇ:

- (1) ئەس - ھۇشى جايدا بولماسلىق، ئەندىشە، قورقۇنۇش ئىچىدە قېلىپ دائىم قورقۇپ يۈرۈش، ئادەم - لەردىن يىراقلىشىپ ياغۇزلۇقنى خالاش قاتارلىق كۈندە - دىلىك ھەرىكىتىدە غەيرى تەبىئى ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ.
- (2) بەدەنلىرى قىچىشىدۇ، قاتتىق قاشلاش نەتە -

جىسىدە يارا پەيدا بولىدۇ.

- (3) سۇدىن قورقىدىغان بولۇپ قالىدۇ. سۈنى كورسىلا قاتتىق ۋاقىرپ قاچىدۇ، سوغاق تەرلەيدۇ، تارتىشىپ ھۇشىدىن كېتىپ ئولۇپ قىالىدۇ. بەزىدە يۇقۇرقىدەك ئەھۋاللار ئېغىرلاشماي ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن، بەزىدە بولسا مۇنداق ھاللار ئېغىرلىشىش بىلەن بىللە ئىتتەك قاۋاش، كىشىلەرنى چىشلەش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ، ئاغزىدىن شۇلىگەي ئاقىدۇ، باشقىلارغا ھۇجۇم قىلىدۇ. مۇنداق چاغلاردا ساق ئادەملەرنى چىشلەپ سالسا ئۇلارغا غالجىر يۇقتۇرۇپ قويىدۇ. غالجىر ئىت چىشلىگەنلەردە غال جىرلىق ئالامەتلىرى پەيدا بولۇش ۋاقتى ئوخشاش بول مايدۇ. 40 كۈندىن 6 ئاي ۋاقىت ئىچىدە يۈز بېرىشى

مۇمكىن. ئەمما بەزى قەدىمقى تىبابەت ئەسەرلىرىدە 7 يىل ھەتتا 40 يىل بۇرۇن غالجىر ئىت چىشلىگەندە شۇنچە يىلدىن كېيىن غالجىرلىق ئالامىتى يۈز بەرگەنەلىكى ھەققىدە خاتىرىلەر بار. خاتىرىلەرگە قارىغاندا ئەس-ھۇشى پۈتۈنلەي جايىدا بولغان بىر كىشى بىر-دىنلا سۈنى كۆرسەتتىرىدىغان ۋە ۋەھشەت باسىدىغان بولۇپ قېلىپ، ئەبۇئەلى ئىبنىسىنانىڭ قېشىغا كەلگەندە، ئۇنىڭغا سۇ بېرىلگەندە سۈنى كۆرۈپ ۋاقىراپ، سۈنى توكۇپ تاشلاپ، غالجىرلىق ئالامەتلىرى يۈز بەرگەن ۋە ئەھۋالى تەدرىجى ئېغىرلىشىپ، ھۇشسىز كېتىپ يېرىم كۈندىن كېيىن ئۆلۈپ قالغان. سۇرۇشتۇرگەندە 40 يىل بۇرۇن غالجىر ئىت چىشلىگەن بولۇپ، ئۇ چاغدا تىۋىپ ئۇنىڭغا چىشلىگەن غالجىر ئىتنىڭ جىگىرىنى يىگۈزگەنەلىكتىن، 40 يىلغىچە كېسەللىك ئالامىتى يۈز بەرمەي يۈرگەنلىكى مەلۇم بولغان. ئۇندىن باشقا غالجىر ئىت چىشلىگەن ئادەمدىن ئېشىپ قالغان تاماقنى يەپ غالجىر كېسىلىگە دۇچار بولۇپ قالغانلىقى ھەققىدە تەپسىلىي خاتىرىلەر بار.

داۋاسى: غالجىر كېسىلىنى داۋالاش قانچە بالدۇر بولسا (روھىي ئالامەتلىرى كۆرۈنۈشتىن ئىلگىرى) شۇنچە ياخشى. شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلەرنى ئىت چىشلىگەندە تىۋىپ ئالدى بىلەن چىشلىگەن ئىتنىڭ غالجىر ياكى غالجىر ئەمەسلىكىنى ئېنىقلىشى كېرەك. ئېنىقلاش چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:

ئىت غالجىرلاشقانلىق ئالامەتلىرى:

(1) ھىچنەرسە يىمەيدۇ. بىر جايدا تۇرۇپ چوگ-
لەيدۇ، سۇ ئىچمەيدۇ، سۇنى كۆرسە قاچىدۇ، تىترەپ
تۇرىدۇ، تىلى دائىم سىرتقا چىقىپ تۇرىدۇ (بۇ تەش-
نالىقنىڭ ئالامىتى). بۇ غالجىر ئىتنىڭ دەسلەپكى ئا-
لامەتلىرى بولۇپ، بۇ ھال بارغانسېرى ئېغىرلىشىدۇ.
(2) كۆزلىرى قىزىرىپ ئاغزى - بۇرنىدىن دائىم
شۇلگەي ئېقىپ تۇرىدۇ. قۇيرۇغىنى ئىككى پۇتى ئارىلى-
غىغا تىقىۋالىدۇ، ماڭغاندا سىرتى (ئومۇرتقىسى) كۆتە-
رىلىپ دەلدەڭشىپ تۇز ماڭالمايدۇ. ئالدىغا ئۇچرىغانلا
نەرسىگە ئېتىلىدۇ ۋە چىشلەيدۇ. ئاۋازى چىقمايدۇ، ئىككى
يانغا قارالمايدۇ ۋە يانغا بۇرۇلماي دائىم ئۇدۇللا ما-
ڭىدۇ، قۇلىغى ساڭگىلىغان بولىدۇ. ساق ئىتلار ئۇنىڭدىن
قاچىدۇ. چىشلىگەن ئىتنىڭ غالجىر ئىكەنلىگى بىلىنگەن-
دىن كېيىن تۆۋەندىكى چارىلەرنى قىلىش لازىم.

(1) غالجىر ئىت چىشلىگەن جايدىكى جاراھەتنى
ئىلاجى بار چوڭايتىپ كۆپرەك قان ۋە زەرداپ چىقىرىپ
ۋېتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن تىلىپ ھىجامەت قو-
يۇش ياخشى ئۇسۇلدۇر. پىشقەدەم تىۋىپلارنىڭ بىردەك
كۆرسىتىشىچە، جاراھەت ئاغزىنى 40 كۈندىن كەم پۇت-
كەزمەسلىك لازىم. ئەگەر پۇتۇپ قالاي دىسە تىۋەنكى
نۇسخىدىكى مايىنى چېپىپ تۇرسا بولىدۇ.

نۇسخە: زۇڭت 3 مىسقال، نوشىدىر 6 مىسقال، تازى-

لانغان ئاق تۇز 6 مىسقال، جاۋۇش 9 مىسقال.
تەييارلاش تۈسۈلى: ئالدى بىلەن جاۋۇشنى
سىركىدە ئېرىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

(2) سەۋدا ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاش
ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)گە ئوخشاش
سەۋدا سۇرگىلىرىنى داۋاملىق بېرىپ تۇرۇش كېرەك.
غالىجىرنىڭ زەھىرى بەدەنگە تاراپ كەتكەندىن
كېيىن تەرياقى فارۇق، تەرياقى ئەربىئە ۋە تەرياقى
سەرتانلار (189 - 190 - 192 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.

(3) ئېغىزدىن دورا بېرىش مۇمكىن بولمىغاندا،
ماھۇدانە، جېنتىيانادىن بىر ھەسسىدىن، قۇندۇز قەرىدىن
يېرىم ھەسسە ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، گۈل يېغى بىلەن
شامچە تەييارلاپ ئارقا يولدىن كىرگۈزۈش لازىم. جېنتىيانا-
نا بۇ ھەقتە ئالاھىدە تەسىرگە ئىگە دورا.

(4) باشقا چارىلار ئالامەتلىرىگە قاراپ بەدەننى
ھۆللىنىدۈرۈش خۇسۇسىيەتلىك بولۇشى لازىم.
بىر ئامال قىلىپ كېسەلگە كۆرسەتمەي سۇ ئىچكۈزۈش
چارىسىنى قىلىش مەسىلەن، ئۇزۇن قۇمۇچ نەيچە ئارقى-
لىق شوراپ ئىچكۈزۈشنى ئويلاپ بېقىش كېرەك. شۇ
يول بىلەن ئىسپۇغۇل لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى،
بالەنگۈلۇئابىنى بېرىش مۇمكىن.

چىشلىگەن ئىتنىڭ غالىجىرلىغى بىلەنگەندىن كېيىن،

دەرھال ئۇنى ئولتۇرۇپ جىگىرىنى يانچىپ قانىلىرى بىلەن قوشۇپ غالجىر چىشلىگەن كىشىگە يىگۈزۈلسە غالجىرنىڭ زەھىرى تەسىر قىلالماسلىقى مۇمكىن. ئۇنىڭغا قوشۇمچە تۈۋەندىكى تالقامۇ بېرىلسە بەدەننىڭ زەھەرگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

نۇسخە: سەرتان نەھرى (قائىدە بويىچە كويدۇرۇل گىنى) 5 مىسقال، جېنتىيانا 5 مىسقال، كۈندۈر، پىننە 3 مىسقال، گىلى مەختۇم 1 سەر. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان دورا تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ. قوشۇمچە:

مەدەن دورىلارنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ۋە تەشلىتىلىشى

“كۈشتە” پارسچە ئولتۇرۇلگەن دىگەن سۆز بولۇپ، ھەرخىل مەدەنلەر مەسىلەن، ئالتۇن، كۈمۈش، مىس، قەلەي، سىمپ، تومۇر، پولات، زەرىنخ، سىر، سەڭگىيالارنى كۈشتەگەرلىك ئۇسۇلى بويىچە يۇقۇرى ھارارەت ۋە ھەز-خىل تېز تەسىرلىك ئېرىتمىلار (ئوسۇملۇك ئېرىتمىلىرى) نى تەسىر قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئەسلىدىكى شەكلى، بەدەنگە زىيانلىق بولغان قىسىملىرىنى ئۈزگەرتىپ بەدەنگە ئۈزلۈشۈپ ئاغرىقلارنى داۋالايدىغان ھالغا يەتكۈزىلىدۇ. كۈشتە قىلىش جەريانىدا قائىدىلارغا تولۇق رىئايە قىلىش

لىنىمىسا ياكى ئەمىلىيەت توغرا بولمىسا ئۇلارنى ئىش-
لەتكەندە ئەكسىچە زەھەرلەپ قويىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن
كۈشتەگەرلىكتە تەجرىبىسى يوق كىشىلەرنىڭ قىلغان
كۈشتىسىنى ئىستىمال قىلماسلىق ياكى كۈشتە قىلدىم
دەپ ئويلاپ بۇ خىلدىكى دورىلارنى قالايمىقان ئىستىمال
قىلماسلىق كېرەك. مۇنداق قىلىش مېيىپلىق كەلتۈرۈپ
چىقىرىدۇ ياكى ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدۇ.
كۈشتە قىلىشتا تۈۋەندىكى نۇقتىلارغا دىققەت
قىلىش لازىم:

(1) ئالدى بىلەن كۈشتە قىلىنغان مەدەنى تازى-
لاش كېرەك. بۇ تىبابەتتە "ساپ قىلىش" دەپ ئاتىلىدۇ.
ئوخشاش بولمىغان مەدەنىلەرنى تازىلاشنىڭ ئالاھىدە
ئۇسۇللىرى بار. مەسىلەن: (1) ئالتۇن، كۈمۈش ۋە
مىسنى ئوتتا راسا قىزىتىپ، ئۇنى كۈنجۈت يېغىدا 7
قېتىم، كالا (تۇغمىغان ياش غۇناچىن) سۇيىدۇگىدە 7
قېتىم، ئامىلە، بەلىلە، ھېلىلىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ
قايىنىتىلغان سۇدا 7 قېتىم، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قايىنى-
تىلغان سۇدا 7 قېتىم سۇغۇرۇلىدۇ. بەزىلەر ئامىلە،
بەلىلە، ھېلىلە سۈيى ئورنىغا سىركە تىزىبى ئىشلىتىشنى
ۋە ئاز بولغاندا ھەربىر سۇدا 3 قېتىمدىن سۇغىرىشنى
كورسىتىدۇ.

مىسنى ئېرىتىپ سۇ مېيىدا 3 قېتىم، قېتىق (دوغ)
دا 3 قېتىم سۇغىرىپ تازىلاش ئۇسۇلىمۇ بار.

(2) قوغۇشۇننى ساپ قىلىش يۇقۇرقىدەك ئىشلىنىدۇ.
(3) سىمپىنى قېلىن رەخ (ماتا)غا سېلىپ بىرقانچە
قېتىم سىقىپ ئۆتكۈزۈلسە ساپ بولىدۇ.
(4) تومۇر، پولاتنى تۈز ۋە سۇ بىلەن سالايە
قىلىنسا ساپ بولىدۇ.

(2) گىلى ھىكمەت قىلىش — كۈشتە قىلىنىدىغان
نەرسىلەرنىڭ كوپچىلىكى گىلى ھىكمەت (ھىكمەت لېيى)گە
ئوراپ ئوتقا سېلىنىدۇ. ھىكمەت لېيىنىڭ تەركىبى:
قىزىل گىل (سېغىز)دىن يىتەرلىك مىقداردا ئېلىپ،
بىر مەزگىل سۇغا چىلاپ يۇمشىغاندىن كېيىن، تۇخۇم
ئېقى، ئۈشكە چۇپۇرى، ئادەم چېچى، كونا مازلارنى با-
راۋەردىن قىشۇپ، گىلگە ئارىلاشتۇرۇپ، تازا سوققاندا
تەييار بولغان لاي گىلى ھىكمەت بولىدۇ. ئادەتتە كۈشتە
ئۈچۈن ساپال (ئوبدان پىشقان) ياكى ئوتقا چىداشلىق
شېشە (ئاتىشى شېشە) ئىشلىتىلىدۇ. يىقىلغۇ ئۈچۈن
سايدىدا، قۇملۇقلاردا قۇرۇپ قالغان كالا تېزىكى ئىشلى-
تىلىدۇ.

(3) كۈشتىلەرنىڭ سۇپىنىنى باھالاش:
كۈشتىلەرنى باھالاشتا، ئاساسەن ئۇلارنىڭ رەڭگى-
نىڭ ئۆزگەرگەنلىكىگە ۋە بەزىلىرىنىڭ سۇغا چۈش-
چۈكمەسلىكىگە قارىلىدۇ.

ئالتۇن كۈشتىسى پاختەك رەڭگىدە؛ كۈمۈش، قە-
لەي كۈشتىسى ئاق رەڭدە؛ تومۇر، پولات كۈشتىسى ئىس

رەڭگىدە، مىس كۇشتىسى نىل رەڭدە بولسا تەلپىكە
لايىق كۈشتە ھىساپلىنىدۇ.

(4) ئىشلىتىش دائىرىسى:

كۈشتىلەرنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسى بەك كەڭ.
ئومۇمەن تىبابەتتە باشقا ئۇسۇللار بىلەن داۋالىغىلى
بولمىغان كېسەللىكلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما
ئىشلىتىش جەريانىدا پەرھىز ۋە كۈتۈشكە ئالاھىدە
ئەھمىيەت بېرىش زورۇر. مۇنداق قىلىش داۋالاش
ئۇنۇمىگە ۋە زەھەرلىك تەسىرلەرگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەت-
لىكدۇر.

ئالتۇننى كۈشتە قىلىش

(1) ئىكەكلەنگەن ساپ ئالتۇن بىر ھەسسە، تازى-
لانغان سىمپ 2 ھەسسە، ئالدى بىلەن بۇلارنى قوشۇپ
سالايە ① قىلىنىپ، ئالتۇن بىلەن سىمپ بىرلىشىپ
كەتكەن ھالغا كېلىدۇ. بۇ چاغدا يەنە لىمۇن سۇيىنى
تامغۇزۇپ تۇرۇپ، پۇتۇنلەي بىر جىسىم بولغانغا قەدەر
سالايە قىلىنىدۇ ۋە بۇنىڭدىن بىر دانە كۇمۇلاچ تەييار-
لىنىدۇ. كۇمۇلاچتىن 2 باراۋەر ئۆلچەمدە تازىلانغان گۇڭ-
گۇرت (ئامىلە سارا) نى لىمۇن سۇيىدە سالايە قىلىپ بۇل-
ماق ھالغا كەلگەندە، يېرىمىنى ساپال قاچىغا سېلىپ
ئۈستىگە كۇمۇلاچنى قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە قالغان
① سالايە — ھاۋانچىدا سوققانداك ئەمەس، بەلكى ھاۋان-
چا تېشىنى چوگىلىتىپ، يەنچىپ تالقانلاش.

تازىلانغان گۇڭگۇرتنى سېلىپ ئاغزىغا يەنە بىر ساپال قاچىنى دۇم كومتۇرۇپ، ئەتراپىنى گىلى ھىكمەت بىلەن ئوبدان ئوراپ تېگىدىن 30 دانە كالا تېزىگى تىزىپ ئوت يېقىلىدۇ. ئوت تۈگەپ ساپال قاچا سوۋىغاندا قاچىنى ئېچىپ كۇمۇلاچىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ قايتا يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن قاچىلاپ، لايغا ئوراپ ئوتتا كويدۇرىلىدۇ، مۇشۇ ئۇسۇل 3 قېتىم تەكرارلانسا ئالتۇن كۇشتىسى ھاسىل بولىدۇ.

(2) ئۇسۇل ئىكەنلىكىگەن ساپ ئالتۇننى باراۋەر مىقداردىكى قەلەي بىلەن تومۇر قاچىغا سېلىپ، كومۇر ئوتىدا قىزىتىلىدۇ. ئۈستىگە تۇز سۈيى قۇيۇلىدۇ. قايناپ سۇ تۈگەپ ئالتۇن ۋە قەلەي بىر جىسىم بولۇپ قالغاندا كۇشتە بولىدۇ. سالاھىيە قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلەتمەش: بەدەننى ساغلاملاشتۇرىدۇ. باشقۇرغۇچى ئەزالارنى كۈچلەندۈرىدۇ، بەدەن قۇۋۋەتلىرىنى ئاشۇرىدۇ. بولۇپمۇ يۈرەك ۋە مىڭىگە قۇۋۋەت بېرىش ئۇنۇمى ياخشى.

مىقدارى: يېرىم ئارپا چوڭلىقىدا مەشكە ماي بىلەن يېمەشكە بېرىلىدۇ.

كۈمۈشنى كۇشتە قىلىش

(1) ئۇسۇل: ئىكەنلىكىگەن كۈمۈش، زەرىنخ باراۋەر مىقداردا ئېلىنىپ، ئاۋال زەرىنخنى ئىزىپ، لىمون سۈيى بىلەن بىر سائەتكىچە قايتا-قايتا سالاھىيە قىلىنىدۇ. ئۇنى

دىن كېيىن كۇمۇش ۋە زەرىنىخنى بۇتا (زەرگەرلەر ئال-
تۇن - كۇمۇش ئېرىتىدىغان ئوتقا چىداملىق قاچا) غا
سېلىپ ئۇستىگە يەنە بىر بوتىنىدۇم كومتۇرۇپ، ئۇستى-
دىن گىلى ھىكمەت بىلەن ئوراپ، 30 دانە قۇرۇق كالا
تىزىگى ئوتتۇرىسىغا قويۇپ ئوت يېقىلىدۇ. تىزەك قويۇپ
سوۋۇغاندىن كېيىن ئېچىلسا كۇمۇش كۇشتىسى تەييار
بولىدۇ.

(2) ئۇسۇل: لازىم مىقداردىكى كۇمۇشنى ئىككە كىلەپ
گۇلاپ بىلەن سالايە قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن توقە-
چاق قىلىپ، قىزىل گۈلى يانچىپ خېمىردەك ھالغا
كەلتۈرۈپ، مەزكۇر توقچاقنى ئارىسىغا ئېلىپ گىلى ھىك-
مەت بىلەن ئوراپ 20 دانە تىزەك ئارىسىغا قويۇپ
ئوت قالاپ تەييارلىنىدۇ.

(3) ئۇسۇل: نېپىز ياۋىق كۇمۇشنى ئىككە پىتى
(ھەبۇلمۇلۇك) يوپۇرمىغىنى سوقۇپ تەييارلانغان خېمىرغا
يوگەپ، ئۇستىدىن گىلى ھىكمەت بىلەن ئوراپ، 20
دانە تىزەك ئارىسىغا قويۇپ ئوت قالاپ كويۇپ كۇشتە
تەييار بولىدۇ.

ئىشلەتمەش: مىگە، يۈرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەت-
لەش، جىسمانىي قابىلىيەتنى ئاشۇرۇش، مەنىنى تۇتۇش
ئۈچۈن ئوزۇن يالغۇر ياكى باشقا دورىلار بىلەن بىللە
(193 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مىقدارى: يالغۇز بېرىلگەندە يېرىم فۇڭ مىقدارى

قايماق ياكى مەشكە ماي بىلەن بېرىلىدۇ. تەشئالىق پەيدا بولسا سۇت ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ.

تومۇر، پولاتنى كۈشتە قىلىش

(1) ئۇسۇل: ئىكەكلەنگەن پولات (ياكى تومۇر)نى يې-تەرلىك مىقداردا ئېلىپ، چىنە پىيالىگە سېلىپ ئۈستىگە جامەن يوپۇرمىغىنىڭ سۈيىنى پولات چۈككىدەك دەرىجىدە قۇيۇپ، 7 كۈنگىچە ئاپتاپتا قويۇلىدۇ. كۈن نۇرى كۈچ-لۈك بولمىسا 11 كۈن ئاپتاپتا تۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن پولات سۆسۈرەڭلىك ياقىراق ھالغا كېلىپ كۈشتە بولىدۇ.

(2) ئۇسۇل: زەنجىۋىلىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، ساپال قاچىغا زەنجىۋىلىنىڭ يېرىمى سېلىنىدۇ. ئۈستىگە 12 مىسقال ئىكەكلەنگەن پولاتنى توكۇپ، توپىسىگە زەنجىۋىلىنىڭ قالغان يېرىمىنى سېلىپ، بىر ئاز لىمون سۈيىنى قۇيۇپ ئاپتاپتا قويىلىدۇ. 21 كۈنگىچە داۋاملىق لىمون سۈيى بىلەن نەم-دەپ تۇرۇلىدۇ. مۇددەت تولىغاندا ھەممىسى بىرىكىدۇ. ئاندىن ئۇنى چويۇن قازانغا سېلىپ، 6 سەر ئاچچىق قېتىق بىلەن سۇس ئوتتا قىزىتىلىدۇ. قوشۇلغان باشقا تەركىبلىرى كۇيۇپ تۈگەپ، پولات قارامتۇل قىزغۇچ رەڭدە كۈشتە بولۇپ چىقىدۇ، سالاھىيە قىلىپ ئىشلىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: بەدەننى قۇۋۋەتلەندۈرۈش، قان ئاز-لىق، مەنى تۇتالماسلىق، جىگەر، مەئدە ئاجىزلىقى قا-

تارلىقلار ئۈچۈن يالغۇز ئۈزى ياكى قۇۋۋەت دورىلىرىغا
(لۇبۇپ، ماددە تىلھاياتلارغا) قوشۇپ بېرىلىدۇ.
مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم، بىر ئارپا چوڭلىقىدا
ئېلىپ، قايماق بىلەن بېرىلىدۇ.

مىسنى كۈشتە قىلىش

1) ئۇسۇل: ياپىلاق مىسنى ئوتتا قىزىتىپ كالا
سۇيىدۇڭىدە 9 قېتىم سۇغىرىلىدۇ. بۇ مىسنى ئىككەكلەپ
25 مىسقال تالغان ئېلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سىماپتىن
 $\frac{1}{2}$ 6 مىسقال، تازىلانغان گۇڭگۇرتتىن 5 مىسقال ئولچەپ،

ئاۋال سىماپ بىلەن مىس سالاھىيە قىلىنىدۇ. ئىككىسى
ئوبدان بىرىكىپ بولغاندىن كېيىن، بوتىنىڭ ئاستىغا
يەنچىلگەن تازا گۇڭگۇرتنىڭ يېرىمى سېلىنىپ، ئۈستىگە
مىس بىلەن سىماپ بىرىكىمىسىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگە قالغان
تازا گۇڭگۇرت تالقىنىنى قۇيۇپ، يەنە بىر بوتىنى دۇم
كومتۇرۇپ يېپىلىدۇ. ئەتراپى گىلى ھىكمەت بىلەن چاپ-
لىنىپ، تىزەك ئوتىدا 4 سائەت قىزىتىلىدۇ. ئاندىن

كېيىن 3 مىسقال سىماپنى 3 مىسقال زەرىخ ۋە لىمون
سۇيى بىلەن سالاھىيە قىلىپ بوتىدىن ئېلىنغان چالا كۈش-
تىگە قوشۇپ قايتا گىلى ھىكمەت بىلەن ئوراپ، تىزەك
ئوتىدا 8 سائەت قىزىتىلسا كۈشتە تەييار بولىدۇ.

ئىشلەتمەش: لەقۇا، پالەچ، تىترەش (رەئىشە)،
مىگە ئاجىزلىق، جىنىسى ئاجىزلىق، ئەرقۇنىسسا، مۇپاسىل،

كوزنىڭ تۇرلۇك كېسەللىكلىرىگە توۋەندىكى نۇسخىلار تەركىۋىگە قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ ياكى يېرىم ماش مىق-دارىدىكى مىس كۈشتىسىنى قايماق بىلەن يىيىشكە بېرىلىدۇ.

(1) ئاقىرقەرھ، زەپەر، قەلەمپۇر ھەربىرى 3 مىس-قالدىن، مىس كۈشتىسى بىر مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ نوقۇتتەك كومۇلاچ تەييارلاپ، بىر دانىدىن كۈنىگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

(2) نۇسخە: زەپەر، ئاقىرقەرھ، دارچىن، خولىنجان، قارامەۋسۇل ھەربىرى بىر مىسقالدىن، مىس كۈشتىسى يېرىم مىسقال. يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تەييارلاپ 2 دانىدىن 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

سىمپانى كۈشتە قىلىش

تازىلانغان سىماپ، تازىلانغان گۇڭگۇرت باراۋەر مىقداردا، دا، ئوشىدۇر سىمپانىنىڭ ئوندىن بىر قىسمى بىلەن تەڭ مىقداردا، زەمچە سىمپانىنىڭ يىگىرمىدىن بىر قىسمى بىلەن تەڭ مىقداردا. يۇقۇرقىلارنىڭ ھەممىسىنى قوشۇپ 2 كۈن سالاھىيە قىلىنىدۇ. 3-كۈنى سىماپ بىلەن تەڭ مىقداردا مورا قۇرۇمى قوشۇپ، يەنە بىر كۈن سالاھىيە قىلىنىدۇ. بۇلارنى ئۈستى ماتا ۋە گىلى ھىكمەت بىلەن ئورالغان شىشكە سېلىپ، ئاندىن ئۇنى قازانغا قويۇلىدۇ، قازاننىڭ شىشە تۈۋى تۇرىدىغان يېرى توشۇك بولۇشى لازىم. قازان شىشەنىڭ دەل ئاغزىغا كەلگىدەك ھەرىجىدە قۇم

بىلەن توشقۇزۇلىدۇ. شىشنىڭ ئاغزى ئوچۇق بولۇپ قۇمدىن يۇقۇرى چىقىپ تۇرۇشى كېرەك. ئاندىن كېيىن قازان ئاستىغا ئوت قالىنىدۇ. بىرىنچى كۈنى ئاستا قالاپ، 2 - 3 - كۈنلىرى ئوت تەدرىجى كۈچەيتىلىدۇ. جەمئى 3 كۈن ئوت قالانسا شىشنىڭ سىمىپ كۈشتە بولىدۇ. شىشنى سۇندۇرۇپ، كۈشتىنى ئېلىپ، پاكىزە شىشىدە قۇرۇق ۋە قاراڭغۇ جايدا ساقلىنىدۇ.

ئەمىلىيەتلىشى: تۇرلۇك ساقايىمىس تېرە جاراھەتلىرىگە، يەل يارا (ئابىلە فەرەڭگى)، ناسۇر قاتارلىق جاراھەتلىرىگە مەلھەملەر تەركىبىدە سىرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ ياكى ئوزۇنى يالغۇز $\frac{1}{3}$ لى ($\frac{1}{3}$ فۇڭ) مىقدارىدا ئېلىپ،

قايماق بىلەن كۈنىگە بىر قېتىم يېمىشكە بېرىلىدۇ (تېرە تاناسىل ئەزا جاراھەتلىرىگە بېرىلىدۇ).

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: سىمىپ كۈشتە - مىنى يېمىشكە بېرىپ، يەل يارا (سىڧىلىس) نى داۋالە - ھاندا ئادەتتە 21 كۈن بىر داۋالاش ۋاقتى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. بۇ چاغدا ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەر يېمىش، جىنىسى ئالاقە قىلىش مەنئى قىلىنىدۇ. دورىنى يىگەندە چىشقا تەككۈزۈپ قويماسلىق لازىم. زەھەرلىنىش ئالامەت - لىرى كورۇلسە دەرھال دورىنى توختىتىپ چارە كورۇش كېرەك ("سىمىپ بىلەن زەھەرلىنىش" گە قاراڭ).

سىمىپنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇللىرى كۆپ بولۇپ،

قەلەبىلىغان ئۇسۇلغا قاراپ سىماپ ھەرخىل رەڭدە كۈشتە بولىدۇ. مەسىلەن، قارا رەڭدە چىقىدۇ. بۇ، 1- دەرىجىدە - دىكى كۈشتە ھىساپلىنىدۇ. 2- دەرىجىدىكىسى قىزىل، 3- دەرىجىدىكىسى ئاق ۋە سېرىق بولىدۇ. بىر جىڭ ئېغىرلىقتىكى قىزىلچىنىڭ ئىچىنى ئويۇپ، ئىچىگە 3 مىسقال سىماپنى سېلىپ، ئويۇپ تاشلىغان پارچىسى بىلەن ئوبدان بېكىتىپ، ئۈستىدىن گىلى ھىكمەت قىلىپ قۇرۇتۇپ 30 جىڭ تىزەك ئوتتۇرىسىدا قويۇپ ئوت يېقىپ كۆيدۈرۈلسە، سىماپ ئاق رەڭدە كۈشتە بولىدۇ.

ياقۇتنى كۈشتە قىلىش

سۈزۈك، قىزىل رەڭلىك ۋە داغسىز ياقۇتنى ئون باراۋەر پەيقارا لۇئابى بىلەن بىللە بىر ساپال قاچىغا سېلىپ، ئاغزىنى گىلى ھىكمەت بىلەن چاپلاپ 30 جىڭ تىزەك ئوتىدا قىزىتىلىدۇ. ئادەتتە بىرىنچى ئوت بىلەنلا كۈشتە بولىدۇ. ئەگەر بىر ئاز چالا قالغان بولسا يۇقۇر - قىغا ئوخشاش يەنە بىر قېتىم ئوت قالاش كېرەك.

ئىشلىتىلىشى: يۈرەك ۋە مىڭىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەككە تەسىر قىلغۇچى مۇھىم مۇرەككەپ دورىلارنىڭ ئاساسىي تەركىۋى قىسمى بولىدۇ. ئوزۇن يالغۇز ئىشلىتىشكە قارىغاندا، باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ (مۇپەررىھى ياقۇتى) تەييارلاپ (9 - 84 - 85 - نۇسخىلەر) بېرىلگىنى ياخشى.

مەرۋايىت، مارجان، سەدەپلەرنى كۈشتە قىلىش

يۇقۇرقلاردىن باشقا، مەرۋايىت، مارجان، سەدەپ -
مەرنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ياقۇتنى كۈشتە قىلىش
بىلەن ئوخشاش. ئىشلىتىش دائىرىسىمۇ شۇنداق. بۇلار
ناھايىتى ئاز ئەھۋاللاردا يالغۇز ئىشلىتىلىدۇ. كۆپىنچە
مىگە، يۈرەك، جىگەر ۋە بورەكلەرنى قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان
مەجۇنلەر (داۋائىلىمىشكى، نوشىدارى ۋە مۇپەررىھلەر)
تەركىبىدە بېرىلىدۇ. يۇقۇرقى ئۇسۇل بىلەن كۈشتە قىلىش
لىنىغىنى، يالغۇز ھالدا سوزنەك كېسىلى، مەنى تۇتالماس -
لىق، مەئدە، يۈرەك، مىگە ئاجىزلىقلىرى ئۈچۈن بىر فۇك
كۈشتىنى قايماق ياكى بىيە مۇرابباسى بىلەن كۈنگە
بىر قېتىمدىن بېرىلىدۇ.

ئادەتتە باشقا دورىلار بىلەن مەجۇنلەر تەركىبىدە
بېرىلگەندە بۇلارنى (شاخ ماجان، بىغ ماجان،
مەرۋايىت ۋە سەدەپلەرنى) تومۇر قاچىغا ئېلىپ، كومۇر
ئوتىغا قويۇپ، رەڭگى ئۈزگەرگىچە قىزىتىلسا كۇپايە
قىلىدۇ. كېيىن گۈلەپ بىلەن سالايە قىلىنىپ مەجۇنلەرگە
قوشۇلىدۇ. بۇ تۈردىكى مەجۇنلەرنى تەييارلاپ، چىنە
قاچىلارغا ئېلىپ، موتىدىل ئىسسىقلىقتىكى جايدا 3 - 6
ئاي قويۇپ ئاندىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

مەرۋايىت كۈشتىسى تۇرلۇك كوز كېسەللىرىدە
(كوزگە ئاق چۈشكەندە، سۇ چۈشكەندە) سۇرىمىلەر تەرى -
كىۋىدە بېرىلىشى مۇمكىن.

دورا نۇسخىلىرى

(دورىلار ھەرقايسى كېسەللەرنى داۋالاشتا كورسەتىل-
گەنلىكى ئۈچۈن ئارىلاش يېزىلدى)

1 - نۇسخە: ئىترىپىل كەبىرى

تەركىبى: كابۇل ھېلىلىسى، بەلىلە پوستى ھەر
بىرى 6 مىسقالدىن. قارا ھېلىلى، ئامىلە پوستى ھەربىرى
6 مىسقالدىن. قارىمۇچ، پىلىپىل 6 مىسقالدىن. شاقاقۇل،
زەنجىۋىل، سېرىق تۇدى، قىزىل تۇدى، ئىرمىدۇن
ئۇرۇغى (لىسانى ئەسپۇر)، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن،
ناۋات، ھەببى قۇل - قۇل، كۈنجۇت، ئاق كۆكنار ھەربىرى
2 مىسقالدىن. ھەسەل پۈتۈن دورا ئىپتىسارلىغىنىڭ ئۈچ
باراۋەرىدە. بادام يېغى 16 مىسقال (كۈنجۇت يېغى بول-
سىمۇ بولىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، بادام يېغى بىلەن ياغلاپ، ھەسەلنى بىر ئاز
ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. 3 ئايدىن
كېيىن ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

يېمەش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۈنىگە 1 -

2 قېتىم.

تەسكەرتەش: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەر ياز
كۈنلىرى ئىستېمال قىلماستىن كېرەك ياكى ئىسكەنجە-
ۋىل بىلەن بېرىش لازىم.

2 - نۇسخە: شەۋىتى بىنەپشە I

تەركىۋى: ئىلۇفەر، قىزىل گۈل، كاسىن ئۇرۇغى،
شاتەرە، شوخلا، ھەمشىۋا ھەربىرى ئىككى يېرىم مىسقال-
دىن. گازىۋان ئەرەقى 7 مىسقال، چىلان 7 دانە، سەر-
پىستان 9 دانە، بىيە ئۇرۇغى بىر مىسقال. قارا سونا
ئۇرۇغى بىر مىسقال، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى بىر
مىسقال، تەرەنجىۋىل 12 مىسقال، گۈلقەن 12 مىسقال.
تەييارلاش: گۈلقەن بىلەن تەرەنجىۋىلنى ئايرىم قاچى-
غا، باشقا دورىلارنى ئايرىم قاچىغا سېلىپ، بىر چىنە سۇغا
2 سائەت چىلاپ قويۇلىدۇ. كېيىن ئۇستىگە 2 چوڭ چىنە سۇ
قۇيۇپ، تەمى چىققىچە قاينىتىپ، ئۇستىگە 10 مىسقال گۈل
بىنەپشىنى سېلىپ، بىردەمدىن كېيىن سۇزۇلسە تەييار بولىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: 10 مىسقالدىن كۈنىگە 3
قېتىم.

3 - نۇسخە: جەۋارش جالىنۇس

تەركىۋى: سۇمبۇل، قەلەمپۇر، قېلىن دارچىن،
دارچىن، قاقىلە، خولىنجان، زەنجىۋىل، زەپەر، ئاقمۇچ،

پىلىپىل، دەريا قۇستى، سەئىدى ھىندى، ئۇدى بىلسان،
ھەببۇلئاس، ئاسارۇن، قەسبۇسزەرەرە ھەربىرى 2 مىسقال -
دىن، مەستىكى 10 مىسقال، شېكەر 44 مىسقال،
ھەسەل (كوپىگىنى ئالغان) 44 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: زەپەردىن باشقا دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. شېكەرنى قىيام
قىلىپ ھەسەلگە قوشۇپ، سوقۇلغان زەپەرنى ئۇنىڭغا
قوشۇلىدۇ. ئاندىن كېيىن سوقۇپ تەييارلانغان دورىنى
ئۇستىگە سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. 10 كۈندىن
كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ.
يېمەش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم.

4 - نۇسخە: ھەببى سەبرە

تەركىبى: سەبرە 6 مىسقال، سېرىق ھېلىلە پوستى
3 مىسقال، قىزىل گۈل، رۇمبىدىيان $1\frac{1}{2}$ مىسقال،
كەتىرا 2 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئازراق قايناقسۇ بىلەن يۇغۇرۇپ
ھەب (كومۇلاچ) قىلىپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمەش مىقدارى: 3 - 5 دانە ياكى 7 دانىدىن
(تېۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە) ھەر كۈنى ئاخشامدا
ئىچىلىدۇ.

5 - نۇسخە: ئىتريپىل سەغەر

تەركىۋى: سېرىق ھېلىلە، كابۇل ھېلىلىسى،
بەلىلە پوستىلىرى، ئۇرۇغىدىن ئايرىلغان ئامىلە 10
مىسقالدىن

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سىرقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، يېتەرلىك مىقداردا ھەسەل بىلەن
يۇغۇرۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە
ياكى تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىستىمال قىلىنىدۇ.

6 - نۇسخە: ئىتريپىل كەشنىز

تەركىۋى: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسىنىڭ
پوستى، ئامىلە، يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى ھەربىرى بىر سەردىن.
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ 5 مىسقال بادام يېغى بىلەن
ياغلاپ، دورا ئېغىرلىغىنىڭ 3 باراۋىرىدە ھەسەل بىلەن
يۇغۇرۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن $2\frac{1}{2}$
مىسقالغىچە.

7 - نۇسخە: ھەبىي ئايارەج

تەرگىۋى: ئايارەج پەيقارا ① تۇرۇت، غارىقۇن
ھەر بىرى بىر سەردىن، كابىل ھېلىلىسى، سېرىق ھېلىلى،
رۇمبېدىيان $3\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ھىندى تۈزى (نەمەكى
ھىندى)، سوقمۇنىيا ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، بادام
يېغى $1\frac{1}{2}$ مىسقال، بېدىيان ئەرەقى 6 مىسقال.

تاييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، بىدىيان ئەرەقى بىلەن ئايارەجنى ئېرىتىپ،
ئۈستىگە بادام يېغى ۋە تالقان دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ
خېمىر قىلىپ نوقۇت چوڭلۇغىدا كومۇلاچ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسىگە ئاساسەن،
3 - 7 - 11 دانىدىن ھەركۈن كەچقۇرۇن بىر قېتىم
قايناقسۇ بىلەن يېمىشكە بېرىلىدۇ.

8 - نۇسخە: نۇشدارى لۇئۇۋى (مەرۋايىتلىق نۇشدارى)

تەرگىۋى: لاچىن دانە، زەرنەپ، دارچىن، ئايلىشى
(زورەنbad) سۇمبۇل، جۇيۇز، بەسباسە، قەلەمپۇر، دۇرۇنەج

③ ئايارەج پەيقارا 16 - نۇسخىغا قارالغۇ.

ئەقرەبى، يۇيۇلغان گىلى ئەرمنى، گىلى مەختۇم، مەستىكى،
 زەپەر، كۇمۇش ۋەرەق، ئۇرۇغسىز زىرىخ، ئىپار، تاباشىر
 ھەربىرى بىرمىسقالدىن، قىزىل گۈل، سەدى كۇفى، گۈلاپقا
 سۇرۇلگەن ئاق سەندەل، ئاقلانغان سېمىز ئوت ئۇرۇغى
 (تۇخىمى خىرفە) ھەر بىرى بىرسەردىن، تېشىلىمىگەن
 مەرۋايىت $1\frac{1}{2}$ مىسقال، ساپ ئامىلە 9 سەر، قىزىل
 گۈل گۈلابى، بىيە سۈيى، يازلىق ئالما سۈيى، تاتلىق
 ئامۇت سۈيى، بىدىمىشكى گۈلابى، چۇكا ئاق ناۋات،
 ھەسەل، ئاق قەن ھەربىرى 12 سەردىن.

تەييارلاش: ئاۋال ئامىلە بىر كېچە سۇتكە چىلە -
 ئىدۇ. ئەتىسى سۇزۇك سۇ بىلەن يۇيۇپ تازىلاپ 2
 جىڭ سۇ قۇيۇپ تاكى سۈيى تۈگەپ ئامىلە قالغىچە
 قاينىتىلىدۇ. ئاندىن كېيىن سىم ئەلگەكتىن ئوت -
 كۈزۈپ، ئۈستىگە مېۋىلەر سۈيى، ناۋات، قەن، ھە -
 سەللەرنى سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى
 يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قىيام سوۋىغاندىن
 كېيىن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ، 40 كۈنگىچە
 قاچىدا ساقلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: ھەركۈن ئەتىگەن كەچتە تاماق -
 تىن كېيىن 2 - 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

9 - نۇسخە: مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى I ①

تەركمۇى: تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، گازىۋان، بىخ مارجان، قۇرۇق يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى، ئاق بەھمەن، قىزىل گۈل، كەھرىبا، تۇرۇنجى پوستى، ئاق پىلە (يىپەك غوزىسى)، سېمىز ئوت ئۇرۇغى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، كاپۇر بىر مىسقال، قىزىل ياقۇت 2 مىسقال.

تەييارلاش: ياقۇت كۈشتە قىلىنىدۇ. بىخ مارجان بىلەن مەرۋايىتلارنى تۇمۇر قاچىغا سېلىپ چوغ ئۈستىگە قويۇپ كويدۇرىلىدۇ ۋە سالايە قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، يۇقۇرقىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، 2 ياكى 3 ھەسسە سېرىق ھېلىلە مۇرابباسىنىڭ شىرىسى بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: كۈنىگە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن.

10 - نۇسخە: زۇفا شەرۋىتى I

تەركمۇى: چىلان 30 دانە، سەرپىستان 50 دانە، پىشقان ئەنجۇر 20 دانە، گۈل بىنەيشە 4 مىسقال، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ھەمىشۋا ئۇرۇغى ھەربىرى 5 مىس -

① ياقۇت، مەرۋايىت، ماچان ئالدى بىلەن كۈشتە قىلىن -
نىدۇ ياكى كويدۇرۇلىدۇ (كۈشۈتلەرگە قارالغ).

قالدىن. پىرسىياۋشان 7 مىسقال. ئاقلانغان چۇچۇكبۇيا
يىلتىزى زۇفا ھەربىرى 8 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلانى چالاسۇقۇپ، 8 سائەت 3
چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويغاندىن كېيىن سۇنىڭ يېرد -
مى قالغىدەك قاينىتىپ سۇزۇپ، تېرىپىنى سىقىپ سۇ -
يىگە 18 سەر قەن سېلىپ قايتا قىيام بولغىدەك قاي -
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: 2 - 3 چاي قوشۇغىدىن بارا -
ۋەر مىقداردا قايناقسۇ بىلەن (ئەگەر قىيام بەك قويۇق
بولسا) 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ. قىيام قويۇق بول -
مىسا قايناقسۇ قوشماسلىق كېرەك.

11 - نۇسخە: ھەببى ئىستەمخىقۇن

تەركىبى: ئايارەج پەيقارا، ھەشقىپچەك ئۇرۇغى
(ھەببۇلىلى) بىر سەردىن، سەبىرە بىر سەر، سېرىق ھې -
لىلە پوستى، ئەپتىمەن، بىستىپايەج، سوقمونىيا يىرىم
سەردىن، شەھمى ھەنزىل ئۈچ مىسقال، سانا، مۇقىل بىر
سەردىن.

تەييارلاش: ئايارەجىدىن باشقا دورىلارنى سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئايارەجنى بىر ئاز سۇ بىلەن
ئېرىتىپ، دورىلارغا قوشۇپ خېمىردەك يۇغۇرۇپ كومۇلاچ
قىلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: 2 - 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر -
قېتىم يېيىشكە بېرىلىدۇ.

12 - نۇسخە: ھوقنە (كلېزما) دورىسى

تەركىبى: بىخ كەبىر، چىڭسەي يىلتىزى (بىخ
كەرەپشى)، بېدىيان يىلتىزى، پودىنە، قەنتە رېون، ئىز -
خىر يىلتىزى ھەربىرى $3\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى بىرچىڭچە سۇدا بىر ئاز
قاينىتىپ، سۇزۇپ، بۇنىڭ ئۈستىگە زاراڭزا مېغىزى، مۇرى
مەككى، قارا شەكەرلەردىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇلارنى
ياخشى ئېرىتىپ، ئارىلاشتۇرۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

13 - نۇسخە: ماتىل ئۇسۇل

تەركىبى: چىڭسەي يىلتىزى، بېدىيان يىلتىزى 1
سەردىن، ئىزخىر 5 مىسقال، بىخ كەبىر 7 مىسقال،
ئارپا بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، قەنتە رېون،
ئاقىرقەرھە، زەنجىۋىل ھەربىرى 3 مىسقالدىن، قۇست،
ئۇزۇن زىراۋەند 4 مىسقالدىن، سىيادان 2 مىسقالدىن،
قەردمەنا، سۇزاپ ئۇرۇغى، شەتەرەنجى ھىندى 5 مىسقال -
دىن، قۇندۇز قەرى 2 مىسقال.

تەييارلاش: ئۇرۇق دورىلار يۇمشاق، يىلتىز دورى-
لار چالا سوقۇلىدۇ. 7 جىڭ سۇدا قاينىتىپ يېرىمى
قالغاندا سوزۇپ تەييارلىنىدۇ. بۇنىڭ ئۈستىگە ئىنەك
پىتى (بىدەنجىر) يېغى، ئايارەج پەيقارا 3 سەر قوشۇلىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: ھەركۈنى 12 مىسقال.

14 - نۇسخە: ھەبىي ئەپتىمۇن

تەركىۋى: ئەپتىمۇن، بىستىپايەج 1 مىسقالدىن،
قارا خەربەق، ھىندى تۇزى 2 مىسقال، ئۈستۈخۇددۇس
 $2 \frac{1}{2}$ فۇڭ، ئايارەج پەيقارا، غارىقۇن 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: ئايارەج ۋە غارىقۇندىن باشقا دورى-
لارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. غارىقۇن
سىم ئەلگەككە س-ۈركەپ ئۆتكۈزۈلۈپ، دورىلارغا قوشۇپ
بېدىيان سۈيى بىلەن خېمىردەك يۇغۇرۇپ كۈمۈلاچ قىلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 3 مىسقالدىن ھەر كۈنى ئاخ-
شامدا بىر قېتىم يېرىلىدۇ.

15 - نۇسخە: شەرۋىتى پەۋاكە (مەۋىلەر شەرۋىتى)

تەركىۋى: ئالما سۈيى، ئاچچىق ئانار سۈيى، بىيە
سۈيى، بۇلار ھەر بىرى 4 سەردىن، گىلاس سۈيى، تە-

مىرى ھىندى، زىرىخ، لىمون سۈيى، ھەربىرى 8 مىسقال -
 دىن. گۈل بىنەپشە، نىلۇپەر، يۇمغاقسۇت 4 مىسقالدىن.
 ئاقسەندەل، گازىۋان، ئالما چىچىگى، بىدىمىشكى
 $2 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، تەررە (بەگىرى

خاڭگا) ئۇرۇغى ھەربىرى $1 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن، چىلان 55
 دانە، تەرەنجىۋىل 2 سەر. سېرىق ھېلىلە پوستى
 $1 \frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: مېۋە سۇلىرى، تەمىرى ھىندى، تە-
 رەنجىۋىل ۋە سېرىق ھېلىلىدىن باشقىلىرى ئەرەق چە -
 قىرىش ئۇسۇلى بىلەن ئەرەق تارتىلىدۇ. تارتىلغان
 ئەرەق ئۈستىگە مېۋە سۇلىرى ۋە ئېرىتىلگەن تەمىرى ھىن-
 دى قوشۇلىدۇ. سېرىق ھېلىلە يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاش -
 ئۇرۇلىدۇ. تەرەنجىۋىل توپا - چاڭلاردىن تازىلىنىپ
 ئۈستىگە قويۇپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
 5 مىسقالدىن بىرسەرگە قەدەر ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

16 - نۇسخە: ئايارەج پەيقارا

تەركىبى: سۈمبۇل، دارچىن، سەلىخە، ھەببى بىلە -
 سان، ئۇدى بىلسان، مەستىكى رۇمى، ئاسارۇن، زەپەر،

ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. سەبەرە 6 مىسقال، ھەسەل 3

ھەسەل.

تەييارلاش: زەپەردىن باشقا دورىلارنى سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. زەپەرنى ئايرىم سوقۇپ بىرئاز
قىزىتىلغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئۈستىگە قالغان دو-
رنى قۇيۇپ خېمىردەك يۇغۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. 40
كۈندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 3 مىسقالدىن ھەركۈنى ئاخ-
شامدا بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

17 - نۇسخە: ھەببى قوقميا

تەركىمى: سەبەرە، ئەپسەلتىن، مەستىكى، غارقۇن
ھەر بىرى تەڭ مىقداردىن، شەھمى ھەنزەل، سوقمۇنسىيا
يېرىم ھەسسىدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، چىڭسەي ئۇرۇغىنىڭ سۈيى بىلەن خېمىر قە-
لىپ كۇمۇلاچ تەييارلىنىدۇ. غارقۇننى سوقماي، سىم
ئەلگەككە سۇرۇپ ئۆتكۈزۈش كېرەك.

يېمىش مىقدارى: بىرمىسقالدىن كۈنىگە بىر قې-
تىم (ئاخشامدا) بېرىلىدۇ.

18 - نۇسخە: مەجۇنى فەلاسىپە (مەجۇنى

مادە تولھايات)

تەركمەۋى: پىلىپل، قارىمۇچ، دارچىن، ئۇرۇغىدىن ئايرىلغان ئامىلە، بەلىلە پوستى، شەترەنجى ھىندى، زد- راۋەندى مۇدەھرەج، خۇسىيەتۇسسۇئىلەب، قارىغاي مۋسى (چەلغۇزە) مېغىزى، بابۇنە يىلتىزى، نارجىل ھەربىرى بىرسەردىن. بابۇنە ئۇرۇغى بەش مىسقال، ئۇرۇغسىز قۇرۇق ئۇزۇم ئۈچ سەر، شاقاقۇل بىرسەر. ھەسەل پۈتۈن دو- رىلارنىڭ 2 باراۋىرىدە.

تەييارلاش: مېغىز ۋە ئۇزۇم ئايرىم سوقىلىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئاۋال مېغىزلار ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇلۇپ، ئاندىن كېيىن قالغان دورىلارنى سېلىپ خېمىردەك يۇغۇرۇپ مەجۇن قىلى- ىدۇ چىنە قاچىدا 40 كۈن قويۇپ ئىستىمال قىلىنىدۇ. يىيىش مىقدارى: 2 - 3 مىسقالغا قەدەر چاي بىلەن كۈنىگە بىر قېتىم تاماقتىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

19 - نۇسخە: مەجۇنى نۇجاھ

تەركمەۋى: كابىل ھېلىلىسى، بەلىلە، ئامىلە پوستى ھەربىرى بىر سەردىن، قارا ھېلىلە بىر سەر. تۇربۇت،

بىستىپايەج، ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇس يېرىم سەردىن، ھە-
سەل 2 ھەسسە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئوتكۇزۇپ، ھەسەلنى ئېرىتىپ، دورىلارنى ئارىلاشتۇ-
رۇپ خېمىردەك ھەجۇن تەييارلىنىدۇ. چىسە قاچىلاردا
ساقلىنىپ 40 كۈندىن كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ.
يېمەش مىقدارى: 1-2 ھىسقالدىن 1-2 قې-
تىم تاماقتىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ. تەييارلانغان
دورنى كۈندە بىر قېتىم قۇچۇپ تۇرۇش كېرەك.

دىققەت: ھەسەلنى ئوت ئۈستىگە قويۇپ ئېرىتىش-
كە بولمايدۇ. ھەسەلنى قاچىغا ئېلىپ، سۇ قۇيۇلغان
قاچىدا قويۇپ قىزىتىلسا، سۇ قاينىغاندا ھەسەل ئېرىپ،
كوۋۇكلىرى يۇقۇرى ئورلىيدۇ.

20 - نۇسخە: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (ئەپتىمۇن

قايناتىمىسى) I

تەركىبى: ئەپتىمۇن، كابىل ھېلىلىسى، ئۇستۇخۇد-
دۇس، ھەر بىرى بىرسەردىن. شاتەرە، بىستىپايەج،
سانا ھەربىرى 5 ھىسقالدىن، غارىقۇن بىر ھىسقال، سەب-
رە ئىككى ھىسقال.

تەييارلاش: ئەپتىمۇن (سېرىق يۈگەي)دىن باشقا دو-
رىلارنى سوقۇپ، 6 جىڭ سۇ قۇيۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىدۇ.

لىمىدۇ. ئەپتىمۇننى بىر خالىغا سېلىپ، ئاغزىنى بېكىتىپ قازانغا تاشلاپ قويۇش لازىم. دورىلار داكا بىلەن سۇزۇپ، سىقىپ تەييارلىنىدۇ. سۇزۇلگەن دورا ئۈستىگە سەبرە ۋە غارىقۇننى (سىم ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلگەن) سېلىپ ئىستىمال قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر ئاز شىكەر سېلىپ ھەممە - سىنى بىراقلا ئىچىدۇ.

21 - نۇسخە: نۇشدارى ساددە (ئاددى نۇشدارى)

تەركىمى: سەئدى كوفى 5 مىسقال، قىزىل گۈل 6 مىسقال، قەلەمپۇر، مەستىكى، ئاسارۇن، سۇمبۇل 3 مىسقالدىن، زەرنەپ، كىچىك قاقىلە، چوڭ قاقىلە، بەسباسە، جويۇز، گۈل دارچىن، زەپەر 2 مىسقالدىن. ئامىلە 9 سەر، قەن 2 سەر، ھەسەل 9 سەر.
تەييارلاش ئۇسۇلى: 8 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش، يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 3 مىسقال - دىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

22 - نۇسخە: داۋائىل مىشكى شىرىن (ھار - ئىسسىق)

ئايلىشى، دۇرۇنەچ ئەقرەبى، تېشىلىمىگەن مەرۋا - يىت، كەھرىۋا، مارجان (كويىدۇرۇلگەن) ھەربىرى بىرسەر -

دىن، قىزىلغان پىلە، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، سۇمبۇل، قاقىلە، سازەج ھىندى، قەلەمپۇر ھەر بىرى بەش مىسقالدىن، ئۇشەنە، زەنجىۋىل، پىلىپىل ھەربىرى تۆت مىسقالدىن. ئىپار بىر مىسقال. ھەسەل پۈتۈن دورا مىقدارىدىن 2 ھەسسە ئارتۇق.

تەييارلاش ئۇسۇلى: (1) پىلە غوزىسىنى قىزىپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ، (2) مەرۋايىتىنى گۈلاپ بىلەن ئۇپىدەك سوقىلىدۇ. (3) ئىپارنى ئازراق قەن بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سوقىلىدۇ. (4) قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقاندەك قىلىنىدۇ. (5) ھەسەلنى ئېرىتىپ، ئۈستىگە مەرۋايىت، ئىپارنى سېلىپ ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن قالغان دورىلارنى سېلىپ، مەجۇن تەييارلاپ چىنە قاچىدا 40 كۈن قويۇپ تىندۇرۇلغاندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە $1 - 1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن ئىستىمال قىلىش كېرەك.

23 - نۇسخە: خەمىرى ئەۋرىشىم ①

تەركىبى: ئۇدى ھىندى، ئاق سەندەل كېپىكى ھەر بىرى بىر يېرىم مىسقالدىن، سۇمبۇل، پىستىنىك ① بۇ مىگە ۋە يۈرەكنىڭ ھەر خىل ئاجىزلىقلىرى ئۈچۈن مۇھىم دورا نۇسخىلىرىدىن بىرى.

تاشقى پوستى، پىشقان جۈيزە شوپىڭى، مەستىكى، قەلەمپۇر،
 لاچىندانە، سازەج ھىندى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، تېشىا-
 مىگەن مەرۋايىت، كەھرېۋا 3 مىسقالدىن، قىزىل ياقۇت
 $\frac{1}{2}$ 1 مىسقال، شاخ مارجان، بىخ مارجان ھەر بىرى 3 مىس-
 2

قالدىن، زەپەر 3 مىسقال، ئىپار، ئەنبەر $\frac{1}{2}$ 1 مىسقالدىن، پىلە
 غوزىسى (قايىنىلمىغىنى) 12 مىسقال، گازىۋان ئەرەقى،
 بېدىمىشك ئەرەقى، قىزىل گۈل ئەرەقى (گۈلاپ)، ئالما
 سۈيى، ئانار سۈيى ھەر بىرى 42 مىسقالدىن، پار سۈيى
 24 سەر، قەن 12 سەر، ھەسەل 6 سەر، ئالتۇن ۋەرەق،
 كۈمۈش ۋەرەق 40 دانىدىن.

تەييارلاش: ئاۋال پىلىنى ئەرەق ۋە سۇدا 3 كۈن
 چىلاپ قويغاندىن كېيىن يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ،
 ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، تازا سىقىپ، سۈيىگە قەن ۋە ئالما-
 ئانار سۇلىرىنى سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. مەرۋايىت، ياقۇت،
 مارجانلارنى كويدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، كەھرېۋا بىلەن
 قوشۇپ سالايە قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سو-
 قۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. زەپەر، ئىپار، ئەنبەرلەرنى
 سالايە قىلىپ، گۈلاپ بىلەن ئېرىتىپ، ئىلمان قىيامغا
 قوشۇپ، تازا ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، سوقۇلغان تالقان-
 لارنى ھاۋانچىغا ئاز-ئازدىن سېلىپ، بىر ياندىن ئىزىپ،
 بىر ياندىن ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ۋە ئەلگەكتىن يەنە بىر قېتىم
 ئۆتكۈزۈپ قىيامغا سېلىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئالتۇن، كۈمۈش

ۋەرەقلەرنى سېلىپ ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن چىنە - قا -
چىلارغا ئېلىپ ساقلىنىدۇ. يېيىش مىقدارى كۈنىگە 1-2
قېتىم، ھەر قېتىمدا 1 - 2 مىسقالدىن.

24 - نۇسخە: ماتىل ئۇسۇل

تەركىمى: بىخ كەبىر، بېدىيان يىلتىزى ھەربىرى
10 مىسقالدىن، چىڭسەي يىلتىزى، چىڭسەي ئۇرۇغى،
كىچىك سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان ھەربىرى
بىر مىسقالدىن. ئىزخىر 4 مىسقال، ھەبىي بىلىسان،
ئاسارۇن، جېنتىيانا ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، ئۇدى
بىلىسان، بوزىدان، سەلەخە، ھەزارئەسپەند 3 مىسقالدىن.
تەييارلاش: 3 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ
تەننىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
3 قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

25 - نۇسخە: مەجۇنى مەشەرتۇس

تەركىمى: ئىزخىر، ئۇستۇخۇددۇس، سىسالىيۇس،
كىمافىتۇس، مەستكى، پىلىپىل، ئوسارە لەھىيە تۇتتىس،
قۇندۇز قەرى، جاۋۇشىر، ئۇدى بىلىسان، قۇست شىرىن،
تاغ پىننىسى، ئۇشەق، ئىگىر، سەكبىنەج ھەربىرى 8

مىسقالدىن، سەلەخە، ئاقمۇچ، قارىمۇچ، سوزۇنجان مىسىرى،
 جوتىدە، ئوسقۇدرىيۇن، دۇقۇ، ئەكىلىل مىلىك ھەربىرى 7
 مىسقالدىن، پەتەر سالىيۇن، قەرەدمەنا، ئەپيۇن ھەربىرى
 5 مىسقالدىن، ئارپا بېدىيان 5 مىسقال، رۇمبېدىيان،
 ئاسارۇن ھەربىرى 3 مىسقالدىن، ئاقاقىيا 4 مىسقال،
 سەقەنقۇر بىر مىسقال، ھوفارقۇن $\frac{1}{2}$ 4 مىسقال. جېنتىيانا،
 رەۋغەنى بىلسان، قۇرس پەرىپىيۇن، مۇقىل ھەربىرى 7
 مىسقالدىن، سۇزاپ 2 مىسقال، نارجىل، سەمغى ئەرەبى
 5 مىسقالدىن. ھەسەل ئومۇمى دورىلار ئېغىرلىغى بىلەن
 3 باراۋەر.

تەييارلاش: يىلىم دورىلارنى رەيھان شەرۋىتىگە
 چىلاپ ئېرىتىلىدۇ. باشقا دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
 ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى قائىدە بويىچە ئېرىتىپ
 قوشۇپ، ئۈستىگە يىلىم دورىلارنى قويۇپ ياخشى ئېلىش-
 تۇرۇپ چىنە - قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە، 12
 ياشتىن تۆۋەن بالىلارغا بېرىلمەيدۇ. پالەچ ۋە لەقۋا
 كېسەللىكلىرىگە مائۇل ھەسەل (ھەسەل سۈيى) بىلەن
 بېرىلىدۇ. ئادەتتە كۈنىگە بىر قېتىم (سەھەردە) بىر
 مىسقالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ. زەھەرلىنىشلەردە ئەھۋالغا
 قاراپ كۈنىگە 3 - 6 قېتىم بېرىلىدۇ.

26 - نۇسخە: ھەبىي جەدۋار (پارپا كومۇلىسى)

تەركىۋى: جەدۋار (پارپا)، ئايلىشى، ئاق سەندەل، قەلەمپۇر، سەمغى ئەرەبى، دۇرۇنەج ئەرەبى، قارىمۇچ، دارچىن ھەربىرى 2 مىسقالدىن، زەپەر، ئاقسىر قەرەھ، ئىپار ھەربىرى يېرىم مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ قەن سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، قارىمۇچ چۆڭلۇغىدا كومۇلاچلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 12 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىشكە بولمايدۇ. چوڭلارغا كۈنىگە بىر قېتىم 7 - 5 دانە يېمىشكە بېرىلىدۇ.

27 - نۇسخە: ھەبىي مەنتىن

تەركىۋى: سەكبىنەج، ئۇشەق، جاۋۇشىر، مۇقىل، شەھى ھەنزەل، ئادراسمان، سەبىرە سۇ قوتىرى، تۇربۇت، سېرىق ھېلىلە پوستى، ئەلىزۇرۇت ھەممىسى ئوخشاش مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، كۈدە (جۈسەي) سۈيى بىلەن كۈمۈلاچ قىلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم، تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ.

28 - نۇسخە: ھەبىي پەرىپىيۇن

تەركىۋى: پەرىپىيۇن، مۇقىل، غارقۇن، سەكبىنەج،
شەھمى ھەنزەل ھەربىرى بىر ھەسسىدىن. سەبىرە سۇقۇ -
تەرى ئىككى ھەسسە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ (غارقۇننى سىم ئەلگەكتىن سۇرۇپ ئۆتكۈزۈپ)
كۈدە (جۈسەي) سۈيى بىلەن ھەب قىلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۈنىگە
بىر قېتىم.

29 - نۇسخە: مەجۇنى بالادۇر II

تەركىۋى: سۇمبۇل، سازەج ھىندى، سەلىخە، مۇرى
مەككى، زەپەر، شەھرۇمى، ئەپتىمۇن، ئىزخىر، رەۋەنچىنى،
ھەببىلبان، قەلەمپۇر، ئىرسا، سەبىرە ھەربىرى $\frac{1}{2}$ 7 مىس -
قالدىن، غارقۇن 8 مىسقال، بالادۇر 5 مىسقال، بىخ
بېدىيان 27 سەر، سىركە 45 سەر، ھەسەل 35 سەر.
تەييارلاش: بېدىيان يىلتىزىنى چالا سوقۇپ، بىر
كېچە ئازراق سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى سىركە بىلەن
قاينىتىپ، تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ، سۈيىگە ھەسەل سېلىپ

قىيام قىلىنىدۇ. باشقا دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قىيام بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ. **يېيىش مىقدارى:** تەييارلاپ چىنە قاچىدا ئالتى ئاي تۇرغاندىن كېيىن كۈنىگە $1 - \frac{1}{2}$ مىسقال بېرىلىدۇ. كىچىك بالا ۋە ئۆسمۈرلەرگە بېرىشكە بولمايدۇ.

30 - نۇسخە: رەۋغەنى قۇست (قۇستە يېغى)

تەركىمى: قۇستە تەلخى 1 سەر، قارىمۇچ، پەر-
پىيۇن 2 مىسقالدىن، ئاقىرقەرھە 4 مىسقال، قۇندۇز
قەرى $\frac{1}{2}$ 4 مىسقال، زەيتۇن يېغى 5 سەر.

تەييارلاش: قۇستە، ئاقىرقەرھە ۋە قارىمۇچلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە مۇسەللەسكە چىلىنىدۇ. ئەتىسى قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا زەيتۇن يېغى قوشۇلىدۇ. قايناپ خاس يېغى قالغاندا، پەرىپىيۇن، قۇندۇز قەرىنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قازاننى چۈشۈرۈش بىلەن تەڭ ياققا سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ شىشلەردە ئاغزىنى مەھكەم بېكىتىپ ساقلىنىدۇ.

ياغلاش ئۇسۇلى: كۈنىگە بىر قانچە قېتىم پەي ۋە باشقا ئەزالارنى ئاپتاپتا ياغلايدۇ.

31 - نۇسخە: رەۋغەنى قۇرۇتى

تەركىمىۋى: ئاق موم 1 سەر، توخۇ يېغى 5 مىسقال، كالا ئىلىگى 4 سەر، كۈنجۈت يېغى 2 سەر، بادام يېغى 1 سەر.
تەييارلاش: كۈنجۈت يېغىنى قىزىتىپ، ئۇستىگە ئاق مومنى سېلىپ، ئېرىپ بولغاندىن كېيىن، باشقىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. شىشلەردە ساقلىنىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: سىرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

32 - نۇسخە: خەمىرى گازىۋان

تەركىمىۋى: گازىۋان، ئاقلىغان يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى، قىزىقلانغان پىلە غوزىسى، ئاق بەھمەن، بالەنگۇ ئۇرۇغى، ئىكەكلىگەن ئاق سەندەل، پەرەنجى مەشكى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئەنەبەر $\frac{1}{2}$ مىسقال، كۆيدۈرۈلگەن مەرۋايىت، ئىپار $\frac{1}{4}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 24 سەر سۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتىسى $\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قايىنىتىپ سۇزۇپ، 12 سەر ناۋات بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. قىيام ئىلمان ھالغا كەلگەندە ئىپار، ئەنەبەر ۋە مەرۋايىتلارنى سالايە قىلىپ، سېلىپ ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئەشلىتىلىشى: $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم تاماقتىن
كېيىن بېرىلىدۇ.

33 - نۇسخە: مەجۇنى سەنچىرىنا

تەركىمى: قۇندۇز قەرى، دارچىن، ئەپيۇن، ئاسا-
رۇن، فۇھ (ئوردان)، موھ، دوقۇ ھەر بىرى بىر مىسقالدىن،
قارىمۇچ، پىلىپىل، بارى زەد، قۇشتە شىرىن ھەر بىرى ئالتە
مىسقالدىن، زەپەر يېرىم مىسقال، ھەسەل پۇتۇن دورىلار
ئېغىرلىغىنىڭ 3 باراۋىرىدە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ. 3 - 6
ئايدىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

يېمەش مىقدارى: يېرىم ياكى بىر مىسقالدىن
كۈنىگە بىر قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

34 - نۇسخە: مەجۇنى سورۇنجان

تەركىمى: سورۇنجان 6 مىسقال، بوزىدان، ماھى
زەھرەج، بىخ كەبىر، زىرە، شەترەنجى ھىندى، سېرىق
ھېلىلە پوستى ھەر بىرى 7 مىسقالدىن، چىڭسەي ئۇرۇغى،
ئارپا بېدىيان، ئاقمۇچ، ياپچان، نەمەكى ھىندى، پىننە

يۈپۇرمىغى، كوپۇڭى دەريا، ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن،

قىزىل گۈل، كۈنجۇت، زەنجىۋىل، سوقمۇنىيا ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. تۇربۇت 1 سەر، بادام يېغى 12 مىسقال، ھەسەل پۈتۈن دورا ئېغىرلىغىغا 2 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلاپ، ئۈستىگە بادام يېغىنى قۇيۇپ ئوبدان ئېلىشتۇرۇپ ساقلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: 2 - 3 مىسقالدىن كۈنىگە

1 - 2 قېتىم قايناقسۇ بىلەن يېمەشكە بېرىلىدۇ.

35 - نۇسخە: سۇپۇيى سورۇنجان I

(بىرىنچى سورۇنجان تالقىنى)

تەركىۋى: سورۇنجان مىسىرى 11 مىسقال، سانا

33 مىسقال، شەترەنجى ھىندى 9 مىسقال، زەپەر 1 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: ھەر كۈنى 3 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن كاپ ئېتىدۇ.

36 - نۇسخە: سۇيۇپى سورۇنجان II (ئەككىنچى)
سورۇنجان تالقىنى)

تەركىۋى: سورۇنجان مىسىرى، مەستىكى 1 مىس-
قالدىن، قىزىل گۈل 6 مىسقال، ھىندى تۈزى، رەۋەن،
زەنجىۋىل، رۇم بېدىيان $\frac{1}{2}$ 1 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 1 قېتىم 2 مىسقالدىن
قايناقسۇ بىلەن سەھەردە ئىچىدۇ.

37 - نۇسخە: ھەببى سورۇنجان (سورۇنجان
كومۇلىسى)

تەركىۋى: ئايارەج پەيقارا 1 سەر، تۇربۇت 1
سەر، شەھمى ھەنزەل، قەنتەرىون، سورۇنجان مىسىرى،
ماھى زەھەرەج، بوزىدان ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، پەر-
پىيۇن، زەنجىۋىل، قىچا، قۇندۇز قەرى 2 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ئايارەج پەيقارانى بىرئاز سۇدا ئېرىتىپ،
تالقان دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ خېمىر قىلىپ كومۇلاچ
ياسىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاخشامدا 12 دا -
نىدىن يەيدۇ.

38 - نۇسخە: مەتبۇخى ھېلىلە (ھېلىلە قاينىتىلمىسى)

تەركىمى: سېرىق ھېلىلە پوستى 1 سەر، تەمىرى
ھىندى 2 سەر، ئەينۇلا 30 دانە، سەرىستان، بىنەپشە، كە -
چىك سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، كاسىن ئۇرۇغى ھەر $\frac{1}{2}$
سەردىن، فۇنۇس 25 مىسقال، تەرەنجىۋىل 20 مىسقال.
تەييارلاش: فۇنۇس ۋە تەرەنجىۋىلدىن باشقىلارنى
چالا سوقۇپ (ئەينۇلنى پارچىلاپ قويۇلسا بولىدۇ)،
دورلار چوڭكىدەك سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى
يېرىمى قالغىچە قاينىتىلىدۇ. قازاننى ئېلىپ ئۈستىگە
تەرەنجىۋىل ، لەن فۇنۇس سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ
تەييارلىنىدۇ. ئاتادىن ئۆتكۈزۈپ سۇزۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: تەۋىپنىڭ مەسلىھەتى بويىچە
كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 - 4 سەرگىچە ئىچىشكە
بېرىلىدۇ.

39 - نۇسخە: مەتبۇخى شاتەرە (شاتەرە قاينىتىلمىسى)

تەركىمى: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسى، بەلىلە،
ئامىلىنىڭ پوستى $\frac{1}{2}$ سەردىن، شاتەرە، شۇمشە

(شياڭدوزا) 7 مىسقالدىن، قارا ھېلىلا 5 مىسقال، سانا 4 مىسقال. نىلۇفەر، مامىرانچىنى 1 مىسقالدىن. ئەپ-تىمۇن، قىزىل گۈل 3 مىسقالدىن، بېدىيان، كاسىن ئۇرۇغى، چىڭسەي ئۇرۇغى، بىستىپايەج، ئۇستۇخۇددۇس، يالىپۇز ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، چىلان، ئەينۇلا ھەر بىرى 20 دانىدىن (بۇلارنى چالا سوقۇپ، چىلانغىدەك سۇ قۇيۇپ بىر كېچە قويۇلسۇن). فۇنۇس، تەمرى ھىندى 15 مىسقال، تەرەنجىبۇل 3 سەر.

تەييارلاش: چىلانغان دورىلارنى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇستىگە فۇنۇس، تەمرى ھىندى، تەرەنجىبۇلنى سېلىپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ ماتا ئارقىلىق سۇزۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسىگە بىنا-ئەن ئىچىلىدۇ.

40 - نۇسخە: شىياڭ ئەھمەرلەيمىن

تەكلىۋى: شادىنەج، يۇيۇلغان ئەدەس 1 سەر، كويدۇرۇلگەن مىس 8 مىسقال. كەتىرا، سەمغى ئەرەبى، ساپ مۇرمەككى 2 مىسقالدىن، بىخ مارجان، كەھرىۋا، تېشىلىمىگەن مەرۋايت، سازەج ھىندى 4 مىسقالدىن، خۇنسىياۋشىيان، زەپەر 1 مىسقالدىن.

تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،

تۇخۇم ئېقى ياكى بىرەر لىۋئاب بىلەن خېمىر قىلىپ
جىگدە ئۇرۇغى چوڭلۇغىدا شامچە تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش: كۈنگە 2 - 3 قېتىم كوز ئىچىگە
سۈركەيدۇ.

41 - نۇسخە: سۈرمە رۇشنايى (كوزنى روشەن - لەشتۈرگۈچى سۈرمە)

تەركىبى: كويدۇرۇلگەن مىس، شادىنەج ھەربىرى
5 مىسقالدىن، زەڭگەر، سەبزە، بورە ئەرەمنى ھەربىرى
1 مىسقالدىن، قارىمۇچ، پىلىپىل، شەھىمى ھەنزەل ھەر
بىرى يېرىم مىسقالدىن، ئىقلىمىيا 2 مىسقال بۇلارنى
توزاڭدەك يۇمشاق سوقۇپ شىشلىرىدە ساقلىنىدۇ.
ئىشلىتىشى: كۈندە 2 قېتىم كوزگە سۈرمە قىلىپ
تارتىلىدۇ.

42 - نۇسخە: ھەببى مۇسەپپىل (سۈرگە كۇمۇلىسى)

تەركىبى: سېرىق ھېلىلى، كابىل ھېلىلىسى،
بەلىلىلەرنىڭ پوستى ھەربىرى بىر مىسقالدىن، سانا ئىككى
مىسقال. غارىقۇن، تۇربۇت، لاجىۋەرد ئىككى يېرىم مىس -
قالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كومۇلاچ ياسىلىدۇ.

يېمەش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە ئىستىمال قىلىنىدۇ.

43 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل III

تەركەۋى: چىڭسەي يىلتىزى، بىخ بېدىيان يىل - تىزى، بىخى كەبىر ھەربىرى 1 سەردىن، رۇمبېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى 2 مىسقالدىن. غافەس، ئەپسەنتىن، بۇ - دۇشقا ھەربىرى 5 مىسقالدىن، قەنتەرىون 3 مىسقال. تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە سۇغا چىلاپ قويۇلىدۇ. ئەتىسى 4 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ، 2 جىڭ قالغاندا سۇزۇۋېلىپ، بۇنىڭغا 4 سەر گۈلقەن قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5 ئاش قوشىغىدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

44 - نۇسخە: ھەببى زەھەب

تەركەۋى: سەبەرە سۇقۇتىرى ① 1 سەر، تۇرۇت

① سەبەرە سۇقۇتىرى - سەبەرەنىڭ بىر خىل ياخشى تۈرى بولۇپ، سېرىق رەڭدە پاقىراپ تۇرىدۇ.

7 مىسقال. سېرىق ھېلىلە پوستى 5 مىسقال. سوقمۇنىيا
 $3 \frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەدە-
 تىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كومۇلاچ
 تەييارلاپ، سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.
 يېيىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاخشامدا 2 مىس-
 قالدىن بېرىلىدۇ.

45 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل IV

تەركىمى: بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىلتىزى
 چىڭسەي ئۇرۇغى، پىرسياۋشان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى (بىخى
 سۇس) ھەربىرى 2 مىسقالدىن، ئارپا بېدىيان، رۇمبېدىيان،
 ئىزخىر ھەربىرى 3 مىسقالدىن، گۈلقەن 12 مىسقال.
 تەييارلاش: يىلتىز دورىلار چالاراق، ئۇرۇق دو-
 رىلار يۇمشاق سوقىلىدۇ. يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا
 بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى 4 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ،
 2 جىڭ قالغاندا سۇزۇپ، قاچىغا ئېلىپ، گۈلقەن قو-
 شۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر كۈندە بىر قانچە قېتىم -
 غا بولۇپ ھەممىسىنى ئىچىپ بولىدۇ

46 - نۇسخە: قۇرسى فېلدىپپۇن

تەركىمى: سۇ تەگمىگەن ئاھاك 3 مىسقال، قە-
زىل زەرنىخ، سېرىق زەرنىخ، قەلەي، ئاقاقىيا ھەربىرى
 $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئۈزۈم
سىركىسى بىلەن يۇغۇرۇپ قۇرىس (توقۇچاق) قىلىپ،
سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: كېرەك بولغاندا ئېزىپ جاراھەتكە
سېپىلىدۇ.

47 - نۇسخە: ئانار شەرۋىتى

تەركىمى: تاتلىق ئانار دانىسى بىر ھەسسە،
ئاچچىق ئانار دانىسى يېرىم ھەسسە، شېكەر ئۈچ ھەسسە.
تەييارلاش: ئانار دانىلىرىنى پاكىز نەرسە بىلەن
سىقىپ، سۇزۇپ، شېكەرنى سېلىپ، ئوتنى ئاستا قالاپ
ھۇشيارلىق بىلەن قاينىتىپ قىيام قىلىنىدۇ. ئوتنى
كۈچلۈك قالاپ شەرۋەت كويۇپ رەڭگى قارىداپ كېتىش-
تىن ساقلىنىش شەرت.
ئىشلىتىلىشى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە، كۈ-
نىگە 3 قېتىم ئېچىلىدۇ.

48 - نۇسخە: ئالما شەۋىتى

تەركمۇى: ئالمىنى سويۇپ ئىچىدىكى ئۇرۇقلىرىنى ئېلىپ تاشلاپ ئۇششاق توغرىلىدۇ ياكى قىرغۇش بىلەن قىرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن چىقىرىلغان سۇدىن بىر ھەسسە، شې-كەردىن 4 ھەسسە ئېلىپ قىيام قاينىتىلىدۇ.

تەييارلاش: ئالما سۈيىگە شېكەرنى سېلىپ، قىيام بولغىچە ناھايىتى سۇس ئوتتا ئاستا قاينىتىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە كۈ-نىگە 3 قېتىم، 5 - 10 مىسقالدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

49 - نۇسخە: مەجۇنى جەۋاردىش كۇمۇنى

تەركمۇى: زىرە (بىر كېچە سىركىگە چىلاپ قۇ-رۇتۇلغان) 18 سەر، قارىمۇچ 3 سەر، زەنجىۋىل، يالىپۇز 4 سەردىن، بورە ئېرىمىنى (توغرىغۇ) 1 سەر، سەلەخە، دارچىن، ھەببى بىلسان، قىرغە، سۇمبۇل، مەستىكى رۇمى 4 مىسقال.

تەييارلاش: زىرىنى مۇدەببەر قىلىش ئۇسۇلى — زىرىنى توپا، ئەخلەتلىرىدىن ئايرىپ، قاچىغا سېلىپ، زىرە ئۈستىگە زىرىدىن 4 ئىلىك يۇقۇرى چىقىرىپ سىركە قۇيۇلىدۇ. سىركە قۇيۇلغان زىرە بىر كېچە - كۈن -

دۇز تۇرغۇزۇلغانىدىن كېيىن سۇزۇۋېلىپ، سايە يەردە ئۈستىنى يېپىپ قۇرۇتۇلىدۇ. قۇرغاندىن كېيىن بىر ئاز قىزىتىپ قورۇلىدۇ. زىرە چالاراق سوقۇلىدۇ. قالغان دورىلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان قىلىنىدۇ. ھەسەلنى ئېرىتىپ، توغرىغۇنى سېلىپ، ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئاندىن كېيىن زىرە ۋە تالقان دورىلارنى ھەسەلگە سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 1 مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە بېرىلىدۇ.

50 - نۇسخە: مەلھىمى ئىسپىداج I

تەركىمى: سۇزۇك ئاق موم 3 مىسقال، گۈل يېغى 12 مىسقال، قەلەي ئۇپىسى $\frac{1}{2}$ 4 مىسقال، تۇخۇم ئېقى بىر دانە.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن قەلەي ئۇپىسى (تال-قىمىنى)، تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىزىلىدۇ. ئاندىن ئۈستىگە موم ۋە گۈل يېغىنى قۇيۇپ ئارىلاشتۇرۇپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

ئىشلەتمەش: ھەر خىل بوۋاسىر كېسەللىكلىرىگە سىرتقى تەرەپتىن ئىشلىتىلىدۇ.

51 - نۇسخە: رەۋغەن

تەركىمى: شۈمشە، سۈمبۇل، زىغىر، كالىك بەسەي،
سۈيى بىر ھەسسە، مەنسائىلە، بابۇنە، مۇقىل، ئەپسەنتىن،
زاراڭزا مېغىزى $\frac{1}{2}$ ھەسسە، ئاق موم، زەيتۇن يېغى،
توخۇ يېغى، كالا ئىلگى $\frac{1}{4}$ ھەسسە، زەپەر 1 مىسقال
مىقدارى.

تەييارلاش: دورىلارنى يېتەرلىك مىقداردىكى سۇ
بىلەن قاينىتىپ، تەمىنى چىقىرىپ، ياغلارنى سېلىپ
قايتا قاينىتىلىدۇ. سۈيى تۈگەپ يېغى قالغاندا ئېلىپ
ساقلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىششىقلىرىدا
سەرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

52 - نۇسخە: تەرياق ئەسنان

تەركىمى: قۇندۇز قەرى، ھەك، مۇرمەككى،
پىلىپىل، زىراۋەندى مۇدەھەرەج، زەنجىۋىل، مەنسائىلە،
ئەپيۇن، بەڭگى دىۋانە ئۇرۇغى تەڭ مىقدارلاردا ئېلىنىدۇ.
تەييارلاش: دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، تالقان

ھالىتىدە ئىشلىتىلىدۇ ياكى ھەسەل بىلەن ھەب تەييار -
لىنىدۇ.

ئەشلىتىلىشى: ھەر خىل چىش ئاغرىغى ئۈچۈن
چىشقا سېلىنىدۇ ياكى كومۇلىسى ئېغىزدا تۇتۇلىدۇ.

53 - نۇسخە: ھوقنە

تەركىۋى: بۇغداي كېپىكى بىر سەر، سېرىق چە -
چەك ئۇرۇغى 5 مىسقال. ئەكىللىل مىلىك 4 مىسقال،
ئەنجىر قېقى 7 مىسقال، تۇز 8 مىسقال، قارا شېكەر 12
مىسقال. ئەپكە ھەب بىر مىسقال.

تەييارلاش: قارا شېكەر، ئەپكە ھەب، تۈزدىن باش -
قىلىرىنى قاينىتىپ، سۇزۇپ كېيىن بۇلارنى قوشۇپ،
كلىزما ئۇسۇلى بىلەن ئارقا يولدىن بىر قېتىمدىلا كىرگۈ -
زۇلىنىدۇ.

54 - نۇسخە: مەتبۇخى خىيارى شەنبەر

تەركىۋى: چىلان 20 دانە، سەرپىستان 30 دانە،
ئۇرۇغى ئېلىنغان ئۇزۇم بىر سەر، بىنەپشە 4 مىسقال،
ئەنجۇر قېقى 10 دانە، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پىرسىياۋ -
شىيان ھەربىرى 5 مىسقالدىن، خىيارى شەنبەر ئىچىدىكى
گوش قىسمى 7 مىسقال، تەرەنجىۋىل 1 سەر.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىلىدىن باش-
 قىلىرىنى چالا سوقۇپ، بىر يېرىم جىڭ سۇ بىلەن قاي-
 نىتىپ، يېرىم جىڭچە قالغاندا قازاننى چۇشۇرۇپ، ئۇس-
 تىگە تەرەنجىۋىل بىلەن خىيارى شەنبەرنى سېلىپ تازا
 ئارىلاشتۇرۇپ، سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.
 ئىچىش مىقدارى: تۈۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە -
 چە 1 - 3 سەردىن ئىچىشكە بىرىلىدۇ.

55- نۇسخە: نوقوتى تەمرى ھىندى

تەركىۋى: تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىل باراۋەر
 مىقداردا.
 تەييارلاش: چىلاشقىدەك قايناقسۇغا 4 سائەتچە
 چىلاپ قويۇپ، ئوبدان تەمى چىققاندا سىقىپ، سۇزۇپ
 تەييارلىنىدۇ.
 ئىچىش مىقدارى: بىر پىيالىدىن كۈنىگە 3 قې-
 تىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

56 - نۇسخە شەۋىتى دىنارى

تەركىۋى: كاسىن ئۇرۇغى، قىزىل گۈل 2 سەر-
 دىن، كاسىن يىلتىزىنىڭ پوستى 4 سەر، نىلۇفەر، گا-
 زىۋان ھەربىرى 1 سەردىن، خالىتىغا ئېلىنغان كوشۇش
 ئۇرۇغى 3 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۇزۇۋېلىپ تەييارلىنىدۇ (كوشۇش ئۇرۇقى سوقۇلماي خالتا بىلەن قاينىتىلىدۇ). ئۈستىگە بىرىچىك قەن سېلىپ قىيام قىلىپ بولغاندىن كېيىن، بىرسەر رەۋەننى يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ھەر قېتىمدا بىرسەرنى تەڭ مىقداردا بېدىيان سۈيى بىلەن تەڭشەپ ئىچىشكە بېرىدۇ.

57 - نۇسخە: لۇتۇقى زەنجىۋىل (زەنجىۋىل يالانچۇغى)

تەركىمى: زەنجىۋىل 10 سەر، پىلىپىل 5 سەر، زەپەر 5 مىسقال، ئىشاستە 15 سەر، تەرەنجىۋىل 30 سەر، شېكەر 45 سەر.

تەييارلاش: زەنجىۋىلنى بىرقانچە كۈن كالا سۇ-تەگە چىلاپ، كۈندە بىر قېتىم يەڭگۈشلەپ تۇرۇپ ئۇنى تاكى زەنجىۋىل خۇددى مۇراببا ھالىغا كەلگىچە تەك-رارلىنىدۇ (تەگەر ھول ھالدىكى زەنجىۋىلنىڭ ئوزى بولسا ناھايىتى ياخشى. ئۇنى سۈتكە چىلاش ھاجەتسىز). كېيىن ئۇنى پاكىزلاپ ئۈستىگە يۇمشاق سوقۇلغان پىلىپىل سېلىنىدۇ. تەرەنجىۋىلنى بىرئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ

ماتا ئارقىلىق سۇزۇپ 45 سەر شېكەر بىلەن قوشۇپ قىيام قىلىنىدۇ. قىيام بولغاندا ئۇستىگە زەنجىۋىل بىلەن نىشاستىنى سېلىپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ پاكىزە قاقچىلارغا ئېلىپ ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھەركۈنى ئەتىگەندە بىر سەردىن.

58 - نۇسخە: لوئۇقى ئەنجۇر.

تەركىۋى: پىشقان ئەنجۇر 10 دانە، زۇفا، گۈل سوسەن ھەر بىرى 8 مىسقالدىن، شېكەر 12 سەر.

تەييارلاش: ئەنجۇرنى 2 چوڭ چىنە سۇدا يېردىمى قالغىچە قاينىتىپ، ئۇستىگە شېكەرنى سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھاجەت بولغاندا 4 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

59 - نۇسخە: لوئۇقى ھولبە (شۇمشە)

تەركىۋى: شۇمشە (شاڭدۇزا)، بادام مېغىزى 4 مىسقالدىن، كەتىرا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزنىڭ قويۇقلاشتۇرۇلغان قاينىتىلمىسى (رۇبى سۇس)، ياڭاق مېغىزى، نىشاستە، سەمغى ئەرەبى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئوتكۈزۈپ شېكەر قىيامى ياكى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ
تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھاجەت بولغاندا ئىككى مىس-
قالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

60 - نۇسخە: لۇئۇقى سەرپىستان

تەركمۈى: چىلان 50 دانە، سەرپىستان 30
دانە، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، بادام مېغىزى، تەرخەمەك
ئۇرۇغى 5 مىسقال، گۈل بىنەپشە 4 مىسقال، كەتە-
را 2 مىسقال.

تەييارلاش: چىلان، سەرپىستان، ئاق لەيلىلەرنى
2 چوڭ چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا 4
سەر قەن بىلەن قىيام قىلىپ قالغان دورىلارنى يۇمشاق
سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم بىر مىسقال-
دىن 2 مىسقالغىچە.

61 - نۇسخە: لۇئۇقى خەشخاش

تەركمۈى: ئاق كۆكنار (خەشخاش سەپىت)، قارا
كۆكنار ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، ئاقلىغان چۈچۈكبۇيا
يىلتىزى 8 مىسقال، ناۋات 4 سەر، كەتىرا، سەمىغى

نۆمبىرى 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش: كۆكنار ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنى سۇدا قاينىتىپ، ناۋات بىلەن قىيام قىلىپ قالغان دو-رىلانى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم بىر مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە ئىستىمال قىلىنىدۇ. كىچىك بالىلارغا بېرىشتە دىققەت قىلىش كېرەك.

ئەسكەرتىش: كۆكنار (خەشخاش) نىڭ تىلىپ ئەپ-يۇنى ئېلىنىشىنى ياخشى ھىساپلىنىدۇ.

62 - نۇسخە: ھەببى غارىقۇن

تەركىبى: غارىقۇن (سىم ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ، سوقۇلمايدۇ) 3 مىسقال، تۇرپۇت 5 مىسقال، شەھى ھەن-زەل، ئەنزۇرۇت 2 مىسقال، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنىڭ قويۇق لاشتۇرۇلغان قاينىتىلمىسى بىر مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئايارەجنى بىر ئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ، قار-مۇچ چوڭلۇغىدا ھەب قىلىپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 12 - 20 دانىدىن ھەركۈنى

ئاخىدامدا ئىچىدۇ.

63 - نۇسخە شەرۋىتى زۇفا II

تەركىۋى: ئارپابېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى 5 مىس-
قالدىن، زۇفا، پىرسىياۋشيان 7 مىسقالدىن، ئەنجۈر، چىلان،
سەرىستان ھەربىرى 20 دانىدىن، ئۇرۇقسىز چوڭ ئۇزۇم
3 سەر، شۇمشە ئۇرۇغى، ھەمشىۋا ئۇرۇغى، گۈل سوسەن،
پاراسيون 3 مىسقالدىن، قەن 20 سەر، گۈلقەن 10 سەر
(ئەگەر مۆتىدىللىرىك قىلىش لازىم بولسا نىلۇفەردىن 3
مىسقال، كوكنار ئۇرۇغىدىن 3 مىسقال ئېلىنىدۇ. گۈلقەن
ئورنىغا تەرەنجىۋىل سالىسا بولىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ 3 چىنە سۇغا بىر
كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قايىنىتىپ
سۈزۈپ، سىقىپ ئۈستىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.
كېيىن گۈلقەن سېلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا
6 ئاش قۇشىغىدىن بېرىلىدۇ.

64 - نۇسخە: ھەبىي پىلپىل (قارىمۇچ كۇمۇلىسى)

تەركىۋى: قارىمۇچ، قۇيۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا
قايىناتەمسى، شېكەر ھەر بىرىنى باراۋەردىن ئېلىپ، يۇم-

شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن قارسۇچ چوڭلۇغىدا ھەب قىلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: بىردىن بىر ھاجەت بولغاندا ئېغىزدا تۇتۇپ شۇمىدۇ.

65 - نۇسخە: مەجۇنى بىنەپشە II

تەركىمى: گۈل بىنەپشە، بادام مېغىزى ھەربىرى بىر سەردىن، مەستىكى، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا قايناتىمىسى بەش مىسقال، تۇرپۇت بىرسەر. تەرەنجىۋىل، پۇنۇس، خىيارى شەنبەر ھەربىرى بەش سەردىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالغان قىلىنىدۇ. تەرەنجىۋىل بىلەن پۇنۇسنى ئومۇمى دورىنىڭ 2 باراۋەر ۋەزىنىدىكى سۇ بىلەن ئېرىتىپ تەمى چىقىرىلىدۇ. كېيىن سۇزۇۋېلىپ، سۈيىگە قەن سېلىپ، قىيام تەييارلاپ، بۇنىڭ ئۈستىگە تالغانلارنى سېلىپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 3 - 5 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

66 - نۇسخە: شۇمشە دەملەمىسى

تەركىمى: شۇمشە ئۇرۇغى 10 مىسقال، بىنەپشە 4 مىسقال، بېدىيان 2 مىسقال، قۇرۇق ئۇزۇم 30 دانە.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، يېتەرلىك سۇ بىلەن قاينىتىپ، قەن قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
مىقدارى: كۈنىگە 3 فېتىم ھەر قېتىم 6 ئاش قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

67 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەنسىل (ياۋا پىياز شەرۋىتى)

تەركىمى: ياۋا پىياز (ئەنسىل) 6 سەر، رۇمبىدد - يان 6 مىسقال، ئورۇقسىز ئۈزۈم 40 سەر، ئەنجۈر 14 دانە، شېكەر 12 سەر.

تەييارلاش: ياۋا پىيازنى ياغاچ پىچاق بىلەن ئاقلاپ، دورىلارنى سوقۇپ، 3 چوڭ چىنە سۇغا (قاينا سۇغا) بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى سىقىپ، سۇزۇپ، شېكەر بىلەن قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئەتىگەن تاماقتىن ئىلگىرى چاي قوشۇغىدا 1 - 2 قوشۇقتىن ئىچىلىدۇ.

68 - نۇسخە: مەجۈنى زىراۋەند

تەركىمى: زىراۋەند مۇدەھەرەج، قەرەدما، پىلىپىل، ئىسپەندان ئۇرۇغى، ئاچچىق بادام مېغىزى، ئەنجۈر بۇلار ھەربىرى 5 مىسقالدىن قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈك - بۇيا قاينا تىمىسى، زۇفا، پىرسىياۋىش ھەربىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە 1 - 2 مىسقالدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

69 - نۇسخە: شەرۋىتى خەشخاش (كوكنار شەرۋىتى)

تەركىۋى: كوكنارغوزىسى (ئۇرۇغى بار بولغىنى ۋە ئەپيۇن تەركىۋى ئېلىنىمىغىنى ياخشى)، يۈز دانە، گۈلاپ 45 سەر، قەن 27 سەر.

تەييارلاش: كوكنارنىڭ پوستىنى چالا، ئۇرۇغىنى يۇمشاق سوقۇپ، گۈلاپقا بىر كىچىك چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى سۇزۇپ، تېرىپىنى سىقىپ سۈيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر چاي قوشۇقتىن كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ. كىچىك بالىلارغا بېرىشكە بولمايدۇ.

70 - نۇسخە: ھەببى سۇئال (يوتەل كۇمۇلىسى)

تەركىۋى: نىشاستە، بىنەپشە، تاتلىق بادام مېغىزى، كوكنار شاكىلى، گىلى ئەرمىنى، كەتىرا، كوكنار ئۇرۇغى، پۇرچاق، سەمغى ئەرمەبى 3 مىسقالدىن، ئىسپۇغۇل 5 مىس - قال (لۇئابى چىقىرىپ قوشۇلىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۈت-
كۈزۈپ ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن ھەب تەييارلاپ سايىدا
قۇرۇتۇلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھاجەت ۋاقتىدا بىر دانىدىن ئېغىزغا
سېلىپ شۇمۇشكە بېرىلىدۇ.

71 - نۇسخە: قۇرسى كەھربا

تەركىۋى: كەھربا، گىل ئەرمىنى، سەمى ئەرەبى،
خۇنسىياۋشىيان، تاباشىر، نىشاستە، كەتىرا، ئاقاقىيا، ئانار
گۈلى تەڭ مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۈتكۈزۈپ، پاقا-يوپۇرمىغى سۈيى ۋە گازىۋان سۈيى
بىلەن خېمىر قىلىپ يۇغۇرۇپ قۇرس (توقسچاق)
تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە
1 - 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

72 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەنجىبار (ئۈرگۈنەك شەرۋىتى)

تەركىۋى: ئەنجىبار 7 مىسقال، ئاق سەندەل،
قىزىل سەندەل (ئىككىگە ئىگىنى) 5 مىسقالدىن ئاقاقىيا
2 مىسقال، قەن 12 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، 3 چوڭ
چىنە قايناقسۇغا بىر كىچىچە چىلاپ، ئەتىسى سۇزۇپ
تىرىپىنى ئوبدان سىقىپ، سۈيىگە قەن سېلىپ قىيام
تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئۆزىنى يالغۇز ياكى باشقا
قان توختاتقۇچى دورىلار بىلەن بىللە 3 قوشۇقتىن
ئىچىلىدۇ.

73 - نۇسخە: مەتبۇخى مۇلەيىپىن (تەرەتنى يۇمشاتقۇچى قايناتما)

تەركىبى: سەرپىستان، چىلان 25 دانىدىن، ئاق
لەيلى ئۇرۇغى، بىنەپشە 3 مىسقالدىن. بابۇنە 2 مىس-
قال، خىيارى شەنبەر، تەرەنجىبۇل 15 مىسقالدىن
(سوقۇلمايدۇ).

تەييارلاش: سوقمايدىغان دورىلارنى يېرىم چوڭ
چىنە قايناقسۇغا چىلاپ، 4 سائەتچە دۇملەپ قويغاندىن
كېيىن سىقىپ سۇزۇۋېلىپ، قالغان دورىلارنى بىر چىنە
سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۇزۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا
بىر پىيالىدىن ئىچىدۇ.

74 - نۇسخە: شەرۋىتى بىنەپشە

تەركمۇى: ھول بىنەپشە (گۈلى بولغىنى ياخشىراق)

$4\frac{1}{2}$ سەر. پار سۈيى (ياكى گۈلاپ) 18 سەر، قەن 5 سەر.

تەييارلاش: گۈلاپقا بىنەپشنى بىر كېچە - كۈندۈز

چىلاپ قويۇپ، $\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ ئۇس -

تىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: 2 - 3 قوشۇقتىن كۈندە 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ئەسكەرتىش: ئەگەر بىنەپشنىڭ ھۆل تۈرى بولمىسا قۇرۇق بىنەپشنى 7 باراۋەر گۈلاپقا چىلاپ، سۈنى پۈتۈنلەي شىمىرىپ بولغانغا قەدەر قويۇلسا ھول بىنەپشە بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

75 - نۇسخە: شەرۋىتى نىلۇفەر

تەركمۇى: نىلۇفەر 5 سەر، قەن بىر جىڭ،

گۈلاپ 18 سەر.

تەييارلاش ۋە ئىچىش مىقدارى: 74 - نۇسخە

بىلەن ئوخشاش.

76 - نۇسخە: قۇرسى كافۇر

تەركىمى: قىزىل گۈل 2 مىسقال، تاباشىر 4 مىسقال، ئاق سەندەل 2 مىسقال، سېمىز ئوت ئۇرۇغى 3 مىسقال. خاڭگا، تەرخەمەك، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى 5 مىسقالدىن، زەپەر 1 مىسقال، كاپۇر $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن بىر فۇڭلۇق تەڭگە چوڭلۇغىدا قۇرس تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: ئانار شەرۋىتى بىلەن كۈنىگە 2 قېتىم 1 - 2 دىن بېرىلىدۇ.
گەسكەرتىش: تال كېسەللىكىدە ئىشلەتكەندە رەۋەن، ئۇساقۇردىنلارنى $\frac{1}{2}$ 1 مىسقالدىن قوشۇلىدۇ.

77 - نۇسخە: خېمىرى سەندەل

تەركىمى: ئاق سەندەلنى گۈلاپقا سۇرۇپ قۇ - رۇتۇلغان تالقىنى گازىۋان گۈلى، قىزىلغان پىسلە، قىزىل گۈل ئەرەقى، بىدىمىشك ئەرەقى ھەر بىرى $\frac{1}{3}$ 3 مىسقالدىن، زەپەر يېرىم مىسقال، قەن $\frac{1}{2}$ 5 سەر.

تەييارلاش: ئەرەقلەر بىلەن قەنىنى قىيام قىلىپ،
 قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قىيامغا سېلىپ،
 خېمىردەك قىلىپ تەييارلىنىدۇ.
 ئىشلەتمەش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر
 قېتىم بېرىلىدۇ.

78 - نۇسخە: شەرۋىتى بادىرەنجىبۇيا

تەركىبى: بادىرەنجىبۇيا ئۇرۇغى، كاسىن ئۇرۇغى،
 فەرەنجى مىشىكى 20 مىسقالدىن، گازىۋان 30 مىسقال،
 چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 10 مىسقال، بېدىيان، بىسپايەج
 7 مىسقال، گۈلاپ 6 مىسقال، تاتلىق ئالما سۈيى
 22 سەر، قەن 24 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، گۈلاپ ۋە
 ئالما سۈيى بىلەن $\frac{1}{3}$ قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ،
 سىقىپ، سۈيىگە قەن سېلىپ، قىيام قىلىپ شىشە قاچى-
 لاردا ساقلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
 4 قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

79 - نۇسخە: گازىۋان شەرۋىتى

تەركىبى: ھول گازىۋان، قەن بۇلار ھەربىرى
 20 سەردىن، گۈلاپ 2 سەر.

تەييارلاش: بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ قاينىتىپ قىيام قىلىپ تەييارلاپ پاكىزە شىشىلەردە ساقلىنىدۇ.
 ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم 4 قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

ئەگەر ھول گازبۇدان بولمىسا قۇرۇق گازبۇداننى قايناق- سۇ ياكى گۈلاپقا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ ئەتىسى قاينىتىپ، سۈزۈۋېلىپ 3 ھەسسە قەن ياكى شېكەر بىلەن قىيام قىلىنىدۇ.

80 - نۇسخە: سەندەل ئەرەقى

تەركىمى: قىزىل گۈل، كاسىن ئۇرۇقى، بىدىمىشكى، نىلۇپەر ھەربىرى 1 سەردىن، ئاق سەندەل كىپىگى، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇقى، زىرىخ، ئالما چىچىگى، بىيە چىچىگى ھەر بىرى $\frac{1}{2}$ سەردىن.

تەييارلاش: بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى 6 ھەسسە سۇ قوشۇپ ئەرەق تارتىش ئۇسۇلى بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئوزۇننى يالغۇز ياكى باشقا مۇناسىۋەتلىك دورىلار بىلەن بىر ئاش قوشۇقتىن 3 قېتىم بېرىلىدۇ.

81 - نۇسخە: مەجۇنى داۋائىلىمىشكى تەلخى
(قېرىق داۋائىلىمىشكى مەجۇنى)

تەركىمى: ئەپسەنتىن، سەبىرە سۇقوتىرى، زىراۋەندە،
مۇدەھرەج، دۇرۇنەج ئەقرەبى ھەربىرى $6\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.
جۇۋىنە، زەپەر، چىگىسەي ئۇرۇغى 4 مىسقالدىن، سۇمبۇل،
سازەج ھىندى 2 مىسقال، قۇندۇز قەرى، ئىپار بىر
مىسقالدىن، سۇزۇلگەن ھەسەل 110 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: 2 - 1 مىسقالدىن كۈنىگە
2 قېتىم.

82 - نۇسخە: مەجۇنى فۇلۇنىيا

تەركىمى: ئاقىر قەرھا، پەرىپىيۇن، سۇمبۇل، بەگىكى
دېۋانە ئۇرۇغى ھەربىرى 1 مىسقالدىن، زەپەر 5 مىسقال،
ئەپيۇن 2 مىسقال، ئاقمۇچ 20 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: كېسەل بەدىنىنىڭ قۇۋۋەت

ئەھۋالىغا قاراپ نوقت چوڭلۇغىدا ياكى ئۈنىڭدىن
چوڭراق بېرىلىدۇ.

83 - نۇسخە: مەجۇنى فەلافى I

تەركمۇى: ئاقمۇچ، قارىمۇچ 15 مىسقالدىن، ئۇدى
بىلىسان $7\frac{1}{2}$ مىسقال، سۇمبۇل، ھۇماما 4 مىسقالدىن،
زەنجىۋىل، چىڭگىسەي ئۇرۇغى، سىسال-مىيۇس، سەلىخە،
ئاسارۇن، راسەن بىر مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: قايناقسۇ بىلەن كۈنىگە بىر
مىسقالدىن ئىچىلىدۇ.

84 - نۇسخە: مەجۇنى مۇپەررەھى ياقۇتى II

تەركمۇى: تاباشىر، گازىۋان، كاسىن ئۇرۇغى ھەر -
بىرى 3 مىسقالدىن، ئامىلە 15 مىسقال، ئاق سەندەل،
قىزىل سەندەل، قىزىل گۈل، تىشىلىمىگەن مەرۋايىت،
مارجان 4 مىسقالدىن (كۆيدۈرۈلگەندىن كېيىنكى ۋەزنى)،
كەھرىۋا 4 مىسقال، زەپەر يېرىم مىسقال، ئالتۇن ۋە -
رەق، كۇمۇش ۋە رەق ھەر بىرى $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: مارجان، مەرۋايىتلارنى كۆيدۈرۈپ

سالايە قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ئالما شەرىۋىتى (48 -
نۇسخە) بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن 2 قېتىم
قەھۋە (كافى) بىلەن بېرىلىدۇ.

85 - نۇسخە: مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى III

تەركىبى: ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، ئايلىشى
2 سەر دىن. دۇرۇنەج ئەقرەبى، بادىرەنجىبۇيا، ئاق ئۇدى
قىمارى ھەر بىرى 1 مىسقالدىن، قەلەمپۇر؛ سۇمبۇل، زەپەر،
ھەر بىرى 5 مىسقالدىن. ئالتۇن ۋەرەق $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ياخشى ئالما شەرىۋىتى (2 ھەسسە) بىلەن
مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالنى ئىشە -
رىشىم شەرىۋىتى (86 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

86 - نۇسخە: شەرىۋىتى ئەۋرىشىم (پىلە غۇزىسى شەرىۋىتى)

تەركىبى: ئاق پىلە (يىمپەك غوزىسى) 6 سەر،
ناۋات 36 سەر، قىزىل گۈل گۇلابى، گازىۋان گۇلابى،

بىدىمىشكى گۇلابى ھەر بىرى بىر جىڭ (16) سەردىن،
سۇمبۇل، پەرەنجى مىشكى، ئاق سەندەل كىپىڭى، ئۇشە
ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، مەستىكى 2 مىسقال، خۇلىنجان، ئىگىر
5 مىسقال، زەپەر $\frac{2}{1}$ مىسقال، ئىپار 1 فۇڭ.

تەييارلاش: پىلە غوزىسىنى قاچا بىلەن ئۇشاق
قىرقىپ، قۇرۇتىنى تازىلاپ، قەلەيلەنگەن مىس قازانغا
ياكى چىنە قاچىغا سېلىپ گۇلاپقا بىر كېچە - كۈندۈز
چىلاپ قويۇش لازىم. ئەتىسى ئىگىر، سەندەل ۋە خۇلىن -
جاننى سېلىپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىش كېرەك. ئۇندىن
كېيىن ماتا ئارقىلىق سۇزۇپ، سىقىپ، سۇيىگە نىۋاتىنى
سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.

قىيام سۈۋىتىدىن كېيىن، زەپەر بىلەن ئىپارنى
سالايە قىلىپ قوشىلىدۇ. ئاندىن قالغان دورىلار سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئوزۇنى يالغۇز ياكى باشقا
دورىلار بىلەن قوشۇپ، كۈندە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
2 - 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

دىققەت: قىيام قىلغاندا ئوتنى ئاستا قىلاش كېرەك،
بولمىسا ئاسانلا تېشىپ كېتىدۇ.

ئەگەر گۇلاپلار بولمىسا، شۇ دورىلارنىڭ ئوزۇنى
سۇ بىلەن قاينىتىپ تەمىنى ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. ئەمما
گۇلاپنىڭ بولغىنى ئەۋزەل.

87 - نۇسخە: مەجۇنى ئايارەج ئوغانىزىيا

تەرگىۋى: شەھىتى ھەنزەل 5 مىسقال، پىشۇرۇلغان
ياۋا پىياز (ئەنسەل)، غارقۇن، سۇقمۇنىيا، قازا خەرىق،
ئۇشەق، ئوسقۇدرىيۇن ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، ئەپتىمۇن،
كىمازيۇس، مۇقىل، سەپىرى، ھەر بىرى 3 مىسقالدىن،
ھاشا، ھۇقارقۇن، سازەج ھىندى، فراسون، سەلىخە،
پىلىپىل، ئاقمۇچ، قارمۇچ، جاۋۇشەر، زەپەر، داچىن، پىستىپايەج،
قۇندۇز قەرى، مۇرى مەككى، پەتەرسالىيۇن، زىۋاۋەند -
تەۋىل، ئوسارە ئەپسەنتىن، پەرىپىيۇن، ھۇما، زەنجىۋىل،
ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، جىپىتىيانا، ئۇستۇخۇددۇس
ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ھەسەل ئومۇمى دورىلار

ۋەزىندىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى قاننىدە بويىچە يۇمشاق
سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 4 - 2 مىسقالدىن كۈنىگە 1 - 2
قېتىم قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

88 - نۇسخە: ئىسكەنجىمىن سەپەر جىلى (بىيە ئىسكەنجىمۇلى)

تەرگىۋى: بىيە، سىركە ھەر بىرى 9 سەردىن، سۇم -

بۇل، قەلەمپۇر، دارچىن ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، شېكەر 12 سەر.

تەييارلاش: بىيەنى توغراپ، سىركە ۋە 3 چوڭ چىنە سۇ بىلەن يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، تازا سىقىپ، ئۈستىگە شېكەرنى سېلىپ، قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. قىيام ئىلما بولغاندا قالغان دورىلارنى، سوقۇپ قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر ئاش قوشۇغىدىن كۈنىگە 3 قېتىم.

ئەسكەرتىش: يەنە بىر نۇسخىدا مەزكۇر دورىلارنى بىر خالتىغا ئېلىپ، قىيام بىلەن بىللە قاينىتىپ تەييارلاشنى كۈتسە تەكەن.

89 - نۇسخە: شەرۋىتى زىرشىك (زىرىخ شەرۋىتى)

تەركىۋى: زىرىخ سۈيى بىر ھەسسە، شېكەر 5 ھەسسە.

تەييارلاش: زىرىخ سۈيىگە شېكەرنى سېلىپ، سۇس

ئوت بىلەن $\frac{1}{3}$ قالغىچە قاينىتىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: 2 ئاش قوشۇقتىن كۈنىگە

3 قېتىم بېرىلىدۇ.

دىققەت: ئوت بەك تېز كېتىپ قېلىپ، دورا

رەڭگىنىڭ قارىيىپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىش زورۇر.

90 - نۇسخە: جەۋارىش تەمرى ھىندى

تەركىمى: تەمرى ھىندى 12 سەر، ئانار سۈيى بىرسەر، لاچىندانە بىر مىسقال. گازىۋان، مەستىكى 2 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى 3 مىسقال، قەن 4 سەر، يۇمىخاقسۇت ئۇرۇغى 2 مىسقال.

تەييارلاش: تەمرى ھىندىنى بىر ئاز قايناقسۇدا ئېرىتىپ سۇزۇپ، ئانار سۈيى بىلەن قوشۇپ قەنىنى سىلىپ قىيام قىلىندۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قىيام ئىلىمان بولغاندا قوشۇلىدۇ. يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم، 5 مىسقال - دىن بېرىلىدۇ.

91 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەپسەتتىن

تەركىمى: ئەپسەتتىن رۇمى 5 مىسقال، قىزىل گۈل 7 مىسقال، شاتەرە، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 2 مىسقال، قارا ئۇرۇك 20 دانە، تەمرى ھىندى 20 مىسقال.

تەييارلاش: 2 جىڭ قايناقسۇغا چىلاپ، تازا تەمى چىققاندا ماتادىن سىقىپ، سۇزۇپ، قاينىتىپ پاكىزە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

ئېچىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئەتىگەندە 40

مىسقالنى 10 مىسقال شېكەر، بىر مىسقال سەبەرە بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

92 - نۇسخە: جەۋارىش ئۇد (I)

تەركمۇ: ئۇدى ھىندى، سۇمبۇل، مەستىكى، قەلەمپۇر، لاچىندانە، جەۋزبەۋا ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، كابۇل ھېلىلىسىنىڭ پوستى، چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، تورۇنجى پوستى، بوزۇغا، بادىرەنجىبۇيا $\frac{1}{2}$ 1 مىسقالدىن، زەپەر، بەسباسە، زەنجىۋىل ھەر بىرى يېرىم مىسقالدىن. تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، 6 سەر قەنىي قىيام قىلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

93 - نۇسخە: جەۋارىش ئۇد (II)

تەركمۇ: ئۇد ھىندى، ئارپا بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، ئىگىر، سۇمبۇل، ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. كافۇر 2 فۇڭ، ئىپار 2 فۇڭ. بەسباسە، نارمىشكى، فەرەنجى مىشكى، سەئىدى كۇفى، بوزۇغا، زەرنەپ 1 مىسقالدىن. دارچىن، مەستىكى، زەنجىۋىل، قارىمۇچ، پىلىپىل، قەلەمپۇر بىر سەردىن، گازىۋان 5 مىسقال، ھەسەل 18 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ھەسەلنى سەل ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر ياكى ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ.

بۇ نۇسخە ئەبۇ ئەلى ئىبنىسىنانىڭ تەجرىبىسىدىن ئۆتكەن نۇسخە بولۇپ، مەئدە، يۈرەك كېسەللىكلىرى ۋە نەپەس قىيىنلىشىشلارغا بېرىلىدۇ.

94 - نۇسخە: ھەببى سەكبىنەج

تەركىمى: سەبرە سوقۇتىرى، سەكبىنەج، مۇقىل، غارىقۇن باراۋەر مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى بۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ ھەب تەييارلىنىدۇ، سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 1 - $\frac{1}{2}$ مىسقالغىچە كۈنىگە

بىر قېتىم كەچقۇرۇن بېرىلىدۇ.

95 - نۇسخە: قۇرسى ئەنسىۋن (رۇمبىدىيان

توقچىغى)

تەركىمى: ئەنسىۋن (رۇمبىدىيان)، چىڭگىسەي ئۇرۇغى

5 مىسقالدىن، ئاسارۇن، ئاتلانغان بادام مېغمىزى 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قاي -

ناقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ $1 \frac{1}{2}$ مىسقاللىقتىن قۇرس

قىلىنىدۇ. سايىدا قويۇپ قۇرۇتلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم بىر دانىدىن

ئىسكەنجىۋىل بىلەن بېرىلىدۇ.

96 - نۇسخە: قۇرسى كەۋكەب (پاقىراق تاش

توقمىچى)

تەركىۋى: سۇمبۇل، قۇندۇز قەرى 4 مىسقالدىن،

مورى مەككى، سەلىخە، يەبرۇجى سەنەم 4 مىسقالدىن،

ئەپيۇن، زەپەر، قۇستە كەۋكەبلىرىز (تەلىق) 5 مىس -

قالدىن، كوكئار، رۇمبىدىيان، سىسالىيۇس، مئە سائىلە،

بەڭگى دىۋانە، چىڭسەي ئۇرۇغى ھەربىرى 6 مىسقالدىن.

تەييارلاش: يىلىم دورىلارنى بىر ئاز سۇ بىلەن

ئېرىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ سېلىپ،

يېرىم مىسقالدىن قۇرس تەييارلىنىدۇ (ھەسەل بىلەن

تەييارلاشقىمۇ بولىدۇ). سايىدا قۇرۇتۇپ ھاجەت ۋاقتىدا

ئىستىمال قىلىنىدۇ.

ئىشلىتىش مىقدارى: بىر دانىدىن 2 قېتىم

تېۋىپنىڭ كورسەتمىسى بىلەن بېرىلىدۇ.

97 - نۇسخە: مەجۇنى جەۋارىش شەھرى ياران

تەركمۇ: قەلەمپۇ، گۈل دارچىن، سەلىخە،
سۇمبۇل، جەۋزبەۋار، لاچىندانە، قاقىلە، ھەببى
بىلسان، زەپەر $4\frac{1}{2}$ مىسقالدىن. سوقمۇنىيا 3 مىسقال،

توربۇت، ھەشىقى پىچەك ئۇرۇغى 8 مىسقال، قەن $6\frac{1}{2}$

سەر، ھەسەل 13 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ (ئەلگەكتىن ئوت-
كوزمەي) قەنىنى بىر ئاز سۇ بىلەن قىيام قىلىپ ھەسەل
بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇستىگە دورىلارنى سېلىپ تازا
قوچۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر
قېتىم ئىچىدۇ.

98 - نۇسخە: جەۋارىش سەپەر جىلى (بىيە جەۋارىشى)

تەركمۇ: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە — سوق-
مۇنىيا 2 مىسقال، توربۇت بىر سەر، قاپاق، خاڭگا،
قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزى 5 مىسقالدىن، قىزىل گۈل
 $2\frac{1}{2}$ مىسقال، تەرەنجىبۇل 25 سەر، بىيە سۈيى 20 سەر،

سوغاق مەزاجلىق كىشىلەرگە -- مېغىزلارنىڭ ئورنىغا زەنجىۋىل، دارچىن، مەستىكى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن قوشۇلىدۇ.

تەييارلاش: تەرەنجىۋىلنى سۇدا، ئېرىتىپ، سۇزۇپ، سۈيىگە بىيە سۈيىنى قوشۇپ قىيام قىلىپ، دورىلارنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

99 - نۇسخە: جەۋارش نارمەشكى

تەركىۋى: نارمەشكى، زەنجىۋىل، قارىمۇچ، پىلىپىل ھەر بىرى 6 مىسقالدىن، لاچىندانە، گۈلدارچىن 8 مىسقال، سوقمۇنىيا 12 مىسقال، قەن 4 سەر، ھەسەل 17 سەر.

تەييارلاش: قەنى ھاجەت مىقدارى سۇ بىلەن تازا ئوبدان قىيام قىلىۋېلىپ سەل ئىلماق بولغاندا ھەسەلنى ۋە ئاندىن كېيىن دورىلارنى سوقۇپ ئارىلاش-تۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىم

بېرىلىدۇ.

100 - نۆسخە: ئىسكەنجىۋىل بوزۇرى

تەركىۋى: كىشۇش ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، چىگىسەي ئۇرۇغى. رۇمبېدىيان 5 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى بىر سەر، ئۆتكۈر سىركە $\frac{1}{2}$ 13 سەر، قەن 45 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالراق سوقۇپ، سىركە ۋە باراۋەر مىقداردىكى سۇ بىلەن بىر كېچە - كۈندۈز چىلاپ، ئەتىسى قوشۇلغان سۇ قالغىچە قاينىتىپ، سۈزۈپ سىقىپ، سۈيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ (قايناش ئالدىدا كوپۇك ئورلەيدۇ، بۇنى سۈزۈۋېتىش كېرەك).
ئىچىش مىقدارى: 1 - 2 سەردىن كۈنىگە بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

101 - نۆسخە: مەجۇنى خۇبىسۇلھەددىد (تومۇر پوقى مەجۇنى)

تەركىۋى: كابىل ھېلىلىسى پوستى، سىپىرىق ھې - لىلە پوستى، قارا ھېلىلە، بەلىلە، ئامىلە، بەسباسە، قا - قىلە، ئۇدى ھىندى، ئىسپار، كۈنجۇت 2 مىسقالدىن. خۇبىسۇلھەددىد (تومۇر پوقى) 5 سەر، ھەسەل 20 سەر.
تەييارلاش: تومۇر پوقىنى ئالدى بىلەن 3 كېچە - كۈندۈز سىركىگە چىلاپ قويغاندىن كېيىن، ئېلىپ سې -

رىق ماي بىلەن قورۇپ، يۇمشاق يەنچىلىدۇ. باشقا دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تومۇر پوقى بىلەن قوشۇپ، ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ (6) ئايدىن كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ.

يېمەش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم 2 مىسقال - دىن بېرىلىدۇ.

102 - نۇسخە: جەۋارىش بۇزۇرى

تەركىبى: چىڭسەي ئۇرۇغى، جۇۋىنە (نانىخا) 2 مىسقالدىن، خولىنجان، گۈلدارچىن، قەلەمپۇر 3 مىسقالدىن، قورۇلغان زاغۇن ئۇرۇغى (ھەببۇر شاد) 2 مىسقال، ئارچا مېۋىسى (ئوبھەل) 5 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ 3 باراۋەر ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. چىنە ياكى شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ. كۈنىگە بىر قېتىم ياغاچ قوشۇق بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇش لازىم.

يېمەش مىقدارى: 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم.

103 - نۇسخە: جەۋارىش مۇناسىبى

تەركىبى: ئاقلىغان كۈنجۈت بىر سەر، بوزۇغا، چىڭسەي ئۇرۇغى، زىرە، جۇۋىنە 2 مىسقالدىن، كۈندۈر،

زەنجىۋىل، پىلىپىل، قارىمۇچ، دارچىن، قاقىلە 2 مىس-
قال، قەن 9 سەر.

تەييارلاش: بىر پىتىالە سۇ بىلەن قىيام قىلىپ
دورلارنى سوقۇپ قىيام بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم 3 مىسقال-
دىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

104 - نۇسخە: جەۋارش مۇتەۋى مەئدە

(ئاشقازاننى كۇچەيتىدىغان مەجۇن)

تەركىمىۋى: رۇمبىدىيان، سېرىق ھېلىلە پوستى،
چوڭ قاقىلە، بەلىلە، كىچىك قاقىلە، ئامىلە، زەنجىۋىل،
مەستىكى، سۇزاپ، زىرە، قارىمۇچ، جۇۋىنە ھەر بىرى 5
مىسقالدىن، ناۋات 18 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ ناۋاتنى 2 پىتىالە
سۇ بىلەن قىيام قىلىپ، ئۇستىگە دورىلارنى سېلىپ
تازا ئارىلاشتۇرۇپ چىنە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قې-
تىم بېرىلىدۇ.

105 - نۇسخە: ماتىل ئۇسۇل V

تەركىمىۋى: كاسنى يىلتىزى، ئارپا بېدىيان، ئاق-
لانغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئارپا بېدىيان ھەر بىرى
ئوخشاش مىقداردا، گۈلقەن لازىم مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، دورىدىن 4 ئىلىكچە ئۈستۈن قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ، ئەتە-سى قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا ماتا بىلەن سۇزۇپ سىقىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: گۈلگەن قوشۇپ بىر پىيالىدىن كۈنىگە 1 - 2 قېتىم ئىچىدۇ.

106 - نۇسخە: قۇرسى سۈمبۇل

تەركىبى: سۈمبۇل، ئىزخىر، سەلىخە 3 مىسقالدىن، زىراۋەندىچىنى، قەسبۇسزەرىرە 3 مىسقالدىن، زەپەر، رۇمبى - دىيان 2 مىسقال، مۇرى مەككى، قۇستە تەلىخى، قارىمۇچ بىر مىسقالدىن، ئۇشەق يېرىم مىسقال، مۇقىل 1 مىسقال.

تەييارلاش: مۇقىل بىلەن ئۇشەقنى مۇسەللەسكە چىلاپ ئېرىتىلىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئېرىتكەن دورىلار بىلەن قوشۇپ 2 فۇگىلۇق تەييارىن چوڭلۇغىدا توقماق تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يىمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

107 - نۇسخە: قۇرسى ئىلاۋۇس (ئۇچەي تويىلىش توقمىچى)

تەركىبى: چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبىدىيان 15 مىسقال، ئەپسەنتىن 10 مىسقال، سەلىخە 20 مىسقال،

مۇرى مەككى، قارىمۇچ، قۇندۇز قەرى، ئەپيۇن

$2 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
قايناقسۇ بىلەن كۈنىگە بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

108 - نۇسخە: قۇرسى كوھلى

تەركىبى: سۈرمە، شادىنەج مەغسۇل، خۇنسىياۋشان
ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. سېمىز ئوت، ئانار گۈلى، موز
2 مىسقالدىن، كويدۇرۇلگەن بۇغا مۇڭگۈزى، ئاقاقىيا
1 مىسقالدىن، لادەن، زەپەر يېرىم مىسقالدىن، پىر-
سىياۋشان $1 \frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، گازىۋان سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، بىر
پۇڭلۇق تىيىن چوڭلىغىدا توقىچاق تەييارلاپ سايدا
قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 - 3 دانىنى كۈنىگە 1
قېتىم بېرىلىدۇ.

109 - نۇسخە: جەۋارشى كۈندۈر

تەركىبى: كۈندۈر، ئانار گۈلى 1 سەردىن، قا-
رىمۇچ، جۇۋىنە، سۇمبۇل، ھىڭ، رۇمبېدىيان، سىيادان
ھەر بىرى 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، 3 باراۋەر ھە -
سەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، چىنە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.
يىيىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم
تاماقتىن ئىلگىرى بېرىلىدۇ.

110 - نۇسخە: جەۋارىش خەرنۇپ

تەركىبى: خەرنۇپ نەبىتى (تازىلانغان) 5 مىس -
قال، سىركىگە چىلانغان زىرە 5 مىسقال، ھەببۇل ئاس،
پىستە، بەللۇت، قورۇلغان يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى، مەستىكى
ھەر بىرى 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ (ئەلگەكتىن ئۆتكۈز -
مەي) 3 باراۋەر ھەسەلنى بىر ئاز ئېرىتىپ ئۇستىگە
دورىلارنى سېلىپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. چىنە
قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

يىيىش مىقدارى: كۈنىگە 1 - 2 قېتىم، 2 - 3
مىسقالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

111 - نۇسخە: سوپۇپى رۇممان (ئانار ئۇرۇغى تالقىنى)

تەركىبى: ئاچچىق ئانار ئۇرۇغى 8 مىسقال،
قەرەدما، يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى ھەر بىرى 4 مىسقالدىن،
گەزمازەج، خەرنۇپ نەبىتى 2 مىسقالدىن، ئانار گۈلى،
سىماق 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش: قەرەدمانا بىلەن يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى -
 نى سىركىگە بىر كېچە - كۈندۈز چىلاپ، ئەتىسى ئېلىپ
 سايدا قۇرۇتۇپ قورۇلىدۇ. ئانار ئۇرۇغىمۇ قورۇلىدۇ.
 كېيىن ھەممە دورىلارنى قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئەل -
 گەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 3 مىسقالدىن قايناقسۇ
 بىلەن بېرىلىدۇ.

112 - نۇسخە: قۇرسى تاباشىر

تەركىبى: تاباشىر، بارتەڭ بىر مىسقالدىن، سەمغى
 ئەرەبى، كەتىرا، نىشاستە 2 مىسقالدىن، قىزىل گۈل
 بىر مىسقال، ئانار گۈلى بىر مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
 ئۆتكۈزۈپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن خېمىر قىلىپ، بىر
 فۇڭلۇق تىيىن چوڭلۇغىدا توقچاق تەييارلاپ سايدا
 قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈندە 2 مىسقالنى بىر ياكى
 ئىككى قېتىمدا ئىچىلىدۇ.

113 - نۇسخە: قۇرسى ئۇد

تەركىبى: پىلىپىل، كاۋاۋىچىن 1 مىسقالدىن،
 سۈمبۇل، مەستىكى يېرىم مىسقالدىن، ئۇدى خام 4 مىس-
 قال، شېكەر 7 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، شېكەرنى بىر ئاز قايناقسۇدا ئېرىتىپ، دورىلارنى خېمىردەك قىلىپ، بىر فۇڭلۇق پۇل چوڭلۇغىدا قۇرس تەييارلىنىپ، سايىدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: بىر دانىدىن كۈنىگە 3 قېتىم بېرىلىدۇ.

114 - نۇسخە: قۇرسى راسەن

تەركىمى: قەلەمپۇر 1 سەر، ئىپار 1 مىسقال، گۈلدارچىن 2 مىسقال، قۇرۇق راسەن $1\frac{1}{2}$ مىسقال مەس - تىكى ئەپيۇن، يەبرۇجى سەنەم (رىنىسك) $1\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئەپيۇننى بىر ئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ، دورىلارنى قوشۇپ جەمى 10 دانە قۇرس تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

115 - نۇسخە: مەتبۇخى تەمرى ھىندى

تەركىمى: سېرىق ھېلىلە، خىيارى شەنبەر بىر سەردىن، ئىت ئۇزۇمى 4 مىسقال، كاسىنى ئۇرۇغى 6 مىسقال،

خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، ئەينۇلا 5 مىسقالدىن،
تەمرى ھىندى $1\frac{1}{2}$ سەر، تەرەنجىۋىل 1 سەر، نىلۇفەر،
بىنەپشە 4 مىسقالدىن.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر، تەمرى ھىندى، تەرەن-
جىۋىلدىن باشقىلىرىنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە - كۈندۈز
4 چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغى-
چە قاينىتىپ ئېلىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، تازا سىقىپ
سۈيىگە سوقمايدىغان دورىلارنى سېلىپ تەمىنى ئوبدان
چىقىرىپ قايتا سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2-3 قېتىم بىر پىيالە-
دىن ئىچىلىدۇ.

116 - نۇسخە: مەجۇنى ئاساناسىيا

تەركىمى: سۈمبۇل، قۇستە تەلخى، زەپەر، مۇرى
مەككى، ئۇدېلىسان، ئەپيۇن، سەلىخە، قۇرۇتۇلغان بورە
جىگىرى ① ھەر بىرى بىر مىسقالدىن، غاپەس 2 مىسقال،
بىخ سۇس 3 مىسقال، ھەسەل 4 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۇن تەييارلىنىپ،
چىنە قاچىلاردا ساقلىنىپ، 6 ئايدىن كېيىن ئىستىمال
قىلىنىدۇ.

① بورە جىگىرى قۇرۇت يەپ قالغان ياكى بەك كونا
بولماسلىقى لازىم.

يېمىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە
كۈنىگە يېرىم مىسقالدىن بىر مىسقالغىچە ئىستېمال قىلىن-
دۇ، بالىلارغا بېرىشكە بولمايدۇ.

117 - نۇسخە: داۋائىل كوركەم

تەركىۋى: ئاسارۇن، دوقۇ، ئەنسىۋن، پەتەر سالىۋن،
رەۋەن 4 مىسقالدىن، سۇمبۇل لەتىپ 6 مىسقال، قۇستە،
سەلىخە، ئىزخىر، ھەببى بىلىسان 1 مىسقال، ئوردان
2 مىسقال، قويۇقلاشتۇرغان چۇچۇكبۇيا يىلتىز قاينات-
مىسى، جوئدە، مەستىكى رۇمى، غاپەس 3 مىسقالدىن،
بىلىسان يېغى 5 مىسقال، شاخ مارجان (كويۇرۇپ سالايە
قىلىنغىنى) 4 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، كۆپىگى ئېلىنغان ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىندۇ،
چىنە قاچىدا ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 1 - 2 مىسقالدىن
ھەسەل سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

118 - نۇسخە: ئەسكەنجەۋىل بۇزۇرى موتىدىل

تەركىۋى: چىڭسەي ئۇرۇغى، كاسىنى ئۇرۇغى، ئارپا
بېدىيان 3 مىسقالدىن، بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىل-

تىزى 1 سەردىن، سىركە 5 سەر، شېكەر 12 سەر
(قەن بولسىمۇ بولىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 3 2 سەر قايمى-
ناقسۇغا 4 سائەتچە چىلاپ قويۇپ، كېيىن يېرىمى قالغى-
چە قاينىتىپ، سۇزۇپ، سىقىپ قەن بىلەن سىركىنى
قويۇپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
3 - 5 ئاش قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

119 - نۇسخە: ئىسكەنجىۋىل بۇزورى ھار (ئىسسىق)

تەركىۋى: ئوسارە غاپەس، رەۋەن 2 مىسقالدىن،
چىڭسەي، كاسىنى ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، رۇمبېدىيان،
كۇشۇش ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، بىخ كەبىر پوستى، بېد-
يان يىلتىزى، چىڭسەي يىلتىزى 8 مىسقالدىن، سىركە
5 سەر، قەن 16 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 جىڭ
(3 2 سەر) سۇ ۋە سىركىگە بىر كېچە چىلاپ، ئىسسى-
قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ، تازا سىقىپ، سۇيىگە
قەن سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
3 - 5 ئاش قوشۇقتىن ئىچىلىدۇ.

120 - نۇسخە: شەرۋىتى دىنارى II

تەركمەۋى: بېدىيان يىلتىزى 2 سەر، چىڭسەي يىلتىزى 2 سەر، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 3 سەر (ئاقلانغان)، كاسىنى يىلتىزى 2 سەر، قىزىل گۈل خەمكى 1 سەر، زىرىخ 1 سەر، رەۋەن چىنى، كوشۇش ئۇرۇغى، ئەپتىم مۇن 1 سەردىن، ئىزخىر 4 مىسقال.

تەييارلاش: كوشۇش ئۇرۇغى ۋە ئەپتىمۇنى چالا سوقۇپ، ئايرىم ھالدا بىر كىچىك خالىغا سېلىپ ئاغزى تىكىلىدۇ. قالغان دورىلارنى چالا سوقۇپ 4 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ، سىقىپ، سۇزۇپ، تەييارلىغان خالىنى ئۇنىڭغا تاشلاپ ئىككىلا قاينىتىپ، خالىتا ئوبدان سىقىپ ئېلىنىدۇ ۋە 12 سەر قەن بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. كېيىن رەۋەننى يۇمشاق سوقۇپ ئۈستىگە سېلىپ تەييارلىنىدۇ.

ئېچىش مىقدارى: 3 - 5 ئاش قوشۇقتىن كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىدۇ.

121 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل VI

تەركمەۋى: چىڭسەي يىلتىزىنىڭ پوستى 7 مىسقال، ئىزخىر 5 مىسقال، غاپەس 3 مىسقال، خوخاتىمىكەن، ئەپ سەنتىن، قىزىل گۈل 3 مىسقالدىن، ئوشەق، ئۇرۇقسىز

ئۇزۇم 20 مىسقال. سۇمبۇل، مەستىكى، ئۇردان، لەكى مەغسۇل، ئۇدى بىلسان ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، بۇدۇشقاق، بىخ كەبىر 3 مىسقالدىن، ئەنجۇر 10 دانە، قەن 9 سەر. **تەييارلاش:** دورىلارنى چالا سوقۇپ، 32 سەر قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتمىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ، سىقىپ، سۇيىگە قەن سېلىپ تەييارلىنىدۇ. **ئىچىش مىقدارى:** 40 مىسقالغا بىر مىسقال ئاچ-چىق بادام، بىر مىسقال تاتلىق بادام يېغىنى قوشۇپ كۈنىگە بىر قېتىم ئىچىدۇ.

122 - نۇسخە: زىماد (سۇيۇق مەلھەم)

تەركىبى: نوقۇت، رەۋەن، مومىيا (ئەسلى مومىيا)، بىنەپشە يېغى، گۈلى سوسەن يېغى، قىزىل گۈل يېغى، بابۇ-نە يېغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. **تەييارلاش:** دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ياغلارنى بىرلەشتۈرۈپ، بىر ئاز قىزىتىلسا ھەممىسى ئارىلىشىپ دورا تەييارلىنىدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** سىرتتىن ياغلايدۇ.

123 - نۇسخە: زىماد (سۇيۇق مەلھەم)

تەركىبى: ئۇدى خام 2 مىسقال، بۇغداي كىپىگى، زىغىر، ھەببۇلغار، مۇقىل، مەستىكى 1 مىسقالدىن، گۈلى

سۈسەن يېغى، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى، موم يېغى، ھەر
بىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ياغلارنى
بىرلەشتۈرۈپ بىر ئاز قىزىتقاندىن كېيىن دورىلارنى
قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىشلەتمەش: سىرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

124 - نۇسخە: قۇرسى تەپسەنتىن

تەركىبى: تەپسەنتىن 6 مىسقال، چېگىسەي ئۇرۇغى،
ئاسارۇن ھەر بىرى 3 مىسقال، بادام مېغىزى 5 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، بادام مېغىزى ئۇستىدىكى نېپىز پوستى-
نى ئاقلاپ سوقۇپ دورىلار بىلەن ئېلىشتۇرۇپ، سۇ بىلەن
خېمىردەك قىلىپ قۇرس تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېيىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن بىر قېتىم.

125 - نۇسخە: مەتبۇخى تەپتمۇن (تەپتمۇن)

قاينىتىلمىسى II

تەركىبى: سانا 1 سەر، تەپتمۇن 6 مىسقال،
بالەنگۇ 4 مىسقال، پىرسىياۋشيان 2 مىسقال، بادام مېغىزى
2 سەر، گازىۋان 4 مىسقال، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 4 مىس-
قال، كاسىنى ئۇرۇغى 4 مىسقال، ئوستۇخۇددۇس 2 مىسقال،

شېكەر 5 سەر، شاتەرە 1 سەر، قىزىل گۈل 2 مىسقال،
ئىت ئۇزۇمى 3 مىسقال، ئەينۇلا 10 دانە.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 3 چوڭ چىنە
قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتىسى يېرىمى قالغىچە
قاينىتىپ سۇزۇپ، تازا سىقىپ، سۈيگە شېكەر سېلىپ
تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر پىيالىدىن كۈنىگە 2 - 3
قېتىم بېرىلىدۇ.

126 - نۇسخە: مەجۇنى پودىنە

تەركىبى: قۇرۇتۇلغان پۇدىنە 5 مىسقال، سۇزاپ
يوپۇرمىقى، قارىمۇچ، جوۋىنە، قەرەدمانا، ھىڭ، زەنجىر
ۋىل، دارچىن، پىلىپىل 5 مىسقالدىن، ھەسەل 15 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن ئېلىشتۇرۇپ مەجۇنى تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: تاماقتىن 1 - 2 سائەت كېيىن
1 - 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

127 - نۇسخە: شەرقىي ئەپسەنتىن

تەركىبى: ئەپسەنتىن، غارتقۇن (سىم ئەلگەكتىن
سۇرۇلگىنى)، ھاشا، سەبرە 4 مىسقالدىن، چىڭگىسەي ئۇرۇغى،
بېدىيان يىلتىزى 2 مىسقال، مەستىكى، ئىزخىر، پىندە،

زەپەر، رۇمبېدىيان، سۇمبۇل، ئاسارۇن، سازەج ھىندى

ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، يالپۇز 3 مىسقال، چۇچۇك -

بۇيا يىلتىزى 3 مىسقال، ھەسەل 15 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، 5 جىڭ

(80 سەر) سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى

قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ، تىرىپىنى سىقىپ سۇزۇلىدۇ،

كېيىن ھەسەل قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2 - 3 قېتىم 2 ئاش

قۇشۇقتىن ئىلمان ھالدا ئىچىدۇ.

128 - نۇسخە: ھەببى رەۋەن (رەۋەن كۇمۇلىسى)

تەركىبى: رەۋەن، غارىقۇن (سىم ئەلگەكتىن

سۇرۇپ ئۆتكۈزۈلگىنى) 2 مىسقالدىن، تۇربۇت 4 مىسقال،

زىراۋەند گىردە، مۇقىل 1 مىسقالدىن، رۇمبېدىيان

$\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىردەك قىلىپ ھەب

تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: كەچتە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

129 - نۇسخە: شەرۋىتى بۇزۇرى I

تەركىمى: بېدىيان يىلتىزنىڭ پوستى، چىڭسەي يىلتىزى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، بېدىيان، رۇمبېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، قەن 7 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە 3 2 سەر قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتمىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ، تىرىپىنى مېچىپ سۇزۇپ، سۇيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 ئاش قوشۇغىدىن ئىچىدۇ.

130 - نۇسخە: شەرۋىتى بۇزۇرى II

تەركىمى: كاسىنى ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، تەرخەمەك ئۇرۇغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، كاسىن يىلتىزى 1 سەر، قەن 12 سەر.
تەييارلاش: چالا سوقۇلغان دورىلارنى 4 0 سەر قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتمىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ ئېلىپ تىرىپىنى تازا سىقىپ، سۇزۇپ سۇيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 4 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 ئاش قوشۇغىدىن ئىچىدۇ.

131 - نۇسخە: كەلكىلانەج I

تەركىۋى: مازەرىيۇن (مۇدەببەر قىلىنغان)، سېرىق
ھېلىلە پوستى 5 مىسقالدىن، ئەپسەنتىن ئوسارسى 3
مىسقال، چىغرىتماق يىلتىزى، كاسىن ئۇرۇغى، قىزىل
گۈل، خاڭگا ئۇرۇغى، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا
يىلتىزى قاينا تەمىسى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، پۇنۇس،
خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل ھەربىرى 15 مىسقالدىن.
تەييارلاش: پۇنۇس، خىيارى شەنبەر ۋە تەرەندە-
جىۋىللىرىنى ئايرىم قاينا قۇسۇغا چىلاپ، تەمىنى چىقىرىپ،
سۇزۇپ، ئۈستىگە قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئېلىشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 2 - 3 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

132 - نۇسخە: كەلكىلانەج II

تەركىۋى: سېرىق ھېلىلە پوستى، قارا ھېلىلە،
لىسانى ئەسپۇر، پىلىپلىمۇيە، زىرە، رەۋەن ھەربىرى
3 مىسقالدىن، تۇرپۇت 9 مىسقال، ھىندى تۇزى، چىڭ-
سەي ئۇرۇغى، شەترەنجى ھىندى، لاھۇر تۇزى، پىلىپىل،
جۇۋىنە ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئامىلە 27 سەر.

تەييارلاش: ئامىلىنى 24 جىڭ سۇدا 8 جىڭ قالغىچە قاينىتىپ، سىم ئەلگەكتىن سۇزۇپ ئۆتكۈزۈل-
گەن سۇيىمگە 4 جىڭ شېكەر سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.
قىيامغا بىر ئاز ھەسەل بىلەن 12 سەر كۈنجۈت يېغى
ئارداشتۇرۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ قوشۇپ تازا قوچۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم 2 - 3 مىس-
قالدىن بېرىلىدۇ.

133 - نۇسخە: قۇرسى مازەرىيۇن I

تەركىمى: مازەرىيۇن (مۇدەببەر) (49 - نۇسخە -
دىكىدەك)، مازەرىيەن يوپۇرمىغى، غارىقۇن، غاپەس ئو-
سارىسى ھەربىرى 1 مىسقالدىن، قىزىل گۈل، خاڭگا
ئۇرۇغى 2 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى 1 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قايناقسۇ بىلەن خېمىردەك قىلىپ
10 دانە توقچاق تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

134 - نۇسخە: قۇرسى مازەرىيۇن II

تەركىمى: مازەرىيۇن مۇدەببەر 3 مىسقال، سېرىق
ھېلىلە پوستى 3 مىسقال، ئارپا ئۇنى 3 مىسقال.

تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوت-
كۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىردەك يۇغۇرۇپ قۇرس تەي-
يارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 1 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

135 - نۇسخە: قۇرسى ئەنەبەر بارىس

تەركىبى: چۈچۈك بۇيا يىلتىزى، قوغۇن ئۇرۇ-
غىنىڭ مېغىزى، خاڭگا ئۇرۇغى ھەربىرى 3 مىسقالدىن،
قىزىل گۈل، تەرەنجىبۇل 6 مىسقالدىن، كوشۇش ئۇرۇغى،
قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈك بۇيا يىلتىزى، تاباشىر، كاسىن
ئۇرۇغى، سۇمبۇل، غاپەس ئوسارسى، ئوردان، رەۋەن،
لەكى مەغسۇل، ئىزخىر، ئەپسەنتىن ھەربىرى 2 مىسقال-
دىن، زەپەر يېرىم مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئوتكۈزۈپ، تەرەنجىبۇلنى بىرئاز سۇ بىلەن
ئېرىتىپ سۇزۇپ، خېمىردەك يۇغۇرۇپ، قۇرس تەييارلاپ
سايىدا قۇرۇتۇپ ئىستىمال قىلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن، ئانار
ياكى ئالما شەرىۋىتى (47 - 48 - نۇسخە) لەر بىلەن
بېرىلىدۇ.

136 - نۇسخە: شەرۋىتى كۇشۇش

تەركىمى: قىزىل گۈل ئۇرۇغى، رۇمبىدىيان 2 مىسقالدىن، كۇشۇش (سېرىق ئوت) ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، كاسىنى ئۇرۇغى، سېرىق ئوت گۈلى، خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، كاسىن يىلتىزى ھەر بىرى 3 مىسقال - دىن، شېكەر 9 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، سىقىپ، سۇزۇپ، سۇيىگە قەن سېلىپ قىيام تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش ەمقەدارى: ھەر قېتىمدا بىر سەردىن كۈنىگە 2 - 3 قېتىم ئىچىدۇ.

دىققەت: سېرىق ئوت گۈلى ۋە ئۇرۇغىنى ئاي - رىم - ئايرىم سوقۇپ بىر خالىغا ئېلىپ تىكىپ، شەرۋەت قايناپ بولۇش ئالدىدا خالىتا بىلەنلا قازانغا تاشلاش كېرەك.

137 - نۇسخە: قۇرسى غاپەس I

تەركىمى: غاپەس ئوسارسى 20 مىسقال، سۇم - بۇل 10 مىسقال، تاباشىر 4 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئوتكۇزۇپ، بىرئاز سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ،
5 فۇڭلۇق تىيىن چوڭلۇغىدا توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم بىر دانە -
دىن بېرىلىدۇ.

138 - نۇسخە: قۇرسى بۇزۇرى

تەركىۋى: بىخ كەبىر، زىراۋەند، ئوسقودوسۇن،
ئۇشەق، ئىگىر، سۈمبۇل، فەرەنجى مىشكى، قارىمۇچ،
قۇست، سۇزاپ، ئۇشەن، گۈلىسۇسەن ھەر بىرى 5
مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ بىخ كەبىر
سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، توقچاق تەييارلاپ، سايى -
دا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

139 - نۇسخە: ئوردان قۇرسى

تەركىۋى: ئوردان 12 مىسقال، ئىرسا، يالىپۇز
يىلتىزىنىڭ پوستى، ئۇزۇن زىراۋەندى ھەر بىرى 2 مىس -
قالدىن.

تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئوتكۇ -

زۇپ، ئىسكەنجىۋىل بىلەن خېمىر قىلىپ، توقچاق ياساپ
سايىدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

140 - نۇسخە: قۇرسى كەبەر

تەركىۋى: ئۇزۇن زىراۋەند 2 مىسقال، بىخ كە -
بىر پۇستى، ئۇشەق ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، پەنجى
ئەڭگۈشت ئۇرۇغى 6 مىسقالدىن.
تەييارلاش: ئوشەقنى كونا سىركىدە ئېرتىپ،
قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
يۇغۇپ توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: ئىسكەنجىۋىل بىلەن بىر
مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

141 - نۇسخە: قۇرسى گۈلنار

تەركىۋى: گۈلنار (ئانار گۈلى) ① 10 مىسقال،
گىلى ئەرمىنى، سەلىخە، سەمغى ئەرەبى ھەر بىرى 4
مىسقالدىن، قىزىل گۈل، ئاقاقىيا ھەر بىرى 3 مىسقالدىن،
كەتىرا بىر مىسقال.

① ئانار گۈلىنىڭ سايىدا قۇرۇتۇلغىنى.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئانارگۈلى قايناتقان سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ تەقچاق تەييارلىنىدۇ. سايدا قۇرۇتۇش كېرەك (قۇرس چوڭلۇقى 2 فۇڭلۇق تىيىندەك بولسا بولىدۇ).

يېمىش مىقدارى: 3 دانىدىن كۈنىگە 3 قېتىم بېرىلىدۇ.

142 - نۇسخە: سۇپۇپى تىن

تەركىبى: نىشاستە (قورۇلغان) 4 مىسقال، گۈل يېغى بىلەن قورۇلغان سەمىغى ئەرەبى 3 مىسقال، كەتىرا، گىلى ئەرەبى، خۇنسىياۋشان، ئىسپۇغۇل (سەقۇلمايدۇ)، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، بارىتەك (قۇرۇلغان) 3 مىسقالدىن، بالەڭگۈ (سوقۇلمايدۇ).

تەييارلاش: سوقۇشقا تېگىشلىكلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۈنىگە 3 قېتىمدىن بىيە سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

143 - نۇسخە: قۇرسى زەرنىخ

تەركىبى: سېرىق زەرنىخ، قىزىل زەرنىخ (كۈش - تە فىلىنغان)، كويدۇرۇلگەن مىس، ئوچۇرۇلگەن ھاك،

مۇزا ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، ئەپيۇن، زەپەر ھەر بىرى بىر مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى بىلەن 2 فۇڭلۇق تەيىندەك قۇرس تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە يېرىم مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ.

144 - نۇسخە: مەجۇنى فىلافى II

تەركىبى: ئاقمۇچ، پىلىپل ھەربىرى 15 مىسقالدىن، ئۇدى بىلسان 7 يېرىم مىسقال، سۇمبۇل، ھۇماما ھەربىرى تۆت مىسقالدىن، زەنجىۋىل، چىڭسەي ئۇرۇغى، سىسالىيۇس، سەلىخە، ئاسارۇن، راسەن ھەر بىرى بىر مىسقالدىن، ھەسەل پۇتۇن دورىلار ئېغىرلىقى بىلەن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: ھەر تاماقتىن كېيىن بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

145 - نۇسخە: مەجۇنى جەۋارش خەۋزى

تەركىبى: كوندۇر، جىۋىنە، مەستىكى، سەئدە كۆپى، سۇمبۇل ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، خەرنۇپ نەبتى،

ئانارگۇلى، يۇلغۇن مېۋىسى (داۋا) 2 مىسقالدىن، قۇرغان
ئۇزۇم ئۇرۇقى 3 سەر، ھەبۇل ئاس 6 سەر، قەين
بىلەن ھەسەل پۇتۇن دورىنىڭ 3 باراۋىرىدە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈلىدۇ. قەيننى بىر ئاز سۇ بىلەن قاينىتىپ قىيام
قىلغاندىن كېيىن ئۈستىگە ھەسەلنى قۇيىمىز. تازا ئاردا-
لاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، دورىلارنى سېلىپ مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 3 - 4 مىسقالدىن
قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

146 - نۇسخە: مەجۇنى تۇرپۇت

تەركىمى: مەھمۇدە (سوقمۇنىيا)، تۇرپۇت ھەر بىرى
10 مىسقالدىن. قاقىلە، لاچىندانە، زەنجىۋىل، دارچىن،
گۈلدارچىن، قەلەمپۇر، قارىمۇچ، نارمىشكى 5 مىسقالدىن.
زىرە، جۇۋىنە، قارا شېكەر 10 سەر. ھەسەل 50 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سەقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى قاچىغا ئېلىپ، قايناقسۇ ئۈستىگە
قويۇپ، بىر ئاز ئېرىتىپ ئۈستىگە قارا شېكەرنى سېلىپ،
تازا ئارىلاشقاندىن كېيىن، دورىلارنى قوشۇپ ئارىلاشتۇ-
رۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 5 مىسقال (كەچتە)
بېرىلىدۇ.

147 - نۇسخە: شىياڧى كۈھلى

تەركمۇي: ئانار گۈلى، موزا، سۈرمە، زەمچى،
ئاقاقىيا، سەمغى ئەرەبى ھەربىرى 3 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن سەڭ شامچىلىرى ياساپ
قۇرۇتۇپ، ھاجەت بولغاندا ئىشلىتىلىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: بوۋاسىر قاناشنى توختىتىش ئۈچۈن
مەقئەتكە قويۇلىدۇ.

148 - نۇسخە ھەبىي مۇقىل I

تەركمۇي: سېرىق ھېلىلە پوستى 30 مىسقال
(كالا يېغىدا قورۇپ) كەھرىبا 1 سەر، مۇقىل 4 سەر.
تەييارلاش: مۇقىلنى جۈسەي سۈيىدە ئېرىتىپ،
دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قوشۇپ ھەب تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ
(قەۋزىيە تىلىك بوۋاسىرغا بېرىلىدۇ).

149 - نۇسخە: ھەبىي مۇقىل II

تەركمۇي: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسى پوستى،
قارا ھېلىلە، ئامىلە، مۇقىل، كەھرىبا، كۆيدۈرۈلگەن

مارجان، كويدۇرۇلگەن سەدەپ ھەربىرى 2 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، مۇقىلنى جۈسەي سۈيى بىلەن ئېرىتىپ،
دورىلارنى يۇغۇرۇپ ھەب تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

150 - نۇسخە: ئەتىرىپىل مۇقىل

تەركىمى: كابۇل ھېلىلىسى پوستى 6 مىسقال، بەلىلە
پوستى 6 مىسقال، ئامىلە پوستى 6 مىسقال، مۇقىل 9 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن مۇقىلنى جۈسەي سۈيى بىلەن
ئېرىتىپ، ئۈستىگە دورىلارنى قوشۇپ، ھەسەلدىن ھاجەت
مىقداردا قوشۇپ، خېمىر قىلىپ، قوناقتەك ھەب تەييارلىنىدۇ.

151 - نۇسخە: مەجۇنى لوبۇبى سەغىر

تەركىمى: بوزىدان، قىزىل ۋە ئاق بەھمەن،
لىسانى ئەسپىر، خولىنجان، دارچىن، ھەربىرى 2 مىس-
قالدىن، تەرخەمەك ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، خاڭگا ئۇرۇغىنىڭ
مېغىزى 3 مىسقالدىن، پىندۇق مېغىزى، بادام مېغىزى،
پىستە مېغىزى، ئاقلانغان كۈنجۈت، چەلغوزە مېغىزى،
قوغۇن ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، كۆكنار ئۇرۇغى ھەربىرى
6 مىسقالدىن. ھەسەل دورىلار ئومۇمى ۋەزىندىن 3 ھەسسە.
تەييارلاش: مېغىز دورىلارنى ئايرىم، باشقا دورىلارنى

ئايىرىم ھالدا يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇلسۇن.
 ھەسەلنى پار ئۇستىدە قويۇپ ئېرىتىپ ئالدى بىلەن
 مېغىز دورىلارنى، ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا دورىلارنى سېلىپ
 تازا ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا
 2 مىسقالدىن.

152 - نۇسخە: قۇرسى كاكىنەج

تەركىمى: تۇز ۋە ئەگرى خاڭگا ئۇرۇقلىرى بىر
 سەر، كاكىنەج 3 مىسقال، چىڭسەي ئۇرۇغى، شوھدانە،
 گىلى ئەرمىنى، سەمغى ئەرەبى، خۇنسىياۋشىيان، بەزۇرۇل -
 بەنجى 2 مىسقال، ئەپيۇن بىر مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
 ئوتكۇزۇپ، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابىدا بىر مىسقالدىن
 توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: 1 دانىدىن شەرىۋىتى بىنەپشە
 (74 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

153 - نۇسخە: بىنادىق بۇزۇرى

تەركىمى: قوغۇن، خاڭگا، قاپاق ئۇرۇقلىرىنىڭ
 مېغىزى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، بە -
 زۇلبەنجى، بادام مېغىزى، نىشاستە، كۆكنار ئۇرۇغى، قويۇق -
 لاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قايناتمىسى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ (مېغىزلار ئايرىم سوقۇلىدۇ) ئىسپۇغۇل لۇئابىدا بىر مىسقالدىن توقچاق تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر دانىدىن.

154 - نۇسخە: قۇرسى زىيائەتۇسى

تەركىمى: تاباشىر، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا قايناتمىسى 5 مىسقالدىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، قارا سونا ئۇرۇغى 15 مىسقالدىن، يۇمىخاقسۇت ئۇرۇغى، پاقا يو-پۇرمىغىنىڭ ئۇرۇغى، گىلى ئەرمىنى 3 مىسقالدىن، ئاق سەندەل، ئانار گۈلى، سىماق، سەمغى ئەرەبى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، كافۇر يېرىم مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، سېمىز ئوت ئۇرۇغى قايناتقان سۇ ۋە ئانار سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، توقچاق تەييارلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

155 - نۇسخە: مەجۇنى بەللۇت

تەركىمى: شاھى بەللۇت، سوئدى ھىندى، موزا، خولىنجان، گۈلدارچىن، كۈندۈز 5 مىسقالدىن، ھەسەل

9 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

156 - نۇسخە: مەجۇنى ئەقرەب (چايان مەجۇنى)

تەركىمى: ئەقرەب (چايان) ① $3\frac{1}{2}$ مىسقال،

جېنتيانا $1\frac{1}{2}$ مىسقال، زەنجىۋىل 1 مىسقال،

قارىمۇچ، پىلىپىل ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، كاكنەج 5 مىسقال، قۇندۇز قەرى 4 مىسقال، ھەسەل ئومۇمى دورىلار ۋەزنىدىن 2 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم $\frac{1}{5}$

مىسقال (2 فۇڭ مىقداردا) نى چىڭسەي ئۇرۇغىنىڭ سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

① چاياننى ساپال ياكى چىنە قاچىغا سېلىپ، ئاغزىنى قىزىل گىل بىلەن مەھكەم بېكىتىپ ئوتى توختاپ بىر ئاز سۇ-ۋۇغان تونۇردا بىر كېچە قويۇپ كويدۇرۇپ تەييارلانغىنى ئىشلەتمىلىدۇ.

157 - نۇسخە: مەجۇنى ھەجەرلىيە ھود

تەركەۋى: قاپاق ئۇرۇغنىڭ مېغىزى، خاڭكا
ئۇرۇغنىڭ مېغىزى 5 مىسقالدىن، ھەجەرلى يەھود
5 سەر. ھەسەل دورىلار ۋەزنىدىن 2 باراۋەر.
تەييارلاش: دورىلارنى سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈ -
زۇپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

158 - نۇسخە: چايان يېغى (رەۋغەنى ئەقرەپ)

تەركەۋى: زىراۋەند مۇدەھرەج، جېنتىيانا، سەئدى
كوفى، بىخ كەبىر ھەربىرى 7 مىسقالدىن، چىلان 50
دائە، ئاچچىق بادام يېغى 9 سەر (گۈل يېغى بولسىمۇ
بولىدۇ). چوڭ چايان (سېرىق ئىشەك) 10 دائە.
تەييارلاش: ئالدى بىلەن دورىلارنى سۇقۇپ بىر
شېشگە سېلىپ، ئۈستىدىن 9 سەر ئاچچىق بادام يېغى
قۇيۇپ، ئاغزىنى بېكىتىپ، ئاپتاپتا 2 ھەپتە قويۇلىدۇ
(تومۇز كۈنلىرىدە بىر ھەپتە تۇرسىمۇ بولىدۇ). دورىلار -
نىڭ تەمى ياخشى چىقىپ بولغاندىن كېيىن 10
دائە تىرىك چاياننى ياغ ئۈستىگە تاشلاپ شىشنى

ئوبدان بېكىتىپ، يەنە ھەپتە ئاپتاپتا قويۇپ، سۇزۇپ تەييارلاپ ساقلىنىدۇ.

ئىشلەتمەش: دوۋىساقىتىكى تاشنى پارچىلاش ئۈچۈن، سۇيدۇك يولىدىن تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە تامغۇزۇلىدۇ.

159 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل VII

تەركىمى: بېدىيان، چىڭسەي، كاسىنى يىلتىزى 1 سەردىن، ئىزخىر 1 سەر، رۇمبېدىيان، زىرە، سۇزۇپ 5 مىسقالدىن، جۇۋىنە، سورۇنجان 3 مىسقال، قۇستى شىرىن، قەسبۇسزەرەرە، مەستىكى ھەربىرى بىر مىسقالدىن، گۈلقەن 3 سەر، ئىنەك پىتى يېغى 1 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سۇقۇپ 32 سەر سۇدا بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ گۈلقەن بىلەن ئىنەك پىتى يېغىنى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئادەتتىكى چاي پىيالىسىدە بىر پىيالىدىن كۈنگە 1 - 2 قېتىم ئىچىدۇ.

160 - نۇسخە: مەتبۇخى سورۇنجان

تەركىمى: سېرىق ھېلىلە پوستى 1 سەر، بىس-پايەج 4 مىسقال، شاتەرە 6 مىسقال، سورۇنجان مىسىرى

5 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى، بېدىيان، قىزىلگۈل 4 مىس-
قالدىن، سانا 15 مىسقال، بىنەپشە، نىلۇفەر 6 مىس-
قالدىن، خىيارى شەنبەر 8 مىسقال، تەرەنجىۋىل 3 سەر،
بادام يېغى 3 مىسقال.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر بىلەن تەرەنجىۋىلنى
ئايىرىم قاچىغا سېلىپ، ئىپرىگىدەك قايناقسۇ قويۇپ
قويۇلىدۇ. باشقا دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 چوڭ چىنە
قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى
قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ تازا سىقىپ بولغاندىن
كېيىن بۇنىڭ ئۈستىگە سۇزۇلگەن خىيارى شەنبەر بىلەن
تەرەنجىۋىل ۋە بادام يېغىنى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم (ئەتىگەن ۋە
كەچتە) بىر چاي پىيالىدىن ئىچىلىدۇ.

161 - نۇسخە: قۇرسى بەۋلەمدەم (قان سىمىش تابلېتى)

تەركىمى: تەرخەممەك ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى 12 مىس-
قال، نىشاستە، كەتىرا، ئانار گۈلى، سوك، خۇنسىياۋشيان،
سەمغى ئەرەبى ھەربىرى 3 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، سېمىز ئوت سۈيى بىلەن ياكى سېمىز
ئوت ئۇرۇغىنى قايناتقان سۇ بىلەن توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: كۈنىگە 1 - 2 قېتىم بىر مىس-
قالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

162 - نۇسخە: قۇرسى گۈل (قىزىل گۈل تابلېتى) I

تەركىمى: سۇمبۇل، ئۇدى ھىندى، ئاسارۇن،
ئەپسەنتىن، ئاچچىق بادام مېغىزى 3 مىسقالدىن، چىڭ-
سەي ئۇرۇغى 1 مىسقال، قىزىل گۈل 6 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ چىڭسەي ئۇرۇغىنىڭ سۈيى بىلەن قۇرس
تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بىر
مىسقالغىچە بېرىلىدۇ.

163 - نۇسخە: قۇرسى گۈل (قىزىل گۈل تابلېتى) II

تەركىمى: قىزىل گۈل 6 مىسقال. پاقا يوپۇرمىغىنىڭ
ئۇرۇغى، سەمى ئەرەبى 4 مىسقالدىن، ئىشاستە، زىرىخ،
تاباشىر ھەربىرى 2 مىسقالدىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى
2 مىسقال، كەتىرا، سۇمبۇل، زەپەر، رەۋەن ھەربىرى بىر
مىسقالدىن، كافۇر بىر ئارپا مىقدارى.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ قايناتقان سۈيى بىلەن
قۇرس تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم.

164 - نۇسخە: داۋائىل تۇربۇد

تەركىمى: ئىچى كاۋاك ئاق تۇربۇد بىر سەر،
زەنجىۋىل، مەستىكى 5 مىسقالدىن، قەن 20 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى قەن بىلەن قوشۇپ يۇم-
شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 1-2 مىسقالدىن كۈنىگە
1 قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

165 - نۇسخە: قۇرسى غاپەس II

تەركىمى: غاپەس 3 سەر، قىزىل گۈل 6 سەر،
تاباشىر 4 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ توقچاق
تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر
قېتىم بېرىلىدۇ.

167 - نۇسخە: قۇرسى مەرۋايىت

(مەرۋايىت تابىپتى)

تەركىمى: تەشمىگەن مەرۋايىت، لەھىيەتۇتتىمىس
ئۇسارىسى، بار تەڭ ئۇرۇغى 2 مىسقالدىن، تاباشىر،

قىزىلگۈل 6 مىسقالدىن، گىلى ئىەرمىنى 4 مىسقال،
قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، تۇز ۋە ئەگرى خاڭگا ئۇرۇق-
لىرى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، كەھربا 3 مىسقالدىن، كافۇر
ئاق سەندەل بىر مىسقالدىن.

تەييارلاش: مەرۋايىت سالايە قىلىنىدۇ، باشقا
دورلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۈزگەندىن
كېيىن، مەرۋايىتنى قوشۇپ ھەببۇل ئاس سۈيى
بىلەن خېمىر قىلىپ قۇرس تەييارلاپ سايدا قۇرۇ-
تىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: بىر يېرىم مىسقالدىن كۈنىگە
بىر قېتىم.

168 - نۇسخە: قۇرسى خەشخاش (كوكنار تابلېتى)

تەركىمى: كوكنار ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ
مېغىزى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، ئەگرى، تۇز خاڭگا ئۇرۇ-
غى، بىيە ئۇرۇغى ھەر بىرى 6 مىسقالدىن، سەمغى ئە-
رەبى، تاباشىر، قىبرىس گىلى، ھۇمماز ئۇرۇغى ئۈچ
مىسقالدىن، نىشاستە 2 مىسقال، قىزىل گۈل 5 مىسقال،
كافۇر $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: مېغىز دورىلارنى بىر قورۇپ، باشقا
دورىلار بىلەن قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئوتكۈزۈپ ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن توقچاق تەييارلى-
نىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنگە 1 قېتىم
سەھەردە ئالما ياكى بىيە سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

169 - نۇسخە: مەجۇنى زەرئۇنى

تەركىبى: پىلىپىل، قارىمۇچ، زەنجىۋىل، گۈل
دارچىن، خولسۇنجان بىر سەردىن، سېرىق تۇدرى، ئاق
تۇدرى، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، بوزىدان، لىسانى
ئەسپىر، سەئدە، سۇمبۇل 3 سەردىن، ھەسەل 90 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئوتكۈزۈپ، ھەسەلنى قاينىدە بويىچە ئېرىتىپ، مە-
جۇن تەييارلىنىدۇ. 40 كۈندىن كېيىن يېمىشكە بولىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

170 - نۇسخە: مەجۇنى بۇزۇرى

تەركىبى: سەۋزە ئۇرۇغى، چامغۇر ئۇرۇغى، پى-
ياز ئۇرۇغى، لوبۇ ئۇرۇغى، پىچان ئۇرۇغى (بىدە ئۇرۇ-
غى)، زاغۇن، ئاقلىغان كۈنجۇت، قارىمۇچ، سېرىق تۇد-
رى، قىزىل تۇدرى، ھەببى زەلەم، لىسانى ئەسپىر ھەر
بىرى بىر مىسقالدىن، شاقاقۇل، بەھمەن، بوزىدان،

قۇستە زەنجىۋىل، پىلىپىل ھەر بىرى بىر مىسقالدىن،
ھىڭ بىر مىسقال، ھەسەل ئالتە سەر.
تەييارلاش: ئادەتتىكى ئۇسۇل بىلەن مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 - 3
مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

171 - نۇسخە: مەجۇنى لوۋبۇي كەبەر

تەركىمى: تاتلىق بادام مېغىزى، ياڭاق مېغىزى،
زاراڭزا مېغىزى، ھەبىي زەلەم مېغىزى، پىندۇق مېغىزى،
چەلغۇزە مېغىزى، نارچىل مېغىزى، كەنار ئۇرۇغى بىر
سەردىن، ئاق تۇدرى، قىزىل تۇدرى، سېرىق تۇدرى،
كۈنجۇت مېغىزى، زەدەك (سەۋزە) ئۇرۇغى، زاغۇن، پىياز،
چامغۇر ئۇرۇغى، ئاق ۋە قىزىل بەھمەن ھەر بىرى بىر
سەردىن، زەنجىۋىل، پىلىپىل، كاۋاۋىچىن، گۈلدارچىن،
سۇئەب، شاقاقۇل، شياڭدوزا ئۇرۇغى ھەر بىرى بىر
سەردىن، ھەسەل 28 سەر، پىياز سۈيى 8 سەر، خۇ-
لىنجان بىر سەر.

تەييارلاش: پىياز سۈيى بىلەن ھەسەلنى بىللە
قاينىتىپ، ھەسەل قالغاندا ئېلىپ، قالغان دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ، قاندىدە بويىچە مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: تەييار بولغاندىن كېيىن قە-

رىق كۈنگىچە ھەر كۈنى بىر قېتىم ياغاچ قوشۇق بىلەن
قوچۇپ قويىلىدۇ. شىشە ياكى چىنىلەردە ساقلىنىپ كۈ-
نىگە 2 قېتىم 3 - 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

172 - نۇسخە: مەتبۇخى شاتەرە

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، كابۇل ھېلىلىسى، بە-
لىلە، ئامىلە پوستى 5 مىسقالدىن، شاتەرە، شۇمشە 7
مىسقالدىن، سانا 4 مىسقال، نىلۇفەر، مامىرانچىن 1
مىسقالدىن، ئەپتىمۇن، قىزىلگۈل 3 مىسقالدىن، بېدىيان،
كاسىن ئۇرۇغى، چىگىسەي ئۇرۇغى، بىستىپايەج، ئوستۇ-
خۇددۇس، يىلپۇز ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، چىلان،
ئەينۇلا ھەر بىرى 20 دانە، كاسىن كوكى. بىر سىقىم.
تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە
3 جىگىچە سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى
 $\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇرۇپ سىقىپ سۇيىگە

تەمرى ھىندى، پۇنۇس، تەرەنجىۋىلىدىن $\frac{1}{2}$ سەرنىڭ

ئايرىم تەمى چىقىرىلغان سۇيى قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر - ئىككى پىيالە مىقداردا
كۈنىگە 2 - 1 قېتىم ئىچىدۇ.

173 - نۇسخە: داۋائىللۇك

تەركىمى: لەكى مەغسۇل، قۇستە تەلخى، ئىزخىر
چىچىكى، تېرمىس، ھەببۇلغار، شۇمشە، قارىمۇچ 10
مىسقالدىن، رەۋەن چىنى 15 مىسقال، ھەسەل 2
ھەسسە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگە-
تىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييار-
لىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

174 - نۇسخە: سۇپۇپى مۇقەۋۋى مەئدە

تەركىمى: پىننە، بېدىيان ھەر بىرى 4 مىسقال-
دىن، لاچىندانە 3 مىسقال، شەترەنجى ھىندى
1 $\frac{1}{2}$ مىسقال، يۇمىغاقسۇت ئۇرۇغى، ئانار ئۇرۇغى
3 $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، قىزىلگۈل، قەرەدمانا 3 مىسقالدىن،
قارىمۇچ، پىلىپىل، نەمەكى لاھورى ھەر بىرى 4 مىس-
قالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: تاماقتىن بۇرۇن 2 - 1 مىس-
قالدىن كۈتكە 3 - 2 قېتىم قايناقسۇ بىلەن ئىچىدۇ.

175 - نۇسخە: مەجۇنى لوغانىزىيا

تەركىبى: شەھىمى ھەنزەل 5 مىسقال، ياۋا
پىياز (ئەنسىل)، غارىقۇن، سوقمۇنىيا، قارا خەربەق،
ئاق خەربەق، ئوشەق، ئوسقۇدرىيۇن
 $4 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن، پىلىپىل، جوئدە، ئاقمۇچ، قارىمۇچ،
جاۋۇشىر، زەپەر، دارچىن، بىستىپايەج، قۇندۇز قەرى،
مۇرى مەككى، پەتەرسالىيۇن، ئوستخوددۇس 2 مىسقال-
دىن. ئەپتىمون $3 \frac{1}{2}$ مىسقال، كامادىۇس $3 \frac{1}{2}$ مىس-
قال، سەبرە 3 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ئومۇمى دورىلار ۋەزنى بىلەن 3 باراۋەر
كېلىدىغان ھەسەل قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. 40
كۈندىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاشخامدا 3 - 2
مىسقالدىن بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

176 - نۇسخە: قۇرسى مور

تەركمۇى: مۇرى مەككى 3 مىسقال، قىزىل لو-
بىيا 5 مىسقال، سۇزاپ، پىننە، قەرەمانا، مىشكى تارا-
مىشى، ئۇردان، ھىڭ، جاۋۇشىر، سەككىنەج 2 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، 2 مىس-
قال ئۇبەل (ئارچا مېۋىسى) قايناتقان سۇ بىلەن خېمىر
قىلىپ توقچاق تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتىلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن 5 كۈن
ئۇدا بېرىلىدۇ.

دىققەت: ھامىلدارلارغا بەرسە بالىسى چۈشۈپ
كېتىدۇ.

177 - نۇسخە: مەلھىمى داخىلەون

تەركمۇى: رۇفتى رۇمى، راتىيانەج، ئاق موم 8
مىسقالدىن، قۇننە 4 مىسقال، زەيتۇن يېغى 30 مىسقال.
تەييارلاش: مومنى زەيتۇن يېغى بىلەن ئېرىتىپ،
قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ماي دورا
تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش: تاشقى تەرەپتىن جاراھەت ۋەرەملەرگە
بېرىلىدۇ.

178 - نۇسخە: مەتبۇخى ھېلىلە II

تەركىمى: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسى، بەلىلە، ئامىلىنىڭ پوستى 15 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە 15 مىسقال، بىنەپشە، نىلۇپەر، كاسىن ئۇرۇقى، شاتەرە، سانا 5 مىسقالدىن، چىلان 50 دانە، سەرپىستان 40 دانە، ئەينۇلا 20 دانە، تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىل ھەر بىرى 2 سەردىن، پۇنۇس 15 مىسقال، خىيارى شەنبەر بىر سەر، بادام مېغىزى بىر سەر.

تەييارلاش: { 38 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش. ئىچىش مىقدارى: }

179 - نۇسخە: مەلۇمى ئىسپىداج II

تەركىمى: ئۇپا 5 مىسقال، ئاق موم 1 سەر، گۈل يېغى 5 مىسقال.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن تومۇر قاچىغا مومنى سېلىپ، ئوتتا قۇيۇپ ئېرىتىپ، ئۈستىگە گۈل يېغى قوشۇلۇدۇ. ئوت ئۈستىدىن ئېلىپ ئۇپنى قۇيۇپ تازا ئارىلاش-تۇرۇپ تەييارلىنىدۇ (ئەگەر سوغاق خۇسۇسىيەتلىك قىلماقچى بولغاندا $\frac{1}{2}$ مىسقال كاپۇر قوشۇلىدۇ).

تەشلىتىش مىقدارى: تاشقى تەرەپتىن جاراھەتلەر-گە بېرىلىدۇ.

180 - نۇسخە: ئىترىپىل غۇدۇدى (بەزئىتىرىپىلى)

تەركىمىۋى: قارا ھېلىلە 15 مىسقال، بەلىلە، ئامىلە،
توربۇت 7 مىسقالدىن، ئەپتىمۇن 1 سەر، ئۇستۇخۇددۇس،
قوينىڭ قۇرۇتۇلغان بويۇن بېزى 5 مىسقالدىن،
سانا 4 مىسقال، غارىقۇن، شەترەنجى ھەندى، نوشىدىر
3 مىسقال، زورەنبات 3 مىسقال، رۇمبىدىيان، گۈل دارچىن،
سۇمبۇل، قەلەمپۇر، جويۇز، لاچىندانە، مەستىكى 2 مىس-
قالدىن، بىستىپايەج 5 مىسقال، ھەسەل 30 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ ماچۇن تەييارلىنىدۇ
(5 مىسقال بادام يېغى قوشۇۋەتسە تېخىمۇ ياخشى).
يېمىش مىقدارى: 5 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم
بېرىلىدۇ.

181 - نۇسخە مائۇلجىبىن

تەركىمىۋى: ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇس ھەر بىرى
بىر سەردىن، ھېلىلە پوستى 2 سەر، شاتەرە، گازىۋان، بىستە-
پايەج، سانا، بادەرەنجىبۇيا 5 مىسقالدىن، غارىقۇن، توربۇت
2 مىسقالدىن، سىركە 8 سەر، ئۆشكە سۈتى 12 سەر،
شېكەر 1 سەر، تەرەنجىۋىل 2 سەر، بادام مېغىزى 1 سەر
تەييارلاش: ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇستىن باشقىلىرىدە-

نى سىركە بىلەن 3 چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويغاندىن كېيىن (ئەپتىمۇنى خالتىغا ئېلىپ تاشلاپ قويىلىدۇ)، ئۇستوخۇددۇسىنى قوشۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ تىرىپىنى سىقىپ سۇيىگە شېكەر، تەرەنجىۋىل، سۇتنى قۇيۇپ بىر قاينىتىپ ئېلىپ، بادام مېغىزىنى يەنچىپ قوشۇۋېتىلىدۇ (تەرەنجىۋىلنى ئالدى بىلەن ئېرىتىپ سۇزۇش كېرەك).
ئىچىش مىقدارى: 1 - 2 چاي پىيالىدىن كۈندىگە 1 - 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

182 - نۇسخە: مەلھىمى زەڭگار

تەركىبى: زەڭگار بىر ھەسسە، ئەنزۇرۇت، ئۇشەق يېرىم ھەسسەدىن، ھەسەل ئومۇمى دورىلار ۋەزنى بىلەن تەڭ. **تەييارلاش:** دورىلارنى سىركىدە ئىزىپ ئۇستىگە ھەسەلنى قۇيۇپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم دورا تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش مىقدارى: تاشقى تەرەپتىن ئىشلىتىشكە بېرىلىدۇ. قىزىتمىسى بارلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

183 - نۇسخە: مەتبۇخى سانا (سانا قايناتمىسى)

تەركىبى: سانا 4 مىسقال، شاتەرە 3 مىسقال، تەمرى ھىندى 2 مىسقال، ھېلىلە پوستى 3 مىسقال،

بخ كەبىر پوستى $\frac{1}{2}$ مىسقال، چىلان، سەرپىستان

15 دانىدىن، ئىت ئۇزۇمى، كاسىن ئۇرۇغى، قىزىل گۈل،
ئاق لەيلى 3 مىسقالدىن، تەرەنجىۋىل 15 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە
2 چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويۇپ يېرىمى قالغىچە قاي-
تىتىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، سىقىپ سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.
تەمچىش مىقدارى: پۈتۈن دورىنى 3 كە بولۇپ
ياكى بىراقلا ئىچىدۇ.

184 - نۇسخە: مەتبۇخى تەپتىمۇن II

تەركىۋى: سېرىق ھېلىلە، بەلىلە، كابىل ھېلىلىسى-
نىڭ پوستلىرى 14 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە 7 مىسقال،
ئامىلە 5 مىسقال، ئۈستۈخۇددۇس 5 مىسقال، بىيە قېقى
1 سەر، زىرىخ 4 سەر، قىزىل گۈل 5 مىسقال، ئاق
سەندەل 3 مىسقال، كاسىنى ئۇرۇغى بىر سەر، نىلۇفەر 4
مىسقال، گازىۋان 1 سەر، بادىرەنجىۋىيا 15 مىسقال،
تەپتىمۇن 2 سەر، بادام مېغىزى 4 سەر، سېرىق ئوت
ئۇرۇغى 1 سەر، سۈمبۇل 5 مىسقال، قەلەمپۇر 2 مىسقال،
شاتەرە 1 مىسقال، بىستىپايەج 4 مىسقال، ئوشنە 3 مىسقال،
خىيارى شەنبەر 1 سەر، تەرەنجىۋىل 4 سەر، سىركە 2 سەر،
شېكەر 16 سەر، لاچىندانە 3 مىسقال، بىدىمىشكى ئەرەقى،

گازىۋان ئەرەقى، بادىرەنجىبويىا ئەرەقى، دارچىن 2 مىس - قال، ئەينۇلا 4 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، سىركە ۋە ئەرەقلەرگە چىلاپ ئەتىسى 6 جىڭ سۇ بىلەن يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ شېكەرنى سېلىپ يەنە بىر قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ. قالغان ئۇسۇلى (20-نۇسخىدىكىدەك).
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 4 سەر، يېرىم ئىسسىق ھالدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

185 - نۇسخە: مەجۇنى بالادۇر II

تەركىمى: سۇمبۇل، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم، زەپەر، سەلخە، سازەنجى ھىندى، ئەپتىمۇن، ئىزخىر، ھەببى بىلەن سان، زىراۋەند، قەلەمپۇر، زەنجىۋىل، سەبەرە، مۇقىل ھەر بىرى 8 مىسقالدىن، بالادۇر ھەسسىلى ①، مەستىكى، غارىقۇن 5 مىسقالدىن، بېدىيان يىلتىزى 27 سەر، سىركە ئومۇمى دورا ۋەزىنىدىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: 29 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش.

يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ.

① بالادۇر ھەسسىلى: بالادۇرنى قىزىتىلغان ئامپۇر بىلەن قىسىپ تۇرۇپ ئېقىتىپ چىقارغان شىلىملىق سۈيى بولۇپ، زەھەرلىك تەسىرى كۈچلۈك، بەدەنگە تىگىپ كەتسە كويىدۇرىدۇ. تۇتۇنى بۇرۇنغا كىرىپ كەتسىمۇ زەھەرلەيدۇ. ئىشلەشتە بۇ نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش لازىم.

186 - ئۇسخە: تەرياقى فارۇق

تەركىمىۋى: مۇرى مەككى، راتيانەج، جاۋۇشەر
4 مىسقال (بۇلار يىلىم دورىلار بولغاچقا ئال-
دى بىلەن يېتەرلىك مىقداردىكى گۈلۈپ سۈيىدە ئېرىتىد-
لىدۇ). دارچىن ئەرەقى 4 مىسقال، مومىيا، ئەنەبەر، مەس-
تىكى، كۈندۈر، سەمغى ئەرەبى 2 مىسقال، بىلسان يېغى
10 مىسقال، تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، قىزىل ياقۇت، زۇم-
رەت، ھىقق، كەھربا، سۇنئى دىگىزىيا (ياداناتاش) 4
مىسقالدىن، لاجىۋەرد، ھەجەرى ئەرمنى (يۇيۇلغان)، پىلە
(قىزىلغان)، ھەبۇلغار، جېنىئىيانا، زىراۋەند تەۋىل، قۇستە
تەلخى، ئارپا بېدىيان يىلتىزى، ئەپتىمۇن، ئۇدى قىمارى،
پارپى (جەدۋار)، ئىزخىر، رەۋەن، سۇنبۇل، ياپچان، سې-
رىق ھېلىلە پوستى، ئۇستۇخۇددۇس، زەپەر، دۇرۇنەج
ئەقرەبى، ئۇدى سەلىب، ئاقىرقەرھ، رىسنىسالىۇس،
پوستى بىخ كەبىر، سازەنجى ھىندى، زورەنباد، غارىقۇن
بەرەنجا سەپ، بابونە ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، قىزىل
گۈل 60 مىسقال، ئىپار 2 مىسقال، ھەسەل پۇتۇن
دورىلار ۋەزنىدىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: يىلىم دورىلار ئەرەق بىلەن ئېرىتىد-

لىدۇ. مەدەن جىنىسلىق دورىلار سالاھىيە قىلىنىدۇ. زەپەر، ئىپار، قۇندۇز قەرى ئايرىم سوقۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، باشقا دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ھەسەلگە قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. چىنە ياكى سىرلانغان ساپال قاچىلارغا يېرىم كەلگىدەك قاچە - لىنىپ ئارپىغا 3 - 5 ھەپتە كۆمۈلسە تەييار بولىدۇ. ئىشلىتىلىشى: 1 - 2 مىسقالغا قەدەر كۈنىگە بىر - ئىككى قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

187 - نۇسخە: تەرياقى گىلى مەختۇم

تەركىبى: گىلى مەختۇم، ھەبۇلغار بىر سەردىن، ھەسەل 6 سەر. تەييارلاش: دورىلارنى سېرىق ياغ بىلەن مايلاپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: بىر مىسقال قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ (قېتىم سانى تەۋپىنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە بەلگىلىنىدۇ).

188 - نۇسخە: تەرتاقى ئەرەبەئە

تەركىبى: زىراۋەند تەۋىل، ھەبۇلغار، مۇرمەككى باراۋەردىن، ھەسەل جەمئى ۋەزنىدىن 2 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
 يېمەش مىقدارى: بىر مىسقال قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ. (بۇ دورىنى تەييارلاپ 2 يىلغىچە ئىشلەتكىلى بولىدۇ).

189 - نۇسخە: تەرياق I

تەركىبى: ھەببى بىلسان، زۇفا، ياۋا چامغۇر ئۇرۇغى، ئاقمۇچ، قارىمۇچ، پىلىپىل، ئىگىر، رۇمبىدىيان، پەتەر سالىيۇن، ئاسارۇن، زىرە، بەڭگى دىۋانە (بەزۇ - رۇلبەنجى) 4 مىسقالدىن، سۇمبۇل، ئىزخىر 6 مىسقالدىن.
 تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، 3 باراۋەر ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
 يېمەش مىقدارى: بىر مىسقالدىن ئەھۋالغا قاراپ بىر قانچە قېتىم بېرىلىدۇ.

190 - نۇسخە: تەرياق II

تەركىبى: سىيادان، ھازار ئىسپەند، زىرە 2 مىسقالدىن، جېنتىيانا، زىراۋەند بىر مىسقالدىن، ئاقمۇچ، مۇرى مەككى بىر يېرىم مىسقالدىن، ھەسەل 33 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
 يېمىش مىقدارى: پۇرچاق چوڭلىقىدا ئېلىپ رەيھان شەرىۋىتى بىلەن بېرىلىدۇ. قېتىم سانى زەھەرلىنىش ئالامەتلىرىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

191 - نۇسخە: مەجۇنى سوم (سامساق مەجۇنى)

تەركىۋى: ئاقلانغان سامساق 9 سەر، زەنجىۋىل، پىلىپىل، قارىمۇچ، قەلەمپۇر، دارچىن، كاۋاۋىچىن، جويۇز، ئاقىر قەرھا ۋە خولسەنجان 2 مىسقالدىن، زەپەر 1 مىسقال، گۈل يېغى 1 سەر.

تەييارلاش: سامساقنى سوقۇپ $1\frac{1}{2}$ 13 سەر كالا سۇ- تىدە تاكى سۇت سىڭىپ بولغىچە قاينىتىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن $1\frac{1}{2}$ 13 سەر ھەسەل بىلەن قايتا قىيام قىلىنىدۇ. قىيام بولغاندىن كېيىن قازاننى ئېلىپ گۈل يېغى ئېلىش- تۇرۇلىدۇ. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈ- زۇپ ئۆستىگە سېلىپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: زەھەرلىك ھاشارەتلەر چاققاندا 2 - 3 مىسقالدىن كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بىر قانچە قېتىم بېرىلىدۇ. مەئىدىنى، جىگەرنى ۋە باھنى كۈچلەندۈ- رۈشكە بېرىلگەندە 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

192 - نۇسخە: تەرياقى سەرتان

تەركمۇي: كويدۇرۇلگەن سەرتان ① بىر سەر، كۇندۇر،
جېنتىيانا 5 مىسقالدىن، ھەسەل 4 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: بىرىنچى قېتىم بىر مىسقال،
2 - قېتىم 2 مىسقالدىن، كېيىنچە ئاشۇرۇپ كۈنگە
4 مىسقالغا يەتكۈزۈلىدۇ.

193 - نۇسخە: ھەببى مۇقەۋۋى باھ

تەركمۇي: بەسباسە، قەلەمپۇر، زەپەر، موچىرەس،
ئاق شېكەر 2 مىسقالدىن، كۇمۇش كۇشتىسى $2\frac{1}{2}$ مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ نۇقۇت چىڭلۇغىدا
ھەب تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 3 - 5 دانىدىن كۈنگە بىر
قېتىم بېرىلىدۇ.

① سەرتاننى كويدۇرۇش ئۇسۇلى ئوپكە سىل كېسىلىدە
كورستىلگەن.

194 - نۇسخە: ھەببى ئىمساك

تەرگەۋى: جويۇز، كەتىرا، شاقاقۇل، تانكار
(دانىكا) 4 مىسقال، سىر 2 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ سۇ بىلەن ماش
چوڭلۇغىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.
پىيىش مىقدارى: تاماقتىن ئىلگىرى كۈنگە بىر
قېتىم بېرىلىدۇ.

(تەشئالىق پەيدا بولۇپ، بىرەر ئۆزگىرىش بولسا
سۇت ئىچكۈزۈش كېرەك، مەنى بالدۇر كېلىشىنى داۋا -
لاشتا ئۇنۇملۇك دورا).

195 - نۇسخە: مەجۇنى ئازاراقى

تەرگەۋى: سۇغا، سۈتكە چېلاپ تىلى ئېلىنغان
كۈچۇلا 6 مىسقال، زورەنباد، ئۇستۇخۇددۇس، كەتىرا،
نارجىل (نارىيل)، چەلغوزە مېغىزى، شاقاقۇل 3 مىسقالدىن،
لاچىندانە 2 مىسقال، ئاق سەندەل، قەلەمپۇر بىر مىسقال،
شاكالسىز ئامىلە، قارا ھېلىلە 5 مىسقالدىن، ھەسەل
دورىلار ۋەزىندىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى ئېرىتىپ قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
ئەشلىتىلىشى: پەي، گۈشلەرنى چىگىتىش، پالەچ،

لەقۇۋا، ئىرقۇننىسا، بەل ئاغرىغى، جىنىسى ئاجىزلىق، سۇيدۇك تامچىلاپ كېلىشلەرنى ۋە ئىسپۇن خۇمارىنى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

مىقدارى: 12 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىلمەيدۇ.

چوڭلارغا كۈنىگە $\frac{1}{2}$ مىسقال بىر قېتىم بېرىلىدۇ. مىقدارى

ئارتۇق بولۇپ كەتسە زەھەرلەيدۇ. ئىشلىتىشتە تېۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن ئىستىمال قىلىنىشى لازىم.

كۈچۈلىنى مۇدەببەر (زەھەرسىز) قىلىش ئۇسۇلى:

ئالدى بىلەن كۈچۈلىنى 3 كۈن قىزىق سۇغا چىلاپ تۇرۇپ پىچاق بىلەن ئۈستىدىكى بىر قات تۈكلەش قەۋىتى قىرىپ تاشلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن كۈچۈلا چۆك-كىدەك سۈتكە 7 كۈن چىلاپ قويغاندىن كېيىن ئېلىپ، ئىسسىق سۇ بىلەن بىر قالچە قېتىم يۇيۇپ تازىلىنىدۇ (سۈتكە چىلىغاندا سۇت ئۇيۇپ قالىدۇ. ئەگەر كۈچۈلا چۆكمەي قالسا ئۈستىگە يەنە سۇت قۇيۇپ قويۇش كېرەك). ئۇندىن كېيىن پىچاق بىلەن كۈچۈلىنىڭ قىرىدىن بويلاپ يالپاقلاپ كېسىلگەندە ئوتتۇرىسىدىن ئاق "تىلى" يەنى زەھىرى چىقىدۇ. ئۇ ئېلىپ تاشلىنىدۇ ۋە ئوتقا سېلىپ كۆيدۈرۈۋېتىلىدۇ (چۈنكى بۇنى ھەر قانداق جانلىقلار يەپ سالسا دەرھال ئۆلىدۇ)، تەييار بولغان كۈچۈلا ئاپ-

تاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. سوقۇشقا ئوڭاي بولسۇن ئۇچۇن
ئىكەكلەپ قويۇلىدۇ.

كۈچۈلىنى زەھەرسىزلەندۈرۈشنىڭ يەنە بىر ئۇسۇلى:
كۈچۈلىنى 2 - 3 كۈن سۇغا چىلاپ ئۇستىدىكى پوستىنى
قىرىپ تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ئىكەك بىلەن يۇمشاق
ئىكەپ قېلىنراق رەختىن ياسالغان خالتىغا ئېلىپ كالا
سۈتىگە سېلىپ قاينىتىلىدۇ. خالتا قازان تىگىگە تەگ-
مەسلىك ھالىتى بىلەن ئېسىپ قويۇلىدۇ. 2 - 3 سائەت
قاينىتىپ ئېلىپ سايىدا قۇرۇتۇپ كېرەكلىك مىقداردا
ئېلىپ سوقۇپ دورىغا قوشۇلىدۇ (كۈچۈلا مۇدەببەر قىلىش-
نىڭ باشقا چارىلىرىمۇ بار ئەمما ئانچە ئۈنۈملۈك ئەمەس).

196 - نۇسخە: ھەبىي تازاراقى I

تەركىبى: قارىمۇچ، پىلىپىل، زەنجىۋىل، قەلەمپۇر،
جويۇز، بەسباسە بىر ھەسسىدىن، كۈچۈلا (مۇدەببەر قىلىن-
غىنى) 2 ھەسسىە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل ياكى بېدىيان ئەرەقى بىلەن خېمىر
قىلىپ 2 دانە قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كۇمۇلاچلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى ۋە مىقدارى: ئىشلىتىلىشى 195 -
نۇسخىغا ئوخشاش. كۈلىكە بىر قېتىم 5 - 7 دانىدىن
بىرىلىدۇ.

197 - نۇسخە: ھەبىي ئازاراقى II

تەركىۋى: قارىمۇچ، مۇدەببەر قىلىنغان كۇچۇلا
ھەر بىرى بىر سەردىن، پارپى بىر مىسقال، سەمەمى
ئەرەبى 2 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئوتكۇزۇپ بېدىيان ئەرەقى بىلەن قارىمۇچ چىڭلىغۇدا
ھەب تەييارلىنىدۇ.

ئىشلەتمەسلىكى ۋە مىقدارى: مەنى تۇتالماسلىق،
تامچىلاپ سىيىش، پالەچ، لەقۋا ۋە ھول سوغاقتىن
بولغان ئاجىزلىقلارغا كۈنگە بىر قېتىم، 5 - 7 دانىدىن
بېرىلىدۇ. 12 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىلمەيدۇ.

198 - نۇسخە: مەجۇنى قەمبەل

تەركىۋى: قەمبەل، سېرىق ھېلىلە پوستى، شاكال-
سىز ئامىلە، توربۇت، زەنجىۋىل، دەرەنە تۈركى باراۋەر
مىقداردا، ھەسەل دورىلار ۋەزنىدىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئوتكۇزۇپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

ئىشلەتمەسلىكى مىقدارى: ھەر خىلدىكى ئۇچەي مەددە
قۇرۇتلىرىنى چۈشۈرۈشكە:

12 ياشتىن يۇقۇرىلار بىر مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە،

12 ياشتىن 5 ياشقىچە $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن $\frac{1}{7}$ 2

فۇڭغىچە.

5 ياشتىن توۋەنلەرگە $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن $\frac{1}{2}$ 2 فۇڭغىچە.

(2 ياشتىن توۋەنلەرگە بېرىلمەيدۇ).

دېققەت: دورا ئىچكەندە كېسەلنىڭ بۇرنىنى توساپ قويۇش (دورنىڭ پۇرۇغى بۇرنىغا كىرمەسلىكى) كېرەك. شۇنىڭدەك دورا ئىچىۋاتقاندا ياغلىق دورىلار مەنىنى قىلىنىدۇ.

199 - نۇسخە: سۇپۇپى سۇزاك (سوزنەك تالقىنى 1)

تەركىبى: كاۋاۋىچىن 5 مىسقال، قەلەي كۈش - تىسى 20 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى 25 مىسقال شېكەر قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالغان تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كونا سىزلام (سوزنەك) كېسلىگە

كۈندە سەھەردە 3 مىسقالنى بىر سەر قېتىق بىلەن بېرىلىدۇ.

200 - نۇسخە: سۇيۇپى سۇزاك II (سوزنەك تالقىنى 2-)

تەركىۋى: شورا، قاقىلە ئۇرۇغى باراۋەر مىقداردا.
تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: يېڭى سىزلام كېسىلىدە 2 مىس-
قالنى كۈنىگە بىر قېتىم (ئەتىگەندە) قايناقسۇ ياكى
قىزىل گۈرۈچ سۈيى بىلەن (ئۇدا 3 كۈن) بېرىلىدۇ.
يىرىك ئېقىۋاتقان سىزلاملارغا 3 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

201 - نۇسخە: لۇبۇپى كەبەر II

تەركىۋى: پىستە مېغىزى، پىندۇق مېغىزى، بادام
مېغىزى، ياڭاق مېغىزى، ھەببە تۇلخۇزرا، چىلغوزە مېغىزى،
ھەببى زەلەم، ماھى رۇبىيان، خولىنجان، شاقاقۇل، قىزىل
بەھمەن، ئاق بەھمەن، سېرىق تۇدرى، قىزىل تۇدرى،
زەنجىۋىل، ئاقلاڭغان كۈنجۈت، دارچىن 5 مىسقالدىن،
سۈمبۇل، سەئىدى كۈپى، قەلەمپۇر، كاۋاۋىچىن، ھەببى
قۇلقۇل، سەۋزە ئۇرۇغى، چامغۇر، پىياز، لوبۇ، بىدە تۇ-
رۇغى، ھەلىيۇن ئۇرۇغى، ئەرمۇدۇن ئۇرۇغى، دۇرۇنەج
ئەقرەبى، زورەنبا 3 مىسقالدىن، يويۇز، بەسباسە، داۋالە،
پىلپىل 2 مىسقالدىن، سوتلەپ مىسىرى، نارچىل، قۇش-

قاچ مىڭسى، كوكنار ئۇرۇغى 2 مىسقال، ئىسكەكلەنگەن بۇقا چۇيىسى، سۈرۈنجان، بوزىدان، يالپۇز 4 مىسقالدىن، تۈگە بوتلىغىنىڭ ئوغۇز سۈتى، زەپەر، مەستەكى

3 مىسال، ئۇدى خام $2\frac{1}{2}$ مىسقال، ئەنەبەر بىر مىسقال.

ئىپار يېرىم مىسقال، ئالتۇن ۋەرەق 30 دانە، كۇمۇش ۋەرەق 50 دانە. ھەسەل پۇتۇن دورىلار ۋەزنى بىلەن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئالدى بىلەن زەپەر، ئىپار، ئەنەبەرلەرنى سالايە قىلىپ، ھەسەلنى قائىدە بويىچە ئىپرىتىپ، ئىپلىشتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن تەييارلانغان تالقان دورىلارنى قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: ساقلاش ۋە ئىستىمال قىلىش 171 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش.

202 - نۇسخە: ھەبىي شەبىيار

تەركىمى: سەبرى سۇ قوتىرى، 3 مىسقال، قىزىل گۈل، سېرىق ھېلىلە پوستى، مەستىكى، تۇربۇت بىر مىسقالدىن، سوقمۇنىيا يېرىم مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كومۇلاچ قىلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاخشىمى 7 - 9 دا -
ئىدىن قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

203 - نۇسخە: ھەبىي تەنكار

تەرگىۋى: سەبىرى سوقۇتسىرى 16 مىسقال، قى -
دىمۇچ 12 مىسقال، تانكار 2 مىسقال، ئاق مىگىدۋانە
ئۇرۇغى 1 مىسقال 5 فۇك.

ياسىلىشى: سوقۇپ، نوقۇت چوڭلۇغىدا ھەب
ياسىلىدۇ.

تېشلىتىلىشى: مەندە ئاغرىغىغا، قوساق كۆپكەنگە،
ئېغىر ئاغرىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دورا يەل ھەيدەش
ئۈچۈن 3 دانىدىن بېرىلىدۇ. ئارتۇغراق بېرىلسە ئىچىنى
يۇمشىتىدۇ. ھەمىشە يەپ بەرسە يەلنى قويمايدۇ.

维吾尔民医手册

吐尔地·买买提编写

(维吾尔文)

新疆人民出版社出版

新疆新华书店发行

新疆新华印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：31 插页：4

1977年12月第1版 1977年12月第1次印刷

统一书号：M14098·23 定价：1.73元

Altunqin

